

100125489




AMNH LIBRARY

497/1  
99

FOR THE PEOPLE  
FOR EDVCATION  
FOR SCIENCE

LIBRARY  
OF  
THE AMERICAN MUSEUM  
OF  
NATURAL HISTORY







# NEUE DENKSCHRIFTEN

DER

ALLG. SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT

FÜR DIE

gesamten Naturwissenschaften.

---

## NOUVEAUX MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

DES

SCIENCES NATURELLES.

~~~~~  
Band III. mit XXVII Tafeln.  
~~~~~

NEUCHÂTEL,

*Auf Kosten der Gesellschaft.*

IN DER BUCHDRUCKEREI VON PETITPIERRE.

---

1839.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

# REGISTER.

T. III

8 14 f. 14 f.

- Erläuterung der Ansichten einiger Contact-Verhältnisse zwischen  
krystallinen Feldspathgesteinen und Kalk, im Berner-  
Oberlande, von A. Escher von der Linth. . . . . 1 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Bog. mit 2 Taf.
- Geologische Beschreibung von Mittel-Bündten, von A. Escher  
und B. Studer. . . . . 27 B. mit 5 Taf.
- Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, première partie,  
par L. Agassiz. . . . . 13 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Feuilles avec 14  
planches.
- Die Pflanzen Graubündens. Ein Verzeichniss der bisher in Grau-  
bünden gefundenen Pflanzen, mit Berücksichtigung ihres  
Vorkommens, von Alex. Moritzi (Die Gefässpflanzen). . . 20 B. mit 6 Taf.

(13 1/4 ab 1/4 20 20)

6 1/2

7



191 - 1

506494)B  
7

# ERLÄUTERUNG

DER ANSICHTEN EINIGER CONTACT-VERHÄLTNISSE

ZWISCHEN

## KRYSTALLINISCHEN FELDSPATHGESTEINEN UND KALK

im Berner Oberlande.

VON

ARN. ESCHER VON DER LINTH.

Band III. 1839. 62½ Bog. 27 Taf.

Escher v. d. L., A. Contactverhältnisse zwischen Feldspathgestein und Kalk.

Escher v. d. L., A. und Studer, B. Geologie von Mittelländern.

Agassiz, L. Echinodermes fossiles de la Suisse. 1<sup>re</sup> partie. Spatangoides.

Moritz, A. Gefässpflanzen Graubündens.

1844

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CRISTIANI, J. J. 1844

in the

of the

# ERLÄUTERUNG

DER ANSICHTEN EINIGER CONTACT-VERHÄLTNISSE ZWISCHEN KRYSTALLINISCHEN  
FELDSPATHGESTEINEN UND KALK IM BERNER OBERLANDE.

---

Im August 1836 besuchten Herr Professor Studer und ich das Berner-Oberland, hauptsächlich in der Absicht, die so merkwürdigen, von Herrn Professor Hugi zuerst beobachteten, Lagerungsverhältnisse an der südlichen Grenze des Kalkgebirgs, zwischen den Thälern von Lauterbrunnen und Gadmen nochmals genauer zu untersuchen.

Die Ergebnisse dieser Reise stimmen im Wesentlichen vollkommen mit den Beobachtungen überein, welche Herr Prof. Studer bereits im *Bulletin de la soc. géolog.* T. II. und in Leonhard's Jahrbuch 1836, bekannt gemacht hat.

## 1. ANSICHT DER JUNGFRAU.

Die beiliegende Skizze (Taf. II, Fig. 1) zeigt im Vorgrunde, in der Gegend der Stufisteinalp, das normale Verhältniss der Gebirgsarten. In der Tiefe herrscht der Gneisgranit mit allgemein steilem südlichem Einfallen; unmittelbar darauf liegen die in dieser Gegend sehr vollständig entwickelten Zwischenbildungen Studer's (*Geologie der westlichen Alpen*, p. 187). Sie stellen sich hier dar als Bruchstücke einer gewölbartigen Biegung, deren nördlich einfallender Schenkel von Hochgebirgskalkstein (*Untere Kalkmasse der Nordseite Studer, Lias Hugi, Niederschläge zweiter Art Lusser*)

überlagert wird, und welche, gleich diesem, in der Nähe der Grenze steil nordwestlich einfallen, dann aber, thalaufwärts, durch allmähliche Verflachung, in fast horizontale Lagerung übergehen. In der Höhe zeigt sich, an den Abhängen des Roththales, unzweifelhaft eine Umbiegung und Auflagerung der Gneismasse auf den Kalkstein, und zwar stehen die Gneismassen der Tiefe und der Höhe in so unmittelbarem Zusammenhange, dass sie als Ein zusammengehöriges Ganzes und als Eine gleichzeitige Bildung betrachtet werden müssen.

Aus der genauen Untersuchung der nordwestlichen Abstürze der Jungfrau geht ferner mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass die Massen von Gneisgranit, welche den Gipfel dieses Gebirgsstockes bilden, nicht nur auf dem, der tieferen Jura- und Lias-Epoche angehörenden, Hochgebirgskalkstein aufliegen, sondern auch auf Gesteinen, die wohl der Kreide beizuzählen sind.

In der That zeigt sich an den nördlichen Gehängen der Jungfrau über dem Hochgebirgskalkstein, in grosser Mächtigkeit, ein graulicher, feinkörniger, oft kalkiger, oft quarziger Sandstein und Sandsteinschiefer, mit eisenschüssig bräunlich und grünlich verwitternder Oberfläche, aus welchem der im Berner Museum aufbewahrte *Clypeaster Boüei* Goldfuss her stammt. Obgleich wir, auf mehreren Excursionen zum *Rothten Brett*, nicht so glücklich waren, charakteristische Petrefakten in dieser Bildung aufzufinden, so überzeugten wir uns doch, von der vollständigen Aehnlichkeit dieser Sandsteine mit denjenigen der höchsten Titliskette, in welchen sich auf der Gadmenfluh, westlich über der Engstlen-Alp, folgende Petrefakten finden :

*Nummulites elegans* Sow. bis 9 millim. im Durchmesser, gewöhnlich kleiner.

*Melania costellata* Lam.? Länge 48 millim., Breite der letzten Windung 12 millim., die Windungen gewölbt, mit Längenrippen.

*Cerithium Diaboli*? Brong. Zu schlecht erhalten, um mit Sicherheit bestimmt werden zu können, aber in den noch erhaltenen Theilen alle Charaktere der citirten Species zeigend.



*Ampullaria*? grosse, sehr dicke Art, scheint identisch mit derjenigen der Diablerets.

*Cardium productum* Sow., sehr ähnlich der Species von der Gosau, abgebildet im *Geol. Trans.* II.

*Cardium*, weniger gewölbt als das vorhergehende, kreisförmig, gleichseitig.

*Astarte*? ähnlich der *A. nitida* Sow., mit sehr deutlichen und enge gedrängten Wachsthumringen.

*Pholas*? sehr gewölbte, ungefähr cylindrische Muschel, mit sehr feinen Längestreifen; die Grenze beider Schalen wenig deutlich; das Innere dieser Cylinder ist mit grobem Sande angefüllt oder mit Kalkspath, dessen Krystallaxe derjenigen des Cylinders parallel liegt. Länge 2—3 Zoll; Dicke sieben Linien.

*Turbinolia*, sehr ähnlich der Species, die ziemlich häufig in der Kreide der westlichen Alpen gefunden wird.

*Lithodendron granulosum* Goldf. scheint nicht verschieden von der citirten Species, die, unter ähnlichen Verhältnissen, in der Abtenau vorkommt.

Die Analogie dieser Bildungen wird noch dadurch erhöht, dass, wie an den Diablerets, sowohl am Rothen Brett, als auf der Gadmenfluh, die tiefsten Schichten dieses Sandsteins kohlenhaltig sind.

Diese Sandsteinbildung des Rothen Bretts, bildet allem Anschein nach, auch die Kuppe des Silberhorns, und setzt südlich fort bis unter die Feldspathgesteine der Jungfrau. Wenn daher künftige Beobachtungen noch bestimmt nachweisen sollten, dass dieselbe vielleicht der Kreideepoche angehöre, so hätten wir auch hier, wie an anderen Stellen in den Alpen, namentlich in Graubündten, einen sehr deutlichen Beleg, dass schieferige und körnige Feldspathgesteine sich über die alpinischen Kreidebildungen weg erstrecken.

Noch ist eine Erscheinung, an der Grenze zwischen diesen Sandsteinen und dem unterliegenden Hochgebirgskalkstein, sehr bemerkens-

werth. Die obersten Schichten, des letzteren nämlich, sind, in nicht unbedeutender Mächtigkeit, ausgezeichnet, durch bunte Farben und fein krystallinische Structur. Mit ihnen finden sich rothe und grüne Schiefer, die oft dünne Kalklagen der angegebenen Beschaffenheit umschliessen, und häufig werden diese Schiefer so talkig und krystallinisch, dass sie als wahre Talkschiefer erscheinen; es sind Gesteine, die mit dem italienischen Galestro vollkommen übereinstimmen.

Das Auftreten dieses, offenbar durch Umwandlung entstandenen Galestro an der oberen Grenze der alpinischen Jurabildungen, ist nicht auf den Nordabhang der Jungfrau beschränkt, sondern eine in den Alpen weit verbreitete Erscheinung. Herr Prof. Studer hat sie auch auf den westlichen Höhen des hinteren Lauterbrunnen-Thales, ferner am Oeschinen-See und am Gemmipasse, oberhalb Kandersteg, und sogar in den von der Central-Kette entfernten Gebirgen der Simme- und Saanenthäler und der Stockhornkette nachgewiesen.

## **2. ANSICHT DES WETTERHORNS UND DES METTENBERGS VON DER WESTSEITE.**

Ganz ausgezeichnet zeigt sich die Auflagerung des Feldspathgesteins auf den Kalkstein, am Nordende der Schreckhorn- und Wetterhorn-Ketten. (Taf. I, Fig. 1.)

Zur genaueren Untersuchung der Contactverhältnisse verfolgten wir, von Grindelwald aus, den Weg nach dem Eismeere, der sich zwischen den westlichen Abstürzen des Mettenbergs und dem unteren Grindelwald-Gletscher ins innere Hochgebirge hinein zieht.

In nicht grosser Entfernung vom Anfange des Eismeersee findet, an der steilen Wand des Mettenberges, die Scheidung zwischen dem Kalksteine und dem Gneisgranite statt. Die Scheidelinie steigt wohl über 1000' hoch, fast senkrecht, oder nur wenig sich gegen Nord zubiegend, in die Höhe; die angrenzenden Schichten des Kalks folgen ziemlich genau derselben Richtung, während sie, am nördlichen Ende des Berges, in der Nähe von

Grindelwald, fast horizontal liegen. Die Verbindung zwischen jenen verticalen und diesen horizontalen Schichten wurde uns nicht klar. Das Feldspathgestein ist ein unregelmässiger flasriger Gneis, dessen Schieferungsflächen, so viel sich beobachten lässt, ebenfalls der Grenze parallel laufen; die Grenze selbst ist scharf, und es findet kein Verfliessen des Gneises in den Kalkstein statt. Der Kalkstein, zunächst dem Gneise, ist schwärzlich grau, dicht, von muschlichem Bruche; einige Fuss von der Grenze entfernt, ist er mehr schieferig, und seine Farbe etwas heller; noch weiter folgt dunkler späthig körniger Kalkstein, mit vielen beigemengten, an der verwitterten Oberfläche ausragenden Quarzkörnern und undeutlichen Bruchstücken von Petrefakten, unter denen wahrscheinlich Stielstücke von Pentacriniten vorkommen. Es stimmt dieser Kalk überein mit einer der Zwischenbildungen auf Stufistein. Noch weiter nördlich herrscht dann bis Grindelwald der eigentliche Hochgebirgskalkstein.

Indem wir die Grenze der Feldspathgesteine, den steilen Westabsturz des Mettenbergs aufwärts, verfolgten, fanden wir, in bedeutender Höhe über dem Gletscher, den Gneis auf eine kleine Strecke keilförmig in den Kalkstein eingedrungen. Dieser ist, zunächst an der Grenze, hellfarbig, fein salinisch körnig und glasartig klingend; der Gneis des Keils aber zeichnet sich durch Armuth an Feldspath aus, und ist wohl eher ein feinkörniger Talk und Glimmer haltender Quarzitschiefer zu nennen. Von manchen compacten Abänderungen des Sandsteins an der oberen Grenze der alpinischen Jura-bildungen ist dieser Quarzit durchaus nicht zu unterscheiden. Auch Talk-schiefer wechselt hier mit demselben.

Am oberen Ende der steilen Grashalde, über die wir hinaufgestiegen, liegt der Kalk horizontal; auf ihm, in gleicher Lagerung, Quarzit und Talk-schiefer, dann wieder, bei 20' mächtig, Kalkstein mit schieferiger Absonderung, innig verwachsen mit Quarzit, der sich theils in Nester aussondert, theils wieder Kalknester umschliesst. Man sieht diese Lagerfolge sehr weit südlich gegen das kleine Schreckhorn fortsetzen, wohl 2000 Fuss hoch von Granitgneis überlagert. Ueber dieser Kalkfolge geht der Quarzit nach

und nach in wahren granitischen Gneis über, der, in der Nähe des Kalks, noch horizontale Ablosungen zeigt, in grösserer Höhe aber steil SO fallende Absonderungen annimmt, die, weiter südlich, und in den oberen Gipfeln, in das allgemein herrschende, steil südliche Fallen übergehn. Schon in beträchtlicher Höhe sieht man in diesem Gneisgranit noch einzelne grössere Kalknester, ausgezeichnet durch eine gelbliche, staubige, dolomitische Aussenfläche, im Innern blaulich und dicht, ähnlich dem dolomitischen Kalkstein der Zwischenbildungen. Längs der schroffen Abstürze des aufliegenden Granitgneises kletterten wir gegen die vorderen Köpfe des Mettenbergs hinab. Diese bestehen, zunächst an der unteren Grenze des Gneisgranits, der sich, wohl über eine halbe Stunde weit, vom kleinen Schreckhorn bis hierher erstreckt, nicht aus Hochgebirgskalk, sondern aus den Zwischenbildungen, die sonst in seiner Unterlage vorkommen. Es ist, theils an der Oberfläche gelblicher, im Innern dichter und hellblauer Dolomit; theils fast schwarzer, Quarzkörner einschliessender, späthiger Kalkstein, mit vielen Bruchstücken meist undeutlicher Petrefakten, unter denen sich jedoch Belemniten erkennen lassen; theils endlich dunkler, etwas talkiger, häufig ganz in Eisenrothenstein übergehender Schiefer. In diesen eisenführenden Schichten bemerkt man auch schöne breccienartige Kalksteine; sie bestehen aus meist rundlichen Stücken eines feinkörnig eisenrothen Kalksteins, die durch eine grauliche feinkörnige Kalkmasse verbunden sind. Die zahlreichen unregelmässigen Ablosungen und Kluftflächen dieses Gesteins sind talkartig schimmernd.

Die nämliche Ueberlagerung des Hochgebirgskalksteins durch die Glieder der Zwischenbildungen sieht man deutlich auch an den Westabstürzen des Wetterhorns, und, wie sich in der Folge zeigen wird, finden sich ähnliche Verhältnisse noch weiter östlich am Stellihorn.

Bei der Betrachtung dieser verkehrten Ordnung wirft sich daher die Frage auf, ob dieselbe wohl eine ursprüngliche sei, d. h. ob sich die Bildung dieser Gebirgsglieder wirklich in verschiedenen Höhen wiederholt habe; oder, ob diese scheinbare Wiederholung, diese Ueberlagerung des Hoch-

gebirgskalksteins durch die Zwischenbildungen, nicht vielmehr eine Folge von Umbiegung und völligem Ueberkippen sei, so dass, was jetzt zu oberst liegt, ursprünglich das tiefste war. Die zahlreichen ganz deutlichen Fälle solcher Umbiegungen der Schichten, z. B. an der Hunnenfluh am Ausgange des Lauterbrunnen-Thales, sowie die Identität der Petrefakten an allen Stellen, wo diese Gesteine vorkommen, sprechen für die letztere Annahme; auch Herr Dr. Lusser, der, an der Windgelle, ähnliche Wiederholungen dieser Gesteine genau verfolgt hat, hält sich von der Richtigkeit der letzteren Erklärung überzeugt.

An den westlichen Abstürzen des Wetterhorns zeigt sich, ausser der Ueberlagerung des Hochgebirgskalksteins durch die Zwischenbildungen, auch deutlich die Bedeckung sämtlicher Kalkgebilde durch Feldspathgesteine, nur nicht in so grosser Ausdehnung wie am Mettenberge; und auch am östlichen Absturze des Eigers, oder vielmehr seiner Fortsetzung gegen die Jungfrau hin, lassen sich, obgleich noch weniger deutlich, die nämlichen Erscheinungen beobachten.

### 5. STELLIHORN.

Steigt man, aus dem weiten Boden des Urbachthales, durch die Gürmschli-Alp, gegen die Laucherli-Hütte hinauf, so befindet man sich stets in der Nähe der Grenze zwischen Kalkstein und Gneis, die wahrscheinlich senkrecht ist, wegen der Vegetation aber nicht näher untersucht werden kann. In bedeutender Höhe über dem Thalgrunde bei einer, krystallhell aus den fast senkrechten Gneisschichten hervortretenden Quelle, findet man ein schwaches Lager von weissem körnigem Kalkstein, begleitet von ächtem Glimmerschiefer, der mehrfach mit schwarzem Thonschiefer wechselt und auch in denselben übergeht. Diese Gesteine bilden eine Einlagerung in deutlich ausgebildeten Gneis, und ähnliche, von der Hauptmasse losgetrennte, von Gneis umhüllte Kalknester wiederholen sich noch öfters am steilen Pfade, der zu der Laucherli-Hütte führt. — Bei dieser angelangt,

wird Jeder, der diesen Punkt zum ersten Male besucht, aufs höchste überrascht sein, durch die Ansicht von vier granitartigen 10—50' mächtigen Lagern, welche sich von der Hauptmasse des Gneises des Tossenhorns, wohl eine Viertelstunde weit, östlich in die Kalkmasse des Stellihorns hinein ziehn (Taf. II, Fig. 2).

Das Gestein dieser Keile ist ein unreiner Granit, oft, durch schiefrige Textur, dem Gneise sich annähernd, oft, durch Abnahme des Feldspaths, in Quarzit übergehend. Die Grenze gegen den Kalkstein ist gewöhnlich sehr scharf, so dass man mit der Hand beide Gesteine bedeckt; bei genauerer Betrachtung erkennt man indess oft auch hier wieder ein gegenseitiges Verwachsen, so dass Nester des einen Gesteins isolirt im anderen eingeschlossen sind. Der Kalkstein ist, theils dolomitisch, äusserlich gelb bestaubt; theils buntfarbig und krystallinisch; theils durch Eisenoxyd geröthet; häufig zeigen sich in ihm dünne Lagen von buntem, glänzendem Thonschiefer, die auch in dem Quarzitgneise nicht fehlen. An der felsigen Kante, welche die Laucherli- von der Gummalp scheidet, fanden wir auch häufige Trümmer von, mit dichtem, buntem Kalk verwachsenem Eisenrognstein, welche eine grosse Menge Belemniten, zum Theil drei Zoll lang, so wie auch verschiedene Ammoniten, worunter ein *Ammonites colubratu*s Zieten, von wenigstens 8" Durchmesser, enthalten. Diese Trümmer müssen von den tieferen Abstürzen des Stellihorns abstammen.

Von der Laucherli-Hütte aus ziehn aber, nicht bloss die so eben beschriebenen Verhältnisse, sondern auch die dunkeln Felsen des noch 2—3000' hoch sich aufthürmenden Gipfels des Stellihorns die Blicke auf sich. Die Aelpler versicherten, dieser Gipfel bestehe aus Geissberger (Gneis und Granit), und ihre Aussage bestätigte sich vollkommen. Aus der Gummalp steigt man sehr steil über abgebrochene, sanft südöstlich einfallende Schichten von Hochgebirgskalkstein, meist hellgrau, schieferig und glasartig klingend, auf den höchsten, nur wenige Fuss breiten Grat des Gebirgskamms. In der Nähe des Gipfels findet man nun, wie auf dem Mettenberge, über dem Hochgebirgskalkstein, nebst anderen Abänderungen

der Zwischenbildungen auch Lager von Eisenrognstein, die, in einer Meereshöhe von ungefähr 8700', nebst Ammoniten, Belemniten, Terebrateln, auch *Pholadomya ambigua* und *Pholadomya ovalis* Sow. einschliessen. Auf diesen Gesteinen ruht, als oberstes Gestein des Stellihorns, bei 100' mächtig, eine, in viele schroffe Zacken zertheilte Masse verwitterten, quarzitartigen Gneises, völlig isolirt und überall von grausen Abstürzen umgeben, so dass jeder Schritt die grösste Vorsicht erheischt. Bei der schon sehr vorgerückten Tageszeit und bedroht von einem Hagelwetter war es uns unmöglich, sie in ihrer ganzen Ausdehnung zu untersuchen.

Auf dem Urbach-Sattel, am südlichen Fusse des Stellihorns, ist die Grenze zwischen dem Kalkstein des letzteren und der Gneismasse des Tossenhorns, die sich hier unter das erstere hineinzieht, ebenfalls sehr schön entblösst. Auf dem Sattel selbst herrscht granitischer Gneis und Glimmerschiefer, mit steilem südöstlichem Einfallen, wie am Tossenhorn; unmittelbar auf diese Gesteine folgt, deutlich vom Gneise getrennt, und nördlich fallend, wie oberhalb Stufistein, ein mehrere Fuss starkes Lager von Arkose-Sandstein, der nur eine Abänderung des früher erwähnten Quarzits zu sein scheint; über diesem, ebenfalls nördlich fallend, schwarzer Kalkstein mit sehr vielen eingeschlossenen Quarzkörnern und rauher, zum Theil röthlicher, zum Theil bräunlicher Aussenfläche. Diese Schichten enthalten Belemniten und Gliederstücke von *Pentacrinus scalaris*? Goldf.

Die hier allgemein nördlich fallende Kalkbildung setzt dann, mit gleicher Einsenkung, unter dem höheren Rosenlaigletscher durch, an den Abhang des Wellhorns fort, wo sie mit ungefähr 45° gegen den Horizont einzufallen scheint.

#### 4. LAUBSTOCK UND PFAFFENKOPF.

Ungleich viel grösser, als die Kalkkeile des Stellihorns, sind die von Herrn Hugi ausführlich beschriebenen des Laubstocks und Pfaffenkopfs (Taf. I,

Fig. 2), an der Vereinigung der Thäler von Urbach, Guttannen und Gadmen. Eine allgemeinere Ansicht lässt dieselben deutlich als losgetrennte Stücke des Kalkgebirges erkennen, in welches Hasli im Grund und Meiringen eingeschnitten sind. An ihrem dem Grund zugekehrten Absturze ist ihre Mächtigkeit am grössten und beträgt wenigstens 1000 Fuss. Die Hauptmasse besteht aus hellgrauem, sehr feinkörnigem, bis dichtem Kalkstein, der mit dem Hochgebirgskalkstein vollkommen übereinstimmt und Belemniten enthält. Seine Schichten fallen sanft südlich in den Berg hinein, an anderen Stellen ist der Kalk mehr massig, dolomitisch, in schroffe Thürme zerspalten. Im Urbachthale setzt der Keil des Laubstocks, mit immer geringerer Mächtigkeit, eine starke Stunde weit südwärts fort, und erscheint zuletzt nur noch als ein wenig Fuss mächtiges Lager. Noch weiter südlich erscheinen, in der Fortsetzung des Keils, mehrere von Gneis ganz umschlossene Nester von weissem grobkörnigem Marmor.

Im Gadmenthale verliert sich der Kalkstein des Pfaffenkopfs schon ob Mühlthal, eine halbe Stunde über dem Thalauslaufe; leicht aber möchten die bekannten Nester von weissem Marmor, die, an der Schaftelen unterhalb Gadmen, in talkigem Glimmerschiefer eingeschlossen sind, als seine letzten, von der Hauptmasse getrennten, Spuren zu betrachten sein.

Auch im Thale von Guttannen lassen sich die beiden Keile beträchtlich weit thalaufwärts verfolgen. Das Feldspathgestein, welches diesen Kalkkeilen, theils zur Unterlage dient, theils sie in grosser Mächtigkeit bedeckt, und sich, an den Enden der Keile, in eine nicht zu trennende Masse vereinigt, ist vorwaltend grobflaseriger Gneis, dessen Ablosungen steil südlich in's Gebirge hineinfallen; am vorderen Ende des Laubstocks jedoch, in der Nähe der Hütten der oberen Laubalp, liegt das Gestein beinahe horizontal, der oberen Grenze des Kalksteins parallel und erscheint hier eher einem talkigen Glimmerschiefer, als wahren Gneise ähnlich.

---

Die Veränderungen, welche die Sedimentbildungen, in der Nähe der Feldspathgesteine, an den beschriebenen Punkten erlitten haben, stimmen



in hohem Grade überein mit denjenigen, welche Basalte und andere in feurigem Flusse an die Erdoberfläche getretene Felsarten auf die von ihnen durchbrochenen Sedimentgesteine ausgeübt haben. In beiden Fällen verlieren die Kalksteine in der Nähe der Grenze ihre dichte Structur und werden krystallinisch; der Kohlegehalt verschwindet; das Gestein wird weiss, oder bunt eisenfarbig. Auf diesen Analogie'n beruht wohl hauptsächlich die Ansicht, welche diesen Erscheinungen des Berner-Oberlandes eine den basaltischen ähnliche Entstehungsart zuschreibt. Gegen ein solches lavaartiges Ueberfliessen der schieferigen Feldspathgesteine, *nach* der Bildung des Sedimentgebirges, sprechen aber die allmählichen Uebergänge des Gneises in Quarzit und Glimmerschiefer, in der Nähe der Grenze, und die der Scheidungslinie parallelen, in Gneis eingeschlossenen Lagen von Sedimentgesteinen, welche sich noch in ihrer natürlichen Lage befinden. In noch höherem Grade sind aber wohl dieser Ansicht die Schieferungsflächen des Gneises ungünstig, indem diese, zufolge ihrer Wechsellagerung mit Petrefacten führenden Sedimentbildungen und Conglomeraten kaum für etwas anderes, als für wahre Schichtungsflächen anzusehen sein dürften. Hieraus geht denn auch hervor, dass diese Verhältnisse nicht, wie noch im *Bull. de la Soc. geol.* 1833 angegeben ist, als eine isolirte Erscheinung zu betrachten sind, sondern Herr Prof. Studer hat sich selbst schon in der Abhandlung über den Davoser Gebirgsstock für ihre völlige Analogie mit denjenigen ausgesprochen, welche aus Bündten, der Tarentaise und allen denjenigen Gegenden bekannt geworden sind, in welchen die Verhältnisse der schieferigen krystallinischen zu den Sedimentgesteinen genauer untersucht worden sind.

---

## ERKLÄRUNG DER TAFELN.

---

TAFEL I. am Rande : Erklärung der Farben.

Fig. 1. Ansicht des Wetterhorns und Mettenbergs von der Westseite.

Fig. 2. Ansicht des Pfaffenkopfes und Laubstocks von der Nordseite.

TAFEL II. Fig. 1. Ansicht der Jungfrau von der Westseite.






Fig. 2. Ansicht der Stellihornkette von der Ostseite.

---

Engstler Alpen Grindelwald Oberer Grind Gletsch Wetterhorn Mettenberg Kette der Schreckhörner  
Grosse Scheideck Unterer.....



Fig. 1.

-  Kreidebildungen
-  Galesio (buntalige Kalksteine u. Schiefer)
-  Hochgebirgskalkstein (Untere Jurabildungen)
-  Zwischerbildungen (Quarz, Sandstein, Dolomit, Kalkstein, roth-Schf. Eisenerzstein.)
-  Feldspathogesteine (Granit, Gneis, Glimmer Talschiefer)

Ansicht des Wetterhorns und Mettenbergs von der Westseite

Penzlaustock B      Mühlthal Pfaffenkopf      Ritzhorn Guttannenhal      Laubalp Isenstörck      Laubstock Unterstock      Urbachtal Hangend Gletscherhorn      Engel und Burghornkette      Janb.




Fig. 2.

Ansicht des Pfaffenkopfs und Laubstocks von Nord




Wildwang Roth. Brett Silberhorn Jungfrau par. Fluh Stufstein Rottthal Rottfluh Berggatt Ebnfluh  
Durbockertener



Ansicht der Jungfrau von West  
Stallhorn Engel Barhorn

Tossenhorn  
Fleisch Enzen  
Urbach Sattel  
Laucherh



Ansicht der Stellhorn - Kette von der Ostseite



# Geologische Beschreibung von Mittelbündten

Einleitung	S. 5
Gruppe der Madrisgebirge	S. 24.
Gebirgsmasse von Oberhalbstein	" 46.
Westlicher Gebirgszug	
Gruppe von Graus alvas	" 52
des Fallengebirge	" 80
des Luvins	" 99
Östlicher Gebirgszug	
Gruppe der Piz Ot	" 121
des Cima di Flix	" 130
des Tirozerhornes	" 147
Schlussbemerkungen	" 160
Gebirgsmasse <del>der</del> Scalotta	" 165
Gruppe des Val Tross	" 167
des Scalotta	" 187
Schlussbemerkungen	" 197
Namen in Bündten	" 207





GEOLOGISCHE BESCHREIBUNG

VON

**MITTEL-BÜNDTEN.**

VON

A. Lischer und B. Studer.





# GEOLOGIE VON MITTEL-BÜNDTEN.

VON

A. ESCHER UND B. STUDER.

---

Es kann diese Abhandlung, sowohl topographisch, als in Bezug auf die darin ausgesprochenen Ansichten, eine Fortsetzung derjenigen heissen, die, im 1ten Bande der Neuen Denkschriften, über die *Gebirgsmasse von Davos* erschienen ist. Die mehrjährigen Gebirgsreisen, die der Untersuchung der Davosergebirge gewidmet wurden, umfassten stets auch einen Theil des mittleren Bündtens, und die Beobachtungen in beiden Gebieten haben sich gegenseitig ergänzt und erläutert. Drei dieser Reisen, in den Jahren 1835, 1836 und 1837 sind von den beiden Verfassern gemeinschaftlich ausgeführt worden, drei andere, in den Jahren 1833, 1834 und 1838 von dem letztgenannten allein. Vielfache Besprechung der beobachteten Thatsachen, und gegenseitiger Ideenaustausch, sowohl während der Reisen, als bei mehreren Vereinigungen zu gemeinschaftlicher Bearbeitung der Karten und Zeichnungen, haben eine so viel als vollständige Gleichförmigkeit ihrer Ansichten über alle wichtigeren Punkte herbeigeführt, so dass beide die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit der in der Arbeit niedergelegten Thatsachen und für den Ausdruck der daraus hergeleiteten Resultate auf sich nehmen. Was das Mechanische der Arbeit betrifft, so hat der Verfasser der früheren Abhandlung auch für diese die Niederschreibung des Textes, Herr Escher dagegen die Ausarbeitung der Karten und Profile übernommen. — Vielfache Belehrung haben wir aus der reichen Sammlung von Gebirgsansichten, so wie aus den zahlreichen und fleissig gearbeiteten Reisebeschreibungen geschöpft, welche *Conrad Escher von der Linth* über Graubündten hinterlassen hat; die benutzten Stellen dieser Manuscripte sind jedoch beinahe immer wörtlich und mit Nennung des Verfassers angeführt worden. — In der Orthographie der Ortsbenennungen haben wir uns vorzugsweise an die im vorigen Jahre erschienene vortreffliche Geographie von Graubündten von *Ræder* und *v. Tschärner* gehalten.

---



## EINLEITUNG.

---

Es fühlt sich der Reisende, der, aus den heissen Seitenthälern der Lombardie, die Höhe der Engadinerpässe erreicht, wunderbar ergriffen, wenn hier, wo er nur die schmale Scheidecke zwischen zwei Abhängen zu überschreiten gedachte, sogleich nun die Hochebene des *Oberengadins* vor ihm sich ausbreitet, mit ihrer Reihe von See'n, ihren Wiesen mit alpinischer Flora bewachsen, ihren städtischen, von Reichthum und Luxus zeugenden Dörfern; und er das schöne Thal umschlossen sieht von Gebirgen, an denen der sparsame Wald nur wenig sich über den Thalboden zu erheben vermag, und nicht weit unter den Schneelehnen der höheren Felsgräte zurückbleibt \*). Von *Chiavenna* (1020'\*\*) steigt man während acht Stunden das schöne Bergell aufwärts nach dem 5650 Fuss hohen *Maloja*, und nur 50 F. tiefer steht man schon am Ufer des *Silsersee's*; ja, es würde dieser gegen Westen der Mera zufließen, wenn nicht der Wall von Gebirgsschutt, auf welchem die Wohnungen von Maloja stehen, ihn zurückhielte. Beträchtlich höher erhebt sich zwar der *Berninapass* (7040'); allein der Fall nach der Ebene des Inn's vertheilt sich auf eine so lange Strecke, dass man auch hier ihn kaum gewahr wird; und noch kann das Auge sich nicht von den herrlichen Gletschern trennen, die aus

\*) Man sehe das schöne Panorama des Oberengadins von Schaffner. Basel 1833.

\*\*) Die in Parenthesen eingeschlossenen Höhen sind in franz. Fuss über das Meer angegeben. Man sehe den Anhang.

dem westlichen Hochgebirge hervortreten, so steht man schon vor *Pontresina* und sieht, jenseits des Inn's, *Cellerina* und *Samaden*. Von *Maloja* bis *Scanfs*, auf eine Länge von fünf geographischen Meilen, fällt der Thalboden nur um 580 F. und diese kommen meist auf Rechnung der zwei Stufen, welche die Ebene von *Sils* und *Silvaplana* vom *St. Moritzer-See*, und diesen von *Cellerina* trennen. In der ganzen Ausdehnung des Alpenzuges ist uns kein zweites Beispiel einer so auffallenden Gebirgsbildung bekannt, kein Thal von solcher Ausdehnung und Cultur, dessen Thalboden höher liegt, als Rigikulm und die höchsten Gipfel des Jura. Man wird an Quito und die Hochebene des Punosee's erinnert, oder an den Himalaja und an die Pässe, die aus dem hindostanischen Tiefland nach den Gangesquellen und den heiligen See'n von Tübet aufsteigen.

Und diese ungewöhnliche Anschwellung des Bodens ist nicht auf Oberengadin beschränkt. Auch östlich finden wir die, einem alten Seegrund ähnliche Thalebene von *Livigno* in einer Höhe von 5750 F.; und westlich müssen die Bewohner von *Stalla* und *Avers*, wie die Hirten von Hochasien, das mangelnde Brennmaterial durch Schafdünger ersetzen. Erst in einer Entfernung von 4 — 5 geogr. Meilen östlich und westlich von Samaden, an der *Etsch*, *Adda* und in *Ferrera*, finden wir Thäler, die unter 4000 F. eingesenkt sind. Weiter nördlich liegt *Bergün* noch 4220 F. hoch; aber *Conters* sinkt schon auf 3650 F., und der Thalboden von *Schams* auf 3030 F. Auch diese Vertiefungen sind jedoch kaum ursprüngliche; sie scheinen durch ein Zurücksinken des Bodens und durch Erosion entstanden; denn die grössere Masse des Landes behauptet sich auf weit beträchtlicherer Höhe bis nahe an *Chur*, und auf den ausgedehnten Hochflächen desselben stehn zahlreiche Dörfer, die daselbst einen von der grösseren Zahl ihrer Felder und Weideplätze weniger entfernten Sitz gesucht haben.

Auf die Temperaturverhältnisse übt diese allgemeine Erhebung des Bodens einen nicht zu verkennenden Einfluss aus. Schon *Wahlenberg* \*)

\*) *Wahlenberg*, de végët. et clim. in Helvet. sept. p. 71, introd.

war verwundert, die mittlere Temperatur von *Chur* um 0°, 59 C höher zu finden, als in dem 530 F. tiefer liegenden *Zürich*; und *Kasthofer*\*) setzt die obere *Vegetationsgrenze* der Culturpflanzen und Waldbäume, in Mittel-Bündten, um wenigstens 1000 F. höher an, als im Berner-Oberland. Die Lerchtanne steigt im Engadin bis auf Höhen von 7000 F. \*\*), so hoch wie an der Südseite des, weiter gegen Mittag zu gelegenen, den italienischen Winden frei sich darbietenden Monte Rosa \*\*\*). Nicht das Klima, sondern die Sorglosigkeit, oder die kurzsichtige Gewinnsucht der Bewohner ist Schuld, dass so viele bündtnerische Thäler ganz von Holz entblösst sind; denn, am Ausgang des baumlosen *Avers*, sieht man noch Gruppen von Lerchtannen hoch über dem Thalgrund, und beträchtlich höher auch, als *Stalla* und seine Umgebungen. Dagegen kann nur natürlichen Verhältnissen der fast gänzliche Mangel an Laubholz in Bündten zugeschrieben werden; Rothtannen, Lerchtannen und Arven bilden ausschliesslich die grösseren Wälder; nur vereinzelt erscheint die Birke; und die Buche, deren mildes Grün so viel zur Schönheit der westlichen Schweizeralpen beiträgt, fehlt, schon vom Gotthardt an, den Bündtnergebirgen beinahe gänzlich \*\*\*\*). — In ungefähr gleichem Verhältnisse, wie die Holzgrenze, hebt sich auch die *Schneelinie*. Den Kamm der ungefähr 8500 F. hohen Gravesalvaskette fanden wir jedesmal, im August, beinahe frei von Schnee, und eben so die nicht viel tiefer eingeschnittenen Joche, die vom Septimer und von Stalla nach Avers führen. Die über 8000 F. hohe, von steilen Gebirgen enge umschlossene Wasserscheide von *Suvretta*, oberhalb *Campfeer*, wo alle Bedingungen zu einer ausgedehnten Gletscherbildung vereinigt scheinen, war, den 9ten August 1838, ohne Schnee, der See auf derselben frei von Eis, und auch auf dem wohl 600 F. höheren Joche, das von *Suvretta* nach *Cellerina* führt, hatten wir, ein Jahr vorher, nur

\*) *Kasthofer*, Alpenreise. p. 205.

\*\*) *v. Buch*, über das Berninageb. Berl. Akad. 1814. *Heer*, Mitth. zur theor. Erdk. p. 135.

\*\*\*) *Van Welden*, Monte Rosa. p. 59.

\*\*\*\*) *Wahlenberg*, p. 41. præf.

fleckweise Schnee getroffen. Die über 8200 F. hohen Pässe, zwischen dem Hintergrund von *Sertyg* und *Ravesch*, waren beidemale, da wir sie besuchten, von Schnee entblösst, und auf den fast 8800 F. hohen *Eschiapass*, westlich von *Madulein*, gelangten wir, von der Nordseite her, ohne zusammenhängenden Schnee zu finden. Ja, selbst auf der beinahe 10,000 F. hohen *Cima di Flix* erstreckte sich, den 8ten August 1838, die dünne Schneebedeckung kaum 1000 F. tief hinunter, und in heissen Sommern soll sie selbst auf dem Gipfel sich theilweise verlieren. Bei der geringen Ausdehnung und der Vereinzelung der in Bündten über die Schneelinie sich ergebenden Gebirge wird zwar die schärfere Bestimmung dieser Linie kaum je gelingen können, doch glauben wir sie, nach unseren Erfahrungen, nicht tiefer als 8600 bis 8800 F. annehmen zu sollen.

Mit diesen Verhältnissen steht die eigenthümliche *Alpenwirthschaft* der Bündtner in enger Verbindung. Wo nämlich, wie es fast allgemein der Fall ist, der tiefere Thalgrund nur geringen Raum, die obere Hochfläche aber beträchtliche Wiesengründe darbot, da wurden auf dieser Sommerdörfer, oder sogenannte *Maiensässe* angelegt, aus denen man sich, für die kältesten Monate, in die, im Thalgrund liegenden Winterdörfer zurückzieht. Diese Maiensässe enthalten gut gebaute, für ganze Familien eingerichtete Häuser, und stehen auf Höhen von 5300 bis 6000 F. Dass nicht die Rauigkeit des Klimas, sondern wirthschaftliche Rücksichten dazu nöthigen, sie im Winter zu verlassen, zeigen die gleich hoch liegenden Dörfer in Avers, die das ganze Jahr durch bewohnt werden. Um die Maiensässe herum und, oberhalb derselben, bis auf 6500 F. etwa, werden die Grasgehänge meist als Wiesen oder Heuberge benutzt und im August abgemäht. Höher folgen die *Kuhalpen*, bis auf ungefähr 7500 F.; jede einzelne auf dem breiten Gebirge einen sehr beträchtlichen Bezirk einnehmend, so dass oft die Heerde stundenweit von der Alphütte zur Weide getrieben wird. Die noch höheren und rauhsten Weiden werden als *Schafalpen* benutzt, aber nicht mit einheimischen Schafen besetzt, weil diesen die Winterfütterung fehlen würde, sondern, seit ältester Zeit, an Bergamasker Heerdebesitzer verpachtet, deren Hirten im Juni die Schafe



ins Land führen, im Herbst mit ihnen zurückkehren und die Winter-  
nahrung meist in der tieferen Lombardei finden. Selten kommen jedoch  
diese vier Abtheilungen, der Winterdörfer, Maiensässe, Kuhalpen und  
Schafalpen, zugleich am nämlichen Gebirgsabhang vor, bald sind, wie in  
Avers und Stalla, die beiden ersten vereinigt, bald stösst, wie in mehreren  
Gegenden von Bergün und Oberengadin, der Bezirk der Maiensässe un-  
mittelbar an die Schafalpen, indem die Kuhalpen, an milderen Gehängen,  
mehr neben, als unter denselben liegen, bald endlich fehlen die Schaf-  
alpen auch ganz, und die Kühe werden, wie auf mehreren Schamser- und  
Oberhalbsteinalpen, bis an die obersten Gräthe getrieben.

Der Gebirgsforschung setzen diese wirthschaftlichen Einrichtungen,  
die Gestaltung des Landes, und der Nationalcharakter in Bündten eigene  
Schwierigkeiten entgegen. Mit grosser Mühe nur findet man Führer, die  
mit den Gebirgen ihrer Umgebung bekannt sind, und über diese Umgebung  
hinaus erstreckt sich ihre Kenntniss niemals. Ungeacht der Höhe seiner  
Thäler, ist der Bündtner, nach Neigung und Lebensart, mehr dem Bewohner  
des Tieflandes ähnlich; er liebt nicht raue Gebirgsreisen und übersteigt  
nur selten die breiten und hohen Ketten, die seine Hauptthäler trennen,  
und deren oberster Kamm, in den wenigen Wochen, da er von Schnee  
frei ist, nur von ausländischen Hirten zuweilen betreten wird. Beinah  
alle unsere Reisen haben wir, ohne Führer, mit Leuten aus dem Berner  
Oberlande und aus Glarus ausgeführt. Aber auch örtliche Erkundigungen  
über Gebirgsnamen und Localverhältnisse sind oft schwer einzuziehen.  
Die Dörfer und Maiensässe sind im Sommer wie ausgestorben, die Häuser  
verschlossen, weil die Leute auf entfernten Heubergen beschäftigt sind;  
auch auf den Alpen findet man die Sennhütte den grösseren Theil des  
Tages zugeriegelt, die Hirten mit den Kühen in abgelegenen Weidegründen.  
Das ganze Gebirge scheint von Menschen und Thieren verlassen, und es  
herrscht eine Stille, wie man sie in anderen Alpgegenden nur in den  
kälteren Jahreszeiten zu finden gewohnt ist.

Die bedeutende Höhe, zu der sich der Boden von Mittel-Bündten erhebt, darf uns nicht befremden. Ein Blick auf die Karte (s. Tab. V) lehrt, dass hier eben die Axe des Alpenzuges durchstreicht, und die Ansicht der mächtigen Schneegebirge, die rings herum aufsteigen, führt uns vielmehr zu der Frage, warum hier das Gebirge sich nicht zu gleicher Höhe aufgeworfen, warum die Kraft, die zu beiden Seiten einzelne Ketten und Stöcke bis weit über die Schneelinie erhoben, in dieser Lücke durch grössere horizontale Ausdehnung sich geschwächt, und eine allgemeinere aber geringere Anschwellung bewirkt habe? Auch diese Frage möchte indess, wenn wir sie genauer prüfen, auf einer irrigen Vorstellung von der Structur des Alpensystems beruhen, auf der Vorstellung, dass eine vergletscherte, hohe Centralkette, als Wassertheiler, die Axe des Systems bezeichnen, und parallel streichende Ketten, hie und da von Querthälern durchschnitten, dieselbe zu beiden Seiten begleiten müssten. Nach so einfachem Plane hat allerdings die Natur hier nicht gearbeitet, und die Unmöglichkeit, in Bündten eine einzelne Kette als Centralkette geltend zu machen, ist bereits schon durch H. v. Buch mit vollkommener Klarheit nachgewiesen worden. Dass aber auch in anderen Theilen der Alpen jene ältere Ansicht ganz aufgegeben werden müsse, dass die Orographie von Bündten nicht eine Ausnahme bilde, sondern nur die allgemeine Regel deutlicher, als diess vielleicht sonst wo möglich ist, darstelle, das ergibt sich, um so vollständiger, je leichter es wird, mit Hülfe guter Karten und durch ausge dehntere Reisen, sich von der beschränkten, theilweisen Auffassung der Alpen zu allgemeineren Uebersichten zu erheben.

Statt einer einzelnen Centralkette finden wir, staffelförmig um die Axe des Alpensystems herum vertheilte, *Centralmassen*, die zwar, nach ihrer Längenerstreckung, jener Axe, oder einer Linie, die aus S70W nach N70O streicht, folgen, an beiden Enden aber sich auskeilen, ohne, nach dieser Unterbrechung sich wieder neu zu erheben. In diesen Centralmassen ist das Gebirge am mächtigsten aufgeworfen, hier finden wir die grossen Eis-meere, die nach allen Seiten Gletscher aussenden, hier die über die ganze übrige Alpenwelt aufsteigenden Riesengipfel. In der Axe dieser Massen

streicht, denselben parallel, Gneisgranit, in vertikale Tafeln abgesondert, und zu beiden Seiten folgt, in fächerförmiger Schichtenstellung, demselben zufallend, Gneis und Glimmerschiefer, oft mehrfach mit einander abwechselnd. So in der Centralmasse des *Montblanc*, so am *Gotthardt*, zwischen Airolo und Urseren, so, im Durchschnitt der *Finsteraarhornmasse*, an der Grimsel. Ein *Ring von Sedimentgebirgen* umschliesst die Centralmasse von allen Seiten; bald als mächtiger Wall von Kalk, der dem Innern des Rings vertikale Wände zukehrt, bald als gerundete, durch Erosion erniedrigte Sandstein- und Schiefergebirge; und in letzteren vorzüglich haben sich, die durch Joche verbundenen Thäler und Niederungen gebildet, welche meist die Bereisung der ganzen Peripherie einer Centralmasse so sehr erleichtern. Längs dem Rande des alpinischen Hochgebirgs haben die Steinarten dieser Sedimentgebirge schwächere Umänderungen erlitten, weil sie nur auf einer Seite mit Centralmassen in Berührung kamen. Sie begleiten den Zug der Hochgebirge, als äussere breitere Zonen, und dringen nur da ins Innere derselben ein, wo zwei Centralmassen weiter auseinander liegen, wie z. B. die Kalk- und Schieferbildungen der westlichen *Berner Alpen*, zwischen der *Gemmi* und der *Dent de Morcles*, ins Wallis hinübersetzen, und daselbst, durch *Val Ferrex* und *Oberwallis*, sich, auch auf der Mittageite, um die Centralmassen des *Montblanc* und des *Finsteraarhorns* herum biegen. Wo aber die krystallinischen Centralmassen sich enger an einander drängen, wie z. B. auf dem schmalen Raume zwischen der *Gotthardt*- und *Finsteraarhornmasse*, von *Oberwallis* über *Urseren* nach dem *Vorder-Rhein*, da gewinnen auch jene Gesteine eine mehr krystallinische Beschaffenheit. Die Mergelschichten werden zu glänzendem Thonschiefer, zu Glimmerschiefer und Gneis, die Sandsteine gehen über in Quarzite, Gneisgesteine und Gneis, der Kalk wird Dolomit oder Marmor, oder er nimmt Glimmer- und Talkblättchen auf und geht ebenfalls in Gneis über. Mit dem centralen Gneisgranit, Gneis und Glimmerschiefer stehn aber wiederum diese epigenirten Gesteine in so enger Verbindung, dass es unmöglich wird, für die ersteren einen von dem der letzteren ganz verschiedenen

Ursprung anzunehmen, jene z. B. für plutonische, aus dem Erdinnern aufgestiegene Massen, diese für wässerige, durch jene umgewandelte Niederschläge zu halten. So wie wir demnach von vorn herein eingestehen, nicht erklären zu können, welcher Mittel die Natur sich bediene, um aus Mergelschiefer Gneis, oder aus Kalk Dolomit zu schaffen, oder, was aus dem Kalk werde, den man allmählig durch Kieselerde verdrängt sieht, und woher diese Kieselerde stamme, und so viel Anderes, das die Beobachtung im Grossen uns, als Thatsachen anzuerkennen, nöthigt; so gestehen wir auch, in den Centralmassen selbst kein Gestein aufgefunden zu haben, dem man bei jenen Processen mit Wahrscheinlichkeit irgend eine thätige Rolle zuschreiben könnte; obgleich allerdings von da her vorzugsweise alle jene Wirkungen ausgegangen zu sein scheinen.

---

Wie in der westlichen Schweiz, sehen wir auch in der östlichen, von der Sedimentzone her, einen breiten Lappen sich tief nach Mittel-Bündten hinein erstrecken. Es geschieht diess in dem weiten Raume, den die Keilendigungen und Seiten von fünf Centralmassen begrenzen, und dieser Umgebung verdankt der Boden dieser Gegenden, der sich nicht selbst als Hochgebirge zu erheben vermochte, offenbar seine grössere Höhe. Auf der Westseite finden wir 1) das östliche Ende des *Finsteraarhorns* im *Toedi*, und, in geringer Entfernung südlich, 2) dasjenige der *Gotthardtmasse* in der Gegend von *Ilanz*. Beide Massen stehn mit dem Bezirk, den wir näher beschreiben wollen, nicht in unmittelbarer Verbindung, und wir ziehen sie daher auch nicht weiter in den Kreis unserer Untersuchungen. Von bedeutender Wichtigkeit müssen uns dagegen die Verhältnisse der drei übrigen Centralmassen erscheinen.

3) Die, von *Val Canaria* über den *Lukmanier* nach *Ghirone* und *Vrin* durchsetzende, schmale Zone, von schwarzem Schiefer, Gyps und Dolomit, trennt die Gotthardtmasse von einer südlicheren Kettenverbindung, die wir nicht Centralmasse, sondern *System der Adulagebirge* heissen wollen, da eine mittlere Hauptmasse und die Fächerbildung nicht bestimmt hervortreten. Der Hauptcharakter dieses, meist aus krystallinisch flasrigen

Gesteinen bestehenden Systems liegt in dem vorherrschenden Streichen der Schichtung von SO nach NW, fast senkrecht auf das Streichen der Alpen, gewöhnlich verbunden mit O und NO Fallen. Das Streichen schwankt von der 8ten Stunde der Boussole bis in die 1te, und als Mittel kann die 11te Stunde, d. h. ein Streichen in N30W mit Fallen nach N60O angenommen werden. — Es herrscht diese auffallende Schichtenstellung vorzüglich im *Rheinwald*, in der Umgebung der *Splügen-* und *Bernardin-pässe*, und ist auch daselbst, bereits vor längerer Zeit, von *C. Escher* und *H. v. Buch* beobachtet worden. Nördlich von Rheinwald erstreckt es sich noch bis *Vals*, aber nicht bis *Vrin*; auch im Thal von *Zerfreila* und am *Piz Lenta*, am *Scopi* und bei *Airolo* zeigt es sich nicht mehr; wohl aber noch bei *Olivone* und in *V. Piora*. Gegen Osten findet man es nicht mehr in *Schams*, dagegen im vorderen *Avers* bis *Canicul*. Eine Linie von *Airolo* bis *Andeer* wird daher ungefähr die Nordgrenze bezeichnen. Es dreht sich an dieser Nordgrenze das Fallen ziemlich schnell in ein wenig geneigtes Nordfallen um. Im Süden zeigt sich das Ostfallen noch am *Muret-pass* und in der Umgebung von *Chiavenna*, nicht aber im Hintergrund des *Malenkerthales*, noch am *Lago di Mezola*, und auch nicht am Ausgang von Misocco, bei *Grono*, noch bei *Bellinzona*. In Westen endlich hat *C. Escher* das Streichen des Adulasyntemes noch in der Lagerfolge des Dolomitgebirgs von *Campolongo*, und in der ganzen Umgebung der *V. Lavizzara*, oder des oberen *Maggiathales*, *Rengger* am *Platifer* und im mittleren *Livinerthal* wiedergefunden.

Die Schichtenstellung dieses Systems musste der Entstehung von Meridianketten besonders günstig sein, und es ist auch die grosse Anzahl derselben in diesem Theile der Alpen auffallend genug. Von *Val S. Giacomo* bis *Val Maggia* zählen wir nicht weniger als sieben Thäler, die alle der Meridianrichtung folgen, und sechs gleichlaufende Ketten zwischen ihnen. Unter diesen Ketten gehört besonders eine der mittleren zu den bedeutungsvollsten im ganzen Alpensysteme. Es ist die Kette der *Adulagebirge*, des *Vogelsberges* (M. dell'Uccello, M. Aquila), des *Zaporthorns* und *Moschel-horns*, deren von Gletschern und Schneefeldern umringte, wenig bekannte

Gipfel über 10,000 F. ansteigen, und die, seit alter Zeit, als die Marche zwischen den Lepontinischen und den Rhätischen Alpen gegolten hat. Und mit Recht; denn von *Lumino*, bei Bellinzona, bis nach *Sumvix*, im Vorder-Rheinthal, auf eine Entfernung von 8 geogr. Meilen, schneidet diese Gebirgsmauer den Westen so gänzlich vom Osten ab, dass nur in den wärmsten Sommermonaten ein Uebergang möglich wird, eigentlicher Verkehr aber gar nicht statt findet. Auch die anstossenden Thäler sind, mit Ausnahme des südlichen *Val Blegno* und *Val Calanca*, fast ganz verlassen und öde. Der *Scaradrapass* (8450'), aus dem Hintergrunde des Blegnothales über diese Kette nach Zerfreila und Vals führend, ist einer der höchsten und wildesten des Schweizeralpen; auf der Westseite, beinahe von der oberen Scaradrahütte an, eine ununterbrochene Schneelehne, auf der Ostseite weit hinunter vergletschert. Und doch wird jährlich das Hornvieh hin- und herüber getrieben, weil die im Hintergrund von Zerfreila liegende Alp *Alpersch* noch V. Blegno gehört und mit Tessiner Kühen besetzt wird. Im Berner Oberland würde man diess für unmöglich halten, und selbst die obere Scaradra nur als Schafberg benutzen. Nicht so wild, aber einsamer, ist der nördlichere Pass über *Disrut* \*) (aus *Alpe di Sarota* entstanden), und auch den noch mehr dem Vorder-Rheinthal genäherten Pass über *V. Kavel* fanden wir sehr hoch und rauh. Erst am *M. Rosa* stösst man wieder auf eine Meridiankette von gleicher Länge und Höhe, und hier auch schieden die Alten die Lepontischen von den Penninischen Alpen. Sollte demnach für das Adulasystem eine Centralmasse hervorgehoben werden, so könnte jedenfalls nur der Gebirgsstock des Vogelsberges, sowohl seiner mittleren Lage, als seiner Höhe wegen, auf diese Auszeichnung Anspruch machen. Aber auch so würde das ganze anomale Streichen immer einen wesentlichen Unterschied zwischen dieser und den übrigen Centralmassen begründen.

Die Begriffe von *Längen-* und *Querthal* erhalten hier, wenn man sie, wie es am natürlichsten scheint, von dem Streichen der Schichtung ab-

\*) S. *Frabel* und *Heer*, Mittheil. I, p. 198. Die Reise von C. Escher.

hängig macht, eine in den Alpen ganz ungewöhnliche Anwendung. Jene Meridianthäler nämlich erscheinen, nach dieser Begriffsbestimmung, als Längenthäler, während das mit den Alpen parallele Rheinwaldthal ein Querthal heissen sollte. Hiemit stimmt jedoch die Gestaltung des Bodens nicht ganz überein. Wie andere Querthäler, zeigen jene, dem Meridian folgende, stufenweises Aufsteigen und grossen Wechsel in der Breite des Thalgrundes, während das bis an den Rheingletscher flache und gleichförmige Rheinwaldthal mehr den Charakter der Längenthäler trägt. Die Schwierigkeit hebt sich jedoch, wenn wir auf ein zweites System von Ketten Rücksicht nehmen, das, mit dem vorigen sich kreuzend, in der Richtung der Alpenkette streicht, und hier, wie überall in den Alpen, ganz unabhängig von der Schichtenstellung, die Physiognomie der Thäler vorzugsweise bedingt hat. Eine diesem System angehörende Kette läuft von *Ferrara* aus nach dem *Moschelhorn*. Sie ist der Wassertheiler zwischen den Gebieten des Rheins und des Po; über sie führen die *Bernardin-* und *Splügenpässe*, und, als einer der höchsten Gipfel dieser Gegend, erhebt sich auf ihr, wo sie mit der Kette, die S. Giacomo von Misocco trennt, sich kreuzt, das 10,120 F. hohe *Tambohorn*. Parallel mit ihr streicht, auf der Nordseite des Rheinwalds, die mehr plateauartige Kette, über welche zwei hohe Pässe nach *Savien* und *Vals*, und ein dritter, über ein 8770 F. hohes Schneejoch, und einen nördlich davon abfallenden Gletscher, durch das sogenannte *Kanalluckli* \*), nach *Zerfreila* führen. Beide Ketten vermögen indess nicht, den hohen Wall der Adulamasse westwärts zu durchsetzen, und die westlichen Ausläufer dieses Walles entsprechen keineswegs den östlichen. Ein solcher Ausläufer wird, nördlich von *Olivone*, in einer fürchterlichen Felskluft, vom Blegno durchbrochen und verliert sich weiter westlich im südlichen Fuss des *Scopi*. Erst beträchtlich weit nordwärts kann eine nach W fortsetzende, schon zur Gotthardtmasse gehörende, Kette sich behaupten, und den Süden vom Norden scheiden. Ueber sie führen die rauhen und selten besuchten Pässe der

\*) Msc. von C. Escher.

*Greina* (7250'), aus dem merkwürdigen Kesselthale von *Ghirone*, nach *Sumvix* und *Vrin*. \*).

Es ist klar, dass die Ketten- und Thalbildung, die sich von der Schichtung abhängig zeigt, mit der Aufrichtung oder Einsenkung der Schichten gleichzeitig entstanden sein muss, dass dagegen diejenigen Ketten und Thäler, deren Dasein die Gleichförmigkeit jener Bewegungen gehindert hätte, späteren Ursprungs sein müssen. Daher hat auch vor längerer Zeit schon *H. v. Buch* die Aufrichtung der Schichten des Adulasystemes und die damit zusammenhängende Bildung von Meridianthälern als das frühere Ereigniss, die Bildung des Rheinwaldthales dagegen und seiner Seitenketten als das spätere bezeichnet, und auch wir können, in dieser Unterscheidung zweier Epochen in der Gebirgsbewegung, die einzig mögliche Erklärung dieser auffallenden Verhältnisse finden. Ganz unerwartet stimmen aber diese Folgerungen auch auf das Schönste überein mit den Schlüssen, die Herr *Elie de Beaumont*, aus einer ganz verschiedenen Reihe von Thatsachen, gezogen hat. Es streicht nämlich unser Adulasystem ungefähr dem System des *Mont Viso* parallel, und ist demnach, sofern paralleles Streichen einen gleichzeitigen Ursprung beweisen kann, was wir nicht unbedingt behaupten möchten, den Hebungen dieser Epoche beizuordnen. Auch Hr. E. de B. setzt aber die Hebung des Visosystemes in eine frühere Zeit, als diejenige der Alpen, in die Zwischenzeit nämlich zwischen der Ablagerung der älteren und jüngeren Kreide, während die Hebung der Alpen und mit ihr die Bildung des Rheinwaldthales erst am Schluss der Tertiärepoche statt gefunden hätte.

4) Beschränkter an äusserem Umfang, aber ausgezeichnet durch die Pracht ihrer Gletscher und die Höhe ihrer Gipfel, finden wir südlich vom Oberengadin die *Centralmasse des Bernina*. Auf 8000 F. hohen Standpunkten, oberhalb Campfer, erscheinen ihre Gipfel wie die höchsten des Berner Oberlandes, wenn man ihnen auf dem Faulhorn gegenübersteht, und, nach einer oberflächlichen Winkelmessung aus *V. di Fien* möchten

\*) *S. Frabel* und *Heer* Mitth. I, p. 199 die Reise von C. Escher.



die höchsten unter ihnen mit dem Finsteraarhorn wetteifern. Die schöne Terrasse von *Poschiavo*, das, durch einen niedrigen Pass damit verbundene *V. Lanterna*, und der Hintergrund von *V. Masino* scheinen diese Centralmasse südlich zu begrenzen, indem auf jenen Punkten Kalk durchstreicht; gegen Ost dehnt sie sich kaum weit über den Berninapass aus; und im Westen wird sie jedenfalls durch das *Piano di Chiavenna* abgeschnitten, wahrscheinlich nimmt sie aber schon früher ein Ende.

Das Fächersystem ist in der Berninamasse zwar angedeutet, aber nicht vollständig entwickelt. Auf der Südseite des Passes fällt der Gneis und Glimmerschiefer, unter geringem Winkel, nach N35W, und alle Gebirge, die von der Strasse aus sichtbar sind, nach H. v. Buch auch die höchsten Berninagipfel selbst, zeigen gleiches Fallen. Im *Lanternathale* ist das Fallen ebenfalls in grosser Ausdehnung nach N20W, und das Streichen, längs der ganzen Südseite, ist das allgemeine der Alpen. Am *Muretpass* dagegen, und auch weiter östlich, in der Umgebung des Feetgletschers, herrscht, bis auf die höchsten Gräte, ein sehr steiles Fallen des Glimmerschiefers nach N25O, beinahe rechtwinklicht auf das vorige, und bereits dem Adulasyteme angehörend. Südliches Fallen zeigt sich auch im Oberengadin nirgends. Es scheint das Streben nach Fächerbildung durch die mächtige Einwirkung des westlichen Systems modificirt oder gehemmt worden zu sein. Als die Kernmasse des Fächers dürfen wir vielleicht den zähen, bläulich grauen Granit betrachten, der zwischen *Pontresina* und den *Bernina-Wirthshäusern* hervortritt, einen Granit, der wesentlich verschieden scheint von dem Granit-Syenit des Juliers, der bei St. Moritz den hügligten Thalboden bildet. Doch hat jener Granit, und, höher gegen die Bernina-Scheidecke zu, auch der Gneis und Glimmerschiefer, noch das Fallen nach NO, flach gegen N40O, mit dem Adulasyteme gemein.

Am *Maloja* ist die wagrechte Hochebene des Engadins plötzlich gegen W abgestürzt, und in ihrer Verlängerung findet man das tiefe, schluchtähnliche *Bergell*, wie durch ein Zurücksinken des östlichen, aufgetriebenen Thalbodens gebildet. Bis auf die Fläche von *Casaccia* fällt man um

1140 F., dann wieder, bei der zweiten Stufe, die nach den schönen Flecken *Vicosoprano*, *Borgonovo* und *Stampa* führt, um 1200 F. und von da bis nach *Chiavenna* noch um 2290 F. Bei *Porta* trennt eine enge Felskluft das obere Bergell von dem unteren, und hier auch zeigen sich die ersten Kastanienbäume, nur wenig tiefer gedeihen Feigenbäume und Wein, und im Schatten üppiger Kastanienwaldung erreicht man die Ebene von *Chiavenna*, wo reichliche Seidecultur herrscht, und Mandelbäume, Cypressen und Lorbeer die Gärten zieren. \*)

Die schroff abgestürzte Kette, welche das Bergell gegen Mittag begrenzt, behauptet, bis fast an ihr Ende, den Hochgebirgscharakter der Berninamasse. Aus einem, tief gegen SW eingreifenden, vergletscherten Kesselthale, umschlossen von hohen Schneegebirgen, strömt die *Ordlegna* gegen Maloja aus. In einem, noch ausgedehnteren Gletscherthale sammeln sich die Quellen der für *Vicosoprano* so gefährlichen *Albigna*. Von da an bedeckt eine kaum unterbrochene Firnmasse das Gebirge bis oberhalb *Bondo*, und nur die mauerähnliche Steilheit der Felsen, die weiter westlich den obersten Kamm bilden, hindert ihre weitere Ausdehnung; denn, auf der linken Seite des Bondascathales, behauptet sich der *Pizzo Porcellizzo*, die einzige in dieser Kette gemessene Höhe, noch auf 9500 F.

Die geologische Beschaffenheit dieser Gebirge ist noch beinahe unbekannt. Im Thale der *Bondasca* soll, nach H. v. Salis, *Gneis* herrschen, in vertikalen, aus SO nach NW streichenden, und also noch dem Adulasysteme angehörenden Schichten. Auch der Engpass von *Porta* setzt quer durch Gneisschichten. Eine ausgezeichnet schöne Steinart zeigt sich in vielen grossen Blöcken thalaufwärts, vorzüglich bei *Vicosoprano* und *Casaccia*; auch der Ausgang des *Murettthales* ist ganz damit übersäet, und sie bildeten auf Maloja den Damm, durch welchen der Abfluss des Silsersee's nach *Casaccia* verhindert wird. Es ist ein sehr frisch aus-

\*) S. Bapt. v. Salis, *Ursachen der im Bergell durch Wildbäche entstandenen Zerstörungen*. — Ausser dieser wichtigen Schrift, die im Churer Volksblatt erschienen ist, verdanken wir dem gefälligen Hrn. Verfasser mehrere werthvolle Beiträge zur Topographie seines Vaterlandes.

sehender, massiger *Granit*, mit oft mehrere Zoll grossen Feldspathkrystallen, weiss, häufiger fleischroth, wenig Quarz, und schwarzem, starkglänzendem Glimmer. In geringem Verhältniss sind den Graniten auch Blöcke von feinkörnigem *Syenit* beigemengt. Die Trümmer auf *Maloja* stammen aus dem Thal der *Ordlegna*, diejenigen des *Bergells* von einer mauerähnlichen, zackigen Felsreihe, die, am Fuss der linken Thalseite, schroff in die Höhe steigt, und die hohen Thalkessel dieser Seite, so wie das Quellgebiet ihrer Wildbäche fast ganz verdeckt. Nur durch schmale Einschnitte finden dieselben und die mächtigen Schuttmassen, womit sie nur zu oft einen Theil des fruchtbaren Thalbodens überdecken, einen Ausgang. Die weitere Verfolgung dieses Granits gegen *Masino*, und die Untersuchung seines Verhältnisses zu dem Serpentin des *M. della Disgrazia* wurde uns leider durch früh gefallenen Schnee vereitelt. Der *Muretpass* ist von *Maloja* bis *Chiareggio* nur in *Glimmerschiefer* eingeschnitten, der bei *Maloja* untergeordnete *Gneislager*, überall aber *Hornblendschiefer* und *Quarzit*, und, in vereinzelter Massen, auch *weissen Marmor* und *Serpentin* einschliesst. Oberhalb dem *Ordlegnathale* sieht man keinen einzigen Granitblock mehr. Das steile Ostfallen jener Schiefer hält an bis nach *Chiareggio*.

Diese unvollkommene, nur einseitige Kenntniss der südlichen *Bergellgebirge* erlaubt nicht, über ihr Verhältniss zur *Berninamasse* in's Klare zu kommen, und zu entscheiden, ob sie noch mit derselben zu vereinigen, oder ob sie, als eine besondere Centralmasse, zu betrachten seien. Für die letztere Ansicht scheinen die Verhältnisse am *Muretpasse* zu sprechen; es ist jedoch auch denkbar, dass durch die Schiefer des *Murets* der in der Tiefe vom *Bernina* gegen das *Bergell* durchsetzende Granit nur verdeckt, nicht aber abgeschnitten worden sei.

5) Von Osten her, endlich, dringt die *Centralmasse des Selvretta* aus Tyrol in Bündten ein. Ein krystallinisches Fächersystem, wie dasjenige des *Montblanc*, und zu der Biegung des Rheins bei Chur in gleicher Stellung, wie dieses zu der Rhonebiegung bei Martigny. Der

Strelapass entspricht dem Col de Balme, Davos dem Thale von Chamouny. Das *Landwasser*, der *Albulapass* von *Filisur* bis *Ponte* im Engadin, und der *Inn* bis *Finstermünz*, bezeichnen, innerhalb der Schweiz, ungefähr die äussere Begrenzung dieser Masse; im Tyrol erstreckt sie sich noch bis *Landeck*; südlich, vom *Innthal*, nördlich, vom *Paznaunerthal* eingeschlossen. Das westliche Keilende liegt etwa vier Stunden östlich von Bergün entfernt, da, wo die Thäler *Sertyg*, *Ravesch* und *Schafboden* zusammenstossen. Hier fängt das Gebirge an, seinen obersten Rücken, den Wassertheiler zwischen den Zuflüssen des Rheins und der Donau, über die Schneelinie zu erheben, und unter der Menge seiner unbenannten und niemals gemessenen Gipfel mögen wohl mehrere, wie der *Piz Linard* (10,700'), oberhalb *Lavin*, eine Höhe von mehr als 10,000 F. erreichen.

Der Ring von Sedimentgesteinen, der, in der Regel, die Centralmassen umzieht, tritt hier besonders deutlich hervor, und fällt zum Theil noch innerhalb unserer Karte. Noch besser lässt er sich auf der allgemeinen Karte (Taf. V) verfolgen. Die mächtigen Kalk- und Dolomitgebirge, die, vom hinteren *Prättigau* her, auf dem rechten Ufer des Landwassers fortstreichen, und Davos von Erosa trennen, biegen sich nämlich, vom *Lenzerhorn* an, plötzlich gegen SO um, und folgen dem Albulapasse, bis in's Engadin, stets auf der westlichen Grenze der krystallinischen Centralmasse sich haltend. Auf der rechten Seite der Engadinfläche, gegenüber *Ponte* und *Scanfs*, wieder in grosser Mächtigkeit und Breite aufsteigend, bilden sie am *Casannaberge* einen Knoten, von welchem aus drei Zweige, in verschiedener Richtung, tief in das krystallinische Feldspath- und Glimmerschiefer-Gebirge eindringen. Einer der Zweige wendet sich gegen NO und bildet im Unterengadin die fürchterlich rauhe Kalk- und Dolomitzette, die, von *Ardez* bis *Martinsbruck*, das Thal südlich begrenzt. Mit diesem Kalk verbindet sich der Flysch, worin der Inn sich sein tiefes felsigtes Bett eingegraben hat, und, bis unterhalb *Finstermünz*, herrschen im Thalgrund, und oft weit an den Abhängen hinauf, diese Sedimentgesteine, als schwarze

Schiefer, Kalk- und Sandsteine. Ein anderer Zweig streicht, ungefähr die Richtung des Albulapasses fortsetzend, ostwärts, zwischen dem *Ofen-Wirthshaus* und *Livigno* durch, nach *V. Fraele* und an die Südseite der Stilsferjochstrasse, um dann in der *Ortlesspitze* die grösste Höhe aller dieser Kalkgebirge zu erreichen. Der nach Ost concave Bogen, den dieser Zweig, in Verbindung mit dem vorigen, bildet, bezeichnet die Westgrenze einer Centralmasse, die ganz ausserhalb dem Felde unserer Beobachtungen liegt, und in den *Oetzthalergebirgen* ihre mächtigste Entwicklung erhält. Der dritte Zweig endlich ist die südwestliche Fortsetzung der Kalkkette des Unterengadins. Von *Casanna* aus setzt er durch *V. Federia* nach *V. del Fien* über und erreicht hier den *Berninapass*. Auf der Ostseite dieses Passes bildet er den *Corno Bianco*, wichtig durch seine Petrefakten, die uns einen Anhaltspunkt für die Altersbestimmung dieser Kalkgebirge gewähren, streicht dann, mit plötzlich verminderter Mächtigkeit und in krystallinischen bunten und weissen Marmor umgewandelt, südlich von den Wirthshäusern, quer über den Pass weg, und keilt sich unter den Gletschern der Berninamasse aus. Diese Kreuzung zweier mächtiger Kalkgebirge in der Mitte der Hochalpen ist gewiss eine sehr auffallende, mit den bisherigen Ansichten über die Structur des Alpenzuges schwer zu vereinigende Thatsache. Aber besonders die eine Hälfte des Kreuzes verdient in hohem Grade unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Das hohe und oft mehrere Stunden breite Kalkgebirge nämlich, das, fast senkrecht auf das Streichen der Alpen, von der nördlichen Kalkzone aus, über Chur gegen die *Albulastrasse* übersetzt, und, quer durch die Hochalpen hindurch, bis an den *Zufallferner*, östlich vom *Ortles*, fortstreicht \*). Nur wenige Stunden weiter östlich erheben sich die hohen Dolomitstöcke der *Val di Non*, welche mit dem *M. Baldo*, und der südlichen Kalkzone zusammenhängen, und diese schmale, durch Glimmerschiefer erfüllte Lücke, worin übrigens auch Kalklager vorkommen,

\*) S. G. von Keyserling in Leonh. u. Bronn. 1837.

ist die einzige Unterbrechung dieser, zwischen der nördlichen und südlichen Kalkzone, quer über das ganze Alpengebirge geschlagenen Brücke von Kalkgebirgen. Merkwürdig genug finden wir diese Brücke gerade da, wo beide Zonen sich am nächsten treten; denn eben so, wie von Mittag her, eine mit Sedimentgebirgen erfüllte Bucht sich vom *Gardasee* aus, bis fast nach *Meran*, tief in das krystallinische Hochgebirge hinein erstreckt, so dringt, von *Chur* her, eine ähnliche Bucht bis nach Oberengadin, beide, so sehr verlängert, dass ihre Spitzen unter demselben Parallelkreis liegen.

---

Nach drei Seiten umschlossen von dem Adulasyteme und den Centralmassen des Bernina und Selvretta, liegt, mitten in Graubünden, das Hochgericht *Oberhalbstein*. Jede der drei Gebirgsmassen, besonders aber die beiden letzten, haben unstreitig mitgewirkt, dem Thalboden dieser Gegend die bedeutende Erhebung zu geben, die ihn dem Oberengadin gleichstellt, und das Streichen des Thales und seiner Seitengebirge ist immer noch dasjenige des Adulasytemes. Die geologische Beschaffenheit jedoch gestattet nicht, diesen Bezirk einem der anstossenden beizuordnen, oder ihn unter alle drei zu zertheilen; denn, unabhängig von ihnen, finden wir im Innern desselben die Spuren einer neuen Classe geologischer Processe, die, sowohl auf seine Orographie, als auf die Steinarten, grossen Einfluss ausgeübt, und die Wirkungen, die von Aussen herkamen, theils aufgehoben, theils wesentlich modificirt zu haben scheinen. Hiedurch hat die Natur in diesem Mittelbezirk jene Einheit der Physiognomie, sowohl in der Gestaltung des Bodens, als in den Steinarten, erhalten, die wir als Hauptcharakter einer Gebirgsmasse betrachten, und wir vereinigen daher alle Bildungen, in denen jenes gemeinsame Princip sich erkennen lässt, zu der *Gebirgsmasse des Oberhalbsteins*.

Wie die nördlich anstossende Gebirgsmasse von Davos, die der Gegenstand unserer vorjährigen Arbeit war, lässt auch diese inselartig sich be-

grenzen, durch Stromthäler, die ungefähr mit der geologischen Grenze zusammenfallen. Von *Maloja* aus bis *Ponte* scheidet sie nämlich der *Inn* von der Gebirgsmasse des Bernina. Steigt man von *Ponte* auf die Höhe des *Albula*, so findet man, weiterhin, im Laufe der *Albula* bis *Sils* eine schickliche Grenze, die freilich nicht genau mit der natürlichen übereinstimmt, gegen die Gebirgsmassen des *Selvretta* und von *Davos*. Der *Rhein* und *Aversbach*, aufwärts bis in die Nähe des *Septimers*, können endlich als Grenze gegen das *Adulasystem* dienen.

Gewichtige Gründe haben uns indess bewogen, die Karte sowohl, als unsere specielle Beschreibung, über diese Grenzen hinaus, auf Theile der westlich und östlich anstossenden Gebirgsmassen auszudehnen. — Einerseits verlangte diese Ausdehnung der unmittelbare Zusammenhang der Bildungen, die durch unsere, zum Theil conventionellen Grenzen zerschnitten werden; andererseits der Einfluss, den jene Gebirgsmassen auf die Gestaltung der Oberhalbsteiner-Gebirge ausgeübt haben. Statt von *Andeer* aus dem *Aversbach* nachzusteigen, sind wir demnach der *Splügenstrasse* gefolgt, bis *Chiavenna*, und durch das *Bergell* aufwärts haben wir die *Malojahöhe* wieder gewonnen. Von *Ponte* aus sind wir ferner dem *Inn* gefolgt, bis *Süss*, und über den *Flüelapass* steigen wir an das *Davoser Landwasser* hinüber, das uns wieder bis *Filisur* zurückführt. Auf diese Weise begrenzt, schliesst sich dann auch diese Arbeit und die Karte unmittelbar an diejenige über *Davos* an, die auf ihrer ganzen südöstlichen Grenze ebenfalls durch das *Landwasser* begrenzt ist. Von West nach Ost fortschreitend, werden wir also zuerst den inbegriffenen Theil des *Adulasystemes*, als *Gruppe der Madrisgebirge*, untersuchen, hierauf zu der *Gebirgsmasse des Oberhalbsteins* übergehen, und unsere Wanderungen in den angrenzenden Gebirgen der *Selvrettamasse* beschliessen.

---

## GRUPPE DER MADRISGEBIRGE.

Die Stellung dieser Gruppe, auf der Krentzung der langen Meridianthäler der Adulamasse mit den grossen Parallelthälern des Rheinwalds und Bergells, hat auch die orographische Structur derselben bestimmt. Noch immer äussert sich, in ihren innern Thälern, *Lei*, *Madris*, *Bregalga*, und in den sie einschliessenden Ketten, der westliche Charakter der Meridianrichtung; er wird aber beherrscht durch die Hebung in der Richtung der Alpenkette, die ein gewaltsameres Einreissen der Oberfläche des Bodens, ein höheres Aufwerfen der Massen zur Folge hatte.

Durch die Einwirkung der Berninamasse ist die Gruppe, besonders in ihrem mittäglichen Theile, stark erhöht worden. Ihr Hauptstamm ist die nördliche Grenzkette des Bergells. Hiedurch wurde der Quellbezirk, der in allen westlichen Nachbarthälern, Misocco, Calanca, Blegno u. s. w., nördlich an der Gotthardtmasse liegt, für die Averser Thäler nach Süden verworfen, und der Lauf der Gewässer ein entgegengesetzter. Als ein mächtiger Gebirgswall, mit schroffem südlichem Abhange, so, dass nur *Soglio*, *Savogno* und einige Alpen, auf schmalen Stufen, Raum gefunden haben, in der Höhe meist mit ewigem Schnee bedeckt, und mehrere Gletscher gegen die nördlichen Thäler absenkend, erstreckt sich diese Wasserscheide vom *Septimer* bis nach *Chiavenna*. Nirgends, von ihrem östlichen Anfang bis an die Val S. Giacomo, ist dieselbe unter 8000 F. eingeschnitten, und alle Pässe übersteigen den höchsten Rücken. — Oberhalb Casaccia greift das Weidethal *Marozzo*, wie eine unvollkommene Fortsetzung der Malojafläche, tief in diese Masse ein, und deutet auf ein Streben, die grosse Breite derselben, durch Bildung von Parallelthälern, zu zerspalten. Zwischen Marozzo und dem Hauptthal steigt der massige *Piz Doan* bis zu den grössten Höhen dieser Kette empor. Dann vereinigt sich wieder das Gebirge zu einem breiten Rücken, auf den, aus dem Hintergrund von Marozzo und von Soglio aus, Alpwege steigen, die, in der Höhe, sich theilen, und,



sowohl in's Thal von Bregalga, als nach Madris, führen. Westlich von Soglio aber wird der obere Kamm wieder zu einem schmalen Riffe zusammengedrängt; das besonders gegen Mittag steil abfällt und auf oberster Höhe nur wenige Schritte Breite hat. Ueber diesen Kamm führt der *Gallegionepass*, 8350 F. hoch, von Soglio (3360') durch *Prassignola* nach der Alp *Sovrana* (6060'), im Hintergrund von Madris, und vereinigt sich daselbst mit den mühsamern östlichen Pässen, die sich länger in der Höhe halten und grössere Schneeflächen durchziehen; sowie auch mit dem 8240 F. hohen *Madrispass*, der von Savogno aus das Gebirge übersteigt. Zwischen dem Gallegionepass und dem Madrispass steigt der *M. Gallegione* auf 9642 F.; von den östlicheren Gipfeln ist keiner noch gemessen, oder auch nur auf Karten genauer bestimmt worden. Noch westlicher aber, als selbst der Pass, der aus dem Hintergrund von V. di Lei nach Savogno führt, erhebt sich, als der südwestliche Eckpfeiler der Gruppe, ein Eisgebirge, dessen höchste Pyramide wahrscheinlich die meisten Gipfel der Gruppe überragt; so wenigstens urtheilten wir, als wir, auf den Höhen des Fianell's, dieser Kette gegenüberstanden. Es scheint dieser hohe, von Gletschern umgebene Stock der *P. Stella* der Karten zu sein.

Bei *Chiavenna* (1020') biegt sich der jähe Absturz des Gebirges in die *Val S. Giacomo* hinein, ohne von seiner Schroffheit zu verlieren. Das Meridianthal ist eben so schluchtartig eingeschnitten, wie das Parallelthal, mit dem es hier zusammenstösst. Im unteren Thale besonders, von *S. Giacomo* bis *Prestone*, zeichnet sich die Ostseite aus, durch aufgerissene Felswände und stets sich erneuernde Einstürze, und, seit den grossen Wasserfluthen, im August 1834, die den meisten südlichen Alpenthalern so verderblich wurden, bieten die unteren Gehänge und der schmale Thalboden nur den Anblick einer, durch wenige Oasen unterbrochenen Trümmerwüste dar, in welcher Schuttkegel an Schuttkegel stösst, und kolossale Felsblöcke dem Liro, wie der Strasse, immer neue Sperren entgegensetzen. Aber auch lange vor dieser Katastrophe fanden *C. Escher* und *Hr. v. Buch* diese untere Hälfte des Jakobsthales mit

Felsschütt und Blöcken dicht überlagert. Erst *Campodolcino* (3380'), in einer fast wagrechten, früherem Seegrund ähnlichen Ebene, gewährt einen angenehmen Ruhepunkt, nachdem man, von Chiavenna her, 2360 F. gestiegen. Dann verengt sich das Thal von Neuem, man erreicht *Isola* (3890'), wo zum letztenmal die Felswände weiter auseinander treten und italienische Vegetation das rauhe Thal verschönert. In der fürchterlichen Schlucht des *Cardinell's* endigt sich das Thal, wie eine Spalte, an dem mächtigen Hochgebirgszuge, der, wieder in der Richtung der Parallele, die südliche Thalseite des Rheinwalds bildet. Durch den Cardinell aufwärts wand sich früher die Saumstrasse, in Schwindel erregende Abstürze eingeschnitten, nach dem *Piano della casa* (5850'), wo die Wirthshaus- und Douanengebäude stehen; eine ausgedehnte, wagrechte Ebene, wahrscheinlich, wie diejenige von Campodolcino, ausgetrockneter Seegrund; umgeben von kahlen, zum Theil vergletscherten Gebirgen, von denen in Menge Bäche herunterstürzen, deren Gesschiebe nur an wenigen Stellen eine ärmliche Weide gedeihen lässt. Auch weiter vorn schon theilt das obere Gebirge nicht die Schroffheit der unteren Thalwände, und erweitert sich stellenweise in breite Terrassen und flache Alpweiden. Es hat daher auch die neue Kunststrasse, in der Mitte des Thales, den unsicheren Grund verlassen, und sich auf der Höhe Schutz vor den Lawinen und Felsstürzen gesucht. Mehrere Alpwege führen, quer über diese Hochflächen, aus dem Jakobsthal in's Leienthal, einige südlich, die anderen nördlich von den Felsstöcken der *M. Groppera*, deren Piz, 9079 F. hoch, sich nicht auffallend, durch relative Erhebung über die allgemeine Oberfläche des Gebirges, auszeichnet. Sogar für ein beträchtliches Meridianthal hat sich auf diesem breiten Plateau noch Raum gefunden; das weidenreiche Alpthal *Madesimo*, aus dessen Hintergrund ein wenig beschwerlicher Pass (7200') in die *V. d'Emmet* führt.

Die Wasserscheide, die, auf der Mittagsseite des Rheinwalds, von den Adulagebirgen gegen Ferrera läuft, kann nur sehr uneigentlich eine Kette heissen, sofern man diese Benennung beschränkt auf Höhenzüge, die

der Schichtung parallel sind, und durch diese bedingt werden; denn die ungewöhnliche Schichtenstellung der Adulamasse gestattet nur Meridianketten, und die Längenthäler werden, wie wir in der Einleitung gesehen haben, Meridianthäler. Die von West nach Ost an einander gereihten Kettenstücke, aus denen jene Wasserscheide sich zusammensetzt, geben nun auch dem Höhenzug eine äussere Form, die ihn von gewöhnlichen Ketten wesentlich unterscheidet. Die nach Westen aufgerichteten Schichtensysteme erheben sich zahnartig zu grosser Höhe, während die zwischen ihnen liegenden Joche zusammenstossender unvollkommener Längenthäler, die wir schicklich *Längenjoche* heissen können, weit tiefer eingeschnitten sind, als man es bei *Querjochen*, die über eigentliche Ketten führen, zu finden gewohnt ist. So steigt das *Tambohorn*, westlich vom Splügenpasse, bis auf 10,120 F. auf, und die ganz vergletscherten *Suretastöcke*, östlich vom Splügen, mögen wohl nicht viel niedriger sein; vom Piano della casa aus erreicht man aber, schon in einer Viertelstunde, die 6510 F. hohe Scheidecke des Splügenpasses, und auch diejenige des Bernardinpasses, 6540 F. hoch, erhebt sich nur um 1460 F. über den Thalgrund des Rheinwalds. Die relative Höhe der Gipfel über die Joche steigt daher hier bis auf 3600 F., während sie in der Kette der Sogliopässe auf nicht mehr als 1300 F. geschätzt werden kann. Auch in horizontalem Sinn zeichnet sich die Wasserscheide aus, durch sehr starke, zikzakartige Absprünge von der geraden Linie, die das mittlere Streichen des Höhenzugs bezeichnet; indem, bald die linkseitigen, bald die rechtseitigen Längenthäler tiefer in die Masse eingreifen. Vom Bernardinjoche springt die Wasserscheide südlich bis in die Nähe der Bernardinbäder, und der Ebene von Isola, kehrt dann zurück auf die Splügenhöhe, und wendet sich von da noch einmal südlich nach dem Emmetpasse, worauf erst das Gebirge, mit neuer nördlicher Richtung, bei Canicul ausläuft. — Eine so ausgezeichnete, in den Alpen so häufig wiederkehrende Gebirgsform, verdient wohl in der orographischen Terminologie bezeichnet zu werden, und am einfachsten möchte diess wohl geschehen, wenn wir uns gefallen liessen,

dem gemeinen Sprachgebrauch zu folgen, und den Begriff der Kette, wie schon denjenigen des Thales, allgemeiner auf jede langgezogene Erhöhung zwischen zwei Thälern auszudehnen. Den Benennungen *Længenthal* und *Querthal* würden dann *Længenkette* und *Querkette* entsprechen, und der erste Ausdruck eine Kette bezeichnen, die der Schichtung parallel, der letztere eine Kette, die ungefähr senkrecht auf das Streichen der Schichtung wäre. Sehr genäherte *Querthäler*, wie z. B. die Thäler von Guttannen und Urbach im Berner Oberland, werden durch *Querketten* getrennt, *Længenthäler* durch *Længenketten*; *Querthäler*, die vom Rücken einer *Længenkette* entgegengesetzt auslaufen, stossen in einem *Querjoch* zusammen, *Længenthäler*, auf dem Rücken einer *Querkette*, in *Længenjochen*.

Wenden wir uns nun, nach Durchwanderung der äusseren Umwallung der Gruppe, zu ihrem Inneren, so muss zunächst die fächerförmige Vertheilung der Thäler uns auffallen, die, von Canicul aus, sich nicht nur gegen die ganze Erstreckung der südlichen Kette ausbreiten, sondern, in den *Sterlera-* und *Emmetthälern*, selbst in die östliche und westliche Seitenkette eingreifen. Ein ähnliches Fächersystem von Thälern kennen wir, im Gebiete der westlichen Kalkalpen, zwischen der Niesenkette und dem oberen Thunersee; die Lage von Mühlenen entspricht derjenigen von Canicul, die Kette der Blümelisalpe der Kette, über welche die Sogliopässe führen. Es hängt diese, in den Alpen sich öfters wiederholende Form, zusammen, mit der staffelförmigen Vertheilung der Gebirgsmassen, die selbst wieder eine Folge der ähnlichen Vertheilung der krystallinischen Centralmassen ist.

Wenn man, von *Schams* her, auf der Splügenstrasse, den Engpass der *Rofla* erreicht hat, so öffnet sich, zur Linken, ein noch engeres Felsthal, aus welchem, in tiefer Kluft, mit furchtbarem Toben, ein Bach, fast so stark, als der Rhein selbst, diesem zuströmt. Die steilen Abhänge des *Hirli* und der *Albingebirge* treten so nahe zusammen, dass die gesammelten Gewässer von sechs grossen Alpenthälern kaum hinreichenden Raum zum Abfluss finden, und die Strasse, bei jeder grösseren

Anschwellung, überschwemmt, oder weggerissen wird. Dieses schlucht-ähnliche, durch den wild daher stürzenden Bach malerisch schöne Thal, ist das Thal von *Ferrera*, im Bündtnerischen Bergbau berühmt durch seine, nun verlassenen, Eisenschmelzen, von denen sich die gänzliche Holzentblössung der oberen Thäler herschreibt. Beim Dorfe *Ferrera*, oder *Vorder-Ferrera* (4160'), dem Hauptorte des Thales, erweitert sich dieses, weil es von einem kurzen Längenthälchen durchschnitten wird, das nach den Alpen *Moss* und *Schmoras* aufsteigt; auch hier aber ist der Thalboden sehr uneben, und der Abhang, auf dem das Dorf steht, senkt sich bis zum Thalwasser (3840'). Eine neue Verengung, durch den vortretenden Fuss des *Fianell's* gebildet, zwingt die Strasse, den Thalbach, dem sie bisher aufwärts gefolgt war, zu verlassen, und jenen Vorsprung zu übersteigen; bald aber nähert sie sich, bei *Forno nuovo*, wieder dem Ufer, und, meist zwischen dem Wasser und dem jähen Abfall des Berges eingeeengt, erreicht sie *Canicul*, oder *Hinter-Ferrera* (4550'), in einer, durch die Ausmündung des *Emmetthales* entstandenen Erweiterung. Von der 3030 F. hohen Schamser-Ebene bis an den Eingang in's Ferrerathal, steigt man 780 F., von da bis nach Canicul, 740 F. In geringer Entfernung hinter diesem Dorfe erscheint aber das tiefere Thal durch eine quer durchsetzende, waldigte Stufe ganz abgeschlossen, und der Thalboden erhöht sich schnell um nahezu 1000 F. In schwindlicht tiefen Schluchten windet sich der *Aversbach* meilenweit her, durch diesen erhöhten Felsgrund, und erscheint erst oberhalb der Kirche von *Avers* (6160') wieder, zwischen flachen Ufern, auf der oberen Fläche des Thales. Die Strasse sucht, bald auf dem linken, bald auf dem rechten Ufer, dort den vordringenden Felsen, hier den zuströmenden Alpbächen auszuweichen, oft schwebt sie, nur wenig gesichert, über schauerlichen Abgründen. Das Wegreissen einer oder mehrerer Brücken, durch grosses Wasser, nach Hagelgewittern, unterbricht in manchen Jahren Monate lang alle Verbindung der oberen Thäler mit Ferrera. Der Einmündung des Leienbachs gegenüber liegt *Campsut* (auch *Macsut* genannt), 5200 F. hoch, in einem düster einsamen Grunde, am Ufer des

Thalwassers, umgeben von hohen und steilen Gehängen, die auf beiden Seiten bis an den Bach vordringen. Hier scheiden sich Volksstamm und Sprache. Ferrera und Canicul werden, wie Schams, von romanisch Redenden bewohnt; die *Val di Lei* ist ein italienisches Alpenthal, das durch die Gropperapässe mit dem Jakobsthal, und durch einen Gletscherpass, neben dem P. Stella durch, mit dem unteren Bergell in Verbindung steht; so wie auch die hinteren Alpen des *Madristhales* von Italien her beweidet werden; Campsut aber, das untere Madris und ganz Avers bilden eine deutsche Gemeinde, die, rings von romanischen, oder italienischen Stämmen umgeben, durch die Schluchten von Ferrera, und durch 8 — 10,000 F. hohe Gebirge, mehr noch, als durch die ungleiche Sprache, von ihnen getrennt ist. Diese Verschiedenheit der Volksstämme lässt sich schon von ferne an der Bauart der Wohnungen erkennen; denn in gleich rauen Gegenden, in Stalla und in Oberengadin, baut der romanische Landmann steinerne Wohnungen, während, auch im warmen Tieflande, der deutsche sich nur in Häusern von Holz gefällt. So in Bündten, so auch im Wallis, in Freiburg; überall, wo nördliche und südliche Stämme an einander grenzen, beharrt jeder in der Sitte der ursprünglichen Heimath. Doch macht Livigno mit seinen hölzernen Blockhäusern eine Ausnahme.

Die hinterste Alp im *Madristhale*, *la Sovrana*, wo drei Pässe durch *V. di Rode*, *V. Prassignola* und der *Madrispass* sich vereinigen, liegt 6060 F. hoch, und der flache Weideboden hat hier eine beträchtliche Ausdehnung. In der Mitte des Thales bilden abwechselnd die beiden Seiten Felsvorsprünge, die das starke Thalwasser zwischen felsigte Ufer drängen. Besonders die rechte Thalseite ist meist steil und in hohen Felswänden abgestürzt. Im unteren Thale finden sich bereits Häuser, die das ganze Jahr bewohnt werden, und, dem Ausgang gegenüber, liegt, in ähnlicher Abgeschiedenheit, wie Campsut, auf dem rechten Ufer des Aversbaches, *Crott*. Ein steiler Pfad führt von hier aufwärts, nach *Cresta*, wo die Thalkirche steht. Von Madris aus zieht man es aber vor, um zur Kirche zu gehen, die waldigte Anhöhe zu übersteigen,

worin die Kette, welche Madris von Bregalga trennt, gegen Crott ausläuft. Ein steiler Weg führt dann abwärts zu einer Brücke über den Aversbach, und von dieser hat man wieder 590 F. zu steigen, bis man die Kirche erreicht. Die Höhe von *Cresta* steigt auf 6460 F., und diejenige des obersten Dörfchens, *Juf*, auf 6570 F. Das erstere liegt also höher, als die Alphütte der Sovrana, höher als der Piano della casa, höher sogar noch als die Scheidecke des Simplonpasses; das letztere höher als die Scheidecken der Splügen- und Bernardinpässe. Die steilen tieferen Gehänge von Avers und Bregalga, und der stellenweise breite und flache Thalboden sind, in den wenigen Sommerwochen, mit schönen Wiesen geschmückt; die Heuerndte, Ende August's oder Anfang's Septembers, ist die wichtigste Epoche des Jahres. Der höhere Theil der Zwischenketten, die Madris, Bregalga und Juf trennen, ist meist von Vegetation entblösst, mit losem Schieferschutt bedeckt, aber ohne grössere Felspartien, und in den Sommerwochen schmilzt auch der Schnee, bis an die südliche Hauptkette, beinahe ganz.

---

Die Schichtenstellung der Madrisgebirge ist im Allgemeinen durch diejenige der Adulamasse bedingt worden. Nordöstliches und östliches Fallen, unter meist nicht starken Winkeln, ist, von Chiavenna bis nach Avers, vorherrschend; dort finden wir die tiefsten, hier die obersten Massen. Wegen des vielfachen Schwankens in der Richtung der Streichungslinie, lässt sich indess nicht erwarten, dass die Ketten genau mit dieser parallel laufen, und auch mit der mittleren Richtung des Streichens fällt die der Ketten nicht zusammen. Wie fast überall in den Alpen, sind, weder die Längenketten, noch die Längenthäler, rein ausgebildet worden, und, obgleich allerdings die Gebirge, welche die Thäler S. Giacomo, Lei, Madris, Bregalga, trennen, ihre steilen Abstürze gegen Abend, ihre flacheren Ablänge gegen Morgen zukehren, so lässt sich doch, auch längs ihrem Fuss, die Lagerfolge untersuchen, weil ihre Richtung sich, noch etwas mehr, als die der Streichungslinie der Schichten,

dem Meridian nähert. Dieser Mangel an Uebereinstimmung beider Richtungen, dem man einen grossen Antheil an der pittoresken Mannigfaltigkeit aller alpinischen Thäler zuschreiben kann, führt aber nothwendig zur Folgerung, dass auch die Thäler und Ketten, die, mehr als die übrigen, durch die Schichtenstellung erzeugt zu sein scheinen, nicht durch diese allein, und nicht immer gleichzeitig mit dieser, entstanden sein können.

Eine erste Störung hat die allgemeine Structur der Gruppe, in ihrem südlichen Theil, durch die Berninamasse, erlitten. Die Kette, über welche die Sogliopässe führen, kann nicht, wie die des Splügenpasses, als eine Querkette betrachtet werden; denn das mittlere Streichen der Schichtung fällt, wie schon am Maloja, in *h* 8, und bildet nur einen Winkel, von ungefähr 20° mit dem Streichen der Kette, oder des Bergells. Erst in den nördlichen Thälern dreht sich die Schichtung um, durch Verwerfung einzelner Schichtenmassen in Zwischenstellungen, bis in *h* 12, oder N20W. — Es hat ferner die Bildung des nördlichen Parallelthales Marozzo eine neue Hebung des Grundgebirges in dieser Gegend mit sich gebracht, so, dass die Schichtenfolge, die man, von Casaccia bis auf den Septimer, anstehen sieht, ungeachtet ihrer nordöstlicheren Lage, doch ungefähr demselben geologischen Niveau angehören mag, wie diejenige der tieferen Gehänge im unteren Bergell, oder Jakobsthal.

Eine noch wichtigere Störung finden wir aber, an der entgegengesetzten Grenze der Gruppe, in dem Gebirgsstocke von *Sureta*. Verfolgt man nämlich den Aversbach, von *Campsut* aus, abwärts, so zeigt sich in der Kette, welche *Madris* von *Lei* trennt, noch das allgemeine Streichen der Schichtung im wahren Meridian, mit Ostfallen, und so auch auf der rechten Seite des Thales, oberhalb Canicul, in dem vom Fianell vorspringenden *Schwarzkopf*. Die Kette zwischen *Lei* und *Emmet* scheint, in dem grösseren Theile ihrer Erstreckung, demselben Gesetze zu folgen; aber an ihrem Nordende wirft sich plötzlich die



Streichungslinie in *h* 7, oder in die Parallele, mit Nordfallen, und auf der Westseite von *Emmet*, bereits dem Suretagebirge angehörend, herrscht deutlich das Streichen in *h* 5, oder N60O, mit NW Fallen, das allgemeine Streichen des Alpensystemes, das Streichen der Bernardin- und Splügenkette. Durch ganz *Ferrera* hinunter ändert die Streichungslinie ihre Richtung nicht mehr; wir befinden uns in einem vollkommenen Querthal, und hätten diess schon aus dem mannigfaltigen Wechsel in der Gestaltung der steilen Thalwände, und den vielen Katarakten des Aversbaches schliessen können. Wie verschieden von dem weidereichen, einförmigen Leithale, das doch die unmittelbare südliche Verlängerung von *Ferrera* zu bilden scheint! — Je mehr man sich dem Ausgang von *Ferrera* nähert, desto steiler wird das Fallen der Schichten, und, am Ende des Thales, in dem Engpass, der in die Rofla führt, stehn sie wirklich vertical aufgerichtet. Steigt man nun weiter die Rofla aufwärts, so ist man lange in Verlegenheit, welche von den vielen Spalten, die hier das gneisartige Gestein durchsetzen, man für Schichtungsabsonderungen soll gelten lassen; auch die mit dem flasrigen Gefüge übereinstimmenden schwanken in ihrer Richtung um mehrere Stunden. Doch scheint *h* 5 das herrschende Streichen, zu welchem die Schichtung, nach öfterem Abspringen in *h* 3, stets wieder zurückkehrt. Das Fallen aber ist nun bestimmt südlich, unter einem Winkel von 60 bis 70°.

Es bildet demnach das Suretagebirge ein kleines, selbstständiges Fächersystem, gleich wie unsere Centralmassen sie uns im Grossen zeigen, und wir werden sehen, dass auch seine Steinarten diese Zusammenstellung rechtfertigen. Mit dem Auftreten dieser Centralmasse stellt sich aber auch sogleich, mitten zwischen Systemen, die anderen Richtungen folgen, die alpinische Streichungslinie ein. Gewiss eine höchst beachtungswerthe Thatsache, die auf ein enges Wechselverhältniss zwischen den krystallinischen Fächersystemen und dem Alpensysteme hinweist, und immer mehr in jener räthselhaften Bildung uns die Grundform des mächtigsten unter den europäischen Gebirgssystemen erkennen lässt. Wie viele solche kleinere Fächer mögen, bis jetzt

unbemerkt, wie kleine Hornitos zwischen grösseren Vulkanen, sich in der breiten Zone des alpinischen Hochgebirges finden!

---

Nach der Darstellung der äusseren Form und der Structur dieser Gruppe, bleibt uns noch die Beschreibung des Stoffs, oder der Steinarten übrig.

Wenn wir den, für sich ein Ganzes bildenden, Suretastock ausnehmen, so lässt sich die übrige Masse dieser Gebirge in zwei grosse Abtheilungen, von ungefähr gleicher horizontaler Ausdehnung, zerlegen, die indess, durch allmählichen Uebergang, Abwechslung ihrer Glieder auf der gemeinschaftlichen Grenze und gegenseitiges Eingreifen, zu enge unter sich verbunden sind, als dass wir in ihnen zwei verschiedene Formationen erkennen dürften. Die *untere Abtheilung*, die in der südwestlichen Hälfte der Gruppe, und an der Nordseite des Bergell's bis an den Septimer hervortritt, besteht aus krystallinisch flasrigen Gesteinen; in der Tiefe, bei *Chiavenna* und im Jakobsthal bis *Gallivaggio*, im Bergell bis an den *Septimer*, vorherrschend aus *Gneis*; in der Höhe aus *Glimmerschiefer*. Nur untergeordnet erscheinen im Gneis auch *Hornblendgesteine*.

In der *oberen Abtheilung*, welche den nordöstlichen Theil der Gruppe bedeckt und sich von da über die nördlich angrenzenden Gebirge ausbreitet, ist die herrschende Steinart das, zwischen Glimmerschiefer, Thonschiefer und Mergelschiefer schwankende, schwarzgraue Gestein, das wir, in der Beschreibung der Davosermasse, *Bündtnerschiefer*, und, in anderen Schriften, *Flysch* genannt haben. Die letztere, altdeutsche, in unserem Lande noch übliche, Benennung, für «Schiefer,» verwandt mit «Flötz,» erlaubt zugleich, durch Vorsetzworte, wie «Glimmerflysch, Mergelflysch u. s. w.,» die nähere Angabe der Beschaffenheit, während dennoch der Unterschied der Gesteinsfolge von derjenigen des eigentlichen Glimmerschiefers oder Mergelschiefers festgehalten wird. Zugleich mit dem Flysch treten sehr mächtige *Kalk-*

*massen* auf, die, wie im nördlichen Bündten, und im alpinischen Kalkgebirge überhaupt, dem Flysch stockförmig eingelagert zu sein scheinen. Nicht selten, besonders an der unteren Grenze dieser Abtheilung, ist der Kalk ein *weisser Marmor*, oder er wird ersetzt durch *Dolomit*.

Das *Kalk-* und *Flyschgebirge* dringt, auf der Nordgrenze unserer Gruppe, von Savien und Vals her, in dieselbe ein, verbreitet sich von Splügen im Rheinwald abwärts, bis es von den Suretagesteinen verdrängt wird; steigt aber auch südwärts auf die Wasserscheide der Splügenkette und bedeckt das Gebirge bis jenseits des Piano. Auch auf dieser Seite scheint der Suretastock den unmittelbaren Zusammenhang dieser westlichen mit der östlichen Flyschmasse unterbrochen zu haben; doch schneiden unsere Beobachtungen keineswegs die Möglichkeit ab, dass, südlich vom Suretastock, ein schmaler Flyschstreifen sich vom Splügenpass, durch die Thäler Emmet und Lei, nach dem Madristhal und der östlichen Flyschmasse fortziehe, indem wir keines dieser Thäler besucht haben. Eine vollständige Verbindung beider Massen findet aber im Norden der Suretamasse statt, indem der Flysch und Kalk von Savien, im unteren Schams und in der Viamala, unmittelbar mit demjenigen von Oberhalbstein, und, durch diesen, mit dem von Avers zusammenhängt. — Die Westgrenze dieser letzteren Flyschmasse tritt, durch Vorder-Sterlera und die Engen von Campsut, in das untere Madris ein, steigt dann, an der rechten Thalwand, allmählig in die Höhe und erstreckt sich durch V. di Rode gegen den P. Doan, der selbst noch, so wie ein grosser Theil der obersten Gebirgsdecke über Soglio, aus Flysch und Kalk bestehen möchte. Auch der *Gyps*, der, hoch oberhalb Soglio, in dem Tobel zwischen beiden Averspässen, im Glimmerschiefer, oder Glimmerflysch, eine mächtige Einlagerung bildet, und der in derselben Gegend anstehende *Kalk*, gehören vielleicht noch unserer oberen Abtheilung, oder der Flyschmasse an. Es erscheint indess, im Thalgrunde bei Bondo, ebenfalls grauer Kalk dem Glimmerschiefer der Südseite eingelagert, den man doch nur

der unteren Abtheilung, dem eigentlichen Gneis- und Glimmerschiefergebirge, wird beordnen können.

Die Hauptmasse des *Suretagebirges* endlich besteht aus einem eigenthümlichen *Gneis*, mit glänzend grünem Talk oder talkartigem Glimmer, vielem weissem Feldspath, zuweilen in zollgrossen Zwillingen ausgesondert, und wenig Quarz. In der Rofla nähert sich dieser Gneis auffallend einem *Porphy*r, durch Zurücktreten des flasrigen Gefüges und Verwachsen seiner Bestandtheile zu einer Grundmasse, die jedoch gewöhnlich als deutliches Gemeng erscheint. H. v. Buch nennt das Gestein geradezu Porphy. In Schams und Ferrera zeigen sich aber, häufiger noch, Uebergänge in grünen, feinschuppigen und starkglänzenden *Talk*- oder *Chloritschiefer*, oder einen stark flasrigen talkreichen Gneis, der in grossen, ebenen Tafeln, von geringer Dicke, bricht, und zu ökonomischen Zwecken benutzt wird. — Die wichtigsten Einlagerungen in diese Bildung sind mächtige Lager, oder lagerartige Nester von ausgezeichnet schönem *weissem Marmor*.

Die Bereisung einiger Profile wird uns aber mit den besonderen, geologischen Verhältnissen und den eigenthümlichen Steinarten dieser Gruppe, besser noch, als eine allgemeine Beschreibung, bekannt machen.

Die Folge der Gebirgsarten längs der *Splügenstrasse* ist mit Meisterhand beschrieben worden, in der Profilreise von Glarus nach Chiavenna von H. v. Buch, und wir beschränken uns daher vorzugsweise auf dasjenige, was für die allgemeinen Verhältnisse unserer Gruppe von höherer Bedeutung ist.

Von *Chiavenna* bis *Gallivaggio* ist *Gneis* das fast allein herrschende Gestein. Ein ausgezeichneter, in grosse Tafeln spaltender Gneis, mit vorwaltendem, sehr feinkörnigem, zuckerartigem, weissem Quarz, oder einem innigen Gemenge von Quarz und Feldspath, weissem, zum Theil in zollgrossen Zwillingen ausgesondertem Feldspath, und vereinzelt Partien von schwarzem und silberweissem Glimmer. — Gegen *Campo-*

*dolcino* zu folgen bereits Uebergänge in *Glimmerschiefer*, und, ehe man die Engpässe ganz verlässt, sieht man auch eine Einlagerung von ausgezeichnetem, rabenschwarzem *Hornblendgesteine*, ähnlich demjenigen des Parpaner Rothhorns; doch möchte die vorherrschende Steinart immer noch Gneis sein. Aber tiefer hinein im Thale, und aufwärts, bis zu den bedeckten Gallerien, ist der *Glimmerschiefer* nun in grosser Mächtigkeit und in mannigfaltigen Abänderungen entwickelt: silberweisse, etwas talkartige Schiefer wechseln mit dunkeln; starkglänzende, vollkommene Glimmerschiefer mit matteren, die dem Chloritschiefer nahe stehen; auch Gneis erscheint noch hier und da, als Abänderung des herrschenden Gesteins, und mit ihm das krystallinische Gemenge, das in der Rofla und in Ferrera die Hauptmasse des Suretafächers bildet, hier aber einer offenbar verschiedenen Folge von Felsarten untergeordnet ist.

In der Höhe von etwa tausend Fuss über dem Thalgrund, wo die Strasse, längs dem schmalen Rücken, der sie vom Madesimothale trennt, zum Theil unter Gallerien fortzieht, tritt ein neues System von Steinarten auf, ohne dass jedoch das bisherige Fallen, mit etwa 50° gegen Ost, eine Veränderung erlitte. — Bis so weit, und wahrscheinlich auch nach Madesimo hinein, erstreckt sich nämlich, von Rheinwald her, die Kalk- und Flyschfolge, die hier den Suretastock von der Adulamasse scheidet. Die vorherrschende Steinart ist eine bräunliche *Rauchwacke*, die ausgedehnte Schutthalden bildet; braune Parteen verwachsen mit weissen, fein krystallinisch, mit Säuren stark aufbrausend, nicht selten grössere und kleinere, meist scharfeckige Stücke von hellgrünem Talkschiefer einschliessend, oder von einzelnen Talkblättern durchzogen. Wohl eben so mächtig erscheint grauer, feinkörniger *Dolomit*, seltener weisser Dolomit, von solcher pulverartiger Feinheit des Kornes und so geringem Zusammenhalt, dass er, wie Kaolin, abfärbt, und, bei schwachem Druck, in Staub zerfällt. Noch andere Massen scheinen reine kohlensaure *Kalksteine*, grau, oder weiss, in weissen Marmor übergehend, oder auch von so gewöhnlichem Flötz-

kalkaussahn, dass man nach Petrefacten suchen möchte. Alle diese Gesteine, theils in regelmässiger Wechsellagerung, theils nesterweise mit einander verwachsen, bilden eine Masse von 150 bis 200 F. Mächtigkeit, in welcher auch weisse, quarzige Talkschiefer, als untergeordnete Lager, auftreten, und man ist von ihnen umgeben, bis man in die Ebene der Zollhäuser eintritt, indem die Strasse ungefähr dem Streichen der Schichtung folgt. Am südlichen Rande der Ebene wird die Dolomitbildung von gewöhnlichem braunem *Glimmerschiefer* bedeckt, der indess bereits eher *Glimmerflysch* zu nennen sein möchte. Auch in der übrigen Umgebung des Piano findet sich dieser Glimmerflysch, als herrschendes Gestein; und mit ihm wechselt ein zuckerartiges Gemenge von weissem Quarz, weissem Feldspath und weissem, feinschuppigem Talk, dem Dolomit von Campolongo täuschend ähnlich; zugleich aber auch ein fast dichter dunkelgrauer Kalk, den man leicht mit dem schwarzem Kreidekalk des nördlichen Alpenzuges verwechseln könnte. Auf der Höhe geht der Glimmerflysch beinahe ganz in den gewöhnlichen grauen Bündtnerschiefer über; wirklich brausen auch einzelne Partien desselben stark auf mit Säuren, und man erkennt, bei genauerer Prüfung, deutlich, graue feinkörnige Kalkblättchen, die von dem Glimmer umschlossen werden. Von den östlichen, vergletscherten Felsgipfeln her, liegen hier auch viele Blöcke von Roflagestein; aber anstehend zeigt sich dasselbe nicht in der Nähe.

Das früher so anmuthige Wiesenthal, durch welches sonst die Strasse von der Höhe des Passes nach dem Dorfe Splügen führte, ist, seit dem 27. August 1834, in eine grause Steinwüste verwandelt. Gleich beim Eintritt fällt die hier wild zerborstene, bräunliche *Rauchwacke* in's Auge, voll Höhlen, und in den wunderlichsten, ausgezackten Gestalten hoch an beiden Abhängen aufsteigend; doch aber wohl als die unter dem Glimmerflysch hervortretende Fortsetzung der ähnlichen Bildung des Südabhangs zu betrachten. Sie schliesst, wie diese, an mehreren Stellen viele, bis gegen ein F. lange Bruchstücke, des in der Nähe vorkommenden Gneis und Glimmerschiefers ein; so

dass man leicht versucht sein könnte, sie für eine neuere Kalktuffbildung zu halten, wenn sie nicht in so enger Verbindung mit dem herrschenden Glimmerflysch stünde. Man sieht sie mit diesem abwechseln, und oft scheint sie zwischen seinen Lagern wie eingeklemmt zu sein; oder sie wird nesterweise von ihm umschlossen. Zunächst am östlichen Abhange lassen sich auch, beinahe von der Scheidecke an, die Spuren eines 20 bis 30 F. mächtigen Lagers von *weissem Marmor* verfolgen, das, wie der Glimmerflysch, in dem Meridian streicht und gegen die Suretamasse einfällt. Dieselben braunen, grauen und grünen glimmerigen Flyscharten, mit untergeordneten Lagern von grauem, feinkörnigem *Kalk*, dessen Schichtungsablösungen meist ebenfalls mit Glimmer bedeckt sind, herrschen in grosser Verbreitung bis nach Splügen, wo sie sich an die identischen Gesteine der Nordseite von Rheinwald anschliessen.

Folgt man, das Thal abwärts, der Hauptstrasse, so zeigt sich auch hier längere Zeit ein steter Wechsel von Glimmerflysch und grauem, feinkörnigen Kalk, und auf der Nordseite des Thales erhebt sich das nackte, zerrissene Kalk- und Dolomitgebirge des *Kalkbergs*. Gegen die Rofla zu nähert der Flysch sich sehr dem *Chloritschiefer*, durch vermehrten Glanz und grüne Farbe, und mit ihm wechselt *weisser Marmor*, oder beide Gesteine sind innig mit einander verwachsen. Die höhere krystallinische Entwicklung verräth auch hier die Nähe der Feldspathgesteine, die nun, in der früher beschriebenen Steinart, vorherrschend die Felsen des Roflaengpasses bilden; ein unvollkommener Porphyry mit grauer, feidsteinartiger, zum Theil mit grünem Talk verwachsener Grundmasse, worin weisse, krystallinische Feldspaththeile, und Feldspathkrystalle, stark glänzende Quarzkörner und schwarze Glimmerblättchen ausgesondert sind. In der Mitte der Rofla gehen, wie wir bereits gesehen, der fläsrige Charakter und die Schichtung des Gesteins beinahe ganz verloren, und die unregelmässige Zersplitterung wird, wie bei massigen Steinarten, vorherrschend, aber weiter gegen Schams zu zeigt sich doch bald wieder die gneisartige

Natur desselben, indem der grüne Talk in Menge sich einfindet und die Schichtungsflächen bedeckt, ohne dass zwischen dem deutlichen Gneis und jenem massigen Gestein sich eine Grenze angeben liesse.

Auf der linken Thalseite erstreckt sich das Kalk- und Dolomitgebirge bis an den Pass, der, unmittelbar über Suffers, nach Savien führt; die felsigte Thalecke aber, um welche herum der Rhein sich nach Schams durcharbeitet, besteht aus Roflagestein, Gneis und Talkschiefer, bis zu der Rheinbrücke bei Andeer, wo sich diese Steinarten an dem Flysch des unteren Schams abschneiden. Eben so bilden die Roflagesteine, auch auf der Ostseite des Thales, noch den steilen tieferen Absturz der *Cera* und treffen an dem steilen Tobel, durch welches der Bach von Nezza nach Pignieu ausströmt, mit dem Flysch zusammen.

Der grüne *Chloritgneis*, mit zollgrossen Feldspathzwillingen, hält auch tief nach Ferrera hinein an, und erscheint, in diesem schönen Profil, als das centrale Gestein der Suretamasse. Erst oberhalb den Ruinen des alten Hohofens treten auf der rechten Thalseite, welcher die Strasse bis nach Canicul folgt, mächtige Felsen von schönem *weissen Marmor* auf, in Verbindung mit grauem *dolomitischem Kalk*, der oft alle Merkmale des Hochgebirgskalk der nördlichen Kalkalpen trägt. Beim Eintritt in die Thalerweiterung von Vorder-Ferrera geht die dolomitische Einlagerung über, in gelbe und röthlichbraune *Rauchwacke*, von zuckerähnlichem Korn, und, wie diejenige des Splügenpasses, Nester von glänzendem grünem Talk und Bruchstücke von Gneis einschliessend. Die ganze Kalk- und Dolomitmasse, vertical geschichtet, hat auf der rechten Thalseite eine Mächtigkeit von mehreren tausend Fuss, auf der linken aber scheint sie auf einzelne Felsköpfe beschränkt zu sein, die kaum mehr als einige hundert Fuss aus einander liegen.

Zu verschiedenen Zeiten ist auf der Ostseite des Suretastockes *Bergbau* versucht worden, und den reichen Eisenerzen, die man auf beiden Seiten des Thales gebrochen, verdankt dieses offenbar seinen Namen. Ueber die Lagerstätten des Suretagebirges finden wir genauere Nachrichten in den Handschriften von *C. Escher*.



«Auf *Ursera*, am östlichen Abhang des *Hirli*, schreibt derselbe, brechen, wahrscheinlich lagerweise, in einem, oft mit verhärtetem Talk gemengten, Quarz, schöne derbe *Fahlerze*, die nicht selten mit buntem Kupferkies, schöner Kupferlasur und Malachit verbunden sind. Das Fahlerz soll ziemlich silberhaltig sein.» Ueber den Betrieb dieses Bergbaues auf Silber, hat man indess nur unsichere Nachrichten, und schon während des ganzen vorigen Jahrhunderts scheint er geruht zu haben.

Mit besserem Erfolg wurde dagegen, bis auf die neueste Zeit, das *Eisen* ausgebeutet. «Den 30. August 1819, schreibt C. Escher, hatte der Verwalter der Oekonomie dieses ausgedehnten Eisenbergwerkes die Gefälligkeit, uns selbst in die jetzt bearbeiteten Gruben zu führen. Wir stiegen, von den, zwischen Ferrera und Canicul gelegenen, Schmelzhütten, eine starke Stunde am steilen linkseitigem Abhange aufwärts, so, dass wir bald Canicul und das untere Avers zu unseren Füßen hatten. Die Schichten fallen hier, mit etwa 45°, nördlich. Das Eisenerz-lager liegt zwischen Lagern von Kalk, die, mit ihm, der chloritischen Gneisbildung untergeordnet sind, und hat eine Mächtigkeit von 2 bis 3 Lachter. Der Kalk ist ein weisser, oder auch isabellgelber Marmor, meist mit vielem Quarz gemengt, feinkörnig in's Dichte, deutlich geschichtet bis schieferig, die Ablösungen mit silberweissem, oder grünem Talk überzogen, der oft so überhand nimmt, dass die Steinart ein Talk-schiefer wird, der zwischen seinen Blättern noch etwas Kalk mit Quarz enthält. Ein grosser Theil des Eisensteinlagers besteht nur aus eisen-schüssigem, violettem Kalkstein, dessen schieferige Ablosungen mit Eisenglimmer bedeckt sind, so wie auch Quarz sich dazwischen drängt. Oft verschwindet aber der Kalkstein gänzlich, und der Quarz und Eisenglimmer bilden ein schieferiges Gemenge. Mit dem Quarz findet sich öfters auch asbestartiger, hell gelblichgrüner Strahlstein. An anderen Stellen endlich wird der Eisenglimmer vorwaltend und erscheint als dunkel stahlgrauer, dichter Eisenglanz, der indess, bei genauerer Prüfung, sich immer noch schieferig und feinschuppig zeigt. Das Lager ist so frei

entblösst, dass nur Tagbau getrieben wird. — In älteren, tiefer liegenden Gruben an dieser linken Thalseite findet man Nieren von dichtem Brauneisenstein, und, wahrscheinlich auf demselben Eisensteinlager, einen dunkel gelblichbraunen, feinkörnigen Spatheisenstein, der mit etwas Quarz gemengt ist.»

Von *Ferrera* nach *Canicul* ist der Chloritgneis wieder das vorherrschende Gestein, doch fehlen auch hier keineswegs Einlagerungen von weissem Marmor, und bei *Canicul* selbst, so wie in den Vorsprüngen des *Fianell's*, werden sie sogar vorwaltend, und der Gneis tritt stellenweise ganz zurück. Der äusserst steile Weg nach den *Eisengruben*, führt, etwas südlich von *Canicul*, an dem westlichen Abfall des Schwarzkopfs, aufwärts, bis fast auf die oberste Höhe des Gebirgs. Der weisse Marmor, der im Thalgrund vorherrscht, wird bald bedeckt von Gneis, und noch öfters wechseln beide Steinarten, mit östlichem Fallen, unter sich ab, bis, in der Höhe, der Kalk wieder die Oberhand erhält. Das Eisenerz ist, wie auf der linken Thalscite, ein derber Eisenglanz, zum Theil schuppig, und sich dem Eisenglimmer nähernd, in grösseren Massen in Rotheisenstein übergehend. Die Mächtigkeit ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, weil nach Oben und Unten das Erz sich mit dem Kalkstein mengt, und damit ein nicht mehr bauwürdiges Zwischengestein bildet. An einzelnen Stellen mag aber der reine Eisenglanz wohl die Dicke von 4 Lachter erreichen. Die Gewinnung geschieht durch Tagarbeit in einer, kaum 20 F. tiefen, höhlenartigen Ausweitung, und, zur Zeit unseres Besuches, waren etwa 25 Mann, meist Italiener, sowohl mit Hauerarbeit, als mit dem Hinunterschlitten des Erzes beschäftigt. — Wie von der Zinne eines Thurmes sieht man von der Schirmhütte aus zu seinen Füßen das Dörfchen *Canicul*, in einer Tiefe von wenigstens 2000 F.

Durch das Vortreten der Felsmassen von weissem Marmor, die den westlichen Fuss des *Fianell's* bilden, entsteht die Thalstufe und der Engpass, welche *Ferrera* von *Avers* trennen; durch sie muss der *Aversbach*, in unzugänglichen, tiefen Schluchten, sich seinen Ausfluss suchen. Zwischenlager von Gneis und Glimmerschiefer fehlen zwar auch hier nicht,

aber der Kalk bleibt doch sehr vorherrschend und erstreckt sich, an den tieferen Gehängen, auch weit in die Seitenthäler, Sterlera, Avers und Madris, hinein.

Im *Aversthale* entwickelt sich ein neuer petrographischer Charakter. Der Thalbach strömt nicht mehr zwischen Felsen von Gneis und Marmor, sondern hat sich tief in schwarzen Flysch eingefressen, der mit Quarzlagen und grauem Kalk wechselt, im Gestein der Via mala und des Prättigaus. Das ganze Thal aufwärts sieht man im Thalgrund, und wohl eine Stunde hoch über demselben, keine andere Steinart, und bei jedem Schritt hofft man darin Fucoiden oder Belemniten zu finden. Von der Forcella aus, die aus dem hintersten Grund von Avers nach dem Septimer führt, sieht man dasselbe tief in die südliche Hauptkette eingreifen, und ausschliesslich alle in jener Gegend erkennbaren Felsen bilden. Südlich von der Forcella erhebt sich über diesem Schiefer ein mächtiger Kalkstock, von welchem, gegen den Pass zu, ein schöner Gletscher hinunterhängt. — Der Flysch, in den Aufrissen unter Cresta, fällt ziemlich steil östlich, und auch höher im Thal, bis Juf, herrscht gleiches, obgleich schwächeres Fallen; er überlagert demnach den weissen Marmor der Campsutenge und die ganze Gneisbildung des Ferrerathales, und ist wirklich die oberste Formation in dem ganzen, westlich vom Aversbach liegenden Gebirgsrevier.

Im *Madristhale* ist die Auflagerung des schwarzen Schiefers, auf dem, von Mitternacht her eindringenden, Marmor, an der steil abgestürzten, rechten Thalseite sehr schön entblösst. Zwischen beiden Bildungen ist, nicht sehr mächtig, grüner Schiefer eingelagert, der also auch hier, wie unterhalb Splügen, den Uebergang der sedimentartigen zu den höher krystallinischen Steinarten bildet. Etwa eine Viertelstunde nördlich von der Sovrana wird, durch den hervortretenden Glimmerschiefer, der weisse Marmor und der Flysch zu grösseren Höhen erhoben, und ein hoher Felskopf, zwischen den Thälern Rode und Prassignola, besteht noch ganz aus dem letzteren Gestein, während tief nach Rode hinein und

über den ganzen Gallegionepass man sich ausschliesslich von Glimmerschiefer umgeben sieht.

Auf der linken Seite des Thales befindet man sich, so wie der Weg, etwa eine Stunde weit vom Eintritt in's Thal, über das Wasser führt, schon ganz von Glimmerschiefer umgeben, und auch im Ansteigen der steilen Trümmerhalde, die, im westlichen Hintergrunde, auf den Felskamm des Madrispasses führt, ist in allen Blöcken grauer und grünlicher Glimmer, mit starkem Metallganz, das vorherrschende Mineral; mit ihm Quarz, und in einigen Blöcken rother Granat. Dennoch brausen die meisten dieser Gesteine noch schwach auf mit Säuren, und in einigen glaubt man, auch mit unbewaffnetem Auge, kleine Particen von körnigem Kalk zu erkennen. Eine nicht unerwartete Erscheinung, nachdem man im Ferrerathale die enge Verbindung von Kalk und Gneis im grössten Maassstabe gesehen hat. Unter dem Glimmerschiefer tritt auf der Höhe des Passes Gneis hervor, und seine felsigten Köpfe bilden den obersten, schmalen Gebirgskamm, von welchem man, über eben so steile und hohe Trümmerhalden, wie die der Nordseite, nach der kesselförmigen Thalstufe der Acqua fraggia hinabsteigt. Ein Gneis mit deutlichen, zum Theil grossen Feldspathkrystallen und gewöhnlichem Glimmer, wie derjenige von Chiavenna, und ganz verschieden von dem Chloritgneis in Ferrera. Selbst dieser oberste Gneis enthält jedoch, obgleich nur sparsam, einzelne aufbrausende Parteen, und sein häufiger Wechsel mit Glimmerschiefer beweist klar genug, dass man, beim Ueberschreiten des Passes, keine neue Formation, verschieden von derjenigen der Nordseite, betreten habe. In der, beinahe alles Anstehende bedeckenden Trümmerhalde liegen auch Blöcke von dunkelgrünem, grossblättrigem, zum Theil zu Topfstein verwachsenem Chloritschiefer. — Eben so steil, wie vom Gebirgskamm nach dem See, führt der Weg, von dem südlichen Rande der Thalstufe, in das schlundartige Savognothal hinab. Ermüdender sind uns wenige Pfade in den Alpen vorgekommen; selbst über Gallegione geht man bequemer und sicherer, obgleich auch da der Gebirgsabhang auf der Südseite fast immer eine Neigung von mehr als 30° hat. Denn, während mehr

als drei Stunden, von Acqua fraggia bis Sovogno, darf man das Auge nicht von den glatten Felstafeln des Bergweges abwenden, ohne sogleich durch Ausglitschen in Gefahr zu gerathen. Und als wir gegenüber die südlichen Gebirge noch steiler und höher, mit fürchterlich zerrissenen Felsgipfeln, aufsteigen sahen, entfiel uns beinahe der Muth, dem ursprünglichen Plane nach, den folgenden Tag jenen mauerförmigen Abfall zu erklimmen, um nach V. Codera überzusteigen. Eintretendes Regenwetter machte unserer Unschlüssigkeit ein Ende, und zwang uns damals, über den Splügen zurückzukehren.

Der Gneis wird, von der Acqua fraggia abwärts, das herrschende Gestein; wie im benachbarten Jakobsthale, in ausgezeichneten, zum Theil granitartigen Abänderungen, reich an weissem Feldspath, mit nicht zusammenhängendem, grünem oder weissem Glimmer. — Je steiler man der Tiefe zusteigt, desto überraschender ist der schnelle Wechsel des Charakters der Gegend. Aus den mit Schnee bedeckten Höhen des Passes und der rauhen Umgebung der Acqua fraggia ist man, wie durch einen Zauberschlag, zwischen die schönsten Waldungen von Kastanienbäumen versetzt; die weiss getünchten Wohnungen, die Pflanzenwelt, Himmel und Klima sind ganz italienisch, und, unterhalb dem schön gelegenen Savogno, folgen bald üppige Weinreben, und der reichste Schmuck südlicher Vegetation zieret den Fuss des Gebirgs.

In der Nähe von Savogno zeigen sich, im Strassenpflaster und in den Mauern, ziemlich häufige *Granitblöcke*, mit weissem Feldspath und schwarzem Glimmer; auch einige *Serpentinblöcke*, wahrscheinlich Fündlinge aus dem oberen Bergell. Anstehend ist, bis ziemlich tief unter dem Dorfe, nur *Gneis*. Tiefer folgt ein sehr feinschuppiger, mit etwas weissem Quarz gemengter *Chloritschiefer*, der, bis in den Thalgrund, anzuhalten scheint, und wohl zuverlässig der um Chiavenna herum so mächtig entwickelten Bildung von *Chloritschiefer*, *Lavezstein* und *Hornblendgestein* angehört, die wir als die Basis des Gneises in dieser Gegend betrachten müssen. Auch auf der Südseite des Thales, am Auslaufe der Schlucht Vallone, findet sich verticaler, oder steil südlich fallender

*Hornblendschiefer*, der mit hornblendreichem und wahrem *Gneis* wechselt, und in grösserer Höhe von dem schönen feldspathreichen *Gneis* überlagert wird, dessen Trümmer das unglückliche Plurs überdeckt haben. Es scheint indess diese *Chlorit*- und *Lavezstein-Bildung* nicht als allgemein verbreitete Grundlage des *Gneises*, sondern mehr stockförmig aufzutreten. Im Tobel von S. Abbondio, so nahe bei Savogno, herrscht, bis in den Thalgrund, ein bräunlicher Glimmerschiefer, und die *Chlorit*- und *Hornblendgesteine* scheinen hier ganz zu fehlen, während, noch tiefer im Thale, Chiavenna wieder zwischen grossen Massen derselben steht. Die in petrographischer Beziehung sehr ähnliche *Lavezsteinbildung* des Malenkerthales zeigt ganz analoge Verhältnisse.

---

## DIE GEBIRGSMASSE VON OBERHALBSTEIN.

Die äussere Begrenzung dieser Gebirgsmasse, durch Stromthäler, ist bereits in der Einleitung angeführt worden. Durch das innere Stromthal des Oberhalbsteiner Rheins wird sie überdiess in zwei Hauptgruppen zerschnitten, die, als mächtige, nur am Septimer unter 8000 F. erniedrigte Gebirgswälle, aus der Gegend des Silvaplana-See's bis nach Tüsis und Tiefenkasten fortstreichen, und fast jeden Verkehr der Oberhalbsteiner mit den nahen Landschaften Schams und Bergüü unterbrechen. Die Richtung dieser Gebirgszüge streicht im Allgemeinen zwar dem Systeme der Adulamasse parallel, doch lässt sich bezweifeln, ob es wirklich der Einfluss dieser westlichen Masse sei, der sie bedingt habe; da zwischen beiden Gebirgsmassen der Suretastock, mit einem ganz abweichenden Streichen der Schichtung, sich hervordrängt; und in der Oberhalbsteiner Masse, wie wir sehen werden, mehr die äussere Form und nicht die Schichtung, in der Adulamasse dagegen umgekehrt,

mehr diese als jene, der Richtung von SSO nach NNW folgt. Eine genauere Ansicht lehrt überdiess, dass nur in ihrem nördlicheren Theile unsere Gebirgszüge in dieser Richtung streichen; in ihrer südlichen Fortsetzung krümmen sie sich mehr und mehr von der Meridianrichtung derjenigen der Parallele zu, so dass der Julier- wie der Albulapass wirklich in OW streichenden Thälern liegen, und, ohne scharfe Winkel, durch einen sanften Bogen die Thäler von Oberhalbstein und Bergün mit dem Engadin verbinden. Nur die neuen Verhältnisse, die im oberen Bergell eine tiefere Zerspaltung des Bodens, und, als Gegenwirkung, das Aufwerfen hoher Ketten mit sich brachte, scheinen der vollständigen Ausbildung eines dritten concentrischen Passes, aus Avers nach Maloja, entgegengewirkt zu haben, der unsere Gebirgsmasse eben so westlich begrenzt hätte, wie die Albulastrasse sie östlich von der Selvrettamasse scheidet. Zu dieser letzteren Centralmasse stehen aber offenbar alle diese Bogen in sehr naher Beziehung, indem ihre Krümmung zusammenfällt mit derjenigen des Ringes von Sedimentgesteinen, der, von Davos her, sich um jene Masse herumschlingt. Die gegen NO concav umgebogenen Gebirgswälle, die den Julierpass und Oberhalbstein umschliessen, sind nach demselben Gesetze gebildet, das Saussure, in der Umgebung des Montblanc, zuerst aufgefunden hat, und das seither durch alle Beobachter in den verschiedensten Gegenden der Alpen, in Oisans, in den Glarnergebirgen, in den Hochgebirgen zwischen Bern und Wallis, bestätigt worden ist. Und wenn in Bündten die Structur jener Wälle nicht überall den Forderungen jenes Gesetzes gehorcht, wie ihre äussere Form, wenn die Schichten nicht von allen Seiten gegen die innere Centralmasse aufsteigen und ihr verticale Abstürze zukehren, so haben wir die Ursache dieser Anomalie in der grösseren Verwicklung zu suchen, die hier durch die vereinigte Einwirkung von Processen entstanden ist, deren Spuren wir zum Theil schon in der vorigen Gebirgsgruppe kennen gelernt haben, die uns aber, in noch weit grösserer Mannigfaltigkeit, und kräftiger auf die ganze Gebirgsbeschaffenheit einwirkend, in der folgenden Detailuntersuchung entgentreten werden.

Auf der schönen Kunststrasse erreicht man, von *Silvaplane* aus, die antiken Säulen, welche die oberste Höhe des *Julierpasses* bezeichnen, ohne je an die Eindrücke erinnert zu werden, die aus der Uebersteigung anderer Alpenpässe uns geblieben sein mochten. In dem langen und offenen Thale, in das man nach wenig langem Steigen, vom Engadin her, eintritt, ist die Scheidecke durch keine schroffere Stufe ausgezeichnet, grüne Weideplätze bedecken den Fels- und Schuttboden, und es bedarf einiger Aufmerksamkeit, um sagen zu können, ob der kleine See auf der Höhe nach Engadin oder nach Oberhalbstein abflüsse. Die Meereshöhe des Passes, bei den Säulen, beträgt 7120 F., diejenige des See's von Silvaplana 5620 F., und die von Stalla 5500 F. Weisse Trümmerhalden, im Romanischen *Gravas-alvas* genannt, steigen auf der Südseite des Hochthales steil bis zu den Gletschermassen und zerrissenen Felsstöcken auf, welche den 9 bis 10,000 F. hohen Gebirgskamm zwischen dem Julier und dem Silsersee bilden. Die Nordseite des Hochthales ist weniger schroff abgestürzt, und mehrere Alpthäler greifen tief in die ausgedehnte Gebirgsgruppe ein, die hier in mannigfaltiger Verzweigung, sich zu den Gletschern von Suvretta und Beverthal erhebt. Bei *Stalla* oder *Bivio* vereinigt sich der Thalgrund *Allagho* mit der in einer wenig hohen Stufe abfallenden *Val Caviggia*, die, als unebenes, mooriges Weidland, sanft ansteigend, sich nach dem Absturz des Septimerpasses ausdehnt. Die Gegend von Stalla ist offen, durch keine nahen Felspartieen und Trümmerhalden wird man an das Hochgebirge erinnert, und der junge Strom fliesst geräuschlos, in wenig tiefem Bette, durch schöne Wiesen.

Bald unterhalb Stalla verengt sich aber das Thal, und die von beiden Seiten vordringenden Gebirge nähern sich bis auf eine Felsschlucht, durch die der *Oberhalbsteiner Rhein* wild tobend in die 500 F. tiefere Ebene von *Marmels* (Marmoreva) stürzt. Er findet hier einen vollkommen flachen Kesselgrund, elliptisch, von steilen, meist bewaldeten oder mit Gebirgsschutt bedeckten Abhängen umgeben; in älterer Zeit gewiss einem See zum Behälter dienend, und ursprünglich wohl, wie auch die



ähnlichen, tiefer liegenden Kesselthäler, durch Einsturz des Bodens entstanden. Das hohe östliche Schneegebirge der *Cima di Flix* und des *Piz Err* wird, durch die weit vorspringende Mittelstufe der *Marmelser* und *Flixeralpen*, dem Blick entzogen; und auch zur Linken ahnt man nicht, dass über dem einzig sichtbaren tieferen Abhange sich noch das weite Alpengebiet der *Scalottaweiden* und, hinter diesen, das hohe *Fallerhorn* (Piz Platta), umgeben von Gletschern und Felspartieen, befinde.

Am unteren Ende der Marmelser Ebene verliert sich der Strom wieder in tiefen Felsschluchten, und die Strasse verlässt ihn, um, auf der rechten Thalseite, in dem hier noch offenen und wenig steilen Tobel des *Flixerbachs*, unter *Suur* durch, sich freier wenden zu können. Am Fuss dieser Stufe liegt *Molins* (Mühlen), 350 F. unter Marmels, noch mitten im Engpass, von steilen, obgleich meist bewachsenen Gehängen nah umschlossen, in zwei Häusergruppen getheilt, durch den wild aus einer felsigten Kluft daher tobenden *Fallerbach*. Man tritt aus der Clus von Molins in ein kleines, fast kreisrundes Circusthal, von verticalen Felswänden umschlossen, und aus diesem führt ein neuer Engpass in die ausgedehnte, elliptische Ebene von *Rofna*. Von Molins bis hier fällt der Thalboden um 340 F., und durch die ganze Rofnaebene scheint das Wasser in dem künstlich gegrabenen Kanal kaum zu fliessen.

Das Kesselthal ist gegen Mitternacht durch den stark vortretenden Fuss der Errgebirge abgeschlossen, und durch eine enge, zunächst an der linken steilen Thalwand sich fortziehende Schlucht, fällt, sowohl das Wasser, als nun auch die Kunststrasse, dem tieferen, fruchtbaren und in zahlreichen, grossen Dörfern stark bewohnten Oberhalbstein zu. Die alte Strasse hatte nicht gewagt, in den Engpass einzudringen, sondern den Weg über den Gebirgswall, auf dem auch Rofna sich angebaut hat, vorgezogen.

Der Charakter der Landschaft, unterhalb diesem letzten Engpasse ist ein ganz neuer. Die Mittelstufen haben sich auf beiden Seiten erniedrigt, und vom Thalgrunde aus erblickt man nun den Kamm und die obersten

Gipfel der Seitengebirge. Auf dem sanft ansteigenden, linken Abhange reiht sich Dorf an Dorf, und ausgedehnte Weidbezirke, an steileren Gehängen von Wald unterbrochen, reichen bis an die obersten Gräte. Die felsigte Kette der rechten Thalseite ist dem Strome mehr genähert und fällt schroffer ab gegen die flache Terrasse an ihrem Fusse, auf welcher die schönen Dörfer *Tinzen* (Tinezung), *Schweiningen* (Savognino), *Conters* und der Hof *Burwein* stehen. Ein zusammenhängender Wald umzieht, vom Errthale an bis an den Ausgang des Haupthales, diesen Abhang, und schützt die untere Thalfläche vor den Lawinen und Felstrümmern, die von den hohen Kalkstöcken im Frühjahr und bei starken Sommerregen hinunterstürzen.

Von der Rofnaebene bis Tinzen fällt der Rhein um 540 F., und ist hier, durch die oberen Zuflüsse, bereits zu einem beträchtlichen Strom angewachsen, der sich bei der Tinzer-Mühle noch um den *Errbach* und bei Schweiningen um den ungefähr gleich starken Bach des *Nandròthales* vermehrt. Von der Einmündung des Errbachs bis unterhalb Conters beträgt sein Fall 260 F., und ungefähr um eben so viel mag auch die stets bei 400 F. höhere Terrasse der Dörfer und der Hauptstrasse sich erniedrigen.

Erst beim Hofe *Burwein* beginnt die letzte Stufe, in welcher sich der, von Tinzen bis hier dem Auge beinahe horizontal erscheinende, Thalboden um tausend Fuss nach dem 2650 F. über dem Meer liegenden *Tiefenkasten* senkt. Der Rhein scheint sich in den tiefen Felsschluchten zu verlieren, und, um die fürchterlichen Abstürze zu umgehen (der *Stein* genannt, saissa, daher *Oberhalbstein*, Sur Saissa), war die alte Strasse wieder hoch an der rechten Thalseite angestiegen. Die neue Kunststrasse ist in die rechtseitige Felswand der Kluft eingesprengt worden; aber, so zerfallen und bis in's Innere zertrümmert ist das Gestein, dass, weder das überhängende Dach, noch der vertical zum Strom abfallende Fuss, der Strasse genügende Sicherheit zu gewähren scheinen.

Die grosse Mannigfaltigkeit in den Form- und Gesteinsverhältnissen der zwei Gebirgszüge, welche den Stromlauf des Oberhalbsteiner Rheins

einschliessen, verlangt, dass wir ihre einzelnen Theile besonders kennen lernen, wenn die Resultate unserer Untersuchung gehörig begründet erscheinen sollen. Auch ist eine Zergliederung der beiden Hauptmassen in kleinere Gruppen, die, jede für sich, in ihrer Beschaffenheit mehr Einheit darbieten, von der Natur selbst vorgezeichnet worden. Eine allgemeine Vorstellung der Gestalt und der Höhenverhältnisse dieser Gruppen geben die Tafel II und III.

Der westliche Gebirgszug zerfällt durch die zwei tieferen Einschnitte des Septimers und des Schmoraspasses in drei Hauptgruppen, von denen jede einen ihr eigenthümlichen Charakter besitzt; es sind

1) Die *Gruppe von Gravesalvas*; auf drei Seiten umschlossen von der neuen Julierstrasse, die von Stalla über Silvaplana nach Maloja führt, auf der vierten von der alten Römerstrasse des Septimer und die V. Caviggia. S. Fig. 1 der Taf. II.

2) Die *Gruppe der Fallergebirge*; vom Septimer bis zur Schmorasalp. Auf ihrer Westseite von Avers und Ferrera, auf der Ostseite von Stalla und dem grösseren Theil von Oberhalbstein eingeschlossen. S. Fig. 2 der Taf. III.

3) Die *Gruppe des Curvér*; von Schmoras bis an das Nordende des Gebirgszuges, am Zusammenfluss des Hinterrheins mit der Albula, bei Sils im Domleschg. Begrenzt von Schams, dem Albulathal und dem unteren Theil von Oberhalbstein. S. Fig. 2 der Taf. II.

Eben so naturgemäss ist die Theilung des östlichen Gebirgszuges in drei Gruppen durch den tiefen Einschnitt des Suvrettathales und Beversthales, und durch die Scheidung des Granit- und Kalkgebirges am südlichen Absturz des Piz Ragnutz. Es ergeben sich demnach

1) Die *Gruppe des Piz Ot*; auf der einen Seite begrenzt durch den Inn, von Campfeer bis Bevers, auf der anderen durch die Thäler Suvretta und Bevers.

2) Die *Gruppe der Cima di Flix*; ein grosses Dreieck einnehmend, dessen drei Seiten sind: die vorige Grenze, von Campfeer durch Suvretta

und Bevers bis Ponte, ferner von diesem über Albula zu den Bergüner Maiensässen, und von da durch die Ochsenalp und das vordere Errthal nach Tinzen, endlich von Tinzen, der Julierstrasse nach, aufwärts zu den Säulen, und von diesen bis Silvaplana und Campfeer zurück.

3) Die *Gruppe des Tinzerhorns*; von der Nordgrenze der vorigen Gruppe bis an diejenige unserer Karte; auf der einen Seite von der Albula umflossen, von den Bergüner Maiensässen bis Tiefenkasten, auf der andern vom Oberhalbsteiner Rhein

---

## WESTLICHER GEBIRGSZUG.

### 1. GRUPPE VON GRAVESALVAS

Die Ansicht, die wir von der Mittagsseite dieser Gruppe geben, wird eher, als eine längere Beschreibung, eine klare Vorstellung von ihren allgemeineren Verhältnissen erwecken können.

In seinem östlichen Theile, wo, gegen Silvaplana zu, der *Piz Pülasching* (Flohspitze, in Stalla *P. Cagott*), oberhalb Sils der *Piz de Graves*, beide wohl über 9000 F., sich erheben, steigt das Gebirge, das den gemeinsamen Namen der *Gravesalvas* (in Sils *Crutscherols*) trägt, zur grössten Höhe an, und fällt nach allen Seiten in pralligen Felswänden ab, meist zu steil, als dass die Schneedecke daran haften könnte. Nur den Genssen sind diese rauhen Felsgipfel noch zugänglich, und beide-male, da wir an ihrem westlichen Absturz gegen den Pass anstiegen, der aus dem Allagho-Thale nach Sils führt, auch *Pass von Gravesalvas* genannt, sahen wir zahlreiche Haufen sich in die oberen Schluchten des Gebirges flüchten.

Ein schmaler Felskamm, in seinen tiefsten Einschnitten über 8000 F. hoch, läuft vom Piz di Graves gegen den Septimer, und schwillt, bevor er an diesem abbricht, wieder zu einer breiteren, obgleich nicht höheren Masse an. Zwischen dieser und der östlichen Masse stehen am mittäglichen Abhange, in einem, gegen Mittag geöffneten, grasreichen Thalkessel, die Häusergruppen von *Gravesalvas*, von welchen ein steiles Thälchen nach einem westlichen Joche, und über dieses zu dem hochliegenden Kessel des *Longhinsees* führt. Diese letztere Gegend ist von alter Zeit her berühmt, weil, auf engem Raum zusammengedrängt, Zuflüsse des Rheins, des Po und der Donau entspringen; und der Ausfluss des Longhinsee's, der über die steile südliche Felswand gegen Maloja hinunterstürzt, ist es, der als die Quelle des Inn betrachtet wird. Ein zweites, niedrigeres und wenig steiles Joch führt von dem See nach dem Hospitz des Septimers. Der *Piz della Greila* endlich bildet den äussersten südwestlichen Eckpfeiler dieser Gruppe.

Der Felskamm, oberhalb den Häusern von Gravesalvas, ist auf der Mittagseite von einer ununterbrochenen steilen Trümmerhalde grosser Blöcke umgeben, die jedes Jahr durch neue Einstürze der dem obersten Rücken aufsitzenden schwarzen Felsstöcke sich vergrössert. Nur an wenigen Stellen ist diese hohe Mauer so vollständig zerstört, dass man den Rücken selbst ersteigen könnte. Ueber eine solche Stelle führt, dicht am Piz de Graves vorbei, der, übrigens durch keine Spur eines Pfades bezeichnete, Pass von Gravesalvas. — Mit Ausnahme der Septimerstrasse, sind auch alle anderen Pässe, über den westlichen, wie über den östlichen Gebirgszug, und so auch die früher erwähnten Pässe aus dem Madristhal nach dem Bergell, von der Höhe stundenweise abwärts, ohne Wege, und nur die tiefste Einsenkung des zu übersteigenden Rückens dient dem Reisenden als Richtzeichen, wohin er sich zu wenden habe. — Auf der Nordseite des Kamms von Gravesalvas erstrecken sich zwei Ausläufer, mit meist steil abfallenden Zwischenthälern, gegen Allagho. Das obere ist das nördliche *Gravesalvasthal*, das Thal des Passes, sehr felsigt und rauh, in einer hohen Stufe gegen Allagho abgestürzt. Weiter

abwärts folgt das Weidethal *V. d'Emmet*, das ebenfalls gegen Allagho eine Stufe bildet. Durch den zweiten Ausläufer, der in der *Roccabella* (8420') sich gegen Stalla umbiegt, wird dasselbe von einem dritten Thale, dem unebenen, aber ausgedehnten Alpenbezirk *Alpascel*, einer Seitenverzweigung der *V. Cavraggia*, getrennt, vom welchem her der westliche Theil des Hauptrückens auch wohl *Sur Alpascel* heisst. Der Absturz dieses Rückens in allen nördlichen Thälern ist weit jächer und felsigter, als auf der mittäglichen Seite, und erst in der Nähe des Septimers wird diese Mauer ganz durchbrochen, so dass ein sanft ansteigendes Thal hier nach dem Joch über dem Longhinsee führt.

Um vorläufig eine allgemeine Uebersicht der geologischen Verhältnisse dieser Gruppe zu geben, vereinigen wir ihre mannigfaltigen Felsbildungen in drei grosse Stufen, jede von mehr als tausend Fuss Mächtigkeit. Das Fallen ihrer Grenz- und Schichtungsflächen ist in der Regel NO, das Streichen in  $h\ 8$  oder S80O; so dass, von Maloja aufwärts, gegen Longhin und den Gravesalveskamm, oder auch, längs dem Ufer des Silsersee's gegen Silvaplana zu, man von den älteren zu den jüngeren Bildungen fortschreitet. Nehmen wir die Längenerstreckung der Gruppe, dem Engadintale parallel, in N60O an, so schneiden beide Streichungslinien, diejenige der Structur und die der äusseren Form, einander unter einem Winkel von  $40^\circ$ , und die Gruppe, als Kette betrachtet, bildet demnach den Uebergang der Längenkette zu den Querketten; es ist, nach Analogie der von C. Escher vorgeschlagenen *Diagonalthæler*, eine *Diagonalkette*.

Die *tiefe Stufe* besteht aus vollkommen ausgebildetem *Glimmerschiefer*, der stellenweise in *Gneis* übergeht. Auf der Ebene von Maloja und längs dem See, bis an das Vorgebirge in der Mitte seiner Länge, findet man keine anderen Gesteine; und, wie auf einer Treppe, steigt man, über die stufenartig hervorragenden Schichtenköpfe, von Maloja gegen den Longhinsee hinauf. — Es ist die oberste Masse der grossen Glimmerschieferbildung des Bergells und der Madrisgebirge. Auch weiter ostwärts setzt sie, schief durch den Silsersee fortstreichend, in das

Feetthal und die Berninamasse fort, und über den Muretpass findet man sie, mit immer gleicher Fallrichtung, aber beinahe vertical, bis an den südlichen Abhang, allgemein herrschend.

Die *mittlere Stufe* bietet weit entwickeltere Verhältnisse dar. Die Hauptmasse derselben, wie man sie besonders an der Nordseite des Gebirges kennen lernt, besteht aus gewöhnlichem *Flysch* und *Kalk*, und, wenn nicht die Val Cavraccia die Schichtenmasse unterbrochen hätte, würde sie mit der gleichgestellten Flyschbildung der Aversthäger in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Auf der Südseite des Engadins setzt sie in dem breiten Rücken von dunkelgrauem Kalk fort, der südlich von S. Maria bis Isola, den NO fallenden Glimmerschiefer der Feet- und Cestothäler überlagert. — In der Mitte ungefähr dieser Flyschstufe treten aber auch mächtige Stöcke von *Serpentin* auf, die auf das umgebende Gestein, durch Verwerfung der Schichten und mannigfaltige Umwandlung ihrer mineralogischen Beschaffenheit, grossen Einfluss ausgeübt haben. Auf der Mittagseite des Silsersee's wird das Vorkommen einzelner Serpentinmassen nur durch seltene Trümmer, im Cestothale und in den Schutthalden des Muretpasses, verrathen. Es ist hier das abnorm auftretende Gestein dem Glimmerschiefer untergeordnet, der auch Lager von weissem Marmor einschliesst, wie man es, nur in weit grösserem Maassstabe, jenseits der Berninamasse, im Malenkerthale findet. In der östlichen Fortsetzung der Kalkstufe, bei S. Maria und im unteren Feetthale, zeigt sich keine Spur von Serpentin, sowie er auch im Aversthale der dort so mächtig entwickelten Flyschmasse, bis auf einen Fleck von umgewandeltem, grünem Schiefer gegenüber Juf, ganz fehlt. Auf der Nordseite des Silsersee's aber zeigen sich an der Hauptstrasse mächtige Felsen von schwarzgrünem, dichtem Serpentin und durch denselben veränderten Gesteinen, und aufwärts, bei den Häusern von Gravesalvas, und von diesen bis zum Longhinsee lässt sich die Bildung ohne Unterbrechung verfolgen. Bald ist der Serpentin selbst, in schwarzen Halden, oder zackigen Felsriffen, an der einen Stelle in grossen Massen, an anderen nur in wenig Fuss mächtigen Gängen, an die Oberfläche

getreten; bald verräth er seine Nähe durch den Uebergang des gewöhnlichen Flyschschiefers in einen *grünen Schiefer*, der dem Serpentin selbst oft sehr ähnlich wird und leicht damit verwechselt werden könnte, oft auch mit *Aphanit* oder *Chloritschiefer* verwandt scheint, oder wirklich in diese Gesteine übergeht. Die grösste Verbreitung erreichen indess alle diese Steinarten, sowie der Serpentin selbst, erst westlich vom Longhinkessel, an den südlichen Abstürzen der Longhin- und Greilastöcke, am Septimer und durch ganz Cavouraggia bis Stalla.

Die Aufeinanderfolge der Bildungen zeigte uns in den zwei bisherigen Stufen keine Abweichungen, weder von der in der Madrisgruppe beobachteten, noch von der in anderen Gebirgen gewöhnlich vorkommenden Gesteinsfolge. Die *oberste* oder *östlichste Stufe* aber besteht aus Steinarten, die wir nur nach der sorgfältigsten Prüfung als wirklich überlagernde und dem Flysch aufgesetzte anerkennen dürfen. Ein eigenthümlicher *Granit-Syenit*, den wir einstweilen *Juliergranit* nennen und später genauer beschreiben wollen, bildet die Hauptmasse, und der Granithabitus ist gewöhnlich der vorwaltende. Mit demselben verwachsen und oft in grossen Massen, den Granit verdrängend, erscheint auch reiner *Syenit*, und in mehreren Abänderungen nähert sich dieser *Gabbroartigen Gesteinen*; so dass in dem Raum weniger Stunden die ganze Mannigfaltigkeit körniger Feldspathgesteine entwickelt scheint. Schichtung und krystallinisch flasrige Gesteine kommen nicht vor. Die ganze östliche Hälfte unserer Gruppe, die Crutscherols von Sils, die P. Pulasching und Piz de Graves, der Julierpass selbst, von Silvaplana bis an die Westseite Allagho, und ein Theil der nördlich angrenzenden Gebirge bestehen aus Juliergranit und den ihn begleitenden Steinarten, und sie sind es auch, die vom Gravesalvaspasse bis in die Nähe des Septimers den höchsten, mauerähnlichen Kamm der Westhälfte bilden. Dass aber diese Steinarten den Flysch bedecken und mit Recht als oberstes Glied der ganzen Stufenfolge dieser Gruppe gelten, sprach H. v. Buch bereits in seiner Profilreise über den Bernina aus, als er am Julierpasse den Flysch unter den Syenit einfallend gesehen hatte. Auf der Südseite der Gruppe



findet, wie unsere Ansicht zeigt, dasselbe Verhältniss zwischen beiden Bildungen statt. Auch der letzte Zweifel an der Richtigkeit dieser That-  
sache verschwindet aber, wenn man, auf dem Rücken über Gravesalvas, mitten zwischen Felsen von Granit und Syenit steht, und zu beiden Seiten, an den Abhängen des Gebirges, die Flysch- und Kalkschichten unter sich durchstreichen sieht. So grossartig und zugleich so vollkommen evident, und so leicht auch dem ungeübtesten Bergsteiger erreichbar, lässt sich die Auflagerung granitischer Gesteine auf petrefactenführende Secundärbildungen in europäischen Gebirgen kaum zum zweitenmale beobachten!

---

#### 1. Nordseite und oberster Felskamm.

In den Umgebungen von *Stalla*, wo wir in dem alterthümlichen Gasthause öfters für mehrere Tage freundliche Aufnahme fanden, ist der *grüne Schiefer* die am allgemeinsten verbreitete Steinart. Dieses merkwürdige Umwandlungsgestein erscheint im gewöhnlichen Flysch, nicht sowohl nester-, als fleckweise; indem in mächtigen dunkelgrauen und kalkführenden Schiefermassen unvermuthet der Flysch, in grösserer, oder kleinerer Ausdehnung, eine hell seladongrüne Farbe annimmt, ohne dass an den Grenzen, sowohl nach der Fortsetzung der Schieferung, als senkrecht auf dieselbe, eine andere Trennung, als die der Farbe, bemerkt würde; indem ferner der Uebergang vom schwärzlich Grauen in das schönste Grün meist durch alle Zwischenstufen vermittelt wird; oder im nämlichen Handstück beide Farben streifenweise einander durchziehen. Mit der Veränderung der Farbe, wenn das Grün vorherrschend geworden ist, verbindet sich eine geringere Spaltbarkeit. Es erscheint zwar auf den Bruch- und Spaltungsflächen das Gestein immer noch schiefrig; aber die Blätter sind weniger leicht trennbar, und man erhält durch den Schlag des Hammers eher einen Querbruch, als Schieferflächen, und, wie bei manchen Thonarten, dickstänglichte

Bruchstücke mit sehr zersplitterten Enden. — Gehört die angrenzende Masse dem Glimmerflysch, oder Talkflysch an, so zeichnen auch die grünen Schiefer sich aus durch stärkeren Glanz und mehr krystallinisches Aussehen der Blättchen, und gehen über in grünen *Talk-* und *Chlorit-schiefer*. — Auch die dünnen Kalkstraten, die häufig im Flysch vorkommen, im gemeinen Flysch von grauer Farbe und dicht oder feinkörnig, im Glimmerflysch weiss und durchscheinend, nehmen oft Theil an der Färbung, und bei Stalla, wo der grüne Flysch überhaupt mehr den krystallinischen Habitus trägt, findet man ausgezeichnete grüne Marmorarten mit weissem Marmor verwachsen, als schmale Nester und Lager im herrschenden Schiefer. — Bei stärker fortgeschrittener Umwandlung endlich wird das Gestein einem versteckt schiefrigen oder dichten, berggrünen *Aphanit* ähnlich, mit unebenem Bruch, matt, undurchsichtig, vor dem Löthrohr ziemlich leicht zu schwarzem Glase schmelzend, mit Säuren nicht aufbrausend. Beinahe möchte man darin den grünen Aphanit des inneren Davoserstocks wiedererkennen \*); doch zeigt sich südlich vom Davoser-Landwasser und der Albula keine Spur von Mandelsteinen und Variolith.

Mit dem grünen Schiefer enge verbunden, zeigt sich häufig auch *rother Thonschiefer*, und durch inniges Verschmelzen beider entstehen grünlich rothe und violette Abänderungen. Nicht selten geht aber der rothe Schiefer auch in einen versteckt schiefrigen kirschrothen *Jaspis* über, der untergeordnete Lager oder Nester im grünen und rothen Schiefer bildet, und an einzelnen Stellen bedeutende Mächtigkeit erlangt.

Es wird niemand bezweifeln, dass bei allen diesen Metamorphosen des grünen Flysch auch die chemische Beschaffenheit desselben wesentliche Veränderungen, nicht nur durch neue Verbindungen der früher vorhandenen, sondern auch durch neu hinzugetretene Stoffe, erlitten haben müsse. Diesen Veränderungen und den sie bedingenden Processen

\*) S. Die Gebirgsmasse von Davos, p. 51 u. f.

durch die chemische Analyse nachzuspüren, wäre eine äusserst verdienstvolle, aber auch sehr schwierige und weitläufige Arbeit, indem nur die Untersuchung mehrfacher Suiten von Gesteinen zu einem Resultate führen könnte. Bei unserer Unkenntniss der Bestandtheile, sowohl der grauen, als der grünen Schiefer, sind wir auf die Folgerungen angewiesen, die sich aus den deutlicher entwickelten Mineralien ziehen lassen.

Wir haben bereits des *Kalks* erwähnt, der an einigen Stellen mit dem grünen Schiefer verwachsen vorkommt, während dieser an anderen Stellen ganz frei davon erscheint. Eben so findet man ihn zuweilen reich an *Quarz*: in Adern und Nestern, als weisser Milchquarz, oder auf Kluftflächen auskrystallisirt; zuweilen scheint derselbe ganz zu fehlen. — Analoge Verhältnisse zeigt der gewöhnliche graue Flysch \*). Dem grünen Schiefer eigenthümlich ist dagegen der fast nie fehlende *Epidot*, theils derb, in gelblichgrünen, feinkörnigen oder dichten Parteen, innig verschmolzen mit dem übrigen Gestein, oder in eigenen Adern ausgesondert; theils in stänglichten Aggregaten auf Kluftflächen; theils endlich in lauchgrünen, wenig deutlichen Krystallen und Drusen. Eine Varietät des Epidots ist wahrscheinlich der *Asbest*, der hier und da Adern bildet; lauchgrün bis hellgrau, mehr strahlig als fasrig, mit Seidenglanz. Eine der auffallendsten Aussonderungen, die wir an mehreren Stellen fanden, ist *Diallag*, grau mit metallähnlichem Glanz. Der Schiefer, worin diese Diallagparteen vorkommen, ist vielleicht dem Diallagthonschiefer beizuordnen, den Hr. Dumont am Lütticher Uebergangsgebirge aufgefunden hat. Nur in dem sehr verdichteten, Aphanit ähnlichen, Schiefer fanden wir auf Kluftflächen und in Adern *Albit*, rein ausgebildete Zwillinge, wasserhell oder durchscheinend, in Drusen vereinigt, grosse Flächen überdeckend.

Sowohl in dem dichten, als im schiefrigen Gestein ist nicht ganz selten *Schwefelkies* eingesprengt; in kleinen Würfeln, oder in feinen, durch die ganze Masse in grosser Menge vertheilten Pünktchen.

\*) S. Gebirgsmasse von Davos, p. 18 u. f.

Wo grüner Schiefer, auch nur in einer Ausdehnung weniger Klafter, vorkommt, darf man erwarten, *Serpentin* zu finden; doch tritt derselbe, wie wir es schon im Davoserstock gesehen haben, auch mitten im unveränderten Flysch auf. Die Steinart ist von dem Serpentin der Davosergebirge nicht verschieden, dicht, grünlich schwarz, matt, zuweilen mit ausgesondertem Diallag; nach vielen Richtungen zerspalten, die Spaltungsflächen stark glänzend, hellgrün, talkartig, oder mit Pikrolith überzogen. Grosse Massen erscheinen oft wie ein Haufwerk schaliger, äusserlich verglaster Stücke. Die Trennung vom grünen Schiefer ist zuweilen sehr scharf; zuweilen aber scheint auch ein Uebergang zwischen beiden Bildungen statt zu finden, so dass man wohl dem Gedanken Raum geben möchte, der Serpentin sei eben nur die letzte Stufe der Umwandlung des grauen Flyschgesteins, und der grüne Schiefer das vermittelnde Glied zwischen beiden.

Auch oberhalb Stalla, im Allaghothale, ist der grüne Schiefer, mit öfteren Uebergängen in gewöhnlichen, oder in Glimmerflysch, die herrschende Steinart. Nicht selten wird er vom Serpentin durchbrochen, in verticalen Gängen, an welche sich die Schieferstraten parallel anlegen. Das allgemeine Fallen der Flyschbildung ist indess immer NO, dem horizontalen genähert. An der obersten Windung der Strasse, wo der Flysch ein wahrer Talkschiefer geworden ist, betritt man das Gebiet des Granit-Syenits, der bis Silvaplana in mannigfaltigen Abänderungen alles Anstehende bildet. Die antiken Säulen, auf der Höhe, die aus einer Art Lavezstein bestehen, schwarze, serpentinähnliche Grundmasse mit grünlichem Talk übermengt, stammen vielleicht von Chiavenna, oder aus dem Feetthale her. Die Trümmer von rothem Jaspis, die nicht selten auf der oberen Fläche des Juliers zerstreut liegen, scheinen von den Gletschern des Gandalva hergeschoben zu werden und eine, uns unbekannt gebliebene, vereinzelte Serpentinmasse in diesem Gebirgsstock zu verrathen.

Der *Juliergranit* ist, wie schon H. v. Buch es ausgesprochen, von dem Granit, der in anderen Gegenden der Alpen vorkommt, wesentlich

verschieden. Eine sonderbare Aehnlichkeit zeigt er dagegen mit den grünen Granitgeschieben, die in Menge, in einzelnen Lagern vorherrschend, sich in der Nagelfluh des Belpbergs, bei Thun und in den Gebirgen des Emmenthals finden. Es ist ein Gemenge von mittlerem Korn aus zweierlei Feldspath, Quarz, Hornblende und wenig Glimmer. Der eine Feldspath ist Orthoklas; graulich und grünlich weiss, durchscheinend, deutlich krystallinisch, mit ausgezeichnetem Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen, zuweilen prismatisch in grösseren Zwillingen ausgesondert. Der andere Feldspath scheint dichter Labrador; blassgrün in's Spangrüne, mit schwarzem Wachsglanz bis matt. Beide schmelzen vor dem Löthrohre; der letztere brennt vorher sich weiss, blättert dann auf, nach vielen Spalten, die vielleicht Spuren von Zwillingbildung sind, und zerfällt. Zuweilen ist der Orthoklas fleischroth; zuweilen auch ist er stark mit dem grünen dichten Feldspath verwachsen. — Der Quarz steht bald nur wenig gegen den Feldspath zurück, bald verschwindet er fast ganz; er bildet derbe Parteen, grau, halbdurchsichtig, dicht und rissig. Die Hornblende ist rabenschwarz, auf deutlichen Theilungsflächen glänzend; derb, oder in undeutlich begrenzten Prismen. Der Glimmer, der immer zurücksteht, und zuweilen ganz fehlt, ist ebenfalls schwarz, in kleinen Blättchen mit der Hornblende verwachsen. Nicht selten ist Schwefelkies eingesprengt.

Obgleich die vorherrschende Abänderung des Gesteins dem Granit mehr als dem Syenit sich nähert, so wird man doch auf einige Massen der Julierhöhe eher die letztere Benennung übertragen. Die einen sind ausgezeichnete Aggregate von grosskörniger Hornblende, zwischen die sich Parteen von ziemlich weissem dichtem Feldspath eingedrängt haben; krystallinischer Feldspath fehlt ganz, und Quarz erkennt man mit Mühe in seltenen zerstreuten Körnern. Andere Varietäten sind ebenfalls arm an Quarz; die Hauptmasse ist ein feinkörniges Gemenge von dunkel und hellgrünem dichtem Feldspath, und in diesem dioritähnlichen Gestein sind stark schillernde schwarze Parteen ausgesondert, die man für Durchschnitte zolldicker, sechsseitiger Säulen erkennt, wahrscheinlich Horn-

blende; andere schillernde Theile von kupferrother Farbe sind Aggregate parallel liegender Glimmerblättchen.

Von der grossen Strasse des Julierpasses stiegen wir, zur Linken des Hauptthales, über eine hohe Stufe aufwärts in das, auch oberhalb derselben noch steile Thal von Gravesalvas. Es bezeichnet dasselbe die Grenze der östlich fallenden Flyschmasse, gegen den ihr vorliegenden Granit, der, von Unten bis auf die Höhe des Silserpasses, in furchtbar schroffen und hohen Felsen, ihr Fuss mit mächtigen Schutthalden bedeckt, zu den Gipfeln des Piz de Graves aufsteigt. Der Schiefer des Thalbodens und der Westseite des Tobels, ist vorherrschend schwärzlich grauer Glimmerflysch, gar nicht aufbrausend mit Säuren, von wahrem Glimmerschiefer sich kaum unterscheidend, zum Theil aber, besonders nahe am Grath, zeigt er sich auch als gewöhnlicher Mergelflysch, von dem allgemein verbreiteten Bündtnerschiefer nicht verschieden. Mit ihm wechselt, wie im Allagho, grüner und rother Schiefer, und, als beträchtliche Einlagerung, erscheint, nicht weit oberhalb der unteren Thalstufe, braune Rauchwacke, Höhlen bildend, und nach Oben zu in sehr feinkörnigen, fast dichten, hellgrauem Dolomit übergehend.

Auf der Höhe ist der granitische Felskamm in einer Ausdehnung von ungefähr 15 Schritten beinahe ganz zerstört, und die aus ihm entstandenen Trümmerhalden stossen am Grathe zusammen. Die vorherrschende, schwarz aussehende Steinart dieser Trümmer ist aber nicht Juliergranit, sondern *Syenit*. Ein feinkörniges Gemenge zweier Bestandtheile, der vorwaltende, grünlichschwarz, glänzend, ist, dem Winkel der Spaltung zu Folge, Hornblende, zuweilen in breiten Prismen auskrystallisirt; der andere, grünlichweiss bis spangrün, dicht, ist wohl unzweifelhaft dieselbe labradorartige Substanz, die auch im Granit vorkommt. Das Verhältniss des Syenits zum Granit lässt sich gleich östlich vom Passe an den Felswänden des Piz de Graves bestimmen. Man sieht hier den Syenit mit scharfer Trennung dem gewöhnlichen Juliergranit aufsitzen, und Gänge von Granit steigen durch den Syenit in die Höhe; aber in nicht grosser

Entfernung zeigen sich umgekehrt Gänge von Syenit im Granit, oder ganz umschlossene eckige Massen der ersteren Gebirgsart in der letzteren; und an noch anderen Stellen geht offenbar das eine Gestein in das andere über, so dass beide Felsarten wohl nur als gleichzeitig gebildet betrachtet werden können. Zu eben dem Resultat führt die genauere Untersuchung der Syenitblöcke, die am Passe liegen; denn in grobkörnigen Aussonderungen ist der weisse stark glänzende Feldspath, der mit der Hornblende verwachsen ist, offenbar derselbe Orthoklas, der im Juliergranit selbst auch vorkommt. — Sollte jedoch eine der beiden Steinarten, Granit oder Syenit, als die jüngere, Gänge bildende, anerkannt werden müssen, so könnte jedenfalls der Granit weit eher, als der Syenit, auf diese Auszeichnung Anspruch machen.

Wo der Syenit sich in kleineren Massen im Granit verästelt, ist er in einen scheinbar homogenen, dunkel graulich grünen *Hornfels* übergegangen, der am Granit sich scharf abschneidet, und häufig von Adern und Nestern von grünlich gelbem *Pistacit* durchzogen wird, gleich demjenigen, der sich im grünen Schiefer findet. Derselbe *Pistacit* bildet öfters zwischen dem Granit und Syenit eine Art Saalband.

Sowohl im Syenit, als im Granit kommen aber überdiess Gänge von einem dunkel grünlich braunen, sehr zähen Gestein vor, das einem *Feldstemporphyr* oder *Dolerit* nahe verwandt scheint. Mit dem Dolerit, der im Vicentinischen und im Süd-Tyrol Gänge bildet, ist die Aehnlichkeit oft sehr täuschend. In der dicht verwachsenen, beinahe matten Grundmasse sind gleichfarbige, oder hellgraue, starkglänzende Krystallblättchen ausgesondert, die nur an den äussersten Kanten schwer zum weissen Glase schmelzen und wahrscheinlich der Feldspathfamilie angehören. Die Grundmasse selbst erscheint, nachdem sie etwas geglüht worden ist, als ein feinkörniges Gemenge innig verwachsener schwarzer und hellgrauer Theile, beide schwerer schmelzbar als die Hornblende und der Feldspath des Syenits. Auch das äussere Ansehen des Steins ist von demjenigen des Syenits sehr verschieden und mehr porphyrartig. —

Auffallend sind, besonders an dieser Steinart, fettglänzende, grüne, oder dunkelbraune Ablosungen, wie man sie sonst nur am Serpentin zu sehen gewohnt ist. Es fehlen diese Ueberzüge auch im Syenit und Granit des Piz de Graves nicht ganz.

Man darf nur wenig an der Südseite des Passes hinuntersteigen, so gelangt man auf die grosse Schiefermasse, die auch an diesem Abhange, mehrere hundert Fuss mächtig, zu Tage geht. Die Granitfelsen des Piz de Graves senken sich, wie das allgemeine NO Fallen es erwarten lässt, mehr und mehr der Tiefe zu, und erreichen, zwischen beiden See'n, den Thalgrund, auch hier dieselben Verwachsungen von Granit und Syenit zeigend, wie auf der Höhe. — Die Schiefer- und Kalkmasse zeigt in der Nähe ihrer krystallinischen Decke dieselbe Mannigfaltigkeit bunter und umgewandelter Gesteine, wie sie am Urbachsattel und in anderen Gegenden der Alpen unter ähnlichen Verhältnissen vorkommen. Es ist zunächst unter dem Passe ein wahrer *Galestro*, glänzend grüne und rothe Schieferblätter, welche Straten von blassrothem, violettem und weissem krystallinischem Kalk und grössere Quarznester umwickeln. Mit diesen Gesteinen in bedeutenden Massen verwachsen erscheint *Rauchwacke* und körniger *Dolomit*, gelblich weiss und blaulich grau, mit gelb bestaubter Aussenfläche, und beträchtliche Parteen dieser Steinarten sieht man auch an der oberen Grenze ganz von Syenit umschlossen, und durch ihn von der unteren Masse getrennt. Auch hier greifen die zwei anstossenden Bildungen in einander ein, wie früher Granit und Syenit; aber es bleibt wohl kein Zweifel, dass der tiefere Flysch doch wirklich die ältere, der Syenit die spätere entstanden sei.

Unsere Reise bezweckte vorzugsweise eine genaue Untersuchung dieser aufgesetzten Feldspathgesteine. Wir wandten uns daher sogleich vom Grathe aus westlich, zunächst, unter den hoch aufgethürmten schwarzen Felsstöcken durch, quer über die breite Halde von Blöcken, die sich steil gegen die oberen Weideplätze des Silser-Gravesalvas hinabsenkt; nicht ohne Bangigkeit zuweilen nach den ganz zerspaltenen, beinahe



nur aus losen Trümmern bestehenden Felsen aufblickend, die bei der geringsten Erschütterung einzustürzen drohten.

Auch diese Felsen bestehen, nach ihrer Hauptmasse, aus feinkörnigem, dunkeln Syenit. Das tiefer anstehende Gestein aber ist, wie am Piz de Graves, grobkörniger Juliergranit. In verticalen Gängen sieht man ihn durch den Syenit in die Höhe steigen, und Blöcke, die nur aus den obersten Gipfeln herkommen können, beweisen, dass er bis in diese eingedrungen ist. Auch die braunen, porphyrartigen Gänge zeigen sich hier wieder, bald scharf getrennt, bald glaubt man Uebergänge in den Syenit zu bemerken. Lebhaft wurde der eine von uns an die ähnlichen Verhältnisse bei Predazzo erinnert, wo der grobkörnige rothe Granit des M. Mulatto dem höheren schwarzen Gestein eben so zur Grundlage dient, und sich gangartig in demselben verzweigt \*).

Der Felskamm erleidet nun eine zweite Unterbrechung, wie auf dem verlassenem Passe, und man kann wieder von der Halde auf den Grat selbst gelangen. Hellgraue und grünliche, meist fein salinische Kalkschiefer, die Ablosungen mit zartem talkähnlichem Glimmer überzogen, bedecken denselben, als anstehendes Gestein, in ziemlich grosser Ausdehnung, indem die Flyschmasse deutlich, von beiden Abhängen her, bis auf die Einsattlung fortsetzt. Und doch bedarf es einiger Aufmerksamkeit, um sich über die Natur des Bodens nicht zu täuschen; denn über den ganzen Rücken liegen auch Syenitstücke, in solcher Menge, dass man oft den Schiefer dazwischen kaum zu sehen bekommt; es sind die letzten Zeugen, dass auch über diese Stelle die Syenitmauer sich früher forterstreckte, als die Zerstörung, der einst auch die anderen Stöcke erliegen werden, noch weniger weit fortgeschritten war. Dass von diesen Stöcken her die Trümmer auf den schmalen Grath gefallen seien, erlaubt die Gestaltung der Localität nicht anzunehmen. Zugleich wird aber durch diese Stelle, so wie durch den Gravesalvaspass, noch eine

\*) S. Studer in Leonh. min. Zeitschrift 1829.

andere wichtige Thatsache entschieden; es beweisen beide, dass der aufsitzende Syenit nicht etwa, wie ein Dyke, in die Tiefe setze und die Flyschmasse gangartig durchbreche, sondern wirklich als aufgelagertes Gestein betrachtet werden müsse. Wenigstens darf, wenn eine Verbindung des Syenits mit tieferen Massen angenommen werden sollte, diese Verbindung nur auf einzelnen Punkten, und nicht zusammenhängend, nach der ganzen Länge des Felskammes, vorausgesetzt werden.

Wahrscheinlich hätten wir von hier aus, an der Nordseite hinunter, nach V. d'Emmet gelangen können, doch schien das Unternehmen etwas misslich, und, auch in der Hoffnung noch fernere Resultate zu gewinnen, zogen wir es vor, über eine neue Trümmerhalde, die sich an der Südseite des westlichen Syenitstockes hinabsenkt, weiter vorzudringen.

Kleinkörniger Syenit ist immer das vorherrschende Gestein. Grobkörnige Aussonderungen bestehen, grösstentheils, aus in einander verwachsenen Orthoklasprismen und Zwillingen, stark glänzend, bräunlich-weiss, durchscheinend; mit wenig Hornblende und noch weniger Quarz; ein Gestein, das einen Uebergang bildet in Juliergranit, von dessen Vorkommen, in vollkommener Ausbildung, auch viele Blöcke in der Trümmerhalde zeugen. Am westlichen Ende der Felsen geht der Syenit in den beinahe homogenen, dunkelgrünen Hornfels über, mit sehr täuschenden Serpentinablosungen, und, zu unserer grossen Ueberraschung, glaubten wir, mit diesem Gestein Eine Masse bildend, auch den grosskörnigen *Gabbro* von Marmels zu erblicken, eine entschiedene Serpentinfelsart. Beide Steinarten sehen sich wirklich äusserst ähnlich; derselbe apfelgrüne dichte Labrador, dieselbe Art des Verwachsens mit dem deutlich blättrigen schwarzen Gemengtheil. Aber der letztere ist nicht Diallag, sondern Hornblende, in stark verwachsenen Aggregaten krummblättriger Individuen, aus denen sich, mit einiger Sorgfalt, Splitter lostrennen lassen, die am Reflexionsgoniometer den Winkel von  $124\frac{1}{2}^{\circ}$  zeigen. Hin und wieder sind auch einzelne Quarzkörner beigemengt, und, mit dem Labrador innig verwachsen, erscheinen weisse unvollkommen kry-

stallinische Feldspaththeile; so dass die Steinart wirklich von den grobkörnigen Syeniten, wie sie auch am Julier vorkommen, sich nicht wesentlich zu unterscheiden scheint; der apfelgrüne dichte Feldspath und die Hornblende scheinen in beiden Gesteinen dieselben zu sein. — Zugleich mit der Hornblende und untrennbar damit verbunden, zeigen sich jedoch auch dünne, halbmatt glänzende, graue Blättchen, die man wohl für Diallag halten möchte, und das schwarze Mineral selbst lässt auch zwei auf einander senkrechte Absonderungen von geringerer Deutlichkeit erkennen, die den Gedanken, dass die Hornblende sich dem Diallag annähert, und ein Uebergang des Syenits in Gabbro sich vorbereite, nicht ganz fallen lassen.

*Hr. v. Fellenberg* hat die Gefälligkeit gehabt, die drei wesentlichsten Gemengtheile dieser Gebirgsart, den schwarzen, hornblendartigen, den apfelgrünen und den damit verwachsenen weissen feldspathartigen, einer genauen chemischen Analyse zu unterwerfen, und folgende Resultate erhalten:

*Schwarzer Bestandtheil.* Spec. Gew. = 3,203; Härte = 4,2 V. d. L. zum schwarzen Glase schmelzend.

Kieselerde . . .	43,844	. . .	7
Eisenoxydul . . .	41,298	}	3
Manganoxydul . . .	3,916		
Kalkerde . . .	6,630	}	4
Talkerde . . .	2,930		
Kali . . . . .	4,557		
<hr/>			
100,124			

Diese Zusammensetzung lässt sich darstellen durch  $\text{Mg}^{\text{C}}_{\text{K}} \left\{ \text{Si} + 3 \left\{ \begin{smallmatrix} \text{f} \\ \text{mn} \end{smallmatrix} \right\} \text{Si}^2 \right\}$ ;

eine Formel, die allerdings sich von der gewöhnlichen Hornblende-Formel beträchtlich unterscheidet; so wie auch die geringe Härte eher auf andere verwandte Species hindeutet.

*Apfelgrüner Bestandtheil.* Spec. Gew. = 2,809; Härte = 6,2; V. d. L. an den Kanten zum weissen Glase schmelzend.

Kieselerde	. . .	57,37	. . .	7
Thonerde	. . .	25,06	. . .	3
Kalkerde	. . .	5,60	} 2	}
Talkerde	. . .	4,15		
Eisenoxydul	. . .	3,25		
Kali und Natron	. . .	8,59	4	1
<hr/>				
101,02.				

Diese Analyse entspricht die Formel  $(\overset{N}{K}Si + 3ASi^2) + 2(RSi + 3ASi^2)$ , die sich, unter den verschiedenen Formeln der Feldspathfamilie, am meisten noch derjenigen des Labradors annähert.

*Weisser Bestandtheil.* Spec. Gew. = 2,794; Härte = 6. V. d. L. sich wie der vorige verhaltend.

Kieselerde . . .	60,767	. . .	6 +
Thonerde . . .	21,373	. . .	2
Kalkerde . . .	4,537	} 2	}
Talkerde . . .	3,323		
Eisenoxydul . . .	3,050		
Kali . . .	3,531	} 4	}
Natron . . .	3,963		
<hr/>			
100,544.			

Die entsprechende Formel ist  $(\overset{N}{K}Si^2 + 2ASi^2) + 2(RSi^2 + 2ASi^2)$ , und stimmt mit der vorigen sehr nahe überein. Da in der angrenzenden Gebirgsart auch Orthoklas sich entwickelt hat, so dürfte leicht die apfelgrüne, dichte Substanz eine Verbindung von Orthoklas mit wahrem Labrador sein, und dieser im weissen Bestandtheil sich etwas reiner ausgeschieden haben.

Eine Lücke in dem Syenitkamm gestattete uns von Neuem die Ansicht des nördlichen Abfalls der Kette. Wie auf der vorigen Einsattelung,

zeigte er sich wieder sehr steil und durch hohe Felswände unterbrochen, so dass an ein gerades Hinabsteigen nach *Alpascel* nicht zu denken war. Von dem hohen Syenitstock, den wir so eben glücklich umklettert hatten, sahen wir jedoch, an seiner Nordseite, einen steilen Felsgrat sich gegen *Roccabella* erstrecken, von wo man leicht in das tiefere Weidland gelangen konnte. Ueber einige Schneeflächen und Trümmerhalden weg glaubten wir, von unserem Standpunkte aus, ihn erreichen zu können, und wir beschlossen, auf diese Weise unseren Rückweg nach Stalla zu versuchen.

Der Syenitstock wird von der Westseite her unterteuft durch eine wohl 25 F. mächtige Masse von weissem dichtem *Quarz*, die schon von ferne unsere Aufmerksamkeit erregt hatte, indem wir den weithin schimmernden schneeweissen Fels für Gyps zu erkennen glaubten. Die Masse zieht sich, quer in die Kette einfallend, gegen die Axe des Syenitstocks und schneidet sich daselbst ab. Unter ihm steigt die Schiefermasse bis auf den Grath und herrscht, ohne Syenitbedeckung, bis an einen westlichen, kleineren Stock, der, nach seiner Farbe und den Trümmerhalden zu urtheilen, wieder aus Feldspathgesteinen besteht. Jenseits diesem Stocke fehlen diese Gesteine aber, in weit grösserer Ausdehnung; die mächtige Kalk- und Schiefermasse, die, von Sils her, immer höher gegen Westen ansteigt, hat hier endlich den Grath erreicht; dieser verliert die frühere zackige Gestalt und rundet sich ab; bis, gegen den Septimer zu, am westlichen Ende der Gruppe, die schwarzen Felsstöcke von Neuem auftreten, und nun, ohne fernere Unterbrechung, bis an den Pass nach dem Longhinsee, den Rücken krönen. Auf diesem Wege werden wir sie bald näher kennen lernen.

So wie wir, an der Nordseite des Gebirges, den Felsgrath erreicht hatten, der uns nach *Alpascel* führen sollte, zeigte sich, in der Grundlage des so eben verlassenen Syenitstocks, gewöhnlicher, schwarzgrauer *Bündtnerschiefer*, sowohl Kalk- als Mergelschiefer, zuweilen mit Glimmerüberzug. Es sind die alleinherrschenden Gesteine längs diesem ganzen nördlichen Absturz der Kette, und, nur in der Tiefe, in den oberen

Weiden, erscheint noch schieferiger dolomitischer Kalk, mit gelber staubiger Aussenfläche, wahrscheinlich die Fortsetzung der auch im Thale von Gravesalvas ausgehenden Massen.

Der schiefrige dunkelgraue Kalk, der unmittelbar unter der syenitischen Trümmerhalde hervortritt, ist den Kalksteinarten, die in den Alpen zuweilen organische Ueberreste enthalten, so vollkommen gleich, dass wir längere Zeit seinen Schutt untersuchten. Und wirklich gelang es uns Stücke zu finden, denen nicht ohne Wahrscheinlichkeit ein organischer Ursprung beigemessen werden kann. Das eine scheint ein Bruchstück eines beträchtlich grossen *Belemniten*, und würde, wenn der Bestimmung vertraut werden dürfte, die Lagerfolge dieser Schiefer als Lias bezeichnen. Es ist ein Theil einer mehr als zolldicken conischen Röhre von concentrisch fasrigem Kalkspath. Andere Stücke, die häufiger vorkommen, stimmen überein mit Körpern, die, im Jurakalk von Engstlen im Hasli, mit Ammoniten gefunden werden. Es sind 5 Zoll lange, 2 — 3 Linien dicke Cylinder, an beiden Enden abgebrochen, in Kammern getheilt, die spiralförmig aufeinander folgen, aber nach keinem der beiden Enden eine merkbare Abnahme ihrer Dimensionen zeigen; die Kammerwände von fasrigem Kalkspath gebildet, die Höhlung der Kammern ausgefüllt mit einem 2 Linien hohen, 4 Linie dicken Cylinder von Schwefelkies, der aber meist in Eisenoxyd übergegangen ist. — Weniger zweideutige organische Ueberreste werden wir in der Fortsetzung dieser Schiefermasse, auf der rechten Seite des Allaghothales, kennen lernen.

---

## 2. Westliches Ende und Südabhang.

Die Felskette Sur Alpascel wird in ihrem westlichen Ende durch ein, von Caviggia her, sanft ansteigendes Hochthal begrenzt, das sich, um sie herum, ostwärts einem flachen Rücken zubiegt. Dieser verbindet sie mit der Glimmerschiefermasse der Greila, die den Maloja vom Septimer

trennt und in sehr zerrissenen, meist verticalen Felsen gegen Casaccia abfällt. Die Westseite jenes Hochthales bildet ein gerundeter Hügel, der ganz aus grauem und grünem Flysch besteht, und dessen westlicher Abfall an den Septimerpass angrenzt.

Indem wir, von Alpascel her, jenem Hochthale zustiegen, fanden wir ebenfalls, in der Grundlage der östlichen Kette nur Bündtnerschiefer, worin sich wohl später einst auch Petrefacten werden auffinden lassen. Alle Blöcke aber, die von den oberen schwarzen Felszacken herkommen, sind Juliergranit, der zum Theil in Quarzit übergeht, zum Theil auch Gänge und Nester von dem grünlich braunen, Dolerit ähnlichen Gestein mit sehr glatten Ablosungen, einschliesst, das wir schon auf dem Joch von Gravesalvas kennen gelernt haben. Beinahe möchte man in diesen scharf begrenzten Nestern vom Granit umschlossene und umgewandelte Flyschstücke erkennen. — Ueber Schneefelder und Schutthalden im Hochthale aufwärts steigend, erreichten wir bald die obere Höhe des Sattels, und sahen ostwärts hinunter in das öde Kesselthal des Longhinsee's (s. Tafel II), der nur durch eine enge Spalte in der südlichen Glimmerschiefersmasse einen Ausfluss nach Maloja findet. In pralligen Felswänden fällt der Granit am nördlichen Ufer unmittelbar in den See ab. Die wenig hohe südliche Umwallung dagegen bietet flächere Gehänge dar; so dass mit geringer Mühe, auf ihrem Rücken, die grandiose Aussicht auf die Eisgebirge des Bernina und Muret und auf die See'n des Oberengadin's gewonnen wird.

Die Lagerungsverhältnisse zwischen diesen fast nackten Felsmassen könnten nicht deutlicher aufgeschlossen sein. Das Hochthal, durch das man angestiegen war, hat wirklich den Granit vollkommen abgeschnitten, und auf dem Sattel, der nach dem Longhinsee führt, kann man sich ganz in der Nähe überzeugen, dass der Bündtnerschiefer mit NO Fallen unter denselben einschiesst. Aus diesem Schiefer besteht der Sattel. Es ist ein dunkelgrauer Kalk- und Mergelschiefer, mit untergeordneten Quarzlagerungen und grossen Nestern von rothem Thonschiefer und gelb bestaubtem

dolomitischem Kalk. Auch ganz nahe am Granit lässt sich keine wesentliche Veränderung an ihm wahrnehmen.

Schreitet man in mittäglicher Richtung einige hundert Schritte auf dem Sattel vorwärts, so sieht man den Schiefer allmählig eine grüne Färbung annehmen, bald ist man ganz von *grünem Schiefer* umgeben, und nun tritt auch *Serpentin* hervor, den man, an der südlichen Grenze der Schieferbildung, bis hinunter an den See verfolgen kann. Betrachtet man vom Maloja aus diesen Theil des Gebirges, so sieht man deutlich, obgleich unterbrochen, den Serpentin, in den höchsten Felsen, bis nach dem Septimer fortsetzen, und auch der grüne Schiefer steht auf dieser Linie in Verbindung mit der am Septimer und in V. Cavraggia allgemein herrschenden grünen Flyschbildung. — Unter dem Serpentin liegt, zunächst am Ufer des Longhinsee's, ein *Glimmerflysch*, der wohl bereits der grossen Glimmerschiefermasse des Maloja und nicht der oberen Flyschmasse beizuordnen ist. Auch tritt, am südlichen Wall des Thales, in bedeutender Mächtigkeit, *Gneis* auf, mit wenig entwickeltem, unklar mit weissem undurchsichtigem Quarz verwachsenem Feldspath, und bräunlich grünem, wenig glänzendem Glimmer, ein Gestein, wie es allerdings, in anderen Gegenden, im umgewandelten Flysch auch vorkommt.

Das Kesselthal wird auf der Ostseite durch einen hohen Querdamm abgeschlossen, über den man, etwas mühsam zwar, nach den obersten Weidplätzen von Gravesalvas gelangt. Der Gneis tritt in diesem Damm so nahe an den Granit, dass der Serpentin und Flysch zwischen ihnen fast ganz zerdrückt werden. Nur in der Ecke des See's, zunächst am Granit, sieht man noch den ersteren durchstreichen; aber bald verliert man ihn ganz unter dem Haufwerk hausgrosser Granitblöcke, zwischen denen durch man sich nach der Höhe des Jochs hinaufarbeiten muss. Der Gedanke an eine nähere Verwandtschaft zwischen Serpentin und Granit drängt sich auch hier wieder hervor; es zeigen sich die grünen Labradortheile in dem letzteren vorzugsweise häufig, so dass sie die



Hauptfarbe des Gesteins bestimmen, und in einigen Blöcken sind überdiess die Gemengtheile so undeutlich von einander geschieden, man möchte sagen, so unvollkommen entwickelt, dass nur die zahlreich vorhandenen Uebergänge den Namen, den die Steinart führen soll, errathen lassen.

Auf dem Joche zeigen sich ebenfalls die Gesteine, die den Gneis vom Granit trennen, nur auf eine Mächtigkeit von wenig Schritten zusammengedrängt. Der Serpentin, auf zwei Linien vertheilt, zunächst über dem Gneis und unter dem Granit; zwischen seinen zwei Massen, dolomitischer Kalk. Der Gneis, abwechselnd mit Glimmerschiefer und schmalen Lagern von weissem Marmor.

Ein schmales Thälchen, in den südlichen Abfall der Gruppe eingeschnitten, zieht sich von da, in östlicher Richtung, gegen die Häuser von Gravesalvas. Die Nordseite des, anfangs beinahe horizontalen, Thalbodens wird, noch eine beträchtliche Strecke fort, von den Felswänden der Granitmasse gebildet; bald aber bricht diese ab an der grossen Kalk- und Schiefermasse, die, von Sils her, in der Diagonale des Abhangs, bis auf den höchsten Kamm der Gruppe fortstreicht, und man sieht nun deutlich den Kalk, im Rücken des Granits, mit NO Fallen diesem aufliegen, während der Kalk selbst auch, der herrschenden Fallrichtung folgend, gegen das Innere der Kette und unter den östlicheren Granit-Syenit einschiesst. Der Granit des Longhinsee's steht also, an der Oberfläche wenigstens, nicht in Verbindung mit demjenigen des Hauptkammes und des Gravesalvaspasses; es ist eine, von Schiefer und Kalk ganz umschlossene, isolirte Masse.

Auch der Gneis, dessen Schichtenköpfe, südlich vom Joche, den Absturz gegen die Malojaebene bilden, verliert sich bald, und eine grosse Masse von schwarzem dichtem Kalk, sehr zerspalten und von vielen weissen Sphadern durchzogen, fällt in einer mehr als hundert Fuss hohen Felswand gegen den tieferen Glimmerschiefer ab, der vom Seeufer an treppenförmig, ungefähr bis zu dem dritten Theil der ganzen

Höhe des Abhanges, ansteigt. Diese Kalkmasse, nur von einer wenig mächtigen Flyschdecke überlagert, bildet die rechte, sehr flach sich erhebende Seite des Thälchens, bis gegenüber dem Ende des Granits, wo der Thalboden sich stärker und mehr dem Mittag zu senkt, so dass er nun den Kalk durchbricht. Theils im Bette des Thalbaches, theils, noch auf der rechten Seite, den Flysch und Kalk überlagernd, setzt auch der Serpentin hier durch, in einer schmalen Linie, die man bis an den vorderen Abfall des Thalbodens verfolgen kann.

Hier, wo der Granit sein Ende erreicht, befindet man sich also mitten in der grossen Kalk- und Schieferbildung, aus der, vom Glimmerschiefer bis an den Granit-Syenit des obersten Rückens, die Hauptmasse des Gebirges besteht. Die früher erwähnte südliche Kalkmasse vereinigt sich nun mit derjenigen, die weiter westlich den Granit überlagert, oder es ist nur gewöhnlicher Flysch, der sich zwischen sie hineindrängt. Der Serpentin aber setzt hier auf die linke Seite des Baches über und krönt, in zackigen schwarzen Felsen, im Kleinen die Gestalten des obersten Kammes nachahmend, das Kalkriff, das sich gegen Gravesalvas hinabzieht. Unmittelbar unter der Serpentindecke sieht man weissen, fast pulverartig feinkörnigen Kalkschiefer, so stark gemengt mit hellgrünen Talkschrüppchen, dass er wie Talkschiefer aussieht. Tiefer folgt beinah dichter grauer Dolomit. Fast sollte man glauben, durch Einwirkung des Serpentin habe sich an der oberen Grenze die Talkerde als Talk ausgeschieden, und der reine kohlensaure Kalk sei nun für sich krystallisirt. An anderen Stellen zeigt sich als Unterlage des Serpentin grüner Schiefer, der in grösserer Entfernung in grauen Flysch übergeht. Noch an anderen findet man hellfarbige, gneisartige Glimmerschiefer und wirkliche Talkschiefer.

Bald wird indess die Kalkmasse von Neuem zerrissen; der Serpentin stösst in grosser Mächtigkeit nun auch aus der Tiefe hervor, und drängt sie auseinander. Der westliche Schenkel des Kalks setzt; durch die Terrasse unterbrochen, welche die beiden oberen Häusergruppen von Gravesalvas trägt, gegen den See nieder, und bildet daselbst ein hohes

Vorgebirge, zum Theil in Dolomit und Rauchwacke, zum Theil auch in weissen Marmor übergehend, stark zerklüftet, von Höhlen durchlöchert, von vielfach gewundenen Flyschmassen durchzogen, und selbst auch, soweit noch Schichtung sichtbar ist, gewaltsam verschoben und gequält. Der Serpentin streicht ebenfalls, an der Nordseite dieses Kalkzuges bis an den See fort, begleitet von grünem Schiefer, und buntem, durchscheinendem Kalk, streifweise grün, blau und weiss, die Ablosungen mit stark glänzendem, hellgrünem, schuppigem Talk, oder mit dünnen Serpentinblättchen bedeckt.

Der obere Schenkel des Kalks dagegen wird, zwischen beiden Häusergruppen, vom Serpentin abgeschnitten, dessen tiefere Masse sich hier mit der dem Kalk aufliegenden vereinigt. An dem Ende des Schenkels sieht man Gänge von Serpentin in den Kalk aufsteigen, dessen Schichten, so wie die des stets ihn begleitenden Schiefers, sich, denselben parallel, ebenfalls vertical stellen. Der Kalk ist körnig und schiefrig, dunkelgrau mit glimmerigen Ablosungen; der Schiefer häufig grün und glänzend, Chloritschiefer ähnlich, oft aber auch grau und wenig verändert, zuweilen; als Glimmerflysch, dem Glimmerschiefer genähert. Der Serpentin schliesst hier Nester von feinkörnigem Magneteisen ein, und enthält zugleich beträchtlich viel Schwefeleisen, als feinerdige, grünlich graue Masse, oder in kleinen Nestern und Adern. Durch Zersetzung dieser Eisenerze hat sich an der Aussenfläche und auf den Spaltflächen ein dunkel rostbrauner Ueberzug gebildet, der die Aehnlichkeit der zackigen Serpentinfelsen mit der Oberfläche neuerer Lavaströme noch sehr vermehrt. Etwas östlicher, nahe an der oberen Grenze des Serpentin, erscheint derselbe, in einer beträchtlich grossen, durch einen Erdrutsch veranlassten Entblössung, äusserst zähe, mit ausgesonderten hellgrünen Parteen, die zum Theil ein krystallinisches Ansehn gewinnen, als ob das Gestein sich zu einem Feldsteinporphyr ausbilden wollte.

Noch einmal stösst der Kalk, westlich von Gravesalvas, aus dem Abhange hervor, die linke Wand des Tobels bildend, durch welches der Serpentin gegen den See fortsetzt. Der Kalk aber erreicht den See nicht ;

der Abhang verflacht sich von Neuem, und die Schutthalden des Piz de Graves erstrecken sich, ohne Unterbrechung, vom Fusse der Granitwände bis an die Strasse am Secufer. Wo der Fels sich noch aus den Trümmerhalden zu erheben vermag, besteht er aus umgewandeltem Schiefer, Galestro, und Rauchwacke. Eine bedeutende Masse von rothem Thonschiefer stösst, in einiger Höhe über dem letzten Kalkrücken, aus dem Abhang heraus, mitten zwischen den herabrollenden Trümmern des Piz de Graves, dessen Granitgipfel diesen Schiefer wie den tieferen Kalk überlagern.

Weiter westlich, wo, oberhalb Gravesalvas, die Kalkkette nicht gehoben oder weggerissen wurde, und der Serpentin, durch sie hindurch, höher anstieg, findet man, bis nahe an den Syenitkamm, *grüne Schiefer*, die zum Theil sehr auffallende Charaktere tragen. Eine graulich grüne, an den Kanten durchscheinende, schiefrige Grundmasse, verhärtetem Talk ähnlich, mit ausgesonderten dunkelbraunen Theilen und einzelnen Quarzkörnern; feinschuppiger, stark verwachsener Talkschiefer, grünlich grau bis silberweiss, dem Lavezstein der südlichen Thäler sehr nahe stehend; graulich grüne, dichte, oder sehr unvollkommen schiefrige Gesteine, dichtem Feldspath, oder Aphanit ähnlich. Jenseits dieser Durchbrechung kehrt jedoch die Schiefermasse zu dem gewöhnlichen Flyschhabitus, grünen Farben, Undurchsichtigkeit und deutlicher Schieferung zurück.

---

Das *Verhältniss des Serpentin zum Juliergranit* ist uns, ungeacht der beinahe vollständigen Bereisung der Gruppe, nicht klar geworden. Wo der Serpentin am mächtigsten auftritt, wird er durch die Kalk- und Flyschmasse vom Granit-Syenit getrennt; wo er, auf dem Longhinjoche, den Granit berührt, ist die Grenze selbst zwar verdeckt, doch sieht man beide Gesteine einander hinreichend nahe, um sich zu überzeugen, dass, hier wenigstens, keine Art von Uebergang statt finde. Für eine engere

Verwandtschaft des Serpentin mit dem Granit-Syenit zeugen aber dennoch so viele Umstände, dass, weder der Mangel eines directen Beweises derselben, durch unmittelbare Beobachtung, noch das scheinbar widersprechende Verhalten auf dem Longhinjoch, uns bestimmen können, jene Umstände alle für zufällige zu halten.

Wir erinnern zuvörderst an die glänzenden serpentinarartigen Ablösungen, die im Juliergranit so häufig vorkommen; an den apfelgrünen, dichten Labrador, der demselben so wesentlich, wie anderwärts dem Gabbro, anzugehören scheint; an die starke Zunahme dieses Labradors am Longhinjoch; an den wahrscheinlichen Uebergang des Serpentin in dichten Feldspath in dem Erdrutsch oberhalb den Häusern von Gravesalvas; an die Menge einer dem Diallag sich nähernden Hornblende im Juliergranit. Erwägt man nun, dass der Juliergranit mit keinem gewöhnlichen Granit, besonders mit keinem Alpengranit, verglichen werden kann; dass dagegen die Verbindung von Serpentin mit körnigen Hornblendgesteinen in vielen Gegenden, und in den nördlichen Bündtneralpen selbst, eine bekannte Thatsache ist; so wird man kaum mehr so entfernt sein, in dem Granit-Syenit einen Stellvertreter des sonst gewöhnlich dem Serpentin aufgesetzten Gabbro, d. h. eine körnige Entwicklung des Serpentin selbst zu erkennen.

Auch bei *Tarasp* im Unterengadin, wo, mitten zwischen Kalk- und Flyschgebirgen von grosser Mächtigkeit, eine beträchtliche Serpentineruption statt gefunden hat, mit welcher das dortige Bitterwasser ohne Zweifel in engem Zusammenhange steht, erscheint über dem Serpentin eine körnige, granitartige Felsart mit apfelgrünem Feldspath, die in vieler Hinsicht sich dem Juliergranit anschliesst. Mit den grünen Granitgeröllen der Nagelfluh, die wir früher schon dem Juliergranit verglichen haben, kommen ferner Serpentin- und Gabbrogerölle in denselben Lagern und in nicht geringer Menge vor, und der ursprüngliche Stammort dieser Gerölle scheint daher ein Gebirge von ähnlicher Zusammensetzung, wie unsere Gravesalvasgruppe, enthalten zu haben. Auch nach den Erfahrungen, die in anderen serpentinreichen Gebirgen gesammelt wurden, könnte

endlich die enge Verbindung, die wir hier zwischen Serpentin, einem Gabbro ähnlichen Syenit und Granit wahrzunehmen glauben, nicht unter die unerwarteten und unwahrscheinlichen Thatsachen gezählt werden.

Ein zweites, nicht weniger wichtiges und fester unterstütztes Resultat unserer Untersuchung ist die grosse Verschiedenheit, die sich in der *Umwandlung der den Serpentin begleitenden Sedimentmassen*, in Vergleichung mit der von den Centralgebirgen ausgegangenen, gezeigt hat. Die grünen Schiefer, in ihren mannigfaltigen Abänderungen, sind der Umgebung des Serpentin eben so eigenthümlich, als der wahre Glimmerschiefer und Gneis der Umgebung des Alpengranits. Der Grundtypus der Umwandlungszonen beider Bildungen ist ein ganz anderer, obgleich allerdings analoge Steinarten in denselben auch nicht fehlen, und z. B. die Galestrogesteine, die dolomitischen Kalke, die Talkschiefer der Serpentinzone identisch scheinen mit den Steinarten, die sich auf der Grenze von Gneis-Granit und Kalk im Berner-Oberland und in den Kantonen Uri und Glarus finden. Die Agentien, von denen die Metamorphose ausging, sind, so weit man aus ihren Producten schliessen kann, ihrem vorwaltenden Princip nach verschieden gewesen; in secundären Wirkungen haben sie übereingestimmt.

Ist aber diese Ansicht begründet, so dürfen wir die Entstehung des Glimmerschiefergebirges, in der Basis der Gruppe, nicht etwa dem Einfluss des Serpentin, sei es des ihn bedeckenden, oder eines vielleicht unter ihm in der Tiefe verborgen gebliebenen, zuschreiben; wie denn auch die Forterstreckung dieses Glimmerschiefers, weit über das Gebiet des Serpentin hinaus, deutlich genug die Unabhängigkeit beider Bildungen bezeugt. Auch haben wir früher schon diese Gneis- und Glimmerschiefermassen des Oberengadins und Bergells mit den südlicheren Centralmassen in Verbindung gesetzt. Fragt man aber nun, welche Metamorphose sich in dieser Gegend als die ältere, welche als die jüngere darstelle, diejenige des Flysch in grüne Schiefer, oder diejenige in Glimmerschiefer; oder noch einfacher, ob die Serpentinruption vor oder nach dem Aufsteigen der Centralmassen statt gefunden habe? so neigt sich die Antwort

wohl eher dahin, die Serpentinbildung für das ältere Ereigniss zu halten. Setzen wir das Altersverhältniss umgekehrt voraus, so ist schwer einzusehen, warum der Serpentin seine Einwirkung nicht auch auf den tieferen Glimmerschiefer ausgedehnt, warum er sich nur an der oberen Grenze desselben ausgebreitet, warum er nirgends ihn durchbrochen habe. Lassen wir aber die Bildung des Glimmerschiefers derjenigen des Serpentin nachfolgen, so bleibt noch für die Voraussetzung Raum, durch Einfluss der Centralmassen den tieferen grünen Schiefer in Glimmerschiefer umwandeln, diesen Einfluss jedoch an den Serpentinmassen sein Ende erreichen zu lassen. Noch stärker spricht aber, für dieses höhere Alter des Serpentin und der mit ihm verbundenen Gesteine, die Unabhängigkeit des Vorkommens dieser Massen von der Gestalt der Gebirge und Hauptthäler, während diese dagegen, wie die Gravesalvasgruppe und das Oberengadin selbst, in ihrem Streichen einen deutlichen Zusammenhang mit den im Sinn der Alpen streichenden Centralmassen zeigen. Dasjenige Ereigniss, das in den äusseren Formen des Landes die meisten Spuren zurückgelassen hat, muss aber wohl auch, wenn wir nur allgemein wirkende Processe vergleichen, das spätere sein.

Haben wir in dem Aufsteigen der Centralmassen eine jüngere Altersgrenze der Serpentin eruption gefunden, so kann die Ablagerung der Kalk- und Flyschmasse uns als ältere Grenze dienen. Denn der Flysch, der vom Serpentin durchbrochen und umgewandelt worden ist, muss offenbar als vor ihm gebildet gedacht werden. Die Belemniten, die im Flysch vorkommen, versetzen aber die Epoche seiner Ablagerung in die neuere Secundärperiode, wenn sie uns auch über die bestimmte Stelle, die ihr in diesem Zeitraum anzuweisen ist, noch ungewiss lassen; und die Serpentinausbrüche erweisen sich demnach als gleichzeitig, oder später, als die Bildung des Lias; vielleicht aber auch als gleichzeitig oder später, als die Kreidebildung, wenn wir, nach Analogie anderer alpinischer Gegenden, den Flysch der älteren Kreide unterordnen wollen \*).

---

\*) S. Die Gebirgsmasse von Davos, p. 25.

## 2. GRUPPE DER FALLERGEIRGE.

Oberhalb *Cresta* in Avers befindet sich, auf der östlichen Thalseite, ein mächtiger Gebirgsknoten, den wir als den Hauptstamm dieser viel gegliederten Gruppe betrachten können. Die massigen Stöcke, die sich in ihm zusammendrängen, an ihrer Nordseite von Gletschern umgeben, heissen in Avers das *Weisshorn*, und sind zum Theil dieselben, die sich in unserer Ansicht der Ostseite dieser Gruppe, Tab. III, Fig. 2, im Hintergrund des Fallerthales sehen lassen. Ihre Höhe vermag zwar nicht die der drei Eckpfeiler der Gruppe, des *Fallerhorns* (*Piz Platta*), des *Piz Forbice* (Forbisch ausgesprochen, *Scheerhorn*) und des *Fianell* zu erreichen, doch steigt sie wohl jedenfalls über 9000 F., da wir auch den zunächst liegenden Jochen und Wasserscheiden nicht eine viel geringere Höhe beimessen dürfen.

Wie ein Wall, steil und einförmig, doch nur an einzelnen Stellen, vorzüglich von *Cresta* an abwärts, nackte Felswände bildend, fällt das Gebirge gegen Avers ab; der Abhang ist in der Tiefe mit Weide, gegen den oberen Kamm zu, mit Felschutt bedeckt. Man würde in Avers nicht die mannigfaltige Verzweigung ahnen, die auf der Nordseite des Gebirges eine ausgedehnte Thalbildung entstehen liess.

Der westliche Ausläufer unseres Knotens, die Kette, die das untere Avers von *Sterlera* trennt, verliert immer mehr an Mächtigkeit und Höhe, je weiter er sich vom Weisshorn entfernt. In der hohen Stufe, in der Avers gegen Ferrera abfällt, setzt die Kette schief durch das Thal in die Gebirge der Westseite über, und in ihre Gesteine hat sich, zwischen *Crott* und *Canicul*, der Aversbach sein schauerlich tiefes, viel gekrümmtes Felsbett eingefressen.

Der östliche Ausläufer wächst dagegen, so wie er dem Oberhalbstein sich nähert, an Breite, und gewinnt auch mehr Mannigfaltigkeit. Von *Cresta* bis *Juf* hat über dem tieferen steilen Abhang, in einer Höhe von ungefähr 8000 F., eine meist mit Steinschutt und magerer Schafweide



bedeckte Terrasse Raum gefunden, hinter der erst der ganz kahle und felsigte Hauptkamm sich erhebt, noch schroffere Abstürze dem Fallerthale, als Avers zuehend. Aus dem vorderen Faller dringt ein beträchtliches, ödes Felsthal, die *Val Bertola* (Finsterthal), in die hier schon sehr breite Kette ein, und führt, über ein wohl bei 9000 F. hohes Joch, das *Fallerjoch*, auf eine wüste, zum Theil mit Schnee und halb zugefrorenen See'n bedeckte Gebirgsfläche, die in einer hohen Stufe gegen Juf abfällt, und durch mächtige Felsstöcke von der westlicheren Terrasse getrennt wird. Auf der linken Seite der Val Bertola entsteigt dem Nordabfall des Gebirges, das *Fallerhorn*, auffallend durch seine zahnartige, kühne Form, an seiner NO Seite einen Gletscher absenkend, an Höhe alle näheren Gebirge überragend.

Der Einschnitt, den die Stufe über Juf und die Val Bertola bilden, und der die einzige, directe, selten benutzte Verbindung zwischen Avers und Faller gewährt, lässt das noch weiter östlich liegende Gebirge beinahe als eine abgesonderte, selbstständige Masse erscheinen. Der V. Bertola, wie der jenseitigen Hochfläche, kehrt sie verticale Abstürze zu, über denen sich, im oberen Felskamm, der *Piz Scalotta* (von der tiefer liegenden Scalottaalp), und der *Piz Surparé* (Horn über der Felswand) erheben. Gegen Oberhalbstein breitet sie sich in einem ausgedehnten, in mittlerer Höhe zum Theil beweideten, tiefer hin steil abfallenden Abhange aus, dessen Fuss sich von Bivio bis Molins erstreckt und, auf ihrer linken Seite, die schöne Thalfläche von Marmels umschliesst.

Mit geringerer Mächtigkeit setzt das Gebirge von Stalla nach dem Septimer fort, und schliesst sich hier an die höheren Massen an, die das Bergell und Marozzo von den Aversthälern trennen. Die flachen Gipfel dieses Rückens erheben sich nicht beträchtlich über seine mittlere Höhe, und zwischen den zwei Hauptketten, des Fallerhorns und der Bergellergebirge, erscheint er beinahe als eine Einsattlung, obgleich er nirgends sich unter 8000 F. erniedrigt. Sein Abfall gegen das oberste Avers ist steil und felsigt, ohne Unterbrechung durch Terrassen, und ohne Ausläufer; während die Nordseite sich mehr verzweigt und kleine Seiten-

thäler des Stallathales bildet. — Drei schlecht gebahnte Pfade führen aus den östlichen Thalgründen über diesen Rücken nach Juf (6570'). Der südlichste, über die *Forcella* (8300'), vom Septimer (7140') aufwärts, längs der Grenze zweier unserer Gebirgsmassen, trifft in der Höhe zusammen mit dem mittleren, bekanntesten (8110'), der von Stalla (5500') durch die *Valletta* führt. Der nördlichste steigt, gleich hinter Stalla, auf die Alpen von *Giüls*, gelangt dann, meist in der Höhe sich haltend, in die Nähe der Steinfläche, über die der Pass von Juf nach Faller geht, und bietet zwischen Avers und Stalla, in den Sommerwochen, wo diese Höhen meist von Schnee frei sind, die nächste Verbindung dar.

Zwei andere Ketten, beide rauh und felsigt, und nur zunächst an ihrer Vereinigung einen Uebergang gestattend, erstrecken sich von unserem Gebirgsknoten mehr nordwärts, als Scheidegebirge, die eine zwischen *Faller* und *Curtins*, die andere zwischen *Nandrò* und *Ferrera*.

Die erstere Kette, gegen *Curtins* schroff abgestürzt, gegen *Faller* steile Weidgehänge bildend, in der Höhe nackt und zerrissen, wächst auch, wie die Kette des *Fallerhorns*, an Breite und Mächtigkeit, je weiter sie sich von ihrem Ursprung entfernt. In der Mitte ungefähr ihrer Längenerstreckung, steigen, zwei Fangzähnen ähnlich, die beiden *Piz Forbice* aus ihrem Rücken auf, durch ihre Höhe würdige Nachbarn des *Fallerhorns*. Von da aus vorzüglich schwillt nun das Gebirge zu einer breiten Masse an, die fast sich in zwei Ketten zerspalten zu wollen scheint, und deren, meist mit Wald und Steinschutt bedeckter Ostabhang, der Querschnitt der Kette, von *Molins* bis *Schweiningen*, die linke Thallwand von *Oberhalbstein* bildet.

Die andere, gegen *Mitternacht* laufende, Kette ist, als Wassertheiler der Stromgebiete des *Aversbaches* und des *Oberhalbsteiner-Rheins*, und auch in Hinsicht ihrer Höhe und Mächtigkeit, die wahre Fortsetzung des Hauptstammes unserer Gruppe, die Fortsetzung der *Fallerhornkette*, obgleich diese mit der durch *Campsut* streichenden Kette in noch engerem Zusammenhange steht. Gegen W steil und felsigt abgestürzt, wie die ganze

Gruppe, dehnt sie sich dagegen ostwärts in eine breite und hohe Masse aus, welche das schlundartige *Curtins* von den reich ausgebreiteten Weidgehängen der *Schmorasalpen* scheidet. An ihrem Nordende aber erreicht sie in dem colossalen Gebirgsstock des *Fianell* eine Höhe, die, gleich derjenigen des Fallerhorns, wohl wenig von 10,000 F. entfernt sein mag. Auf seiner Ost- und Nordseite ist der Fianell von beträchtlichen Gletschern umgeben, an seinem Abfall gegen die *Mossalp* und an seiner westlichen Vorstufe, dem *Schwarzkopf*, befinden sich die reichen Eisenerzgruben, von denen früher die Rede gewesen ist.

Die steilen Abstürze, die unsere Gruppe den westlichen Thälern zuwendet, sind eine Folge des fast allgemeinen, oft zwar nur schwachen *Fallens* der Schichtung nach O und NO. Das Streichen des Adulasystemes äussert sich in einem sehr beträchtlichen, besonders in dem NW Theile der Gruppe, und die Boussole zeigt meist die 8te, in den letztgenannten Gegenden aber auch nicht selten die 10te bis 2te Stunde. Die Hauptkette, welche das Fallerhorn mit dem Weisshorn und dem Fianell verbindet, nähert sich daher am meisten dem Character der Längenketten, während die Kette des P. Forbice den Querketten beizuzählen ist. Wie überall in den Alpen, wie man es allgemein in Gebirgen erwarten muss, die wiederholte Hebungen und Umwälzungen in verschiedenen Richtungen erlitten haben, sind aber auch in dieser Gruppe die Ketten nicht, wie z. B. öfters im Jura, reine Producte der Schichtenstellung, und das Streichen der Schichtung bildet in den Längenketten grössere oder geringere Winkel mit dem Streichen der äusseren Kettenform.

In dem vorliegenden Falle scheint jedoch die äussere Gestaltug beinahe mehr noch durch die *Beschaffenheit der Steinart*, als durch die Gebirgsstructur und den Schichtenfall bedingt worden zu sein.

Massiger *Kalk*, der oft in *weissen Marmor* übergeht, und *gewöhnlicher Flysch*, oder *Glimmerflysch* herrschen fast ausschliesslich in der ganzen Gruppe; es sind dieselben Gesteine, die wir in den anstossenden Gruppen der Aversthäler und der Gebirge von Gravesalvas, kennen ge-

lernt haben. Nur längs dem östlichen Abfall der Gruppe setzt, von der Val Caviggia und von Stalla her, auch der *grüne Schiefer* und *Serpentin*, in zuweilen grosser Ausdehnung und Mächtigkeit, bis nach Schmoras fort, und im westlichen Fuss des Fianell tritt mit dem weissen Marmor auch der glänzende *Chloritschiefer* und *Chloritgneis* auf. — Das Vorkommen grösserer, der Zerstörung weniger ausgesetzter Kalkmassen scheint die Erhaltung der mächtigeren Stöcke und Ketten vorzugsweise begünstigt zu haben. Aus solchen Kalkmassen bestehen nämlich grösstentheils der Gebirgsknoten des Weissorns und der mächtige Fianell, und sie herrschen auch in einem beträchtlichen Theile der Hauptkette. Eben so trug zur Befestigung der Gebirgsmasse bei, das Eindringen von Serpentin und die Umwandlung, die durch ihn der benachbarte Flysch erlitt. Daher die grosse Breite, in der sich die nach Ost auslaufenden Ketten an ihrem östlichen Ende erhalten haben. Wo aber, zwischen der westlichen Kalklinie und der östlichen Serpentinlinie, nur der unveränderte Flysch das Gebirge zusammensetzt, sieht man noch jetzt die Zerstörung so thätig fortschreiten, dass man ihr auch in früherer Zeit einen sehr wichtigen Antheil unter den Ursachen der Thalbildung und der verminderten Mächtigkeit oder der gänzlichen Zerstörung mancher Ketten zuschreiben muss.

---

#### 1. Ostseite des Gebirges.

Wenn man von *Casaccia* (4510'), an dem steilen südlichen Abfall der Hochfläche gegen den *Septimer* (7140') aufwärts steigt, so sieht man sich, ungefähr vom Eingang des Marozzothales an, fast immer nur von *grünem Schiefer* umgeben, der hier offenbar weit tiefer abwärts in den Glimmerschiefer absinkt, als in dem angrenzenden Longhinstock. Bald ist es die dem Chloritschiefer genäherte Abänderung, bald wird er sehr verwachsen, dickschieferig, bald wechselt er mit gewöhnlichem grauem Glimmerflysch, der auch wohl zu wahren Glimmerschiefer wird, und

deutlich ausgesonderten Quarz enthält. An der letzten Stufe des Berges erscheint auch eine Einlagerung von weissem Marmor, und, noch näher am Hospiz, tritt, in beträchtlicher Ausdehnung, *Serpentin* unter dem Schiefer hervor, der aber von diesem schon wieder bedeckt wird, noch ehe man das Haus erreicht hat.

Auch in der *Val Cavraggia*, vom Septimer bis nach Stalla, ist der grüne Schiefer die herrschende Steinart, und überall zeigt sich, in Anschürfungen und grösseren Steinflächen, *Serpentin* als seine Grundlage. Am letzten Abfall gegen Stalla tritt wieder gewöhnlicher schwarzgrauer Kalkschiefer auf, mit dem grünen Schiefer Eine Masse bildend, und an der Julierstrasse haben wir bereits die Fortsetzung dieser mannigfaltig wechselnden, oft von *Serpentin* durchbrochenen Gesteine kennen gelernt. Im Jahr 1849 besuchte C. Escher «am Ausgang der V. Cavraggia gegen Stalla, Anschürfungen von gelbem und buntem *Kupferkies*, eingesprengt in einer quarzig thonigen, sehr schwer zersprengbaren Masse.»

Am nördlichen Fuss des hohen Kalkstocks vorbei, der, gegen den Septimer zu, das östliche Ende der Bergellerkette bildet, führt der Pfad über die *Forcella* nach Avers. Auch hier gleiche Verhältnisse, wie im Thalboden von Cavraggia. Vom angrenzenden Kalkstock her streichen gelb bestaubte dolomitische Kalklager, oder reine Dolomitlager durch den Schiefer. An mehreren Stellen ist der sonst flach nordöstlich fallende grüne Schiefer senkrecht in die Höhe gebogen, und im Kern dieser vertical stehenden Massen findet man einen Gang von *Serpentin*. Auf der Höhe des Passes selbst, ungefähr im gleichen Niveau, wie am gegenüberliegenden Longhin, bricht *Serpentin* hervor. Dann sieht man die grünen Schiefer noch weit westlich in die Bergellergebirge hinein fortsetzen, den schwarzen Schiefer, der die hintersten Abstürze des Jufthales bildet, überlagern und sich unter den Gletschern verlieren.

Zwischen der *Forcella* und Giuils unterscheidet man, von der Roccabella aus, drei breite Kuppen in dem Rücken, der die V. Cavraggia und Stalla vom Jufthale trennt. Die mittlere scheint ganz aus *Serpentin* zu bestehen

die beiden anderen scheinen grüner Schiefer. Die charakteristischen schwarzen und braunrothen Schutthalden zwischen den rauen, verworren schiefrigen, von hellgrünen Trümmerhalden umgebenen Felsabstürzen lassen keine andere Ansicht zu, und die Untersuchung der herabgerollten Stücke, sowohl auf der Seite von Stalla, als im Jufthale, bestätigt sie vollkommen.

Der breite Gebirgsstock, der auf seiner südlicheren Abdachung die Alpen *Giüls*, auf der nördlicheren die Alpen *Scalotta* und *Promiez* trägt, und durch den Einschnitt des Fallerjoches von dem Hauptstamm der Gruppe getrennt erscheint, muss auch in petrographischer Hinsicht als die Fortsetzung des vorigen Rückens betrachtet werden. Seine Hauptmasse besteht aus grünem und grauem Schiefer, und mächtige Serpentinstöcke, so wie auch dolomitische Kalkmassen, bilden Einlagerungen in derselben.

Steigt man von Stalla über *Giüls* in die Höhe, so sieht man den grünen Schiefer, horizontal gelagert, vom Fuss des Berges bis in seine obersten Gipfel herrschen; in allen Uebergängen von gewöhnlichem Kalk- und Bündtnerschiefer, bis in den entwickeltesten, mit Serpentin zu verwechselnden grünen Schiefer. Zwei Serpentinmassen, eine in der Tiefe, die zweite in mittlerer Höhe, erscheinen als mächtige Einlagerungen, und in dem höheren Felsstock, zunächst am *Piz Surparé*, umschliesst der grüne Schiefer auch grössere Massen von dolomitischem Kalk, wie isolirte, aus aller Verbindung losgerissene Stöcke.

Die höhere Serpentinmasse setzt auch auf die rechte Seite des Baches über, der die *Giülsalp* südlich begrenzt, und umschliesst hier kleinere, aber auch bis mehrere Fuss grosse Nester eines blass lederbraunen, äusserst zerspaltenen Gesteines, das fast einem Leberopal oder Pechstein ähnlich sieht: Härte 5,5, Spec. Gew. 3,144, der Bruch, wo man ihn erhalten kann, muschlich, schwacher Wachsglanz in Fettglanz, undurchsichtig, in Säuren nicht auflöslich, v. d. L. zu einem bräunlichen bis schwarzen Glase schmelzend. Feine Serpentinadern durchziehen diese

Nester nach allen Richtungen. Gegen den Rand der Nester geht die Farbe in Violett über, der Glanz verstärkt sich, und die Rinde, nach der die Stücke sich vom Serpentin ablösen, besteht aus einem dunkelgrünen, serpentinähnlichen Mineral, von Gypshärte, durchscheinend, nach Aussen glatt und glänzend. — Hr. v. Fellenberg hat gefälligst die Analyse dieser Nester vorgenommen und folgende Resultate erhalten :

Kieselerde	.	.	50,3	.	.	3
Thonerde	.	.	19,8	.	.	1
Kalkerde	.	.	17,6	}	.	1
Eisenoxydul	.	.	10,9			
Wasser	.	.	1,3			
			<hr/>			
			99,9.			

Dieselben lassen sich darstellen durch die Formel  $\frac{\text{Ca}}{\text{Fe}} \text{Si}^2 + \text{A Si}$ , die sich am ersten mit derjenigen des *Wernerits* vergleichen lässt.

Die rauhe Hochfläche, über welche der Pfad von Juf nach Faller führt, wird gegen NO begrenzt durch die Felswände des sehr zerklüfteten Surparékammes. Ein grosser Theil der Fläche wird von den Trümmern dieses Kammes bedeckt; in grösserer Entfernung von seinem Fuss stammen die Trümmer von den halb zerfallenen Riffen und aufgeborstenen Schichten her, die überall aus dem Schnee hervorragen; und noch mehr westlich steigen die Halden von Felsschutt wieder gegen die hohen Stöcke auf, die das Kesselthal von den Jufer Schafalpen trennen. — *Grüner Schiefer* ist die herrschende Steinart des Bodens der Hochfläche, und auf beiden Seiten bildet er auch, bis in einige Höhe, den Fuss der einschliessenden Felskämme. Er ist auf's Engste verbunden mit schiefrigem *rothem Jaspis*, gelb bestaubtem *dolomitischem Kalk*, dunkel grauem *Kalk* und grauem *Bündtnerschiefer*, und in den westlichen Felsen gewinnen die letzteren Steinarten, in denen wir, leider vergeblich, längere Zeit nach Petrefacten suchten, die Oberhand. Eine scharfe Grenze zwischen dem grünen und dem gewöhnlichen Kalkschiefer ist auch hier

nicht vorhanden; beide, mit allen ihren Zwischengliedern, bilden Eine Masse.

Zu auffallenden Resultaten führt aber eine genauere Prüfung der im mittleren Theil des Kesselthales vorkommenden grünen Schiefer. Durch stärkeren Glanz und krystallinische Structur erinnern einige an *Chlorit-schiefer*, oder gehen wirklich in dieses Gestein über, wie wir es schon an mehreren Stellen gesehen haben. Andere aber werden, ohne die Schieferstructur zu verlieren, durch Farbe und Durchscheinheit täuschend dem berggrünen Labrador ähnlich, der einen Hauptbestandtheil des Bündtnerischen Gabbro ausmacht, unterscheiden sich indess von ihm durch geringe Härte. Noch andere scheinen jedoch wirklich schiefrige Aggregate von in einander verschmolzenen, dichten Labrador- oder Saussuritkörnern, und, ihrer Substanz nach, identisch mit dem apfelgrünen Mineral, das in dem Gabbro, oder dem ganz ähnlichen, das im Juliergranit vorkommt. Und endlich findet man in diesem apfelgrauen Schiefer auch grössere Diallagpartieen entwickelt, er ist zu einem wahren *Diallagschiefer* ausgebildet, den man fast lieber noch *Gabbroschiefer* nennen möchte, wenn die Identität des apfelgrünen Bestandtheils mit Labrador bestimmt erwiesen wäre. Ein beträchtlicher Kalkerdegehalt scheint jedenfalls demselben nicht zu fehlen, da, wie auch im Gabbro von Marmels, häufige Adern und innig mit der Grundmasse verschmolzene Nester von weissem, oder grünem körnigen Kalk vorkommen. Mit dem gewöhnlichen grünen Schiefer ist dieser Diallagschiefer durch eben so allmähliche Uebergänge verbunden, als der grüne Schiefer selbst mit dem grauen Kalk- und Mergelflysch, und wenn das eine Gestein als eine Umwandlung des sedimentären, petrefactenführenden Bündtnerschiefers gelten darf, so müssen wir diese Ansicht nothwendig auch auf den Diallagschiefer ausdehnen.

Beinahe wird man indess versucht, von diesem Schlusse, wo möglich, zurückzukommen, wenn man die oberen Massen der östlichen Wände näher betrachtet. Diese klippigen, wild zerrissenen Felsen, bestehn aus schwarzem *Serpentin* und vollkommen ausgebildetem *Gabbro*, identisch



mit dem bekannten Gabbro von Marmels. Es setzen diese Gesteine, rings um die Hochfläche, in das Fallerjoch fort, und bilden die Decke des westlichen Stockes; hier den grauen Schiefer eben so überlagernd, wie auf der Ostseite den grünen. Es sind Verhältnisse, wie wir sie, nur mehr im Grossen, auf dem Gravesalvaskamm, zwischen Syenit und Bündtnerschiefer gesehen haben. Ist aber der Diallagschiefer wirklich nur ein umgewandelter Flysch, so ist es kaum denkbar, dass dem massigen Gabbro eine ganz andere Abstammung zugeschrieben werde. Es verhalten sich beide Gesteine wie Gneis und Granit; denn mag auch die Identität des labradorartigen Bestandtheils noch zweifelhaft heissen, so ist dafür die des Diallags, nach allen mineralogischen Charakteren, entschieden. So wie wir nun, in der Davoser Gebirgsmasse, aus dem Flysch haben Glimmerschiefer und Gneis, und aus dem letzteren zuletzt Granit entstehen sehen; so scheint allerdings hier, nach einem anderen Bildungsgesetze, der Bündtnerschiefer durch den Diallagschiefer in Gabbro übergegangen zu sein; oder wenigstens die Möglichkeit eines solchen Uebergangs aus unserer Beobachtung sich zu ergeben, da wir leider den Diallagschiefer nur in Verbindung mit Flysch, nicht aber mit Gabbro gesehen haben. Andererseits zeigt sich dagegen hier, wie in anderen Gegenden, der Gabbro in innigstem Zusammenhang mit Serpentin; er erscheint als körnige Entwicklung des letzteren, der ja bereits häufig ausgesonderten Diallag einschliesst, und beide Steinarten bilden nur dieselbe Masse. Auch auf den Serpentin selbst müssen wir daher zuletzt diese Entstehung aus dem Flysch ausdehnen, wenn wir in unserer Schlussfolge nicht willkürlich stille stehen wollen, auf das Gestein, das wir bis jetzt geneigt waren, als die erste Ursache aller anderen Metamorphosen zu betrachten.

So ungelegen dieses Resultat scheinen mag, so kann man es doch nicht unerwartet heissen. Bereits haben wir ja die grünen Schiefer dem Serpentin in allen Charakteren so nahe treten gesehen, dass nur die Schieferung noch zwischen beiden einen Unterschied feststellte, wie denn auch H. v. Buch Vieles, das wir noch dem grünen Schiefer beizurechnen, als Serpentin beschrieben, und auf seine Karten verzeichnet zu

haben scheint. Auch hat Hr. Boué es schon ausgesprochen, dass die Verhältnisse, unter denen der Serpentin auftritt, oft sehr dafür sprechen, ihn für eine umgewandelte Steinart zu halten \*); und zur Unterstützung dieser Ansicht erinnern wir vorzüglich an die so häufig vorkommende innige Verbindung des Serpentin mit krystallinischem kohlensaurem Kalk; an das Vorkommen z. B. von Streifen und Nestern von Serpentin im Marmor, wo dieser mit Granit und analogen Steinarten in Berührung kommt, wie auf den Hebriden \*\*), bei Predazzo \*\*\*), und anderen Orten, obgleich daselbst grössere Serpentinmassen in der Nähe gar nicht vorkommen; an die feine netzartige Durchflechtung des Serpentin mit Kalkspathadern, und des Marmors mit Serpentinadern, im Davoserstock, in den Appenninen u. s. w., unter Verhältnissen, die oft denjenigen, unter welchen die Dolomitisirung des Kalks, oder die Impregnation desselben mit Kieselerde, mit Eisenoxyd und anderen Stoffen statt findet, in hohem Grade ähnlich sind; endlich, an das auffallende Verdrängen des Dolomits durch Serpentin, so dass, wo Massen des letzteren in Dolomitgebirgen auftreten, diese in der Nähe sich in reinen kohlensauren Kalk umwandeln, gleich als ob ihre Talkerde in den Serpentin übergegangen wäre. — Es ist übrigens klar, dass die Annahme eines engeren, genetischen Zusammenhangs zwischen Flysch und Serpentin keineswegs etwa uns nöthigt, von früheren Resultaten unserer Beobachtungen zurückzukommen; dass wir den aus Flysch entstandenen Serpentin und Gabbro uns eben so wohl als eine feurig flüssige, andere Gesteine in Gängen durchdringende, oder sie überfließende Masse denken können, als wenn wir voraussetzen, diese Masse sei unmittelbar dem Erdinnern entstiegen, und aus uns gänzlich verborgenen Urstoffen gebildet worden. Dagegen entzieht uns jene Annahme der Versuchung, den grösseren Theil der Veränderungen, die wir in diesen Gebirgen bemerken, die Erhebung des

\*) Boué, Guide du voyageur, II, 142.

\*\*) Macculloch, West. Isl. I. p. 21, 51, 332.

\*\*\*) Studer, in Leonh. Jahrb. 1829, p. 261.

Bodens, das Aufwerfen von Ketten, die Umwandlung der Steinarten, auf Rechnung des Serpentin allein zu setzen, indem wir uns nun genöthigt sehen, allgemeinere Processe in Thätigkeit zu setzen, von denen seine Bildung selbst nur eine der Wirkungen gewesen sein muss.

Auf dem Fallerjoche steht man dem höchsten Stocke dieser Gebirge, dem *Fallerhorn*, nahe genug, um seine geologische Beschaffenheit beurtheilen zu können. Serpentin bildet die Hauptmasse desselben; mit ihm grüner Schiefer, der, in klippigen Tafeln, artischockenartig an der Aussenfläche in die Höhe steigt, und sich im Gipfel der weithin sichtbaren Pyramide ausspitzt. Nur am Fusse des Stockes, wo nicht Gletscher oder Schutt ihn bedecken, sieht man auch schwarze Schiefer heraus-treten.

Der vordere Theil von *Faller* ist von grauem und grünem Schiefer umschlossen. Ein ganz ebener, fast kreisrunder Thalboden (5790), mit reichem Weidgrunde, dem die dorfähnlich zusammengebauten Maiensässe, und eine Kapelle am Eingang, ein stark bewohntes Ansehen geben, wird durch eine enge Clus geschieden vom hinteren Faller, *Val Grande*, der sich bis an unseren Gebirgsknoten des Weisshorn's forterstreckt. Der Engpass wird veranlasst durch das Vortreten der Basis des Fallerhorns und des Piz Forbice. — Bei den Maiensässen stehend, glaubt man die Thalfläche bis an die jenseitigen Flixeralpen ausgedehnt zu sehen, und ahnt nicht die Spaltung, in der, 4100 F. tiefer, die Julierstrasse durchzieht. Durch eine Felskluft, neben dem wild tobenden Thalbache, steigt man gegen *Molins* (4650') hinunter. Etwa eine Viertelstunde, bevor man das Dorf erreicht, im innersten Kern dieser Schiefermasse, brechen schwarze Felsen von Serpentin hervor, welcher, bei der schwachen nördlichen Einsenkung des ganzen Schiefersystemes, leicht in der Fortsetzung des tieferen Giuilsserpentins liegen könnte, wenn überhaupt bei diesem Gestein, das wir so eben auch bei 5000 F. höher verlassen haben, von regelmässiger Lagerung die Rede sein dürfte.

Im Ansteigen, längs der Hauptstrasse, von *Molins* gegen *Suur*, fallen die vielen Adern von *Pistacit* auf, die hier den grünen und rothen Schiefer

durchziehen; sowohl derber Pistacit grünlich gelb dicht, als stänglichte Aggregate und Drusen von graulich grüner Farbe. Deutliche Krystalle suchten wir vergebens.

In der südlichen Thalenge, zwischen *Marmels* und *Stalvedro*, hat nun der Strassenbau auch zahlreiche Anbrüche von grosskörnigem *Gabbro* aufgeschlossen, während früher nur von den östlichen Höhen herabgefallene Blöcke bekannt waren. Der *Gabbro* bildet unregelmässige grosse Nester im Serpentin, der selbst wieder, in verworrenen Lagerungsverhältnissen mit grünem Schiefer verwachsen ist, und diese Gesteine halten an, bis man in die Thalerweiterung von *Stalvedro* und *Stalla* eintritt.

Es schien uns, sowohl an sich, als der Vergleichung mit analogen Steinarten dieser Gebirge wegen, von grosser Wichtigkeit, den, so viel uns bekannt, noch niemals genauer untersuchten *Gabbro* und Serpentin dieser Stelle einer chemischen Analyse unterwerfen zu lassen, und mit gewohnter Gefälligkeit übernahm Hr. v. Fellenberg auch diese Arbeit.

Die zwei Bestandtheile des *Gabbro* sind deutlich von einander getrennt, und es lassen sich keine fremdartigen Beimengungen von Quarz oder krystallinischem Feldspath, wie in dem *Gabbro* ähnlichen Syenit des Gravesalvaskammes, bemerken.

Der *Diallag* ist lauchgrün, bis grünlich schwarz, mit hellgrauem Strich, auf den sehr deutlichen Spaltungsflächen stark perlmutterartig, bis halbmatt glänzend, auf den weniger deutlichen Spaltungsflächen, die jene senkrecht durchschneiden, beinahe matt. Härte zwischen 3 und 4, Spec. Gew. 3,237. Die Analyse gab folgende Resultate:

Kieselerde	. . . 46,640	}	. . . 26,46 Sauerstoff
Thonerde	. . . 4,778		
Kalkerde	. . . 17,077	}	. . . 14,52
Talkerde	. . . 17,206		
Eisenoxydul	. . . 13,451		
Wasser	. . . 0,896		
<hr/>			
100,048			

welche mit der gewöhnlichen Diallagformel,  $R Si^2$ , selbst wenn man die Thonerde noch zur Kieselerde zieht, nicht ganz übereinstimmen, indem immer die Basen einen Ueberschuss geben; die Abweichung ist indess nicht so gross, dass man dem Mineral die Aufnahme in die Familie der Diallage verweigern könnte. Durch den geringeren Gehalt an Kieselerde nähert sich dasselbe auch den Hornblenden; zu gänzlicher Uebereinstimmung mit ihrer Formel ist aber, sowohl der Gehalt an Kalkerde, als der an Kiesel- und Thonerde zu gross. Man könnte es demnach als eine Uebergangsstufe zwischen Hornblende und Diallag betrachten. — Von dem hornblendeartigen Mineral des Gravesalvaskammes, pag. 66, unterscheidet es sich wesentlich durch den weit schwächeren Eisengehalt, und durch ein sehr abweichendes Verhältniss zwischen der Kieselerde und Kalkerde.

Der *Labrador* unterscheidet sich, nach äusseren Charakteren, nicht wesentlich von dem berggrünen, dichten Gemengtheil des Juliergranits, oder des Gabbro ähnlichen Gesteins von Gravesalvas; nur das spec. Gew. = 2,877 ist etwas grösser. Die Bestandtheile sind

Kieselerde . . .	52,609	. . .	27,330	Sauerstoff
Thonerde . . .	22,522	. . .	10,518	
Kalkerde . . .	40,530	}	6,092	
Talkerde . . .	1,779			
Eisenoxydul . . .	3,430			
Natron . . .	4,964			
Kali . . .	2,343			
Wasser . . .	2,800			
		<hr/>		
		100,974.		

Dieselben stimmen mit der Formel des Labradors  $R Si^3 + 3 Al Si$  gut genug überein. Vergleicht man das Resultat der Analyse mit demjenigen des ähnlichen Gestein von Gravesalvas, so zeigt sich in diesem ein beträchtlicher Ueberschuss von Kieselerde, der wohl auf Rechnung der fein eingesprengten Quarztheile zu setzen ist.

(Die Analyse des Serpentin's folgt am Schlusse der Abhandlung.)

Wir kehren nun von Stalla wieder zurück, um auch thalabwärts den östlichen Abfall unserer Gruppe kennen zu lernen.

Die *Forbicekette* bildet gegen *Molins* zu einen ungefähr 8000 F. hohen Ausläufer, auf dessen leicht zu ersteigendem Rücken man eine der prachtvollsten Ansichten der gegenüber liegenden Eisgebirge geniesst. Die höhere Masse dieses Ausläufers besteht, bereits von Faller an aufwärts, nicht mehr aus grünen, sondern aus gewöhnlichem *grauem Flysch*, und nur in dem äussersten felsigten Vorsprung streicht noch *Serpentin* durch. Auch unten im Thale hält zwar der grüne Schiefer mit *Epidot* noch eine Strecke weit unter *Molins* an; aber, bevor man noch in die *Rofnaebene* eintritt, findet man ihn schon ganz vom *grauem Flysch* und dick geschichtetem *grauem Kalk* verdrängt. In der Clus zwischen *Rofna* und *Tinzen* zeigen sich an den Felsen der linken Seite nur graue Gesteine; eben so am Ausgang des *Nandròthales*, oberhalb *Savognin*, und nur zahlreiche Trümmer von *Serpentin* deuten hier auf das Vorkommen dieser Steinart in grösserer Höhe über dem Thalgrund.

Etwas unterhalb *Tinzen* ragen aus dem sonst bewachsenen linken Ufer des Rheins Felsgruppen hervor. Sie bestehen, theils aus feinkörnigem *weissem und grauem Kalkstein*, theils aus *weissem Gyps*, der von *grauem Dolomit* und *Rauchwacke* umgeben ist. Das herrschende Gestein aber, auf dieser, wie auf der anderen Seite des Thalstromes, ist gemeiner Bündtnerschiefer, der sanft ansteigende hügelichte Ufer bildet, die zum Ackerbau benutzt werden.

Erst an der östlichen Ecke des *Fianellstockes*, bei der Vereinigung der aus *Curtins* und *Schmoras* herströmenden Gewässer, in dem weiten, flachen Thalboden von *Nandrò*, tritt wieder ausgezeichneter *Gabbro*, identisch mit demjenigen von *Marmels*, aus dem *Flysch* hervor, in Felsriffen, die sich nördlich, nach *Schmoras* hinein, erstrecken.

---

2. *Westseite des Gebirges.*

Längs einem Graben, nördlich von *Juf*, der, vom Fuss des Gebirges an, den auf seiner Westseite herrschenden grauen Flysch entblösst hat, stiegen wir an dem sehr steilen Abhang auf die hohe Terrasse, welche allein im oberen Avers die Einförmigkeit der rechten Thalseite unterbricht. Die Schiefer fallen in der Tiefe mit etwa 45°, in der Höhe mit geringeren Winkel, gegen NO. — An der äusseren Kante der Terrasse steht, oberhalb *Juf*, eine Hütte der Bergamasker-Schäfer, kaum gross genug, dass zwei Männer darin, niedergekauert, oder liegend, Raum haben, auch sieht man, besonders gegen die Kalkstöcke über *Cresta* zu, ziemlich ausgedehnte Weidplätze. Der grössere Theil aber der Terrasse, besonders ihr Hintergrund, ist bedeckt mit ununterbrochenen Schutthalden, die hoch an die hinteren schroff abgestürzte Gebirgswand ansteigen. Kaum haben sich zwischen diesen Trümmern einige See'n erhalten können, in denen sich das Schmelzwasser der auch im Spätsommer nicht ganz verschwundenen Schneemassen sammelt.

Eine bei 50 F. mächtige Kalklage bildet den Boden dieser Terrasse. Sie bedeckt den tieferen Flysch und hat ihn vor der Zerstörung, der die oberen Massen unterlegen sind, geschützt. Der Kalk ist sehr krystallinisch, im Innern dunkelgrau, in der Höhe übergehend in reinen weissen Marmor. Seine Mächtigkeit wächst, so wie er sich gegen N. der centralen Kalkgruppe des Weissborns nähert, und wir dürfen ihn als einen von diesem Knoten aus in den südlichen Flysch eingedrungenen Keil betrachten. — Auf dem Kalk liegt wieder Glimmerflysch, oder glänzend schwarzer Schiefer, der mit Kalk, Sandstein und Quarz wechselt, und sich oft sehr wahrem Glimmerschiefer nähert, obgleich eine Kalkbeimengung fast niemals fehlt. Nur im östlichen Theile der Terrasse, wo sie an den südlichen Abfall des Fallerhorn und seiner serpentinreichen Umgebung angrenzt, zeigen sich, in Verbindung mit dem weissen Marmor, noch bunte, grüne, häufiger aber rothe und violette Schiefer; weiter westlich ist bis auf den obersten Felskamm Alles grauer Glimmerflysch.

Ueber die Schutthalden weg folgten wir dem Fuss dieses Kammes bis nahe an den breiten Gipfel des ersten über Cresta sich erhebenden Kalkstockes, indem das Ende der schroffen Felswand hier einen Uebergang nach Faller zu gestatten schien. Es wird allerdings ein beinahe gar nicht eingeschnittenes Joch durch das Anstossen des Schiefers und sein Abschneiden am weissen Marmor des Weissorns veranlasst, man kann von den Schieferhalden auf den festeren Kalk übertreten, und, längs dem Rande des Gletschers, der auf der Nordseite des Kalkstocks sich hinabsenkt, gelang es uns, obgleich nicht ohne Schwierigkeit, den Hintergrund von Faller zu erreichen. — Auf dem Joche, wo man sich im Niveau der grössten Erhebungen dieser Gegend befindet, übersieht man die ganze Ostseite des Gebirgsknotens der Gruppe, und den hintersten, einsamen und wilden Grund des Fallerthales. Graue und schwarze Schiefer, gewöhnlicher Glimmerflysch, sind allgemein herrschend, in massigen, gerundeten, meist vegetationsarmen, mit Schieferschutt überdeckten Rücken, die im westlichen, zum Theil vergletscherten Hintergrund in einem Sattel, der Faller von Sterlera trennt, zusammenstossen.

Auch von Ferrera her haben wir diesem Knoten uns genähert, und, in Hinsicht der Steinart, nicht wesentlich verschiedene Verhältnisse gefunden.

Bei der Eisengrube des Schwarzkopfs, oberhalb Canicul, wussten die italienischen Bergleute uns keine Auskunft zu geben, wie man über das Gebirge nach Oberhalbstein gelangen könne; auch war es uns schwer, ihnen verständlich zu werden, weil damals die Namen der nahe liegenden Alpen uns unbekannt waren, und keiner aus ihnen das jenseitige Thal je besucht hatte. Wir waren im Begriff, die Richtung über den östlichen Kamm einzuschlagen, die uns, nach gefahrvoller Uebersteigung des Felsgrates, auf die grossen Fianellgletscher geführt hätte, als wir zu unserem Glück noch einen Bergamaskerhirten trafen, der es für unmöglich erklärte, an einer anderen Stelle, als durch den Hintergrund von Sterlera, das Gebirge zu übersteigen. Längs den rauen Abstürzen der Hauptkette



fortklettern, erreichten wir glücklich, nach etwa 4½ Stunden, die oberste einsame Hütte der Sterleralp, und ersparten uns hiedurch den langen und mühevollen Umweg durch das untere Thal, über dessen Grund wir uns bei der Eisengrube um mehr als tausend Fuss erhoben hatten.

Der eisenführende Kalk des Schwarzkopfs wird in grosser Mächtigkeit durch Kalkschiefer und Glimmerflysch überlagert, und diese Gesteine allein bilden auch, mit NO Fallen, die rechte, steil abgestürzte Thalseite von Sterler. Unter dem Schiefer durch streicht, wie im oberen Avers, weisser Marmor. Er ist es, der, am Eingang von Sterler, die Terrasse an der SO Seite des Schwarzkopfs bildet, auf welcher, als ein beträchtliches Dorf, die Maiensässe von Canicul stehen. Von da dringt die Kalkmasse tiefer in Sterler ein, und verliert sich, etwa in der Mitte des stark ansteigenden Thales, unter dem nun allein herrschenden Schiefer. Man wird indess kaum bezweifeln, dass, unter der Flyschbedeckung durch, der Kalk bis in die mächtige Anschwellung des Weissborns fortsetze, da wir ja auch, ausserhalb Sterler, von Campsüt bis Cresta, den Kalk stets an der Oberfläche verfolgen können. — Es ist ein merkwürdiges, schwer zu erklärendes, aber in den Alpen regelmässig wiederkehrendes Verhältniss, diese Einlagerung des Kalks mitten im Flysch; im Schwarzkopf und Fianell viele tausend Fuss mächtig, dann zu einem schmalen, nur im Thalgrund sich haltenden Ausläufer sich zusammenziehend, in der Weissbornmasse wieder gewaltig anschwellend und die Flyschdecke ganz abwerfend, hierauf in den, zuletzt kaum 50 F. mächtigen Keil auslaufend, an dessen Ende, auf Giuils, der untere und obere Flysch ganz zusammentreten und eine ungetrennte Masse bilden.

Von der Alphütte in Sterler erreicht man, nach einer kleinen Stunde starken Steigens, einen sehr hoch liegenden Gebirgskessel, im Halbkreise umschlossen von den Gletschern und schneeigten Hörnern der Averserstöcke und der Forbicekette, welche durch einen nicht mehr sehr hohen, aber vergletscherten Sattel getrennt werden. Auf den nahen Gräthen und dem Boden des Kessels, wo der Schnee ihn nicht bedeckt, sieht man

nur Schiefertrümmer, und erst südwestlich vom Sattel ragen die wilden Kalkstöcke des Weissorns hervor. Fast ohne mehr zu steigen, gelangt man nun auf die Höhe des Kammes, von der man nach Curtins hinabsieht. Eine tiefe, öde Schlucht, auf der rechten Seite von den Felswänden und steilen Trümmerhalden der Forbicekette, auf der linken von jähem Weidhängen eingeschlossen, liegt vor uns, und nur nach Umgehung des Hintergrundes derselben, auf den Höhen der linken Seite, kann man endlich gefahrlos in den Thalgrund niedersteigen.

Kalkreiche Schiefer und körnige bis dichte graue Kalksteine, häufig abwechselnd mit Quarzlagern, herrschen auch hier auf beiden Thalseiten.

Einen weit bequemerem Pass über diesen Gebirgszug, den ersten für Jedermann gangbaren nördlich von den Pässen, die von Stalla nach Juf führen, gewährt die breite Einsattlung zwischen der *Moss-* und *Schmorasalp*, die wir zur Nordgrenze dieser Gruppe gewählt haben. — Von *Forno nuovo*, bei Vorder-Ferrera, bis nach *Zaffün*, dem unteren Kessel der Mossalp, herrscht, so viel die allgemeine Walddecke erkennen lässt, der chloritische Gneis des Ferrerathales. Der Alpboden von Zaffün ist mit schönen Weiden bedeckt, und zu beiden Seiten von weissen Kalkwänden eingeschlossen, von denen die südliche den unteren Abfall des schroffen, auch auf dieser Seite zum Theil mit Gletschern belasteten Fianell bildet. Am Wege zum oberen ausgedehnteren Alpboden von *Moss* hinauf, finden sich fortwährend von der Höhe herabgefallene Blöcke von weissem Marmor und Dolomit, der Boden selbst aber besteht aus grünlichem und stahlgrauem, oft sehr kalkreichem Glimmerflysch, der jedoch in dem herrschenden Kalkstein nur eine untergeordnete Bedeutung erhält. Die Abhänge, welche die Alp umfassen, bestehen auch hier, bis auf die höchsten Kämme hinauf, aus körnigem und schiefrigem hellfarbigem Kalkstein, aus Rauchwacke und ausgezeichnetem, gelb bestaubtem Dolomit, und dieselben Steinarten herrschen, in mannigfaltig gewundenen Felszacken, auf der Höhe des Passes. — In den sanft abfallenden Weidhängen von *Schmoras* tritt wieder grauer Glimmerflysch unter dem

Kalkstein heraus, und, sowohl im Kalk, als im Flysch, werden hier, am nördlichen Fuss des Fianell, Eisenerze, Eisenglanz und Eisenglimmer, gebrochen, in ähnlichen Lagerungsverhältnissen, wie am Schwarzkopf.

---

## 5. GRUPPE DES CURVÉR.

Es ist diese nördlichste Gruppe des langen Gebirgszuges, der Oberhalbstein gegen Abend begrenzt, weniger, als die beiden vorigen, ausgezeichnet, durch schroffe, zerrissene Felsgipfel; sie erhebt sich weniger hoch über die angrenzenden Thäler, und, obgleich auf den obersten Kämmen, in manchen Sommern, der Schnee auch nicht ganz wegschmilzt, so hat doch nirgends Gletscherbildung statt gefunden.

Die Gruppe erscheint (s. Tab. II, Fig. 2), als eine von Schams aus gehobene, daher gegen West steil abfallende, gegen Oberhalbstein sich langsam abdachende Hochfläche, die, durch einen in der Mitte fortlaufenden Felskamm, in eine östliche und westliche Hälfte getheilt wird. In diesem Felskamm ist nur der breite, nach allen Seiten schroff abgestürzte *Piz Curvér* (8650') ein Gipfel von Bedeutung; doch hebt auch er sich nicht auffallend hervor, da der Felskamm selbst, bis gegen Schmoras, und auch beträchtlich weit nördlich vom Curvér, sich in einer Höhe von mehr als 8000 F. behauptet.

Von dem Mittelkamm gehen nach beiden Seiten beträchtlich hohe, und in seiner Nähe felsigte Ausläufer aus, welche die verschiedenen Alpbezirke von einander scheiden.

Die bedeutendste dieser von O nach W streichende Ketten erhebt sich zwischen dem *Nandrò* - und dem *Présanzthale*. Im Anfang wenig steil, so dass noch das grosse Dorf *Réams*, auf einer breiten Vorstufe, Raum zu ausgedehntem Feld- und Wiesenbau findet; auch tiefer, nach *Schmoras* hinein, auf den unteren Gehängen noch sanft abgedacht, in der Höhe aber schon schroff und felsigt; nach der Kreuzung mit dem Mittelgrathe auch gegen den Ausgang von *Ferrera* und *Schams* fortsetzend.

In Oberhalbstein fällt jedoch, wenn man das Gebirge von der Hauptstrasse aus betrachtet, vorzugsweise der sonderbar gestaltete *Toissa* in's Auge, durch welchen das weidreiche *Présanzthal* von den Alpbezirken von *Mons* und *Stürvis* geschieden wird. Ueber der Stufe, auf der *Sallux* steht, erhebt sich der *Toissa*, wie die Ruine eines colossalen, römischen Amphitheaters, eine elliptische, thurmartig, in schroffen Felswänden aufsteigende Masse. Nur auf der Conters zugekehrten Seite ist diese Ringmauer eingestürzt, und gestattet den Eingang in ein mit Wald und Schafweide bedecktes, inneres Kesselthal, in eine kleine Caldera. — Von dem Mittelkamm wird der *Toissa* durch eine tiefe Felsschlucht abgesondert, über welcher, auf einer schmalen Terrasse, der, in der ganzen Gegend hoch verehrte, Wallfahrtsort *Ziteil* (7520'), an den Abhang des nördlicheren, kleinen *Curvér* angebaut ist. Ein piemontesischer Kapuziner und ein alter Sakristan, aus einem der näheren Dörfer, versehen, an diesem rauhen Orte, den Gottesdienst. Am Abend vor Feiertagen füllen sich die zwei, wegen der kleinen Fenster, beinahe dunkeln Kammern, und die, im nämlichen Gebäude befindliche Kapelle, mit einer solchen Menge von Landleuten, dass man kaum Raum zum Stehen findet, und, als wir, den 4ten August 1838, in der Frühe auf dem kleinen *Curvér* (8480') standen, erscholl, bis zu uns herauf, der Gesang einer zahlreichen Procession, die von *Stürvis* heraufgezogen war, um Regen zu erbitten. Es bewies auch das Gnadenbild seine Wunderkraft in reichem Maasse; denn, nur zwei Tage später, wurden, durch ein Hagelgewitter, alle Brücken in *Avers* und *Ferrera* zerstört, der *Fallergrund* unter Wasser gesetzt, und, in dem, durch den *Fallerbach* bedrohten *Molins*, durchwachten wir die fürchterliche Gewitternacht, nicht ohne Besorgniss, die Verwüstungen von 1834 sich erneuern zu sehen.

Der Mittelkamm zieht sich, nördlich vom *Curvér*, um den weiten Kessel der *Despinalp* herum, derselben schroffe Felsabstürze zukehrend, aber immer mehr sich erniedrigend, je mehr er sich dem nördlichen Ende der Gruppe nähert. Jenseits *Despin* steht, mitten auf einer Einsattlung des Rückens, das Sommerdorf *Ober-Mutta* (5760'), mit herrlicher Aussicht,

über ganz Schams nach einer Seite, über Domleschg nach der anderen. Hier wohnt eine kleine deutsche Gemeinde, von wenig über hundert Bürgern, ganz umringt vom romanischen Stamm; die Stufe, die sich bis dahin an der Ostseite des Gebirges herumzog, hat sich hier beinahe ganz verloren, oder sie wird, wie die gegenüberliegende des *Schyns*, durch weite und bis in die Tiefe des Albulabettes eingreifende Tobel, so stark zerrissen, dass nahe liegende Dörfer, wie *Stürvis*, *Solis* und *Unter-Mutta*, nur durch lange, die Tobel umgehende Umwege, in Verbindung stehen.

Auf der Westseite des Gebirges brechen die Ausläufer des Curvér ab an dem allgemeinen Absturz gegen Schams. Der eine, der sich am Mittelkamm mit dem südlichen Grenzkamm der Gruppe verbindet, trennt die *Albinalp* von der *Nezzaalp*; und endigt sich, oberhalb *Andeer*, in der flachen Pyramide der *Céra*. Der andere, unmittelbar vom Curvér ausgehend, scheidet *Nezza* von *Despin*, und krümmt sich, am Westrande des Plateau, um diesen Gebirgskessel herum, bis oberhalb *Ruschein* (Reischen), so dass das Alpwasser nur durch eine enge Felskluft einen Ausfluss findet.

Die Schichtenstellung in dieser Gruppe ist, der vielen localen Unregelmässigkeiten wegen, schwer zu beurtheilen, und, besonders in der Höhe, sehr veränderlich. Als Mittelresultat, und nach Beobachtungen an den unteren Felsen, in der *Via mala*, bei *Ruschein* und *Pigneu*, ergibt sich ein, zuweilen stärkeres, zuweilen dem Horizontalen genähertes Fallen nach SO, und hiemit stimmt auch die äussere Form der Gruppe und ihre flachere Abdachung gegen Oberhalbstein überein. Die Entstehung des *Schamserthales* kann jedoch nicht durch diese Schichtenstellung erklärt werden. Der elliptische, meist von steilen Abstürzen umschlossene, mit benachbarten Thälern nur durch die langen Clusen der *Rofla* und der *Via mala* verbundene Thalkessel erinnert an die Erweiterungen des höheren Oberhalbsteins, an die Ebenen von *Rofna* und *Marmels*, und, wie diese, verdankt er wohl seinen Ursprung dem localen Zurücksinken des erhobenen Bodens. Die in der Höhe gebliebenen Theile dieses Bodens finden wir wieder in den ausgedehnten Alpflächen von *Nezza*, *Despin*

und *Arosa*, jene auf der rechten, diese auf der linken Seite von Schams; und wirklich scheinen auch dem Auge, wenn man sich nahe am Vorderrand dieser Alboden befindet, ihre Flächen unmittelbar zusammenzuhängen, und das 3000 F. tiefer liegende Schamserthal wird ganz übersehen. Die Täuschung ist eben so vollkommen, als im vorderen Faller, wenn man nach Flixeralp hinübersieht.

Das herrschende SO Fallen steht wohl offenbar in Verbindung mit dem Auftreten der Centralmasse des *Suretastocks*, in deren östlichen Fortsetzung sich der hohe südliche Grenzkamm dieser Gruppe befindet. Die äussere Form folgt demnach hier noch dem Adulasysteme, der Schichtenfall den Gesetzen der alpinischen Centralmassen; gerade umgekehrt, als wie wir es, auf der Westseite der Suretamasse, in Rheinwald, gefunden haben. Da jedoch die Hauptthäler, welche östlich und westlich die Curvérgruppe begrenzen und ihre Gestalt bestimmen, wahrscheinlich noch jünger sind, als die angrenzenden Centralmassen, indem Schams z. B. auch die Suretagneise durchschnitten hat, so kann diese Differenz auf keinen Fall unsere früheren Schlüsse wankend machen.

Wie fast immer in Bündten, würde man die geologische Beschaffenheit auch dieser Gruppe sehr falsch beurtheilen, wenn man sich begnüge, nur den Fuss und die tieferen Abhänge derselben zu untersuchen. Mit Ausnahme der zunächst an die Suretamasse angrenzenden Partie von Ferrera bis Andeer, zeigt die ganze übrige Peripherie nur gemeinen *Flysch* und *Kalk*. Die *Via mala* und der benachbarte *Schyn* sind ganz in diese Gesteine eingeschnitten, und es wiederholen sich, in stundenlangen Engpässen, die bekannten Eigenthümlichkeiten dieser, in Bündten vorherrschenden Steinarten; furchtbare, enge Spalten, aus deren Grunde man, auf den mehrere hundert Fuss hoch darüber wegführenden Brücken, kaum noch das Rauschen des Thalflusses vernimmt, der sich zum Theil auch, unter überhängenden Felsen, dem Auge entzieht; stets sich erneuernde Anbrüche, mit weit hervorstehenden Quarzlagern; ausgedehnte, steile Halden von Schieferschutt; enge Tobel, die, von der Hauptspalte aus, quer in's Gebirge eingreifen, und einem regelmässigen Strassenzug

fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzen. — Auch auf dem obersten Kamm findet man noch diese Flyschgesteine als herrschende Steinarten. Die Despinalp ist grösstentheils von ihnen umschlossen, der Curvér selbst besteht in seiner Hauptmasse nur aus ihnen, der Toissastock aus Kalk. Um so unerwarteter ist das Auftreten ganz anderer, nur in Bündten in solcher Verbindung erscheinender Steinarten, an den mittleren Gehängen der Gruppe.

---

#### 1. Ostseite der Gruppe.

Der breite Eingang des Nandròthales, von Savognin her, wird von mehreren Flyschtobeln durchschnitten, die zu langen Umwegen zwingen, bevor man die auf der linken Seite von Nandrò sich haltende Strasse erreichen kann. Noch ist man nicht weit auf derselben fortgeschritten, so sieht man, in einem Erdrutsch, des mit steiler Weide bekleideten, südlichen Abfalls unserer Gruppe, *Gyps* anstehen, weiss, feinkörnig bis dicht, in unklaren Lagerungsverhältnissen.

In geringer Entfernung ragen *grüne Schiefer* aus der Grashalde heraus, und viele Blöcke von *Serpentin* und *Gabbro* zeugen von ausgedehnten Felsmassen dieser Steinarten in grösserer Höhe. Wir stiegen, um dieselben zu erreichen, am steilen Abhange aufwärts, und fanden, nach ungefähr einer Stunde, den anstehenden Fels, der von da, meist in unersteiglichen Wänden, bis auf den obersten Kamm sich erhebt. Die Steinart dieser Felsen ist fester, grauer *Flysch*, und bis an das östliche Ende des Ausläufers bildet er die Hauptmasse desselben. Eine Stelle erregte jedoch unsere Aufmerksamkeit durch ihre braunrothe, eisen-schüssige Farbe, und, bei näherer Ansicht, zeigte sich uns ein 2—3 F. mächtiger, verticaler *Gang von Serpentin*, mit Verzweigungen in die Schiefermasse, und hoch gegen die nicht mehr zugänglichen Theile der Felswand fortsetzend. Eine neue Bestätigung, dass der Flysch den Ser-

pentin durchbrochen habe, also jünger sei, und, wenn auch zum Theil aus Flysch entstanden, doch zugleich mit anderem Flysch in dasselbe Verhältniss getreten sei, wie die übrigen pyrogenen Gesteine zu geschichteten Sedimentgesteinen. Dass aber, bei dieser Durchsetzung, der Flysch nicht grün geworden ist, dass wir überhaupt die Gänge von Serpentin in der Regel mit grauem Flysch in Contact finden, lässt den unmittelbaren Einfluss des feurig flüssigen Gesteines auf das Nebengestein als einen sehr beschränkten erscheinen, und deutet wieder an, dass wir nicht diesem Einfluss die Umwandlung ganzer Gebirge, wovon die Alpen so grossartige Beispiele enthalten, zuschreiben können.

Erst tiefer einwärts in Nandrò, wo es sich in die zwei Thäler Curtins und Schmoras theilt, kann man den oberen Rücken des Gebirges ersteigen. Ein mächtiger Kamm von *Serpentin* und *Gabbro* krönt denselben, und setzt, in rauhen, zackigen, von Trümmerhalden umgebenen Stöcken, ostwärts fort. Der angrenzende Schiefer ist *grüner Schiefer*, auf allen Stufen der Entwicklung, und, als eine derselben, erscheint auch der *Diallagschiefer*, den wir schon auf Giuils kennen gelernt haben. Häufig zeigt der grüne Schiefer, beträchtlichen Kalkgehalt; ferner Adern von *Epidot*, und eingesprengten *Schwefelkies*. Auch sieht man *Serpentinbreccien*, in denen eckige Stücke von Serpentin und Kalk, theils scharf abgeschnitten, theils miteinander verwachsen sind. Im Serpentin, wo er in grösseren Massen auftritt, bemerkt man *Magneteisen* in eingesprengten Körnchen, Adern von *Asbest* und Ueberzüge von *Pikrolith*. — Diese Serpentine und Gabbro mögen den Rücken in einer Ausdehnung von einer Viertelstunde bedecken; man sieht aber auch Spuren derselben aus dem südlichen Abhange des Gebirges heraus treten, durch die sie sich wahrscheinlich an den Gabbro im Thalboden von Nandrò anschliessen.

Nicht mehr fern von der Stelle, wo der Rücken sich mit dem Mittelkamm vereinigt, sieht man demselben eine pyramidale Kuppe aufgesetzt, deren schneeweisse Anschürfungen ein neues Gestein verrathen. Es ist wirklich *Gyps*, der die Kuppe bildet. Mit ihm enge verbunden erscheint auch bräunlich gelbe *Rauchwacke*, und nur im obersten Gipfel der Kuppe



wird er von schwarzem und buntem Schiefer bedeckt. Wie der unmittelbar an ihn angrenzende Serpentin, erstreckt sich der Gyps am südlichen, und auch am nördlichen Abhange, tief abwärts; man sieht ihn, theils wirklich hervortreten, theils verräth er sich durch eine Folge trichterartiger Vertiefungen.

Weiterhin besteht das Gebirge aus einem chaotischen Gewirre, zum Theil eingestürzter, zum Theil noch in zackigen Gipfeln emporstarrer Felsen, durch die man nur mühsam sich durcharbeitet. Die Steinart ist ein festes *Conglomerat*, in groben *Sandstein* übergehend, auffallend ähnlich dem Gestein, das, in den Berneralpen, die obere Masse der räthselhaften Niesenkette bildet. Dichter und feinkörniger, grauer und schwarzer Kalk, Dolomit, schwarzer Thonschiefer und Quarz, theils eckig und breccienartig, theils mehr gerundet, sind, ohne Cement; als das der feineren Theile ihrer Substanz, so innig verwachsen, dass man gewöhnlich ebene Bruchflächen erhält, und niemals einzelne Trümmer aus der Masse zu lösen vermag. An den äusseren, der Atmosphäre ausgesetzten Flächen ragen die Quarztheile, als vereinzelte Spitzen und Zacken, oft weit heraus, während der Kalk fast einen Zoll tief zerstört und weggeführt worden ist. Diese Breccie ist auch auf dem Gebirgsknoten das allgemein herrschende Gestein, wo, in einer Höhe von mehr als 8000 F., die drei Ketten am Mittelkamm zusammenstossen, die, ostwärts, Nandrò von Presanz, westwärts, Moss von Albin, und dieses von Nezza trennen. Hier aber geht sie nun, durch Beimengung gelblich erdiger Dolomittrümmer in eine zellige Breccie und in Rauchwacke über, deren Vorkommen, in solcher Nähe des Gypses, nicht auffallen kann; und, bei der Untersuchung der Westseite des Gebirges, werden wir noch andere, mehr unerwartete Metamorphosen derselben kennen lernen.

Als directe Fortsetzung des östlichen Ausläufers macht sich vorzüglich die Kette der Cera, zwischen Albin und Nezza, geltend, und man darf auch nicht weit auf diesem Rücken fortschreiten, so erscheint von Neuem *Gyps*, in grosser Mächtigkeit, die ganze Kette, von der einen Alp bis in die andere, durchsetzend, und gegen Nezza wild zerhorstene zackige

Felsen hervorstossend, die, in einiger Entfernung, täuschend einer in den Alboden herabsteigenden Gletschermasse ähnlich sehen. Die nächste Umgebung dieses Gypses besteht aus gelb bestaubtem *dolomitischen Kalk* und aus *Rauchwacke*, die, auf dem obersten Kamm theilweise, von *Flysch*, grauem und glimmerigem Schiefer und schiefrigem Kalk, bedeckt werden. Näher am Mittelgrat erhebt sich ein höherer Felsstock, fast ausschliesslich aus Rauchwacke bestehend, felsigt, mit steilen, weit verbreiteten Trümmerhalden an seiner Nordseite, die, mit denjenigen des Curvér zusammenstossend, den ganzen hinteren Thalkessel erfüllen. Das Fortschreiten über die furchtbar rauhen Felsen der Rauchwacke und ihre zerfallenen Massen wurde uns etwas erleichtert durch einzelne Schneeflächen, die hier dem Sommer getrotzt hatten.

Auf dem schmalen Mittelkamm, zwischen Nezza und den Alpen von Presanz, wird die Rauchwacke noch einmal verdrängt durch *Gyps*, so nahe der zuerst gefundenen Stelle, dass beide Massen wohl in unmittelbarem Zusammenhange stehen, der nur durch die Trümmer- und Schneehalden verdeckt wird. Ganz nahe an diesem Gyps, am südlichen Fuss des Curvérgipfels, erscheint auch *grüner Schiefer* und grünlich schwarzer *Serpentin*, gangartig in die Curvérmasse eingreifend. Es enthält dieser Serpentin Adern eines blassgrünen, durchscheinenden Minerals, versteckt fasrig, mit unbestimmten krystallinischen Parteeen, unschmelzbar, die Härte=3,8, auf Kluftflächen bedeckt und auch sonst enge verbunden mit schuppigem Talk. — An den südlichen Abstürzen des Curvér lässt sich der Serpentin, in  $h\ 9\frac{1}{2}$ , ziemlich weit verfolgen, und geht, an seinem westlichen Ende, wo er sich unter den Trümmern des Curvér verliert, in undeutlich entwickelten *Gabbro* über. Zugleich enthält er hier Nester und Adern von weissem Kalkstein, in denen man auch derben, braunrothen *Granat* entdeckt.

Die Hauptmasse des *Curvérgipfels* aber besteht aus *Flysch*, schwarzem, sehr dünnblättrigem Thonschiefer, der kaum Spuren von Aufbrausen zeigt, und dunkel grauem schiefrigem Sandstein, fest und wie gefrittet, der ziemlich stark aufbraust und kleine, mit der Masse verwachsene,

weisse Glimmerblättchen einschliesst. Die Schichten sind vielfach zerborsten und gekrümmt, und der oberste Gipfel, nach allen Seiten zerissen, umgibt sich, durch stets erneuerte Einstürze, mit hohen Schutthalden.

Von dem, im Hintergrund von Nezza, auf dem Mittelkamm anstehenden Serpentin (8230') weg, richteten wir, an den östlichen Abstürzen des Curvér durch, unseren Weg gegen *Ziteil*. Die vorherrschenden Trümmer der höchsten Gipfel, sowie die in der Nähe anstehenden Felsen, bestanden immer aus braunen und grauen, wie verbrannt aussehenden Flyscharten; aber längs dem ganzen Abfall, bis *Ziteil*, mengten sich ihnen häufig auch *grüne Schiefer* und *Galestrogesteine*, oder mit vielem grünem Talkschiefer verwachsene Quarzite, bei, die ersteren oft sich sehr einem berggrünen dichten *Aphanit* nähernd. — Auch in dem hohen Felskranz, der, auf der Nordseite des Curvér, sich um die Despinalp herumzieht, steigen in dem grauen Flysch mächtige Rippen von grünem, durch Eisengehalt oft stark geröthetem und mit braunrothen Krusten überzogenem Schiefer vertical in die Höhe, durch festeren Zusammenhalt der Verwitterung mehr Widerstand leistend, und, an den Abhängen, wie auf dem oberen Kamm, über den Flysch hervorstehend.

Am östlichen Fuss dieser Rippen und in der Tiefe der Schlucht, die den Despinkamm von dem Toissa trennt, ist *Serpentin* anstehend; die Rippen selbst umschliessen wohl in ihrem Kern Gänge, die aus der tieferen Grundmasse im Flysch aufgestiegen sind. — Auch längs dem östlichen Fuss des Toissa, sieht man, im Walde, der ohne Unterbrechung denselben umzieht, nur Trümmerhaufen von grünem Schiefer und Galestro, und, oberhalb Salux, mengen sich denselben viele Stücke von Serpentin und Gabbro bei, so dass, auch auf dieser Seite des Berges, am unmittelbaren Fuss der Felswände, diese Gesteine in grosser Mächtigkeit hervortreten müssen.

Der *Toissastock*, scheint es, ist durch den Serpentin, oder durch die Kraft von Dämpfen, wie der Pfropf eines Sauerwasserkruges, herausgestossen worden. Die fürchtlichen Abstürze, die er, besonders gegen

S, W und N, zukehrt, zeigen Schichten, die von Aussen gegen das Innere des Stocks einfallen, und deren abgebrochene Schichtenköpfe, wie die Steine einer zusammenstürzenden Mauer aus der äusseren Wand hervorragen. Hohe Trümmerhalden bedecken überall den Fuss der Mauer. Die Steinart ist, theils grauer und schwarzer *Kalk*, bei Ziteil, in einzelnen Stücken auch *weisser Marmor*, theils schwarzer *breccienartiger Kalk*, wie er z. B. im Flysch des Simmenthales und bei Saanen vorkommt; vorherrschend aber ein sehr feinkörniger grauer *Dolomit*, von so vielen Spalten durchsetzt, dass man kaum einen frischen Bruch schlagen kann.

Der Serpentin und die grünen Schiefer, die in dieser Gegend noch in so grosser Mächtigkeit entwickelt sind, setzen, obgleich unterbrochen, bis gegen *Mutta*, und wahrscheinlich noch weiter nördlich fort. Das anstehende Gestein, auf Obermutta sowohl, als in den Tobeln, durch die man von da zur Brücke von *Solis* hinabsteigt, ist zwar grauer Flysch, die Steinart der *Via mala*; aber eine Menge Blöcke von grünem Talkschiefer und Galestro, grünen talkigen Sandsteinen, und, etwas seltener, auch von Serpentin lassen auf ausgedehnte Felsmassen dieser Gesteine in den oberen Höhen des Abhangs, in der Fortsetzung des Despinerkamms, schliessen; obgleich es auch möglich ist, dass einige derselben, z. B. die grünen Sandsteine, aus dem Gebiet der höheren Albulazuflüsse herkommen. Von der *Solisbrücke* bis *Alvaschein* zeigen sich jedoch diese grünen Trümmer, denen sich nun auch rothe Schiefer und Sandsteine beimengen, so zahlreich, dass grössere Halden und Haufwerke ausschliesslich aus ihnen bestehen, und kaum an dem Vorkommen anstehender Felsen in der steil gegen Mittag abgebrochenen Hügelmasse, zwischen *Lenz* und *Obervaz*, gezweifelt werden kann. Wirklich findet man auch, am westlichen Ende von *Alvaschein*, einen Felskopf von rothem Schiefer und Sandstein, der, mit O Fallen, dem gewöhnlichen grauen Flysch aufgelagert ist. Ob von hier aus diese Gesteine sich noch weiter gegen Mitternacht verbreiten, können wir nicht bestimmen. *Ebel*\*)

\*) *Ebel*, Anleitung, Art. Domleschg.

führt an, dass auf den Höhen, die Domleschg von Churwalden trennen, ein hochrother Thonstein mit Quarzkörnern gefunden werde. Als wir jedoch von Churwalden aus den höchsten Gebirgskamm bestiegen und ziemlich weit gegen Mittag zu verfolgten, fanden wir überall den grauen Flysch als allein herrschende Steinart. Dagegen haben wir bereits in der Beschreibung von Davos angeführt, dass der isolirte kleine Felskopf, das *Rotelser-Bühel*, das so unerwartet aus der Rheinebene des Domleschg aufsteigt, aus charakteristischem grünem Schiefer besteht, der in jeder Hinsicht mit demjenigen von Stalla oder Molins übereinstimmt.

---

## 2. Westseite der Gruppe.

In ungefähr zwei Stunden steigt man von *Andeer*, über *Bärenburg* und die *Andeerer-Maiensässe*, steil aufwärts nach dem vorderen Theil der *Albinalp*, stets umgeben von dem grünen *Chloritgneis* und *Gneisporphyr* von Ferrera. Das Fallen ist N, mit schwankendem Streichen, in der Tiefe, bis zu den unteren Maiensässen,  $h\ 8\frac{1}{2}$ , bis  $h\ 10\frac{1}{2}$ , in der Höhe dagegen ist die herrschende Stunde, constant  $h\ 6$ .

Am Eingang der ziemlich flachen Alp, und am Abfall der Cerakette gegen dieselbe, zeigen sich neue Gesteine, die aber, nach ihren Bestandtheilen und äusseren Formen, den vorigen so nahe stehen, dass alle Bemühung, ihre Grenze gegen den Gneis zu bestimmen, vergeblich war. Es ist ein *Conglomerat* von sehr mannigfaltiger Zusammensetzung, das diese obere Masse des Gebirges bildet. Länglichte Mandeln von grauem Quarz und feinkörnigem, weissem und gelblich weissem Kalk werden umwickelt von grünlich grauem, fettartig glänzendem Thonschiefer, dessen Blätter allen Krümmungen der Mandeln folgen. Nach einer andern Seite nähert sich die Steinart mehr einem krystallinisch chemischen Gemenge: Quarz und Kalk sind in dünnen Adern und Nestern mit dem Thonschiefer verwachsen, dieser gewinnt stärkeren Glanz und geht über in Talk-

schiefer, es erscheinen silberweisse Glimmerblättchen, und nun entdeckt man auch krystallinische Parteen von grauem Orthoklas, der bald, in 1 bis fast 3 Zoll grossen, breiten und stark glänzenden Zwillingen zu einem herrschenden Bestandtheil wird. Der Kalk tritt, so wie der Feldspath häufiger erscheint, zurück, und, gegen die Alphütte hin, ist das Gestein wieder ein wahrer grobflaseriger Gneis geworden, ohne Kalkeinschlüsse. In dem Haufwerk von Blöcken, am Eingange des Alpbodens, die daselbst vom Cerakamm herabgestürzt sind, zeigen sich alle Uebergänge, von vollkommenem Gneis in eine deutliche Kalkbreccie, so dass man sich hier von diesem Zusammenhang der Steinarten besser noch überzeugt, als es am anstehenden Fels selbst geschehen könnte. Nicht selten sind kleine Schwefelkieswürfel eingesprengt, zuweilen so gedrängt, dass, durch ihre Zerstörung, das Gestein sich mit einer braunrothen Kruste überzieht. In anderen Blöcken schwillt der weisse Kalk zu grösseren, mehrere Fuss haltenden Massen an, und an der Felswand selbst, sieht man viele Klafter grosse, lagerähnliche Nester von weissem Marmor mitten in dem Conglomerat, gleich denjenigen, die, unter ähnlichen Verhältnissen, in dem Chloritgneis von Ferrera vorkommen. Solche Massen zeigen sich vorzüglich auf der Nordseite, in dem steilen Abfall der Cerapyramide, und eine derselben, die unmittelbar über dem unteren Gneis zu liegen scheint, möchte man, ihrer grossen Ausdehnung wegen, beinahe als eine selbstständige Zwischenbildung betrachten, wenn die höheren, ganz umwickelten Massen nicht eine allgemeinere Auffassung dieser Verhältnisse verlangten.

Räthselhaft bleibt, bei dieser Umwandlung des petrographischen Charakters, der Uebergang aus der steil N fallenden Structur des tieferen Gneises in die beinahe horizontale, oder schwach SO fallende der oberen Sedimentmassen. Diese letztere Schichtenstellung theilt bereits der mächtige weisse Marmor, der die Grundlage des Conglomerats zu bilden scheint. Wir erinnern jedoch an die ganz ähnlichen Verhältnisse, die im Berner-Oberland, am *Mettenberg* und im *Urbachthal*, zwischen der Schichtung der Kalkkeile und derjenigen des sie überlagernden Gneises

beobachtet worden sind, und die der eine von uns, in diesem Bande der Denkschriften, beschrieben hat; wir erinnern ferner an den gneisähnlichen Sandstein, der, an der *Jungfrau* und auf *Foullyalp*, zwischen den oberen N fallenden Sedimentlagern und dem unteren, vertical oder steil südlich abgesonderten Gneis-Granit, liegt, und die reine Auffassung der Contactverhältnisse so schwierig macht \*). Diese Thatsachen scheinen beinahe zu Gunsten der Ansicht zu sprechen, die in der Stratification des Gneises keine wahre Schichtung erkennen will; und die regelmässige Fächerstructur der alpinischen Centralmassen scheint auch ihrerseits auf etwas ganz Anderes, als auf mechanische Bewegung und Aufrichtung von Schichtensystemen, die grosse Gebirge bilden, hinzudeuten.

Höher, gegen den Cerakamm hinauf, und im Hintergrund, wo der Alphoden zu steigen anfängt, gewinnt der Kalk in unserem Conglomerat rasch das Uebergewicht, und zugleich entwickelt dasselbe immer mehr den Charakter einer mechanischen Bildung. Mit dem weissen Kalk erscheinen eckige Parteen von dunkelgrauem, feinkörnigem und dichtem Kalk, gegen welchen die weissen Marmorparteen zuletzt ganz verschwinden, der Thonschiefer wird grau und schwärzlich und mengt sich mit Kalk; die Steinart wird ganz zu dem im Knoten des Mittelkamms herrschenden grobkörnigen Niesensandstein und Niesenconglomerat. Auch hier sind indess die Gemengtheile wieder so innig unter sich verwachsen, der Quarz dringt in so feinen Parteen in den Kalk ein, die Trennungsflächen der eckigen Kalkstücke gegen den Schiefer und Quarz sind so wenig deutlich, dass man den Gedanken an eine rein mechanische Bildung so gleich wieder aufgibt.

Ein öder Thalgrund, von felsigten Kämmen enge umschlossen, führt, oberhalb der Alphütte, in mehr südöstlicher Richtung, nach einer langen Schneehalde, über die wir auf den Mittelkamm stiegen. Beide Seitengebirge bestehen aus braunem und grauem, breccienartigem und zelligem *Dolomit*, oder *Rauchwacke*, verwachsen mit grauem körnigem Kalk;

\*) S. Studer, Geologie der westl. Alpen, p. 162 u. 192.

einem Gestein, das man nur als eine die Nähe des Gypses bezeichnende Abänderung der in der tieferen Alp und auf dem Mittelkamm selbst herrschenden Steinart betrachten kann. — Auf dem hohen Joche, das, am oberen Ende der Schneelehne, über das Gebirge führt, sieht man gegen Mittag, in beträchtlicher Tiefe, den Sattel zwischen den Alpen Moss und Schmoras; in grösserer Nähe, am Fuss der Trümmerhalden, über denen man steht, einen kleinen See und einzelne Schneefelder.

Wie räthselhaft! wie entgegen allen herrschenden Systemen die, mehr auf die Grundlage einer noch in der Kindheit stehenden Chemie, als auf die Chemie der Beobachtung im Grossen gebaut sind! Gneis, Marmor, Conglomerat und Rauchwacke in so enger Verbindung, dass die vier Steinarten nur Eine Masse bilden; ein mehrere tausend Fuss hohes Profil der verschiedenartigsten Bildungen und alle in einander übergehend; in der Tiefe verticale, in der Höhe horizontale Lagerung, ohne dass man sagen dürfte, es seien die oberen Massen den tieferen aufgesetzt, oder es seien diese in jene umgebogen.

Wir fanden die, in Albin über die Natur dieser merkwürdigen Conglomerate gesammelten Thatsachen vollkommen bestätigt, durch die Untersuchung der nördlicheren Alpkessel von *Nezza* und *Despin*.

Von *Pignieu* führt ein steiler, doch ziemlich gut gebahnter Weg in etwa zwei Stunden nach den Maiensässen *Baül* (6020'), am vorderen Rand der *Nezzaalp*, auf einer halbkreisförmig von Felsen umschlossenen Stufe. — Im unteren Theile des *Pignieuer Tobels* herrscht dunkler *Glimmerflysch*, der jedoch von den vielen Trümmern und grossen Blöcken, die, an der Nordseite des Tobels, eine mächtige und sehr hoch ansteigende Schutthalde bilden, meist verdeckt wird. Erst etwa  $1\frac{1}{2}$  Stunde über *Pignieu*, wo der Weg, der sich bis hier auf der Nordseite hielt, über den Bach setzt, um hohen Felswänden auszuweichen, findet man den Flysch wieder in grösserer Ausdehnung anstehend, horizontal. Er bildet die Grundlage jener hohen Felsen von *weissem Marmor*, deren Trümmer vorherrschend den unteren Abhang bedecken. Es setzen diese Felsen durch das Tobel



gegen Albin fort, wo sie sich mit der, den Gneis bedeckenden, grösseren Kalkmasse vereinigen; in noch grösserer Mächtigkeit aber sieht man sie nordwärts, über Zillis durch, gegen den Ausgang von Despin sich ausbreiten, dem Hauptthal mehr als hundert Fuss hohe Abstürze zukehrend.

Bevor man noch die Stufe von Baül erreicht, wird der reinere Kalk bereits von *Conglomerat* bedeckt. Es ist, bald eine fast reine Kalkbreccie, mit talkigen Ablosungen; bald sind Talk und Quarz in grösserer Mengenerweise mit dem Kalk verwachsen, und in diesem Gemenge findet man wieder andere Nester von grünem Gneis mit grossen Feldspathkrystallen, die man beinahe für eingeschlossene Trümmer von Ferreragneis halten könnte, wenn sie nicht mit der übrigen Masse nach allen Seiten verwachsen erschienen; bald zeigt sich der Kalk nur noch in einzelnen Blättern oder tafelartigen Stücken in dem ganz vorherrschenden grünen Talkschiefer oder Gneis; an noch anderen Stellen geht die Kalkbreccie über in ein dolomitisches gelbliches Conglomerat und in Rauchwacke, worin oft ebenfalls noch grüne Talkblätter glänzen. Die Grenze der einzelnen Gemengtheile erscheint an der äusseren, halb verwitterten Oberfläche ziemlich scharf, das Gestein deutlich breccienartig; während im frischen Bruch Alles mehr in und durch einander fliesst, grauer und weisser krystallinischer Kalk, graue und grüne glänzende Thonschiefer-substanz, Quarz, Talk und Felspath.

So auffallend diese Gesteinsbildung erscheinen mag, so fehlen uns doch keineswegs Analogieen dazu aus den westlichen Alpen: Wir haben bereits eine Abänderung, die auf Albin sich sehr entwickelt zeigt, mit Niesenconglomerat verglichen; die reineren Kalkbreccien stimmen überein mit dem ganz ähnlichen Gestein bei Zweisimmen und Saanen, worin nicht selten vollkommen frische grüne Talkblätter vorkommen; die mehr krystallinischen, verwachsenen Breccien sind Gesteinen ähnlich, die im Wallis, bei S. Leonhard und Sitten, sich in der Nähe des Gypses zeigen und häufig als Gneis beschrieben worden sind. Ueberall in den Alpen äussert sich, in grossen Entfernungen, und in ganz heterogenen Umgebungen, ein gemeinschaftlicher Typus, selbst in der Beschaffenheit der Stein-

arten, der bezeugt, dass wir nicht irren, wenn wir, der orographischen Erscheinung folgend, diess ganze, verwickelte und vielfach verzweigte Gebirgssystem doch als Ein Ganzes betrachten, dem, in seiner weiten Längenerstreckung, gleicher Ursprung und gleiche Umwandlungen beigemessen werden müssen.

Das Conglomerat bildet auch die Felswände hinter Baül, und setzt von da in die Cerakette über, wo, tiefer im Thale, die Rauchwacke entschieden das Uebergewicht erhält. Auf der rechten Thalseite verliert es sich bald unter dem Flysch, der, vom Curvér aus, in einer mit ausgedehnten Weidgehängen bekleideten Rippe, zwischen Nezza und Despin, gegen den vorderen Rand des Gebirges ausläuft.

Nachdem wir, in der Mitte ungefähr von Nezza, eine Einsattlung dieser Kette erstiegen hatten, gelangten wir, am jenseitigen sehr steilen Abhang hinunter, in den grossen, ziemlich flachen Kessel der *Despinalp*. Der westlichere Thalboden, wo die Weide und Flyschschutt den Fels hervortreten lassen, besteht aus grauem, feinkörnigem *Dolomit*, oder *dolomitischem Kalk*, und auch der hohe Wall, der die Alp gegen Schams zu umfasst, zeigt, bis hoch hinauf, dieses Gestein in bedeutender Mächtigkeit.

In der engen Kluft jedoch, durch welche der starke Alpbach in das Hauptthal hinabstürzt, treten unter diesem Kalkplateau Gesteine hervor, in denen man sogleich die Fortsetzung derjenigen von Albin und Nezza erkennt, obschon ihr mineralogischer Charakter ein ziemlich abweichender ist. Die einen Abänderungen nähern sich einem *Quarzit*, durch vorherrschenden Quarz, worin viel Talk und blaulich grüner Thonschiefer verwachsen ist. Andere aber kann man nur *Gneis* nennen, indem, neben den vorigen Bestandtheilen, bei zurücktretendem Quarz, dieselben grauen, stark perlmutterartig glänzenden Feldspathzwillinge sich einmengen, die auch die Conglomerat-Gneise der südlicheren Alpen auszeichnen; bald regelmässig begrenzt in mehr als zollgrossen breiten Krystallen; bald in mehr gerundeten, stets aber krystallinisch blättrigen Parteen. Die dicken, ziemlich undeutlichen Schichten dieses Gneises streichen h 4, mit SO Fallen.

Die Bildung ist hier mehrere hundert Fuss mächtig, und man sieht sie, am vorderen Absturz des Gebirges, so weit, als das Auge reicht, gegen Mittag fortsetzen. Auch gegen N waren wir von ihr umgeben, so lange sich der Weg in mittlerer Höhe hielt. Auf Obermutta zeigten sich einzelne Blöcke, die von ihr herzustammen schienen; die hohen Felswände jedoch, die sich gegen Despin hinziehen und sich beträchtlich über das Dorf erheben, bestehen aus gewöhnlichem Flysch, so dass der Gneis, wenn er wirklich bis hierher fortstreicht, noch bedeutend höher vorkommen muss. Es mag auch allerdings Despin wohl nahe an 1000 F. über Obermutta liegen.

Auf der linken Seite der Kluft, am Ausgang von Despin, sieht man die alten *Erzgruben*, welche, in früheren Jahrhunderten, den Namen dieser Alp berühmt gemacht haben \*). Theils nahe an dem in vielen Fällen hinabstürzenden Thalbache, theils längs dem felsigten Westabhange, gegen Nezza zu, mögen wohl über ein Dutzend Stolleneingänge auf einander folgen, alle längst zerfallen und versumpft, so dass wir nur aus den Halden die Erze beurtheilen konnten.

Diese Erze sind, theils in weissen, feinkörnigen und schaaligen *Schwärzpath* eingesprengt, der die Gangmasse gebildet haben mag, sofern wirklich regelmässige Gänge vorkommen, theils im Quarzit und Gneis selbst. Silberhaltender *Bleiglanz* findet sich am häufigsten, mit ihm dichtes *Fahlerz*, schwarz, stark glänzend, tombakbraun angelaufen, in der blossen Lichtflamme schmelzend, auf Kupfer, Antimon und Zink reagirend; nicht selten auch *Kupferkies*. Aus diesen Kupfererzen hat sich, wahrscheinlich als neueres Product, auch *Malachit* gebildet. — Den älteren Nachrichten zu Folge, wurde der Bergbau ausschliesslich auf Silber und Blei getrieben.

Der Alpweg führt, auf der rechten Seite des Baches, in nördlicher Richtung, abwärts, gegen die Maiensässe von Zillis. Ehe man diese

\*) Nachrichten über diesen Bergbau sehe man im N. Bündtn. Sammler II. p. 522.

erreicht, hat man jedoch, etwas tiefer, als die untere Grenze des Quarzit-Gneises, einen zweiten Zufluss des Ruscheinbaches zu überschreiten, der, oberhalb jener Maiensässe, sich eine fürchterlich wilde Schlucht eingefressen hat. Die Felsart dieser Schlucht ist *Dolomit*, grau, bis in's Innerste in kleine eckigte Stücke zerspalten, gleich dem Gestein des Versamertobels, auch wohl von Neuem zu einer Breccie verküttet, oder dicht mit gelb bestaubter Aussenfläche. Es scheint, auf der rechten Seite des Berges, der Dolomit ziemlich hoch über die untere Grenze des Gneises anzusteigen, so dass die tiefere Masse des letzteren Gesteins sich an demselben abschneiden, oder in ihn übergehen muss. Auf der linken Seite des Baches sieht man, von den Maiensässen aus, den Dolomit deutlich, unter dem Gneis durch, gegen Mittag fortsetzen, so dass er wahrscheinlich mit den mächtigen Felsen von weissem Marmor, am Absturz von Nezza und Albin, nur Eine Masse bildet.

Auch von den Maiensässen weg behält der nach Ruschein führende Weg immer noch eine nördliche Richtung. Das Gebirge, unmittelbar über Zillis und Ruschein, ist zu steil abgestürzt, als dass, ohne Sprengarbeit, ein Pfad gebahnt werden könnte. Man muss daher, bis zunächst unter Obermutta, fortgehen, ehe man, an den tieferen Gehängen des Gebirges, wieder zurück gegen Schams einbiegen kann. Noch vor dieser Biegung des Weges, bedeutend tiefer, als die Maiensässe, kommt man an wohl 150 F. hohen Felsen von *Gyps* vorbei, dessen Lagerungsverhältnisse sich aber, wegen der allgemeinen Waldung, nicht genauer untersuchen lassen. Die Steinart ist weiss, feinkörnig, und in kleinen, krystallinischen Parteen glaubt man beinahe noch ursprüngliches Anhydritgefüge zu erkennen.

Die Felsen über dem Gyps, die, im Niveau der Maiensässe, gegen Obermutta fortstreichen, bestehen nicht mehr aus Dolomit, sondern aus dunkel grauem *Flyschsandstein*, sehr fest und quarzreich, aber stark aufbrausend; wohl unmittelbar zusammenhängend mit dem Flysch, der von Obermutta nach SO fortsetzt, wenn nicht zwischen beiden der Dolomit sich noch durchzieht.

Auch in der engen Kluft, aus welcher, am Fuss des Gebirges, der Ruscheinbach hervorströmt, ist, bis hoch hinauf, nur gemeiner *Flysch* anstehend, h 5 mit S Fallen. Dieses Gestein erscheint hier ebenfalls als die Grundlage, des Dolomits sowohl, als des Gneises, ohne doch, nach seiner ganzen Beschaffenheit, sich wesentlich von dem *Flysch* zu unterscheiden, der, 5000 F. höher, die Decke jener Gesteine und die Gipfel des Mittelkamms bildet.

---

Werfen wir nun zum Schlusse noch einen Blick auf die Hauptverhältnisse dieser Gruppe, so treten beinahe alle übrigen zurück gegen die auffallende keilförmige Ausdehnung des Gneises und der krystallinisch umgewandelten Gesteine tief in das Gebirge hinein. Es ist diese merkwürdige Thatsache den Analogieen beizuordnen, die wir früher bereits zwischen dieser Gruppe und den Gebirgen der westlichen Schweiz bemerkt zu haben glauben; denn offenbar gehört der über zwei Stunden lange, mehrere hundert Fuss mächtige Keil, der unter Nezza und Despin fortstreicht, zu derselben Classe räthselhafter Erscheinungen, die wir zuerst am *Urbachsattel*, in kleineren Maassstabe, kennen gelernt haben\*). Der Suretastock vertritt das Tossenhorn, die Curvérgruppe das Kalkgebirge des Engel's. Die Steinarten selbst stimmen zum Theil überein, die Rauchwacken, die gelb bestaubten Dolomite, die krystallinischen Kalksteine, die Galestro und Quarzite, und an beiden Stellen sind dieselben innig verwachsen mit dem herrschenden Gneis, der selbst nur als die höchste Entwicklung des Quarzits erscheint. Auffallen darf es nur, dass in Bündten die kleine Suretamasse einen Keil zu bilden vermocht hat, der diejenigen des Berner-Oberlandes, die von einer der mächtigsten Centralmassen ausgehen, an Masse so sehr übertrifft. Ob wohl das umgekehrte Verhältniss hier als Regel gelten darf? sind vielleicht die Keile um so mächtiger, je weniger die Umwandlung eine allgemeine zu werden vermocht hat?

\*) S. die Abbildung bei der Abh. v. A. Escher in diesem Bande der Denkschriften.

Aber, auch abgesehen von dieser Keilbildung, wird man die so grossartige Entwicklung dolomitischer Breccien in dieser Gruppe, die Mannigfaltigkeit der Gesteine, in welche sie übergehen, und ihr räthselhaftes Verhältniss zum Ferreragneis und zum Flysch ohne Zweifel den wichtigsten Thatsachen der alpinischen Geologie beizählen. — Die Grenzen, die wir uns gesetzt haben, erlauben uns leider nicht, diese Erscheinungen erschöpfend zu behandeln, weil sie in ein Gebiet sich ausdehnen, das ausserhalb unserer Karte liegt, und uns, durch eine einzige schnelle Bereisung, nur oberflächlich bekannt geworden ist.

Die Conglomerate und Rauchwacken von Albin und Nezza zeigen sich nämlich, in noch grösserer Ausdehnung und Mächtigkeit, westlich von Schams, auf dem breiten, mit rauhen Gebirgsstöcken besetzten Plateau, das sich zwischen *Schams*, *Savien* und *Rheinwald* erhebt, und dessen obere Fläche ungefähr die Höhe der Alpboden von Nezza und Despin haben mag.

Aus dem ganz in Flysch eingeschnittenen, einsamen *Savien* (3970') waren wir, mehr als drei Stunden, die steilen westlichen Abstürze der *Beverinkette* hinauf gestiegen, um über eine, nahe an 8000 F. hohe Einsattlung, zwischen *Piz Beverin* (9230') und *Piz Ostal*, nach *Andeer* (3030') zu gelangen. Bis nahe an den höchsten Kamm sahen wir kein anderes Gestein, als gewöhnlichen Flysch, schwach, aber constant, nach SO fallend, das Streichen in N 25 — 55 O; und, an der vertical abfallenden Westseite des Beveringipfels, steigt diese Bildung noch weit höher an. Die Mächtigkeit der Flyschmasse kann in diesen Gebirgen nicht unter 4000 F. gesetzt werden. — Auf dem Joche selbst und auf der ganzen Ostseite des Gebirges wird der Flysch bedeckt durch Kalk, der, auf dem Gebirgskamm, mannigfaltige Uebergänge bildet in krystallinischen, weissen, gelben und rothen Kalk, verwachsen mit glänzendem buntem Thonschiefer, in gelb bestaubten, oder grauen dolomitischen Kalk und in Rauchwacke. Ein weniger verändertes Kalkstück, aus den Trümmerhalden des Passes, schliesst einen vollkommen deutlichen Belemniten von mittlerer Grösse ein. Ueber dem Kalk liegt noch eine schwache Flysch-

decke, die aber an mehreren Stellen ganz zerstört ist. — Je mehr der Kalk, der allgemeinen SO Einsenkung folgend, von dem Gebirgskamm zu der Hochfläche der *Arosaalp* niedersteigt, desto mehr verliert sich sein anomaler, krystallinischer Charakter, und, oberhalb *Lohn* und *Mathon*, bildet er ein beinahe horizontales, kaum über hundert Fuss mächtiges Plateau von gewöhnlichem geschichtetem Kalk, das man wohl als die westliche, durch den Einsturz des Schamserthales, losgerissene Fortsetzung der ebenfalls plateauartigen Kalkmasse von Despin zu betrachten hat.

Gegen Mittag hin sieht man aber von der *Arosaalp* in ein Chaos von Gebirgen hinein, wie wir in den Alpen wenige so fürchterlich rauhe kennen. Eine Gruppe vollkommen nackter Felstöcke, durch öde, mit Schutt oder Schnee erfüllte Thäler und Schluchten getrennt, erhebt sich, in seltsamen Formen, zu Höhen, die wenig hinter derjenigen des *Piz Beverin* zurückbleiben mögen. Es sind die *Piz Tschons*, *Piz Visan*, der *Kalkberg* (nach Wörl *Löchliberg*), die wir in Savien schon den hinteren circusartigen *Flyschabstürzen* aufgesetzt sahen, und die auch von Rheinwald oder Splügen her, durch ihre Nacktheit und ihre Aehnlichkeit mit den tyrolischen *Dolomikofeln*, auffallen. — Die Steinart dieser Stöcke ist wirklich, theils grauer Dolomit, theils Rauchwacke, öfters sehr eisen-schüssig und roth; die Schichten, wo ihre Spur noch sichtbar ist, vielfach gekrümmt; das ganze Gebirge, durch eine Menge von Löchern und Höhlen, wulstartiges Anschwellen der Oberfläche, heraustretende Zacken, und rothe oder braune Farben, mehr an ausgebrannte Schlackenkegel, als an Sedimentbildungen erinnernd.

Schon in früherer Zeit hat dieses Gebirge die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Von dem übel berüchtigten *Calandari-See*, in der Nähe des *Piz Visan* weiss *Scheuchzer* viel wunderbare Geschichten zu erzählen. Nach, freilich wenig zuverlässigen, älteren Nachrichten soll auch *Gyps* hier vorkommen. Was dagegen *Gruner* von vielen *Versteinerungen*, besonders herzförmigen Seeigeln (*Spatangen*?) berichtet, die bei Nufenen im Rhein-

wald, also an der südwestlichen Ecke des Kalkbergs, sich finden sollen, möchte wohl Missverständniss sein. \*)

Am nördlichen Fuss des P. Vizan, sahen wir, in diesen Gegenden zuerst, die Rauchwacke übergehen in Breccien, Talkgesteine, und gneisartige Quarzite; und am vorderen Rande der Hochfläche lagen, dicht gedrängt, Blöcke, die uns, ihrem Vorkommen nach, ebenfalls als Trümmer des Vizan hätten gelten können, wenn nicht der Gedanke, solche Steinarten einem Dolomitstock eingelagert zu glauben, uns als ein Verstoß gegen alle Geologie erschienen wäre. Das Gestein dieser Blöcke ist ein Gneis, demjenigen der Rofla, aber auch dem erzführenden Gneis von Despin, sehr ähnlich; wir erklärten daher diese Blöcke für Fündlinge, die vom nahen Suretastock herstammten. Vielleicht mit Recht, obgleich es auffallen muss, diese Fündlinge nicht auch auf Albin und Nezza zu sehen, während, am Fuss der Felswände, bei Zillis und Reischen, sie sich wieder in grösster Menge zeigen. In jener Ansicht wurden wir jedoch bestärkt, als wir, im Hinabsteigen nach Andeer, auch auf dieser Seite des Gebirgs, die mehrere tausend Fuss mächtige Grundlage der Rauchwacke aus Flysch bestehen sahen, der, sowohl am Wege, als in den tief eingeschnittenen Graben von Donat und Lohn, in grosser Ausdehnung zu Tage liegt. Nur in der südöstlichen Ecke des Gebirges greift, wie auf der Ostseite von Schams, das Roflagestein in die Seite desselben ein, und verdrängt hier den Flysch, der, mit verticaler Grenzfläche, bei der Rheinbrücke von Andeer, an den Gneis anstösst.

So wie das Kalkplateau von Arosa demjenigen von Despin, so entspricht die Gruppe der Dolomitstöcke den Rauchwackegebirgen von Albin und Nezza. Sofern nun diese zelligen, krystallinischen Dolomite als umgewandelte Kalkmasse betrachtet werden dürfen, kann man kaum anstehen, in dem geschichteten Kalkplateau den ursprünglichen Stoff zu erkennen, dessen Aufschwellen, in Folge allgemeiner Aggregationsänderung und des Eindringens oder der Entwicklung neuer Stoffe, die auffallende

\*) Gruner Eisgebirge, II, p. 79.



Gestalt jener Stöcke veranlasst habe. Jede andere Erklärung ihres Ursprungs scheint uns auf grössere Schwierigkeiten zu stossen. Die Fortsetzungen des plateauartigen, wie des umgewandelten aufgeschwollenen Kalks, liegen aber im Streichen des Rheinwalds, oder des Alpensystems. Die Dolomitisirung zeigt sich demnach in enger Verbindung mit der Suretamasse, so wie bereits das allgemeine SO Fallen, auf beiden Seiten von Schams, die Abhängigkeit unserer Curvérgruppe von dem System der Centralmassen bewiesen, und ihre Trennung von den zwei vorigen, noch dem Adulasystem folgenden Gruppen gerechtfertigt hat.

Die Umänderung des Streichens, aus demjenigen des Adulasystems in das der östlicheren Gebirge, findet statt im Hintergrund von Savien: die linke Seite dieses Thales folgt noch dem ersteren und kehrt dem Thalboden eine sehr gleichförmige schiefe Fläche zu, während in dem hinteren Circus und dem Plateau der Dolomitstöcke sich das neue Streichen geltend macht. Genau betrachtet folgt aber auch dieses nicht ganz der Alpenrichtung, sondern wendet sich, vielleicht in Folge eines von der älteren Schichtenstellung ausgeübten Einflusses, etwas mehr als diese, dem Meridian zu.

---

## OESTLICHER GEBIRGSZUG.

### 1. GRUPPE DES PIZ OT.

Es liegen dem Standpunkte des Panorama's von Schaffner die Gebirge dieser Gruppe direct gegenüber, so dass sie sich ohne beträchtliche Verschiebung darstellen. Der *Piz Ot* trägt im Panorama den Namen *Piz Morter*; westlich von demselben bemerkt man den *Schlatainbach*, der aus dem *Saluverthal* (Saluer Sch.) herströmt; der Hintergrund dieses Thales erstreckt sich, was im Panorama nicht deutlich ausgedrückt ist,

zwischen den östlichen *Cellerinaalpen* und der Saluverkette durch, bis hinter den *Pfannenspitz* der Zeichnung; noch mehr westlich sieht man den Einschnitt des *Suvrettathales* (Savretta Sch.); der östlichste, mit R bezeichnete Stock, der höchste jenseits Suvretta, ist der *Piz di Gandalva*, der in unsere nächste Gruppe gehört.

Der scharfe, felsigte Charakter, und die bedeutende Höhe der Gipfel und obersten Gräthe lassen die Gebirge dieser Gruppe nur mit denjenigen von Gravesalvas vergleichen. Auf der Scheidecke des *Suvrettathales* (8070'), wo die Peripherie der Gruppe sich 1000 F. über die Höhe des Julierpasses erhebt, erscheinen die nahen Felsstöcke noch wenig erniedrigt; man sieht sich, sowohl auf dem Joche, als weiter nördlich, in einem engen, vegetationsleeren, tiefeingeschnittenen Thale, umschlossen von hohen, nackten Wänden, über welche, von der Westseite her, Gletscher, von beiden Seiten, Schneelehnen und Trümmerhalden herunterhängen und im Thalgrund zusammenstossen; die höchsten Gipfel unserer Gruppe bleiben durch die Vorstufen verborgen. Steigt man nun, durch das östliche *Suvretta* (Suvretta di Samaden), in das lange *Beverthal* hinab, das, bei der Gabelung, immer noch 6500 F. hoch liegen mag, so zeigt auch hier, und das Beverthal auswärts bis nach *Bevers*, der steile Abfall der Gruppe überall vollkommenen Hochgebirgscharakter, schroffe Felswände, hochansteigende Halden hausgrosser Blöcke, nah auf einander folgende Lawinenzüge, vereinzelte Schneefelder, und, nur sparsam vertheilt und wenig gesichert, entdeckt man auch hier und da eine magere Weide, die nur von Gensen benutzt wird.

Die dem Engadin zugekehrte Seite ist weniger rauh und nackt. Von *Samaden* bis in den Hintergrund des *Saluverthales* zieht sich, in ungefähr mittlerer Höhe, eine Terrasse um das Gebirge, welche schöne Weide trägt. Das *Saluverthal* selbst breitet sich, nachdem man durch den engen, felsigten Eingang gedrungen, in sanft ansteigende Gehänge aus, die für drei Alpen hinreichende Weide haben. Noch weniger Unterbrechung erleiden die Weidgehänge auf den ausgedehnten *St. Moritzer Alpen*, zwischen dem *Saluver-* und dem *Suvrettathal*. Die Terrasse setzt auch hier, in

gleicher Höhe, wie über Samaden und Cellarina, fort, sie hat aber noch mehr Breite, und auch ihr Abfall gegen das Hauptthal ist, ohne beträchtliche Felsaufrisse, mit Wald oder Weide bekleidet. Diese sanfteren Gehänge halten beinahe bis in den Hintergrund von *Suvretta* an, während, gleich von *Campfeer* an, die rechte Seite dieses Thales steile Felsabstürze und mit Gletscherschutt erfüllte Seitentobel zeigt.

Durch das *Saluverthal*, aus welchem der *Schlatainbach* gegen Cellarina ausströmt, wird die Gruppe in zwei Theile zerschnitten, die, in der äusseren Form und in ihren Gesteinen, wesentlich von einander abweichen. Ueber einen ziemlich tief eingeschnittenen Sattel gelangt man, nach wenig steilem, aber lang anhaltendem Steigen, aus dem Saluverthal hinab auf die Scheidecke von *Suvretta*.

Die nordöstliche Hälfte spaltet sich, im obersten Gebirgskamm, in zwei Felsketten, von denen die vordere, welche die obere Wand der Samadner Terrasse bildet, einen in der Höhe horizontal abgeschnittenen, flachen Gipfel trägt, den *Piz della Padella*, oder *Pfannenspitz*. Die hintere Kette ist weit mehr gezackt, und ihr höchster, einer Kirche ähnliche Gipfel, der höchste der ganzen Gruppe, ist der *Piz Ot*. Wenn man, vom Bernina herkommend, dieses Gebirge zuerst erblickt, so erhebt sich der *Piz Ot* hoch über den *Pfannenspitz* und über alle näheren Gipfel, so auch auf dem Panorama von Schaffner. Nahe an 10,000 F. möchte seine Höhe jedenfalls steigen. Aber schon bei Pontresina vermag er kaum noch über die Vorkette herauszuragen, und im Thalboden bleibt er unsichtbar. Das öde Felsthal, *la Valletta*, das die beiden Ketten trennt, muss demnach eine beträchtliche Breite haben. Dennoch ist auch in diesem höheren Theile der Gruppe die Ausdehnung der Schneeflächen nicht hinreichend, um Gletscher zu bilden.

Die südwestliche, massige Abtheilung wird ebenfalls von einem Felskamm gekrönt, der, wie eine Mauer, über dem Weidboden der St. Moritzeralpen aufsteigt, und auch gegen das hintere Saluverthal felsigt abstürzt. Eine steile Trümmerhalde bedeckt ihren Fuss von ihrem Anfang,

in der Mitte des Saluverthales, bis auf das hintere Joch. Mit Hrn. Schaffner wollen wir diesen merkwürdigen Felskamm die *Saluwerkette* heissen.

Die geringe Ausdehnung der Gruppe, die einfachere Vertheilung der Steinarten und das getrennte, selbstständigere Auftreten derselben, gestatten uns, die bisherige topographische Methode zu verlassen, und die Beschreibung rein petrographisch durchzuführen. — Es bestehen nämlich diese Gebirge aus drei Gesteinsformationen, die, ungeacht jede für sich noch beträchtliche Mannigfaltigkeit darbietet, doch durch keine sehr entwickelten Uebergangsbildungen unter sich verbunden sind, wie etwa Flysch und Serpentin durch den grünen Schiefer, oder Bündtnerschiefer und Gneis durch den Glimmerflysch. Die erste dieser Formationen, die als Grundlage der beiden anderen betrachtet werden kann, besteht aus *Feldspathgesteinen*, vorzüglich aus Granit. Die zweite, die den Saluverkamm bildet, ist nicht leicht durch ein einzelnes Wort zu charakterisiren, und wir wollen daher einstweilen ihre Felsart mit dem Namen *Saluvergestein* bezeichnen. Die dritte enthält vorherrschend *Kalk*, und, demselben untergeordnet, *Gyps*.

### *Feldspathgesteine.*

Die Hauptmasse der Gruppe, der Rücken, der, von Bevers bis Samaden, die beiden Thäler trennt, das hohe Gebirge, aus dem der Piz Ot sich erhebt, und auch die südöstlich hervortretende Grundlage der beiden anderen Bildungen, bestehen aus *Granit* und *Gneis*.

Der *Granit* ist das vorherrschende Gestein. Auf dem langen Wege, von der Suvretta Scheidecke bis nach Bevers, sahen wir, an dem anstehenden Felsen und in den häufigen Trümmerhalden der Lawinenzüge, beinahe keine andere Steinart. Es ist *Juliergranit*, der das Gebirge des Piz Ot bildet. Der grüne, dichte Labrador ist vorherrschend, mit ihm verbunden, zuweilen nur weisser Quarz und tombackbrauner Glimmer, zuweilen auch weisser Orthoklas, in grossen Krystallen. Hornblende scheint zu fehlen.

Mit diesem Granit verwachsen, in unklaren Lagerungsverhältnissen, bemerkten wir, im nördlichen Suvretta, auch grössere Parteen von Gneis und Glimmerschiefer.

Am südöstlichen Fuss der Gruppe, an den tieferen Gehängen von Suvretta di Campoferio, an der vortretenden Stufe, die man, der Thalstrasse folgend, zwischen Campfeer und St. Moritz übersteigt, und die sich von da, meist bewaldet, bis zu dem *Statzer-See* und an die östliche Thalseite ausdehnt, bei Cresta und am Ausgang des Saluverthales, ist bald *Syenit*, bald ein dunkel grüner *Gneis* herrschend.

Im Suvrettathale scheint das Gestein eine schiefrige Abänderung des Juliergranits zu sein: weisser und grauer Quarz und grüner Feldspath sind innig mit einander verwachsen, und die Schieferung wird vorzüglich bewirkt durch grünlich grauen, stark glänzenden Glimmer, der, theils in einzelnen grösseren Blättchen, theils in zusammenhängenden Straten, das Quarzit ähnliche Gestein durchzieht. Häufig erscheint, zugleich mit dem Glimmer, eine wenig glänzende, dunkelgrüne, Thonschiefer ähnliche Substanz. Zuweilen sind weisse krystallinische Feldspaththeile ausgesondert; auch finden sich Adern von Pistacit ein, oder es ist dieser ebenfalls innig mit der Grundmasse verwachsen.

Auf dem Buckel, zwischen Campfeer und St. Moritz, bestehen alle, in grosser Menge herumliegenden Blöcke, und wahrscheinlich der Boden selbst, der sie trägt, aus einem sehr zähen, feinkörnigen Feldspathgestein, das mit *Syenit* am nächsten verwandt sein möchte; blaulich grauer und graulich grüner, dichter Feldspath, sehr verwachsen mit einem grauen, bis fast schwarzen, Hornblende ähnlichen Bestandtheil, von starkem Glanz und deutlicher krystallinischer Theilbarkeit, in geringem Verhältniss auch mit grauem Glimmer. Weit deutlicher ist der *Syenit* in der Umgebung des Sauerbrunnens entwickelt, so wie auch in den Hügeln, die den Statzer-See einschliessen.

Westlich von St. Moritz, am Seeufer, zwischen St. Moritz und Cresta, im Thalboden von Cellerina, und bis an den Schlatainbach herrschen aber

wieder die grünen *Gneise* von Campfeer, aus denen jedoch, etwas östlich von Cellerina, an der Strasse, ein halbkugeliger Buckel von Juliergranit hervortritt, der ganz von Gneis eingeschlossen wird.

### *Kalk und Gyps.*

Die hohe Vorstufe, welche, von Samaden bis St. Moritz, die Ostseite der Gruppe bildet, besteht aus *Kalk*, *Dolomit* und *Flysch*, mit eingelagerten *Gypsmassen*. — Von Samaden bis Cellerina zeigt sie sich am mächtigsten, und die Vorkette, zu welcher der Pfannenspitz gehört, enthält, bis an ihrem Fuss, keine anderen Gesteine. An der Gebirgsecke des Saluverthales folgt sie der linken Thalseite aufwärts, bis auf das hintere Joch, und setzt von da quer durch Suvretta. Auf der rechten Seite von Saluver dehnt sich der Kalk nicht weit über St. Moritz hinaus, das selbst noch auf ihm steht. Am Fuss des Gebirges herrscht, wie wir gesehen, Gneis, und, tiefer einwärts im Saluverthale, sieht man auf dieser Seite nur bunte Schiefer und andere umgewandelte Flyschgesteine.

Ein kleines Tobel scheidet, hinter Samaden, den Granit, der den erniedrigten Ausläufer der Masse des Piz Ot bildet, von dem Kalkgebirge. Am Fuss dieses Granitrückens, bei St. Pietro, zeigt sich der erste tiefere *Gyps*, weiss, feinkörnig bis dicht, mit nördlichem Einfallen, dem Granit zu. Er wechselt ab mit dunkelgrauem *Dolomit* und schliesst auch eckige Stücke von demselben ein. Steigt man in dem Tobel aufwärts, so erscheint *Rauchwacke* und sehr zerbröckelter *Dolomit*, mit W. Fallen, und, demselben aufgelagert, grauer *Thonschiefer* und *Glimmerflysch*, in geringer Mächtigkeit. Man befindet sich in einer ganz ähnlichen Bildung, wie in dem best charakterisirten Flysch- und Kalkgebirge.

Erst beträchtlich höher, am vorderen Rande der Terrasse, über welcher der Pfannenspitz sich erhebt, tritt der zweite *Gyps* auf, ebenfalls von gewöhnlichem Flysch bedeckt. Die allgemein herrschende Steinart aber ist *Dolomit*. Er bildet den Pfannenspitz und fällt auch, von der Terrasse, in hohen Abstürzen, gegen das Hauptthal ab. Es ist ein hellgrauer, fein-

schuppiger oder dichter Dolomit, mit weiss bestaubter Aussenfläche, sehr zerspalten, in Rauchwacke übergehend, und leicht in eckige Trümmer zerfallend, die, in hohen Schutthalden, das Gebirge überall umziehen. Nicht selten wird das Gestein breccienartig, und ist verwachsen mit eisenschüssigem Thon, und, an der Ecke über Cellerina, ist es wirklich ein dolomitisches Conglomerat mit eisenschüssigem Bindmittel geworden, worin das Eisen, als *Rotheisen*, sich auch wohl reiner aussondert und in Zacken aus dem leichter verwitternden Dolomit hervorragte.

Durchschneidet man von da das Saluverthal und besteigt die St. Moritzer-alpen, so verräth sich der *Gyps* sogleich durch eine Menge von Trichtern, und bald findet man ihn auch in grosser Ausdehnung anstehend. Er grenzt östlich, in der bewaldeten Ecke, die man zuerst aus dem Saluverthal erreicht, an sehr zerrissene *Kalkfelsen*, die, in eine, tief gegen das Hauptthal sich hinunterziehende Halde hausgrosser Blöcke, zusammengestürzt sind, und scheint an diesen Felsen, über dem östlichsten Theil von St. Moritz, am Abhang weit abwärts sich zu erstrecken. Weiter westlich verliert er mehr und mehr an Mächtigkeit und keilt sich dann im Kalke aus, lange bevor dieser das Suvrettathal erreicht. — Mitten im Gyps, und auf beiden Seiten sich in ihm auskeilend, liegt ein bei 50 F. mächtiges Nest von stark glänzendem Glimmerschiefer, grüne und weisse, zum Theil talkartige Blättchen, ohne deutliche Begrenzung, unter sich und mit Quarz verwachsen. Man wird an den ausgezeichneten Glimmerschiefer, mit Granat und Strahlstein, erinnert, der in Val Canaria, mitten im Dolomit und Gyps, eine mächtige Einlagerung bildet.

Auf dem Joch des Saluverthales stösst der Kalk und Dolomit zusammen mit den Gesteinen der Saluverkette; die ersteren erheben sich in einem rundlichen Stock, die Saluergesteine fallen mit steilem Absturz gegen das Joch ab. Der Kalk ist schiefrig, zum Theil gewöhnlicher Kalkflysch von graulich schwarzer Farbe, beinahe vertical stehend, oder steil S fallend. Mitten in ihm steht ein mächtiges Lager von weissem Dolomit, das man beinahe für eine Gangmasse ansehen möchte, da seine Dicke im oberen Ausgehenden beträchtlich stärker ist, als tiefer unten am Abhang.

Je mehr sich der Kalk der Saluverkette nähert, desto deutlicher wird sein südliches Fallen, und, da die Saluverkette selbst gleiches Fallen zeigt, so bildet der Kalk offenbar ihre Grundlage, während er selbst wieder, wie die Verhältnisse zwischen St. Moritz und Cresta zu beweisen scheinen, von dem grünen Gneis unterteuft wird, und, auf dem Saluverjoch, auch dem Juliergranit aufgelagert sein muss.

### *Saluergesteine.*

Man hat vom Dorf *St. Moritz* (5590') über eine Stunde zu steigen, bevor man, direct oberhalb demselben, auf der Terrasse der *Novaalp*, das vordere Ende der Saluverkette erreicht.

Die Trümmer, die am Fusse derselben liegen, sind vorherrschend unvollkommener *rother Thonschiefer*, der in *rothen Jaspis* übergeht; dasselbe Gestein, das in Oberhalbstein häufig mit grünem Schiefer vorkommt. Die Schichten der Kette fallen, mit 40°, S, Campfer zu, und, am Absturz gegen das Saluverthal, zeigen sich ihre abgebrochenen Schichtenköpfe, durch deren fortdauernde Zerstörung die steile und hohe Trümmerhalde sich bildet, die sich bis an das hintere Joch fortzieht.

Die tiefsten Schichten, unmittelbar über der Halde, bestehen aus *rothem* und *grünem Schiefer*, und beide bilden deutliche Uebergänge in gewöhnlichen, grauen *Flyschschiefer*; auch erscheint dieser ganz unverändert zwischen den bunten Gesteinen. — Dennoch trägt die Bildung einen anderen Charakter, als die bunten Flyschgesteine, die in der Nähe des Serpentin's vorkommen, und von diesem zeigt sich keine Spur.

Mit dem bunten Schiefer abwechselnd und, wie man nach den vielen Trümmern schliessen kann, besonders in der Höhe sehr mächtig, zeigt sich nämlich ein Gestein, das ganz an die merkwürdigen, Gneis ähnlichen Schiefer des Käpfstockes in Glarus \*), oder auch an die talkigen Schiefer des Sandhubels\*\*), erinnert; Körner von Quarz und weissem, perlmutter-

\*) S. *Studer*, in *Leonh. Zeitschr.* 1827, p. 22.

\*\*) S. Die Gebirgsmasse von *Davos*, p. 48.



artig glänzendem Feldspath, umwickelt von grünem, glänzendem Talk, bald einem Sandsteinschiefer, bald einem Gneis sich mehr nähernd; häufig von Quarzadern durchsetzt, die von erdigem Chlorit begleitet werden. Am Kärpfstock stehen diese, wie hier, deutlich aus Flysch entwickelten Gesteine, in enger Verbindung mit Mandelsteinen und Porphyr. In der Umgebung der Saluverkette berechtigt uns jedoch Nichts, das Vorkommen solcher Steinarten anzunehmen: die talkigen Schiefer mit Feldspath erscheinen, wie die bunten Thonschiefer und Jaspis, als umgeänderter Flysch, ohne dass eine sichtbare Ursache dieser Umwandlung, oder jene höchste Stufe derselben, hervorträte.

Im Hintergrund von Suvretta, wenn man von Campfer das steile Thal aufgestiegen ist, und nun, um das andere Ende der Saluverkette herum, sich dem See zuwendet, findet man im Allgemeinen die vorigen Gesteine wieder. Mit ihnen enge verbunden aber auch ein *Conglomerat*, wie nur in den Alpen man bis jetzt ähnliche gesehen hat. Runde und eckige Trümmer, von Nuss- bis Kopfgrösse, von grauem Kalk, dolomitischem Kalk, Dolomit, dunkel violettem Glimmerschiefer, Quarzit, dunkelgrünem Schiefer, aber kein deutlicher Juliergranit, kein Serpentin, sind fest verkittet und verwachsen mit grauem Glimmer, der, theils vollständig entwickelt ist, stark glänzend, theils dem Thonschiefer sich nähert. Abgesehen von den eingeschlossenen Trümmern würde das Gestein unbedingt als Glimmerschiefer gelten. Der Kalk ist vorherrschend, und der Glimmer wird zuweilen fast von ihm verdrängt. — In den westlichen Alpen kann nur das Conglomerat von Valorsine, oder dasjenige von Sepey mit dieser Steinart verglichen werden; „doch fehlt in diesen beiden der Kalk, und nur das Glimmercement ist allen gemein. — Die oberste Stufe des Saluverthales ist mit hausgrossen Blöcken dieses merkwürdigen Gesteins ganz bedeckt.

Der Mangel an Juliergranit in diesem Conglomerat ist eine auffallende Thatsache, in der Nähe so mächtiger, die Saluverkette bedeutend überragender Gebirge, die nur aus diesem Granit bestehen; denn, nicht nur der grössere Theil dieser Gruppe, sondern auch die unmittelbar angren-

zenden Massen, welche die andere Seite von Suvretta bilden, sind, beinahe ohne Ausnahme, granitisch. Fast sollte man daher sich zum Schlusse berechtigt glauben, dass das Conglomerat älter sei, als der Juliergranit, älter, als Serpentin, dass es einer Epoche angehöre, der, in dieser Gegend, nur Gneis-, Kalk- und Flyschbildungen vorhergegangen seien.

## 2. GRUPPE DER CIMA DI FLIX.

Der hohe Zug vergletschter Gebirge, an dessen südwestlichem Fuss die Julierstrasse durchzieht, stellt sich als das wahre Centralgebirge von Mittel-Bündten dar, durch dessen Erhebung die des ganzen ihn umgebenden Landes, durch dessen Streichen das der angrenzenden Rücken und Thäler und die Theilung der Gewässer vorzugsweise bestimmt worden sind.

Die *Cima di Flix* (9870'), die zu einem Signalpunkt der schweizerischen Vermessung gewählt worden ist \*), steht, ungefähr im Mittelpunkt der Gruppe, am oberen Rande des wohl 4 Stunden breiten Gletschers, der den Hintergrund des Beversthal's bedeckt. Sie ist aber nicht der höchste Punkt derselben. Ein mässiger, breiter Gebirgsstock, dessen oberster Kamm drei, nicht bedeutend über ihn aufsteigende Spitzen trägt (s. Taf. III), erhebt sich über der ausgedehnten Flixeralp, nördlich von der Cima di Flix. In Oberhalbstein heisst der ganze Stock schlechthin *Vadretg* (von Vedretta, Gletscher) *da Flix*, die nördlichste, höchste Spitze, von der anstossenden Alp, *Piz d'Err*; in Bergün soll diese *Cimult* (Cima alta) genannt werden. Es mag der Piz d'Err gegen 1000 F. höher sein als die Cima di Flix, und demnach die Höhe der Adulagebirge, oder der höchsten Gipfel zwischen

\*) Die mit ihr zu Hauptdreiecken verbundenen Signale sind: das Schwarzhorn in Dischmà, der Calanda bei Chur, der Piz Beverin, das Tambohorn und der P. Porcellizzo in der Südkette des Bergell.

dem Reussthal und Hasli, erreichen. In derselben Richtung, in der diese Spitzen der Gruppe auf einander folgen, in der Richtung der Julierstrasse, erstreckt sich der Gebirgskamm, südlich, bis an die Thalfläche von Campfer, nördlich, bis an den Piz Ragnutz, nirgends unter 8000 F., wahrscheinlich nicht unter 9000 F. tief eingeschnitten, so dass nur einzelnen Jägern bekannte, selten betretene Gletscherwege aus Oberhalbstein und Stalla über das Gebirge führen. Der auf Karten bezeichnete Weg von Suur ins Beversthal ist ein Pass, wie derjenige über S. Theodule, aus dem Nicolaithal am Matterhorn vorbei; denn es ist, von Oberhalbstein aus, fast die volle Höhe der Cima di Flix zu ersteigen, bevor man, über den grossen Beversergletscher, auf die Ostseite des Gebirges gelangen kann.

Vom höchsten Kamm gegen das Thal der Julierstrasse erstrecken sich hohe Vorstufen und Ausläufer, welche ausgedehnte Weidethäler einschliessen. Zwei dieser Thäler greifen noch, von der östlichen, oder Engadinerseite des Julier ins Gebirge ein, oberhalb dem *Monteratsch* durch, der, mit dem Piz *Pülaschin* der Gravesalvas-Gruppe von Alters her genannt wird, indem beide, am Anfang des Passes stehend, gleichsam als die von der Natur gesetzten Juliersäulen betrachtet worden sind. Das tiefere jener Thäler steigt sehr steil an und hat geringe Länge, da die Gruppe hier, zwischen dem Julierthal und Suvretta beengt, nur wenig Breite hat. Das obere Thal dagegen ist bedeutend lang und flach. Beide stossen in ihrem Hintergrund auf Gletscher, die gegen Suvretta abfallen. Ausgedehnter, als beide, ist die *Val d'Agnei* (Lämmeralp), die, gleich jenseits der Julierhöhe, als ein breites Thal, wenig steil gegen eine hintere, felsigte Stufe ansteigt, über welcher sie sich noch weit gegen einen nicht mehr hohen, hinteren Felskamm, und auch südwärts, um einen am Eingang stehenden Stock herum, gegen den *Piz di Gandalva* ausbreitet. Ungeacht des scheinbar ziemlich sanften Ansteigens der Alp, sieht man sich doch schon beträchtlich höher, als der Julierpass, ehe man noch den Fuss der Felsstufe erreicht hat.

Ueber ein hohes Joch kann man, aus dem Hintergrund der Lämmeralp, in die tiefere, gegen Marmels auslaufende, *Seesalp* übersteigen. Circus-

artig ist der Hintergrund dieser Alp von verticalen, mehr als tausend Fuss hohen Felswänden umschlossen, und der nördlichste und höchste der beiden Gipfel der hinteren Wand, ist die *Cima di Flix*. Ein steiler, felsigter Kamm, der von dieser gegen das Hauptthal ausläuft, bildet die rechte Seite der Seesalp und der tiefer gelegenen Marmelser-Weiden, und scheidet sie von der nördlich anstossenden *Flixeralp*. Zwischen der Lämmeralp und der Seesalp befindet sich aber, als ein dem sie verbindenden Joche vorliegendes Stufengebirge, ein mächtiger Felsstock, in den, von Allagho her, die Castroneraalp eingreift. Der höchste Gipfel dieses massigen Gebirges ist der *Piz Morter*, oder *della Glera*, dessen Höhe wir auf etwa 9000 F. schätzen. — Die Seesalp ist das letzte, tiefer eingeschnittene Thal, auf dieser Seite der Gruppe, und von ihr, bis an das nach Tinzen auslaufende Errthal, breitet sich nun, über den steilen Thalwänden der Marmelser- und Rosnaebenen, auf einer etwa 6000 F. hohen, unebenen Terrasse, die grosse *Flixeralp* aus, am Fuss der hohen Errgipfel, deren Trümmer und Gletscherschutt jedoch auf einer höheren Stufe liegen bleiben.

Auf der Ostseite der Gruppe sendet ihr Hauptstamm weit längere Verzweigungen aus. Eine mehrere Stunden lange, beträchtlich hohe Felskette bildet die Nordseite des Beversthales, beinahe überall nackt, und felsigt gegen dasselbe abfallend, mit gleichem Charakter, wie die südliche Kette des Piz Ot. Im hinteren Thale ist sie in einzelne Stöcke zertheilt, mit sehr hohen, von Gletschern bedeckten Zwischensatteln, und, wo sie sich an den Hauptstamm anschliesst, oder doch in geringer Entfernung, erhebt sich dieser am höchsten, in dem *Errstocke*. Es steht dieser also auf der Kreuzung der beiden Hauptrichtungen der Gebirge von Mittel-Bündten; denn das Beverthal streicht gegen N55O, im Systeme der Alpen, der Hauptkamm gegen N40W, im Adulasysteme. — Betrachtet man diesen langen Ausläufer von der Albulahöhe aus, so zeigt er auch auf seiner Nordseite sich nicht weniger rauh, als in der dem Beverthal zugekehrten. Ueber der oberen Hochfläche des Passes und auch über der ersten westlichen Stufe erhebt sie sich als eine gleichförmige nackte Wand,

von hohen Trümmerhalden umzogen. Bei Weissenstein ist diese Wand wie abgebrochen, und ein Einschnitt, nur wenig höher als der Albulapass, in mehreren unebenen Stufen bis auf den obersten Rücken beweidet, bietet einen, selten benutzten, Felspfad in's Beversthal dar. Diese Lücke ist ziemlich breit, und weiter westlich stellt sich die frühere Einfachheit nicht wieder her, sondern mehrere felsigte Ausläufer und Stufengebirge breiten sich, von dem Winkel her, den die zwei sich kreuzenden Gebirgskämme bilden, bis gegen die Albula aus.

Der hohe, in mehrere Stufen aufsteigende Rücken, der hier die Südkette mit dem Ragnutz verbindet, ist indess nicht der Hauptstamm der Cima di Flix und der Errgipfel. Zwischen beiden Ketten liegt das hohe, mit Oberhalbstein parallel laufende *Errthal*; mit flachem, ziemlich breitem Thalboden, im Hintergrund durch einen steil abgestürzten Gletscher geschlossen, der den, wohl bei 2000 F. über das Thal erhöhten Sattel der Beversthalkette bedeckt. Der bis an den Fuss des Gletschers beinahe gar nicht ansteigende Thalboden mag sich ungefähr auch um 2000 F. über Tinzen erheben.

Ein zweiter östlicher Ausläufer, der das hintere Beversthal gegen Mittag begrenzt und von Suvretta scheidet, trennt sich, im Hintergrund der Agneialp, von dem Mittelkamm ab. Die bedeutende Höhe der ganz vegetationsleeren Felsstöcke, die Gletscher, die alle Einschnitte des Rückens bedecken, die von Lavinenzügen durchfurchten Seitenwände entsprechen der wilden, öden Umgebung. Bei der Suvretta-Alphütte, wo das Suvretta-thal sich in das Beversthal ausmündet, ist dieser Ausläufer abgebrochen; sowohl nach der äusseren Gestaltung, als nach der Steinart, lässt sich jedoch die Kette des Piz Ot als seine östliche Fortsetzung betrachten, und, mit dieser Verlängerung erscheint er, von gleicher Ausdehnung, wie die nördliche Beversthalkette, als ein ganz würdiger Begleiter derselben. — Zwischen dieser Kette und dem Gandalva breitet sich ein ausgedehnter, ziemlich flach abgedachter Gletscher gegen den obersten Hintergrund von Suvretta di Campofério aus, und, so viel wir, vom Saluverjoche aus, sehen konnten, drängt er sich noch, weit nördlich, zwischen den Mittel-

kamm der Agneialp und den ersten Stock des Ausläufers hinein, vielleicht zusammenhängend mit dem grossen Beversergletscher.

Die Vertheilung der Gebirgsarten folgt zum Theil dem Streichen des Alpensystems, und die Grenzlinien haben eine ostwestliche Richtung,  $h\ 6$ , um etwa  $20^\circ$  mehr der Parallele genähert, als die Streichungslinie der beiden Beversthalketten.

Im südlichsten Theil der Gruppe erstreckt sich der *Granit-Syenit* des Julierpasses bis an das Suvrettathal, und bildet noch den gegen N steil abgestürzten *Piz di Gandalva*. Der grosse Suvrettagletscher aber scheint denselben abzuschneiden, und, sowohl an den Felskämmen in seinem Hintergrund, als an dem, ihm nördlich liegenden Stocke sieht man deutlich die Gesteine des Saluverjoches, *Kalk* und *rothe* oder *grüne Schiefer*, gegen W. fortsetzen. Von da an besteht die Hauptmasse des Mittelkamms aus *Saluergestein*, an der Cima di Flix, wie am Errstocke, bildet es die Gipfel und die hohen Felswände der Ost- und Westseite, und, auch am Ausgang des Errthales, im Durchschnitt der, in so geringer Entfernung, so hoch aufgeworfenen Kette, zeigen sich nur gewöhnliche, oder umgewandelte Flyscharten. Erst in den zwei Ausläufern, die das Beverthal einschliessen, wird der *Juliergranit* wieder herrschend, und, von der Beversalphütte, durch das 4 Stunden lange Thal, bis man in's Engadin austritt, sieht man, anstehend und in den fast ununterbrochenen Trümmerhalden beider Thalseiten, kaum ein anderes Gestein.

So wie der Granit-Syenit der Gravesalvasgebirge unmittelbar zusammenhängt mit demjenigen des Gandalva, so setzt daher auch der Flysch von Gravesalvas, durch die Lämmeralp und Suvretta, über nach Saluver und steht in Verbindung mit dem Kalk und Dolomit von St. Moritz und Samaden. Wahrscheinlich werden diese Gesteine der Piz Ot Gruppe von dem Granit des Gandalva eben so überlagert, wie der Flysch von Gravesalvas von dem Juliergranit, und das steile S Fallen des Saluergesteines, das auch in der Lämmeralp anhält, unterstützt diese Vermuthung. Dem Granit des Beversthalles dagegen ist das Saluergestein und der mit ihm verbundene

gemeine Flysch und Kalk aufgesetzt, und die ganze Masse geschichteter Gesteine dieser Ostseite des Juliers lässt sich demnach als ein collossaler, im Juliergranit eingeklemmter Keil betrachten, ähnlich den Keilen des Berner-Oberlandes. Denn schwerlich werden wir uns dazu verstehen, in dem Granit des Beversthalles die wahre Grundlage des Flysch's anzuerkennen, da wir, in den Madrisgebirgen, in noch grösserer Ausdehnung und Regelmässigkeit, die westliche Fortsetzung dieser Flyschmasse auf Glimmerschiefer, Gneis und Gneisgranit gelagert wissen; da ferner, auf dem Kamm von Gravesalvas und im Julierthale, der Granit eben so evident dem Flysch aufsitzt, als, weiter östlich, dieser dem Granit, und die Uebereinstimmung dieser Granite in den meisten Charakteren nicht erlaubt, sie als verschiedene Bildungen zu betrachten, wenn auch ein unmittelbarer Zusammenhang derselben, oder des Granits von Silvaplana mit demjenigen von Bevers, wegen des dazwischen liegenden Gneises, nicht nachgewiesen werden könnte.

Eine andere Analogie dieser Gebirge der Ostseite mit denjenigen der Westseite des Hauptthales finden wir in der Entwicklung des Serpentin's, dem Hauptthale parallel, in linearer Erstreckung, längs dem westlichen Abfall der Gruppe. Mit diesem Serpentin stehen grosse Massen von grünem Schiefer in Verbindung, die hier sich enge an das grüne Saluergestein anschliessen scheinen, wenn es je möglich ist, sie davon zu trennen. Es ist ferner der Serpentin, nicht nur auf einer Linie, sondern, wie auf Giuils und im Faller, auf verschiedenen Höhen hervorgetreten, und es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass diese lagerartigen Stöcke, die, durch die Thalbildung getrennten Fortsetzungen derjenigen der linken Thalseite sind. Mit dem Serpentin endlich, haben auch Gabbromassen sich entwickelt, wozu unter anderen die Gabbro gehören, die als Blöcke in der Nähe von Marmels liegen und von diesem rechtseitigen Abhange herabgekommen sind.

---



## 1. Westseite der Gruppe.

Bei den Julier-Alphütten stiegen wir, am östlichen Abfall der Mortermasse, aufwärts in die *Læmmeralp*. Der ganze Abhang ist bedeckt mit Schutthalden von dunkelgrauem schiefrigem Kalk, dem sich auch Stücke von gelbem, dolomitischem und von breccienartigem Kalk beimengen, und, bis an Castronera, besteht diese östliche Hälfte der Mortermasse ausschliesslich aus diesen Gesteinen. Es sind dieselben regelmässig nach SO einfallenden Schichtenmassen, die, obgleich in weit geringerer Mächtigkeit und mehr umgeändert, im direct gegenüberliegenden Tobel von Gravesalvas vorkommen; und um so höhere Wichtigkeit hatte für uns das Auffinden gut charakterisirter organischer Ueberreste, das, freilich erst nach langem Suchen, in den Trümmerhalden, oberhalb der Julierhütten, gelang.

Das eine Stück enthält einen deutlichen *Belemniten*, in grauem, schiefrigem Kalk; die Länge mag bei  $1\frac{1}{2}$  Zoll betragen haben, er ist aber an beiden Enden beschädigt; an der Alveole misst der Durchmesser bei 2 Linien. Noch stärker beschädigte *Belemniten* fanden sich in anderen Trümmern.

Andere Stücke, theils von gleicher Steinart, theils von graulich schwarzem Schiefer, tragen, theils flache, theils etwas erhöhte *Fucoidenabdrücke*, die mit *Fuc. intricatus* und *F. æqualis* grosse Aehnlichkeit haben. Die ersteren scheinen von den gewöhnlichen *Fucoiden* der alpinischen Flyschkreide nicht verschieden, die letzteren stimmen ganz überein mit Abdrücken, die sich, in gleicher Steinart, auf dem Gebirgskamm zwischen Vorder-Rheinthal und Kalseuserthal, und auch im Hintergrund des Weisstannenthals finden.

In noch anderen Stücken zeigten sich Spuren kleiner *pectenartiger Bivalven*.

Auch die östliche, oder linke Seite der Alp wird von einem sehr zertrümmerten Kalkberg begrenzt, so dass der vordere Theil des Thales ganz



in Kalkstein eingeschnitten ist. Hinter jenem Kalkberg durch, sieht man, in dem sehr wilden und öden Thal, das sich, weit östlich, gegen Suvretta erstreckt, den Kalk so weit, als die Aussicht reicht, fortsetzen und einen Theil des hintersten Felskammes bilden. Diesen Felskamm halten wir aber für denselben, der auch den Hintergrund des Suvrettagletschers begrenzt.

Bereits auf der Julierstrasse waren uns grüne Felsstöcke aufgefallen, die, in einem zackigen Grathe, die Alp gegen Mitternacht umschliessen. Wir glaubten sie für Serpentin zu erkennen, für die Fortsetzung der, bei Tinzen und Marmels, auf der rechten Thalseite, durchstreichenden Serpentinlinie. Aber die nähere Untersuchung bewies auch hier wieder, wie wenig man, in diesem Lande, den Inductionsschlüssen vertrauen darf.

Die neue Steinart erscheint zuerst an der felsigten Stufe, die den oberen öden, zum Theil mit Schneefeldern bedeckten Hintergrund, von den unteren Weidplätzen scheidet, und sich, immer ansteigend, bis an die hintersten Felsgräthe hinaufzieht. Wir hätten vielleicht noch einer Stunde Zeit bedurft, um, vom vorderen Rand der Hochfläche weg, jene Gräthe zu erreichen.

Die Felsart der Stufe und dieses oberen Hintergrundes der Lämmeralp ist *Salwegestein*. Vorherrschend ist, in der hier verbreitetsten Abänderung, eine undeutlich und verwachsen schiefrige, graulich grüne Masse, zwischen Kalkspath- und Flussspathhärte, beinahe matt, zum schwarzem Glase schmelzend; in dieser Masse sind ziemlich viele graulich weisse Quarzkörner, zuweilen mit krystallinischer Begrenzung, und weisse, perlmutterartig glänzende Feldspaththeile eingewachsen; die Verwitterungsflächen sind talkig, serpentinähnlich schimmernd. In einer anderen Abänderung ist die grüne Grundmasse Speckstein oder Talk ähnlich, unvollkommen blätterig, mit Fettglanz, schmilzt aber, wie die früheren, zu dunklem Glase; die Quarzkörner sind noch häufiger, Feldspath selten, dafür aber viel Körner und Theilchen von rothem Jaspis. In noch einer anderen nimmt die Grundmasse selbst eine blass rothe Farbe an, die sich

in die grüne verläuft, die Quarz- und Jaspiskörner sind so häufig, dass man den Stein wohl als Sandstein, oder kleinkörniges Conglomerat bezeichnen kann. Er ist wirklich, in der letzten Varietät von den rothen Sandsteinen des Sandhubels und Kummerberg's in Davos, oder von den Conglomeraten von Mels in Nichts verschieden; während andere Varietäten mehr an verwachsene Talkschiefer, oder an die grünen Schiefer von Molins und Stalla erinnern.

Das Fallen dieser Gesteine ist steil südöstlich, und sie dienen dem vorigen, petrefactenführenden Kalk zur Unterlage. Sofern demnach, wie wir glauben annehmen zu sollen, dieser Kalk unmittelbar mit demjenigen des Saluverjoches zusammenhängt, so können die grünen Gesteine der Agneialp nicht in der Saluverkette ihre Fortsetzung finden, da diese dem Kalk aufgelagert ist. Wahrscheinlich würde man diese letzteren Gesteine in einem der östlicheren Seitentobel der Julierhöhe, in demjenigen, aus welchem die rothen Jaspistrümmer herkommen, wiederfinden.

Nach ziemlich langem Ansteigen gelangten wir auf das Joch, das die Lämmeralp von der Seesalp trennt. Das Saluvergestein wird hier von gelb bestaubtem *Dolomit* und *Rauchwacke* bedeckt, die sich weit an den Morterstock hinaufziehen und mit dem petrefactenführenden Kalk nur Eine Masse bilden. Auch an der Südseite der noch aus grünem Gestein bestehenden Spitze, die, nadelähnlich, mit steilem Absturz gegen die Seesalp, neben dem Joche aufsteigt, hat sich die Rauchwacke noch schildförmig angelagert. Das Joch selbst und seine Abhänge nach beiden Alpen sind mit Blöcken dieser zelligen und porösen Dolomite ganz überdeckt. Wie Lavablöcke rauh, mit Zacken und hackigen Spitzen, oder an Bimsstein erinnernd, lassen diese Dolomite auch nicht die unscheinbarste Flechte auf ihrer Oberfläche sich ansetzen. Ein kraterähnlicher, kleiner See, mitten auf dem Joche, scheint auch *Gyps* zu verrathen, und wirklich soll hier, nach Hr. B. v. Salis und nach Erkundigungen, die wir in Stalla einzogen, *Gyps* in bedeutender Mächtigkeit vorkommen. Da wir erst nach unserer Reise diese Angabe erhielten, so waren wir vielleicht, ohne sie zu bemerken, in nicht grosser Entfernung von diesen Gypsfelsen vor-

beigegangen, oder Einstürze von Dolomitmassen hatten sie mit neuem Schutt überdeckt.

Von Agnei aus hatten wir, auf einer Felsspitze, die etwa 500 F. sich über das Joch erhebt, ein steinernes Signal bemerkt, und in ihr die von unseren schweizerischen Ingenieuren uns öfters, als eine der höchsten Spitzen in Bündten, genannte *Cima di Flix*, zu erkennen geglaubt; um so mehr, als auch der Wirth in Stalla uns Hoffnung gemacht hatte, es sei die Cima di Flix von Agnei aus leicht zu besteigen. Sehr erfreut, mit so weniger Anstrengung, diesen berühmten Punkt erreichen zu können, waren wir demselben zugeeilt und hatten glücklich die oberste Höhe, von der südöstlichen Seite her, erstiegen, als nun der Blick in die tief unter uns liegende Seesalp und auf die furchtbaren, hoch über unseren Gipfel aufsteigenden Felswände, die ihren Hintergrund umgeben, besonders aber auf das Signal, das wir auf dem höchsten von hier aus sichtbaren Gipfel zu erkennen vermochten, sogleich uns über unseren Irrthum und über die Lage der wahren Cima di Flix belehrten. Diese zu erreichen, war es zu spät geworden, da kein anderer Weg, als durch die Seesalp, hätte gewählt werden können, und wir beschlossen daher, die noch übrige Tageszeit der Untersuchung der vorderen Seesalp und der südwestlichen Abhänge des Morterstockes zu widmen.

Nicht ohne Mühe stiegen wir, eine sehr steile Halde hinunter, in die Seesalp. Der *Kalk* streicht von der Nordseite des Morter her, quer durch den hinteren Alpkessel und zeigt sich, mächtige Felsen bildend, in dem Felsgrathe, der, von der Cima di Flix, auf der rechten Seite des Sees-thales, gegen Marmels ausläuft. Das Fallen bleibt auch hier immer nach SO. — Weiter vorn in der Alp tritt unter, oder neben dem Kalk *Serpentin* hervor, der ebenfalls auf beiden Seiten des Thales, auf der rechten jedoch in grösserer Mächtigkeit, zu Tage geht. Die vorherrschende Steinart aber, in der ganzen mittleren und vorderen Alp, und auch an dem wohl 2000 F. hohen und steilen Abfall derselben gegen das Hauptthal, ist *grüner Schiefer*, der das schieferige Gefüge zum Theil verliert, und in ein berggrünes Aphanit ähnliches Gestein übergeht. Der Kalk sowohl, als der

Serpentin verschwinden beinahe in der ungeheuren Masse dieses merkwürdigen Gesteins. Auch als wir auf der linken Seite von Sees wieder in die Höhe stiegen, um längs der Südseite des Morter, nach Stalla zurückzukehren, sahen wir uns, bis nahe an Stalla, nur von ihm umgeben, und der Gipfel des Morter selbst, scheint aus keiner anderen Steinart zu bestehen. Eine Rückkehr zu deutlich schieferiger Structur und selbst zu gewöhnlichem grauem Flysch ist auch hier so häufig, dass man über die wahre Natur des Gesteins niemals in Zweifel sein kann. Dann aber wird dasselbe an anderen Stellen wieder so massig, dass man grünen Gneis zu sehen glaubt; und die Gestalt und Oberfläche der Blöcke, die Flechten selbst, die sie bedecken, sind so täuschend, dass man durch Anschlagen frischer Bruchflächen sich von der wahren Natur der Steinart überzeugen muss. Im vorderen Seesboden, und an den Abhängen des Morter war es, wo sich uns die schönsten Drusen von kleinen *Albitkrystallen*, durchscheinend, farblos oder weiss, auf Klüften des grünen Gesteins, zeigten; auch Adern von weissem, körnigem Albit sind häufig. — Erst in geringer Höhe über dem Thalgrund von Stalla, tritt aus dem grünen Schiefer wieder Serpentin heraus, der tieferen Linie angehörend, die in der ganzen Gegend von Stalla und gegen Marmels hin, eine Menge Anbrüche zeigt.

Später lehrte uns die Besteigung der *Cina di Flix* (den 8. Aug. 1838) keine wesentlich neuen Verhältnisse kennen; wohl aber berichtigte die auf ihr gewonnene, leider durch Nebel und Schneestürme getrübt Gebirgsansicht, in mehreren Punkten, unsere topographische Kenntniss dieser Gegenden.

Von Stalla aus, folgten wir dem Thalgrund, bis nahe an Stalvedro, stiegen von da, den meist bewaldeten Abhang in schiefer Richtung durchschneidend, gegen die Alphütte der höheren Marmelser-Weiden, und erhoben uns nun, theils über Weidgehänge, theils über Felsgetrümmer, an dem Gebirgskamm, der das Seesthal von der Flixalp scheidet, bis wir den hinteren Seesboden beträchtlich tief unter uns sahen. Von da an werden die Felsen zu rauh, als dass, ohne Gefahr, der Grath weiter verfolgt werden könnte; gegen die Flixalp ist derselbe in fürchterlich hohen Wänden

abgestürzt. Wir vertrauten uns daher einer steilen, gegen den Seesboden ausgehenden Schneelehne an, über die aufwärts, wir, nach etwa einer halben Stunde unausgesetzten Steigens, an den unteren Rand des obersten domartigen Gipfel gelangten. Noch eine Viertelstunde etwa musste der dünne, kaum das Steingetrümmer deckende Schnee der stets noch ziemlich steil ansteigenden Westseite des Gipfels durchschnitten werden, dann standen wir am Signal, und vor uns breitete sich der mächtige Beversgletscher aus, und das Beverthal bis nahe an die Serra. Wir hatten, ohne viel zu rasten, von Stalla bis auf den Gipfel 5 Stunden gebraucht; also, wenn wir 1 Stunde für den Weg im Thalboden von Stalla abziehen, für 1100 F. Erhebung 1 Stunde. Den Rückweg legten wir in 3 Stunden zurück, indem das Hinabgleiten über die lange Schneelehne bis Sees eine bedeutende Abkürzung gewährte.

Die Cima di Flix und die ganze Reihe von Gebirgen, die, von ihr aus, sich gegen Suvretta erstreckt und den Hintergrund der Lämmeralp umschliesst, fällt in schroffen, wohl bei tausend Fuss hohen Felswänden gegen den Beversgletscher ab. Nur im Norden der Cima di Flix erhebt sich der Gletscher bis auf den obersten Gebirgskamm, und über diese Einsattlung kann man allenfalls aus dem Beverthale nach der Flixeralp gelangen. Noch mehr nördlich folgen die höheren Errgipfel, von denen der nächste, so viel sich aus der Ferne beurtheilen lässt, von hier aus ohne Gefahr bestiegen werden könnte.

Die Steinart des Gipfels der Cima di Flix ist die vorherrschende des ganzen Seesthales, das grüne, gneisartige *Saluergestein* des Morter und der Agneialp, auch dem Gneis von Ferrera sich nähernd; vorherrschend grüner Talk, schiefrig verwachsen mit unvollkommen entwickeltem graulich und grünlich weissem Feldspath und Quarz; die drei Bestandtheile meist in eine beinah homogene Masse verflossen. Nach den Aussagen unseres Führers von Stalla (P. Cattilini) soll, einige hundert Schritte nördlich vom Signal, *Serpentin* anstehen. Er theilte uns leider diese Notiz erst mit, als wir, auf der Rückkehr, bei dem Serpentin (*sasso nero*) der Seesalp vorbeikamen; und wahrscheinlich hätte uns auch der Schnee

an der Aufsuchung der Stelle gehindert. So weit man, an dem östlichen Absturz der Cima di Flix und der nördlichen und südlichen Gebirge, sehen konnte, besteht die ganze Kette nur aus jenem grünem Schiefer; auch die Guferlinien des Gletschers lassen nirgends die leicht zu unterscheidenden, weissen Granitblöcke erkennen, die im Beversthal selbst ausschliesslich alle Trümmerhalden bilden. Das nämliche grüne Gestein zeigt sich auch an allen Abstürzen der Errstöcke; hier aber sehr eisenschüssig, und, wahrscheinlich durch Zersetzung von Kiesen, an der Aussenfläche braunroth gefärbt, wie oft der Gneis der alpinischen Centralmassen.

---

## 2. Ostseite der Gruppe.

Nur mit vieler Mühe hatten wir in Bevers einen Gemsjäger gefunden, der sich getraute, uns durch das *Beversthal* nach *Tinzen* zu führen. Wir waren bis zur Bevershütte gekommen, beinahe im Hintergrund des Thales, und ruhten hier aus von dem mehr als dreistündigen Marsche durch das einförmige, felsigte Thal, das der Beobachtung stets nur den gewöhnlichen Juliergranit dargeboten hatte. Im westlichen Hintergrund erhob sich die Cima di Flix, wie ein isolirter Stock, umgeben von einem ausgedehnten, wenig steil ansteigenden Gletscher, da in dem tiefen Thalgrunde die weniger hohen und mehr zurückstehenden Felsen durch den Gletscher verdeckt werden. Ein anderer Gletscher senkte sich aus einem hohen nördlichen Seitenthal der Hütte zu.

Ein, zwar romanisch geführter, lebhafter Streit, zwischen unserem Führer und dem Alphirten, liess uns nicht lange im Zweifel, dass, weder der eine, noch der andere, genau wisse, über welchen der beiden Gletscher eigentlich der Weg führe, keiner hatte früher das Gebirge überstiegen. Wir vertrauten dem Hirten, der für den nördlichen Gletscher stimmte, und grösseres Vertrauen in seine Behauptung zu setzen schien; und er fand sich auch bereit, uns als Wegweiser zu dienen, bis man von

der Höhe in das jenseitige Errthal hinabsehen könne. — Auf der Ostseite des Gletschers konnten wir, über steile Weidplätze und Felstrümmer, bis fast auf die Höhe des Joches steigen, ohne den Gletscher betreten zu müssen; aber nun wurde jedes weitere Vordringen auf dieser Seite unmöglich, und wir sahen uns genöthigt, den ferneren Weg auf der nur noch schwach ansteigenden, mit leichtem Schnee bedeckten Eisfläche zu suchen. Bald zwangen uns die häufigen Spalten, die zu breit waren, um ohne Gefahr überschritten werden zu können, uns nach der Westseite des Gletschers zu wenden, wo wir ein mehr zusammenhängendes Eis zu finden hofften, und, nach einer längeren Wanderung, auf der jeder neue Schritt erst mit dem Alpenstock geprüft werden musste, gelangten wir endlich an die linke Seite des nördlichen Absturzes, und, wohl 2000 F. unter uns, erblickten wir das Errthal. Das Hinabsteigen aber war eine missliche Aufgabe. Auf der linken Seite, wo wir standen, zog sich der Gletscher steil hinunter, so furchtbar zerborsten, dass jeder Versuch, hier in die Tiefe zu gelangen, aufgegeben werden musste; weiter rechts folgte eine, mehrere hundert Fuss hohe, verticale Felswand, über welcher der Gletscher abgebrochen war, und nur auf der uns entgegengesetzten Seite zeigte sich die Möglichkeit, zur Seite des Gletschers, über die steile Gandecke hinabzuklettern. Um dahin zu kommen, musste, am oberen Rand der Felsabstürze durch, die ganze Breite des Gletschers durchschritten werden. Eine dünne Schneedecke lag hier auf dem steil abgebrochenen Gletscherrande, sie konnte leicht unter der Last der Reisenden, die sich feste Fusstritte einstampften, hinuntergleiten, und bei jedem Schritte, den unser Vordermann, der aus Bevers mitgenommene Gernsjäger, that, erwarteten wir dieses Schicksal. Bald hörte auch diese trügerische Decke auf, die Tritte mussten in's Eis selbst eingeschnitten werden, und ein Fehltritt, oder leichter Schwindel konnten nun, wo das Eingreifen in den höheren Schnee keinen Halt mehr bot, eben so verderblich werden. Unvorbereitet auf solche Schwierigkeiten, nur mit kleinen Hämmern bewaffnet, ohne Steigeisen, ohne Seile, legten wir auch diese zweite Hälfte des Weges nicht ohne Besorgniss zurück, und

schätzten alle uns glücklich, als wir wieder auf festen Fels stehen konnten. Um keinen Preis wäre der Beverser zu bewegen gewesen, unserem Vertrag gemäss, denselben Weg zurückzukehren; er folgte uns am nämlichen Tage bis Tinzen, und ging, den Tag nachher, über den Julier nach Hause.

In der näheren Umgebung der Beverser Alphütte und bis hoch an den Gletscher hinauf ist *Juliergranit* die allein herrschende Steinart. Die obersten Gipfel dagegen bestehen, bereits auf den an das Beversthal grenzenden Gebirgen, und von diesem aus sichtbar, aus Sedimentgesteinen. Die Gipfelreihe, die den Gletscher östlich einschliesst, trägt Kuppen von *Kalk* und *Rauchwacke*, dem Granit horizontal aufgesetzt; auf der Westseite des Gletschers sieht man, von der Oberfläche des Gletschers bis auf die obersten Gräthe, *bunte Schiefer*, vorherrschend grün, auch wohl roth, wahrscheinlich unmittelbar mit den Schiefermassen der Errstöcke zusammenhängend. Am nördlichen Abfall des Gletschers und durch den ganzen Thalboden der Erralp findet man diese Schiefer, auf beiden Seiten horizontal gelagert, allgemein verbreitet. Auf der Ostseite, wo sie beinahe in wahren *Glimmerschiefer* übergehen, bilden sie eine Vorkette der östlichen Granitgebirge, deren Trümmer, durch eine Lücke dieser Vorkette bis in den Errboden selbst dringen. Auf der Westseite erniedrigen sich die hohen Errstöcke bald zu einer Kette von mittlerer Höhe, die ganz aus horizontalem, buntem Schiefer besteht. Hinter diesem Schiefer erheben sich mächtige *Kalkstöcke*, die wir als die Fortsetzung derjenigen der Seesalp betrachten; und noch weiter westlich sieht man, durch die Zwischenräume der Kalkstöcke, schwarze Gipfel hervorragen, die aus *Serpentin* zu bestehen scheinen.

Die Nordseite des langen Ausläufers der Gruppe, der die eine Thalseite des Albulapasses bildet, ist uns nur an seinen beiden Endpunkten näher bekannt geworden. Auf der Stufe oberhalb Weissenstein bestehen indess alle von der Nordseite herstammenden Blöcke, die sich hier mit den Kalkblöcken des Albulahorns mengen, ausschliesslich aus *Juliergranit*, und die Gestaltung und Farbe der Felsen lassen mit grosser Wahrchein-



lichkeit annehmen, dass diese Steinart auch auf dieser Seite der Kette, wie auf der dem Beversthal zugekehrten, die herrschende sei.

Im Hinabsteigen von der Höhe des Albula nach Ponte erscheint, am östlichen Ende der Kette, *Gneis*, und hält an bis in den Thalboden. Es scheint eine nestartige, mit dem Granit innig verwachsene Partie weniger vollkommen umgewandelten Gesteins, analog den Gneismassen, die auch anderwärts, sowohl am äusseren Rande, als im Inneren dieser Granitgebirge, vorkommen. Das Fallen des Gneises von Ponte ist steil südlich.

Vergebens hatten wir mehreremale versucht, von dem Albulapasse, an der Südseite des Piz Ragnutz vorbei, nach Tinzen überzusteigen. Grünlich schwarze Kuppen, die man, von Weissenstein aus, nahe am obersten Kamm des Scheidegebirges unterscheiden kann, hatten vorzüglich unsere Aufmerksamkeit erregt.

Als wir von den *Bergüner-Maiensæssen*, durch *Falò*, nach der Alp *Città* aufstiegen, waren wir, an dem tieferen Gebirgsabhange von *Flysch*, dann aber, bis in bedeutende Höhe, nur von *Granit* umgeben, und auch weiter südlich und südöstlich war keine andere Steinart zu erkennen. Nur der oberste Kamm, der uns von der Erralp trennte, bestand deutlich aus einem *braunrothen Schiefer*, zwischen dessen flachen Pyramidengipfeln sich Schneemassen eingelagert hatten. Die mittlere Höhe dieses Kammes kann, nach der Ausdehnung der Schneefelder zu urtheilen, nicht unter 8500 F. angenommen werden. — Niemand von den vielen Thal-leuten, die, an den mittleren Gehängen, mit Einsammlung des Heu's beschäftigt waren, konnte uns genauere Auskunft geben, ob, und in welcher Richtung man von da in's Errthal gelangen könne, und, gewarnt durch unsere Reise über den Errgletscher, wollten, bei ohnehin drohendem Himmel, weder wir, noch unsere Leute es wagen, ohne Jemand, dem das Gebirge bekannt wäre, die Uebersteigung zu versuchen. Erst zwei Jahre später fanden wir in Bergün einen alten Gernsjäger, der, theils durch Città, theils weiter nördlich, längs dem Abfall des P. Ragnutz, öfters schon über das Gebirge gegangen war, und bis auf die Höhe als

Führer dienen wollte. Wie sich nun zeigte, lässt der Weg von Bergün nach Tinzen sich in etwa 5 Stunden bequem zurücklegen und ist nicht beschwerlicher, als z. B. die Surenen, oder die Nufenen.

Zunächst dem südlichen Abfall des Ragnutz stiegen wir in einem Tobel sehr steil und ununterbrochen aufwärts, bis wir, über die Scheidecke des Albulapasses weg, die südöstlichen Engadiner Gebirge hervortreten sahen. Hier, wohl 2000 F. über dem Thalgrund der Maiensässe, verflacht sich das Tobel in ein ziemlich ebenes, ödes Thälchen, dessen Nordseite durch die verticalen Kalkfelswände des Ragnutz, die Süd- und Westseite durch nackte Schiefergebirge gebildet werden, und dessen Thalboden wir, den 24. August, noch grossentheils mit Schnee bedeckt fanden. Schon während des Ansteigens hatten wir zur Linken stets nur *Schiefer* gehabt, theils gewöhnlichen grauen *Flysch*, theils bunte, rothe und grüne *Galestroschiefer*. Der Gebirgsvorsprung, der unseren diessjährigen Weg von dem früheren und von dem Granit von Città trennt, besteht ganz aus diesen Flyscharten. — Nach langem, aber wenig steilem Ansteigen über die westlichen Schutthalden, welche kesselartig das Thälchen umschliessen, erreichten wir die oberste Höhe des schmalen Rückens, der die Zuflüsse der Albula von denjenigen des Errbaches scheidet. In bedeutender Ausdehnung wird hier, gegen Mittag zu, der Schiefer von *Rauchwacke* und *dolomitischem Kalk* überlagert, und, noch südlicher, erheben sich, von Schneefeldern umgeben, höhere *Granitgipfel*. Keine Einsattelung erleichtert das Uebersteigen des Rückens, und man übersieht daher von der Höhe des Passes den grössten Theil der Gebirge dieser Gruppe: die lange granitische Kette vom Albulapasse bis Città, das nackte Schiefer- und Rauchwackegebirge, das sich von dem erreichten Standpunkte bis an den Errgletscher erstreckt; vor Allem aber wird das Auge gefesselt durch die grossartige Ansicht der Errstöcke, die sich, im westlichen Hintergrund des von hier aus nicht sichtbaren Errthales, ganz in Schnee und Eis gehüllt, im ganzen Panorama am höchsten erheben.

Ueber eine steil geneigte, längere Schneelehne hinab gelangten wir nach dem *Rothenberg*, einer beinahe von aller Vegetation entblösten Ge-

birgsstufe, welche, auf der Westseite des Scheidegebirges, den südlichen Absturz des Ragnutz nach dem *Ochsenberg* und *Errthal* unterbricht. Der mittlere Theil der Stufe umschliesst einen kleinen See, der übrige Boden ist klippig, oder mit Schutt bedeckt. Auch hier ist *Schiefer* die herrschende Steinart; in verticalen, oder steil südlich fallenden Schichten, *h* 6 streichend; während die hohen Kalkwände des Ragnutz nördliches Fallen zeigen. Es ist vorherrschend *Galestro*, abwechselnd mit mächtigen *Quarzitlagern*. Die bunten Flyscharten sind auf dieser Westseite des Gebirges mächtiger und in höherem Grade entwickelt, als auf der Ostseite. Aber noch evidenter, als in dieser Umwandlung des Bündtnerschiefers, hat sich der mächtige Einfluss der subterranean Agentien in dem Beschlag von schuppigem *Eisenglimmer* und *Eisenglanz* gezeigt, der die meisten Schichtenflächen des *Galestro* überzieht, und, von einem leichten, oft unterbrochenen Anfluge, bis zu eigenen Zwischenlagern, von der Dicke mehrerer Zolle anwächst. Der innige Zusammenhang dieses Eisenoxydes mit der rothen und grünen Färbung des *Galestro* ist eine an sich klare Thatsache, und der secundäre Ursprung des Eisens, durch Sublimation, den hier alle Verhältnisse beweisen, gibt auch dem Vorkommen der Eisenglimmermassen in anderen Gegenden von Bündten, seine wahre Deutung.

Auf dem *Ochsenberge* soll, in älterer Zeit, auf *Kupferkies*, oder andere *Kupfererze* Bergbau statt gefunden haben. In Chur und in anderen Schweizensammlungen bewahrt man Stücke auf, von schön himmelblauem *Allophan*, der sich in den alten Gruben secundär gebildet haben soll. — Auch *Eisenerze* sind, nach älteren Nachrichten, theils auf dem *Ochsenberge*, theils auf der Flixeralp gefördert worden.

---

## 5. GRUPPE DES TINZERHORN'S.

Im Norden des so eben beschriebenen Passes erhebt sich, in meist nackten Felsen, von kaum unterbrochenen Trümmerhalden umgeben,

eine Kalkgruppe, deren Höhe und grosse Mächtigkeit um so mehr auffallen, als man, in ihrer ganzen Umgebung und in den angrenzenden Berggruppen, einen analogen Charakter der Gebirgsbildung nicht wahrnimmt. Es sind vorzüglich drei hohe Pik's, den tyrolischen Kofeln, oder den Dolomitstöcken von Savien ähnlich, deren kühne Gestalten in allen Panoramen von Mittel-Bündten das Auge auf sich ziehen. Ihre Höhe muss bis 9000 F., oder noch mehr, betragen; da sie sich beträchtlich über den Rücken, der zwischen Città und Err liegt, erheben, und, auch in warmen Sommern, an dem niedrigsten unter ihnen, dessen geringere Steilheit noch das Haften des Schnee's an seiner Nordseite gestattet, dieser niemals verschwindet und sogar zu einem kleinen Gletscher angewachsen scheint.

Dieser etwas niedrigere der drei Stöcke ist der nördlichste derselben, *Piz Crapp* (Felsspitze) oder *P. Promasc*, *P. Promascel* (Spitze der Mannesalp, wie «Männlichen» im Berner-Oberland). Gegen Abend ist er steil abgestürzt; gegen NO erstreckt sich eine Felsrippe von ihm aus bis gegen Filisur. Der mittlere Stock ist das *Tinzerhorn* oder *P. Ugliz*, eine schöne Pyramide, ähnlich dem Schreckhorn, wie es von Bern aus gesehen wird. Auch von ihm geht ein felsigter Grath aus, der erst am Albulathal abgeschnitten wird. Der *P. Ragnutz* (Krätzestock) erscheint, wenn man ihn von vorn, z. B. von Faller aus, sieht, wie ein Halbkreis, im Profil gesehen; z. B. von den Höhen bei Parpan, zeigt er sich als eine schmale Pyramide mit verticalem Absturz gegen Westen. Auch die tiefen Einschnitte zwischen den drei Stöcken haben die nackte Felsmasse nicht ganz zu durchbrechen vermocht; der westliche Absturz hält an vom Promascel bis zum Ragnutz, und kein Pfad führt, durch einen jener Einschnitte, quer über das Gebirge aus Oberhalbstein in's Albulathal.

In dem Engpasse zwischen den Bergüner-Maiensässen (5430') und Bergün (4220'), wo die, erst noch so sanft durch Wiesengründe fliessende Albula, wild aufschäumend und mit furchtbarem Toben, sich durch die Felsen drängt, setzt die Gruppe in dem Kalkgebirge fort, das den Albulapass nördlich begrenzt, ohne jedoch hier seine bisherige Mächtigkeit und Höhe zu behaupten. Gehen wir nun, der Albula nach, Thal abwärts, so

sehen wir, über der Thalerweiterung von Bergün, auf der Westseite, nackte Kalkgipfel sich erheben, die, von höheren Standpunkten aus betrachtet, wie eine, vom Ragnutz losgespaltene Masse erscheinen; der unmittelbare Zusammenhang aber dieses Kalkes mit demjenigen der Ostseite hält an, bis an den *Bergüner-Stein*, wo der Thalboden plötzlich, wie am Ausgang von Oberhalbstein, sich um mehrere hundert Fuss erniedrigt und zu der Schlucht von *Bellaluna* und *Filisur* (3210') absinkt. Die steilen Wände dieser Schlucht bestehen nicht mehr aus Kalk; es erstreckt sich aber derselbe in den, theils felsigten, theils bewaldeten Ausläufern der nördlicheren Stöcke, bis an ihren oberen Rand, und die breite Gebirgsstufe, um die sich die Albula, vom Stein bis nach Tiefenkasten, herumwindet, wird ganz von ihm bedeckt. Bei der Vereinigung der Albula mit dem Davoser-Landwasser, und, weiter abwärts, bis Tiefenkasten, ist das Thal wieder auf beiden Seiten von Kalkfelsen eingeschlossen, und der Kalk unserer Gruppe steht demnach hier im Zusammenhange mit der mächtigen Kalk- und Dolomitkette, die sich, dem Landwasser nach aufwärts, bis an den Ursprung der Landquart ausdehnt. Diesen Verhältnissen, an seinem nördlichen und südlichen Ende, zu Folge, kann der Gebirgsstock des Tinzerhorns nur als ein durch Spaltenthäler losgetrenntes Glied des grossen Ringes von Sedimentgesteinen betrachtet werden; welcher die Peripherie der Selvrettamasse bildet; und wir müssen, um ihn nach seinen natürlichen Verbindungen aufzufassen, sowohl auf die Davosergebirge, als auf diejenigen, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden sollen, Rücksicht nehmen.

Vor der Zerreissung des Bodens durch die Thalbildung, stand die Kalkdecke unserer Gruppe wahrscheinlich auch in Zusammenhang mit dem Kalk und Dolomit der Nezza- und Albinalpen und des Fianells, und, durch diese, mit dem Dolomit von Savien und Rheinwald. Denn, wo nicht abnorme Gesteine, wie bei Bellaluna, oder in Ferrera, sich hervorgedrängt haben, erstreckt sich unter allen diesen Kalkmassen durch dieselbe Grundlage von Flysch, und auch die Steinart der Kalk- und Dolomitgebirge selbst ist in diesen verschiedenen Gruppen stets dieselbe; nur dass

hier mehr reiner Kalk, dort dolomitischer Kalk, oder Dolomit, und noch an anderen Stellen die Rauchwacke vorherrschend wird.

Die Flyschbasis zeigt sich besonders am südwestlichen Fuss unserer Gruppe. Es setzt nämlich der Flysch des Errthales, noch ehe dieses gegen Tinzen abfällt, von der Südseite des Errbaches auf die Nordseite über, und bildet vor dem Ragnutz eine mächtige Pyramide, die, nur schwach und sehr unterbrochen mit Weide bewachsen, aus der Ferne gesehen, braunroth erscheint. Ob dieser Flysch wirklich unter den Kalk des Ragnutz ein falle, wurde uns nicht deutlich, ist aber, bei der horizontalen Lagerung des Schiefers und dem NO Fallen des Kalkes, wahrscheinlich. Im Hinabsteigen nach Tinzen tritt jedoch unter dem Flysch wieder, in grosser Mächtigkeit Kalk heraus, über dessen Felsen der Weg längere Zeit weg führt, und erst im Thalgrunde selbst, bei Tinzen und Savognin, bis gegen Burwein, zeigt sich in allen Anschürfungen und Steinbrüchen der gewöhnliche graue Flysch, wie er auch auf der anderen Thalseite, am Ausgang von Nandrò, als allgemein herrschendes Gestein auftritt.

Der *Serpentin* der Flixalp setzt auch in dieser Gruppe, obgleich unterbrochen, mit dem Flysch gegen N fort. Man findet ihn zuerst, in beträchtlicher Höhe über *Conters* und *Burwein*, im Fuss des Promascel, und mit ihm grössere Massen bunter Galestrogesteine. Eine zweite Masse, die wir nicht besucht haben, muss, unterhalb dem Stein, in der Nähe von *Tiefenkasten* vorkommen. Es zeigt sich hier Serpentin schutt, zunächst an der Strasse, im Walde; und noch in diesem Jahrhundert ist auf *Kupfererze*, die in diesem Serpentin brechen, ein, wie es scheint, fruchtloser Bergbau getrieben worden \*). Der Serpentin scheint hier, wie im Nandròthale, in sehr naher Verbindung mit dem bei Tiefenkasten mächtig auftretenden *Gyps* zu stehen.

Von Tiefenkasten bis Filisur, und noch etwas das Albulathal einwärts, bestehen, so viel man von der gegenüberliegenden Seite her urtheilen

\*) S. N. Bündtn. Sammler II. p. 539.

kann, die schroffen, theils nackten, theils mit dichtem Wald besetzten Wände des linken Albulaufers aus Kalk und röthlicher Rauchwacke; daher die Benennung *Crappa cotschna*, rother Fels, oberhalb der Maiensässe von Surava. Die Angabe von Ul. v. Salis \*), dass in dieser Gegend *Granit* anstehe, mit rothem Thonstein eingesprenkt, dem orientalischen ähnlich, möchte wohl auf Missverständniss beruhen.

Das Gestein, das, von Filisur bis in die Nähe des Bergüner-Steines, die Grundlage der Kalk- und Dolomitmasse bildet, ist das *rothe* und *grüne Conglomerat*, das auch in den Gebirgen von Davos, bei Wiesen und am Kummerberg, in Verbindung mit Quarzporphyr, so mächtig ist. Das Thal ist bei Bellaluna ganz in diese Steinart eingeschnitten, und wir werden sie daher auch in dem folgenden Abschnitte zu berücksichtigen haben. Sie zeigt sich, theils als sehr fest verküttetes, fast möchte man sagen, verschmolzenes Conglomerat von vorherrschend weissem Fettquarz, auch wohl blassrothem Quarz, Hornstein, Kieselschiefer, Gneis und Glimmerschiefer, die Gemengtheile gerundet und eckigt, meist von sehr ungleicher Grösse, einzelne, mitten zwischen kleineren, bis zu Kirsch- oder Baumnussgrösse, das Bindmittel, bald sehr zurückstehend, bald vorwaltend, ein kirschrother, unreiner Thon; theils ist die Steinart ein sehr fester, klein- und feinkörniger, kirschrother Sandstein, in dem nur hin und wieder ein Quarzgeschiebe, oder gröberes Quarzkorn freier hervortritt; theils endlich erscheint sie blassgrün, durch eine vorwaltende talk- oder specksteinartige, graulich grüne, unvollkommen schiefrige Grundmasse, welche vereinzelte Quarzkörner und Feldspaththeilchen umschliesst. Man ist oft versucht, diese letztere Abänderung, die, besonders auf der rechten Thalseite, unterhalb Stuls, die vorherrschende ist, für wirklichen *Porphyry* zu halten; die häufigen Uebergänge in deutliche Sandsteine und das enge Verwachsen beider Steinarten gestatten jedoch keine Trennung derselben. Auch mit dem Saluergestein hat diese Varietät grosse Aehnlichkeit, so

\*) Alpina II, p. 189.

dass wir anfangs, als wir von Stuls gegen Bellaluna niedersteigen, überzeugt waren, das Gestein der Agneialp wiederzusehen.

Die mächtige Decke, die auf dieser Grundlage von Flysch und rothem Sandstein liegt, besteht aus, meist deutlich geschichtetem *Kalk*, aus *Dolomit* und *Rauchwacke*. Der Kalk ist, wo er am reinsten auftritt, schwarz oder grau, mit feinsplittrigem oder unvollkommen muschligem Bruch, in seltenen Fällen Spuren organischer Ueberreste enthaltend. Der Dolomit ist der in den übrigen Bündtner-Gebirgen, bei Chur am Calanda, bei Davos an der Scheichornkette, gewöhnlich vorkommende, dunkelgrau, hart, sehr feinsplittrig, von einer Menge krystallinischer Pünktchen wie Hornstein, oder dichter Quarz schimmernd, in Säuren nur langsam sich auflösend, öfters durch viele Spalten bis tief ins Gebirge hinein zertrümmert. Die Rauchwacke ist ein dolomitischer Kalk und Dolomit, mit weiss, gelb, oder roth bestaubter Aussenfläche und breccienartiger Structur. Die Verwitterung verkütteter Trümmer veranlasst die Entstehung leerer, oder mit gelbem Dolomitstaub angefüllter Zellen und gibt der Steinart, bei oberflächlicher Ansicht, ein Kalktuf ähnliches Aeusseres. In den meisten Fällen möchten diese Rauchwacken wohl entstanden sein, durch eine Erschütterung des bis in's Innerste zerpaltenen Dolomits und Kalkes und nachherige Verküttung der Trümmer. In diese Steinarten, hat auch die neue Kunststrasse unterhalb Burwain eingeschnitten werden müssen, die an die Stelle der früheren, höher (über den Stein) steigenden, gesetzt worden ist. Und noch weiter fortgeschritten, als auf dem rechten, zeigt sich die Zertrümmerung des ganzen Gebirges auf der linken Seite der Schlucht; der Stein hat sich zum Theil in eine gelblich braune Erde aufgelöst, und die Felsen, vom tief einfressenden Rhein unterwaschen, bilden immer neue Einstürze. Täuschend erinnern diese steilen, bräunlichen Halden, unterbrochen von einzelnen, herausstehenden Felsköpfen, an Gypsanbrüche; doch soll der Gyps erst in grösserer Nähe von Tiefenkasten hervortreten.

Das Kalkgebirge wendet seine steilen Abstürze gegen Oberhalbstein, und man beobachtet auch deutlich, sowohl in den drei Stöcken, als an den



tieferen Felsen, ein allgemeines Fallen der Schichtung mit 40 — 50° gegen NO. Im Einzelnen finden sich indess so viele Abweichungen und locale Unregelmässigkeiten, dass man leicht, wenn man nur Messungen mit der Boussole vertrauen wollte, die Regel ganz übersehen könnte. Eine allgemeinere Ausnahme scheint aber das Hervortreten der Grundlage von Conglomerat bei Bellaluna, gerade in der Gegend, nach welcher die Schichten sich hinneigen, und der steile, wohl über 1000 F. hohe Absturz des Gebirges längs der ganzen NO Seite anzudeuten. Die Schichten stehen allerdings, in dieser Gegend, an den tieferen Felsen vertical, in grösserer Höhe scheinen sie fast horizontal zu liegen; aber auch hier führen specielle Beobachtungen nicht zum Ziele; nur allgemeinere Uebersichten des Gebirges, von gut gewählten Standpunkten aus, und von der Beleuchtung begünstigt, geben oft, auf einen kurzen Blick hin, einen überraschenden Aufschluss über Verhältnisse, die man lange vergeblich durch mühevollen Localuntersuchungen zu entziffern gestrebt hatte. Solchen Aufschluss gewährte uns die Ansicht des Ragnutz und der ganzen Ostseite der Gruppe, im Lichte der Morgensonne, als wir von Bergün nach der Tischalp anstiegen. Das NO Fallen, der höheren Stöcke sowohl, als der Felsmassen unmittelbar über Bergün, zeigte sich sehr deutlich; an den mittleren Gehängen ging aber das Fallen, in einer langsamen Krümmung, ganz in's Verticale über, und noch tiefer sah man die Schichten in den Berg hinein, nach SW, fallen. Das ganze Kalkgebirge bildet demnach, wenn wir recht gesehen haben, ein gegen NO gekehrtes Knie, und die Schichten der obersten Gipfel müssen als übergekippte oder von NO her zurückgeschlagene betrachtet werden, während die wahre Grundlage in dem rothen Conglomerat von Bellaluna zu suchen ist. Es ist eine Structurform, die in den Alpen so häufig wiederkehrt, dass sie für jede mächtigere Kalkkette fast zur Regel wird. In den westlichen Schweizeralpen kennen wir sie, an der Hauptkette der Rawyl- und Sanetschpässe, an der Schwalmeren und Hunnenfluh, an den Brienzergräthen und dem Giswylerstock, so wie an den Kalkeinkeilungen der Gneisgebirge; in den östlichen, an mehreren Kuhfirsten, am Mürtschenstock, und an den Gebirgen von Weisstannen.

Am Lüpasse, der von Scharl nach dem Münsterthale führt, sieht man eine ganz isolirte, kaum 100 F. hohe Kalkkuppe, auf einer flachen Pyramide von Gneis aufsitzen, und auch in dieser kleinen Kuppe sind die Kalkschichten knieförmig umgebogen, so dass die Höhe der Kuppe die doppelte der Schichtenfolge ist. — Keine Thatsache ist wohl besser geeignet, die alle Vorstellung übertreffenden Umwälzungen, die das alpinische Sedimentgebirge betroffen haben müssen, über jeden Zweifel zu erheben; denn kaum lassen diese Umbiegungen anders sich erklären, als durch einen ungeheuren Druck von Unten, durch den die Kalkdecke aufgebrochen und rückwärts übergestürzt worden sein muss, und da, mit Ausnahme der Einkleidungen im Berner-Oberland, die umgebogenen Lagermassen von keinen pyrogenen Gesteinen bedeckt werden, so kann dieser Druck nur dem Ausbruch von Dämpfen zugeschrieben werden. Dieser Ausbruch muss in derjenigen Gegend statt gefunden haben, welcher die Convexität des Knies zugekehrt ist, und, in Betreff unserer Tinzerhorngruppe, sehen wir uns daher wieder auf die Centralmasse der Selvrettagbirge, als den Herd jener Dampfbildung, gewiesen. Die Kniebildung erscheint, auf diese Weise betrachtet, in dem Ringe von Sedimentgesteinen, nur als eine verstärkte Wirkung derselben Kraft, welche, nach dem allgemeinen Gesetze von Saussure, die Schichten des Sedimentgebirges gegen das granitische Centralgebirge aufgerichtet hat, und, was zuerst uns, als eine Anomalie, in Verlegenheit setzte, zeigt sich jetzt als eine erwünschte Bestätigung früherer Folgerungen. Dennoch dürfen wir nicht verschweigen, dass diese, so befriedigend scheinende Darstellung nicht gegen alle Einwürfe gesichert steht. Obgleich die Mehrzahl der Kniebildungen in den Alpen allerdings ihre convexe Seite den nächsten Centralmassen zukehren, wie unter anderen die Keile im Berner-Oberland, die Hunnenfluh, der Mürtschenstock, die Kuhfirsten, so finden wir doch auch andere, bei welchen das Gegentheil statt findet, z. B. diejenige, der Brienergräthe und des Giswylerstockes. Und sollten auch, was wir wohl glauben, diese Ausnahmen, bei genauerer Untersuchung, der Regel sich unterordnen und sie bekräftigen, so sehen wir doch, im zunächst vorliegenden Falle, uns von einer anderen Seite

er bedrängt. Es wird nämlich, unter der Voraussetzung, dass die höheren, gegen SW aufgerichteten Schichten unserer Gruppe übergekippte seien, schwer, sich von den Lagerungsverhältnissen auf der Seite von Oberhalbstein, von der Auflagerung nämlich des Kalkes auf den Flysch, Rechenschaft zu geben. Man findet sich beinahe zur Annahme einer neuen, muldenartigen Umbiegung im unteren Schenkel des Knie's genöthigt, wenn, sowohl die rothen Sandsteine auf der Ostseite des Gebirges, als der Flysch auf der Westseite die Kalkmasse unterteufen sollen; oder, man muss auch den Flysch der mittleren Gehänge oberhalb Savognin für übergekippt und ursprünglich dem Kalk aufgesetzt ansehen, so dass die wahre Grundlage, der untere Schenkel des Knie's, in den Dolomittfelsen des Steins, unterhalb Burwein, gesucht werden müsste.

---

Ein steiler Waldpfad führte uns von *Conters* aufwärts nach den Weiden, die sich, oberhalb der Schlucht des Steins, um das Nordende der höchsten Kalk- und Dolomittfelsen herumziehen. Schon im Walde deutete die grosse Menge von rothen und grünen *Galestro*trümmern auf mächtige, in der Höhe sich durchziehende Felsen dieses Gesteins. Anstehend zeigte sich nur gewöhnlicher *Flysch*, Kalk- und Mergelschiefer, abwechselnd mit Flyschsandstein, gegen N 20 W fallend, während an den Kalkfelsen des Steins die Schichten gegen S 10 O fallen.

Nahe am oberen Ende des Waldes, oberhalb Burwein, erreichten wir jedoch die *Galestro*felsen selbst, unter denen hier auch in beträchtlicher Ausdehnung *Serpentin* hervorstösst. Noch klarer zeigten sich die Verhältnisse etwas nördlicher, an der Gebirgskante, welche die Zuflüsse des Oberhalbsteiner Rheins von denjenigen der Albula scheidet. Unmittelbar über dem dunkelgrauen *dolomitischen Kalk*, der hier, ohne deutliche Schichtung, vertical gegen die Schlucht des Steines abgestürzt ist, liegt, bei 20 F. mächtig, mit steilem NO Fallen, eine braungelbe, sehr durchlöchernte und zu grotesken Formen verwitterte *Rauchwacke*, verbunden mit braunem, zerreiblichem Dolomit, der eckigte Trümmer von grünem

Galestroschiefer, und auch Stücke und Theilchen einer weissen und hellgrauen pulverförmigen Substanz einschliesst. Die flächeren Parteen der Felsen sind mit tiefem Dolomitsand bedeckt. Mit etwas geringerer Mächtigkeit liegt auf diesem Gestein ein fester, hellgrauer *dolomitischer Kalk*, von vielen mikroskopischen Rhomboederflächen stark schimmernd, durchzogen von einer Menge weisser Spathtrümmchen, ziemlich stark aufbrausend. Und nun erst folgt, mit fast verticalem NO Fallen, der bunte *Galestro* wohl über 400 F. mächtig, ein in grossen Parteen verwachsenes Gemenge von rothem und grünem glänzendem Thonschiefer, rothem und grünem Jaspis und weissem Fettquarz. Serpentin fehlt hier. In der Höhe geht der *Galestro* in gut charakterisirten, glänzend grünen *Glimmerschiefer* über, und setzt als solcher ziemlich weit südwärts fort, wahrscheinlich als Keil in das Kalkgebirge eindringend; die Vegetation und Gebirgsschutt hindern das weitere Verfolgen desselben. Der *Galestro* bildet noch den nördlichsten Felsstock der Gebirgskante; gegen Mittag zu aber wird er überlagert von gewöhnlichem, grauem *Flysch*, der sich mit ihm, durch den dazwischen liegenden Glimmerschiefer oder Glimmerflysch, auf's Engste verbunden zeigt, und über dem *Flysch* erheben sich, als oberste Gebirgsbedeckung, Felsen von *dolomitischem Kalk*, hellgrau, dicht, von vielen Spathadern durchsetzt. Das Fallen der Schichten hat sich gegen die Höhe zu wieder mehr verflächt; in den obersten Felsen aber ist jede Regel in der Schichtenstellung verschwunden: vielfach gewundene, bald horizontale, bald senkrecht stehende Schichten, in rasch fortschreitender Zertrümmerung begriffen, bilden den höchsten Felskamm und steigen, in immer wilderen Gestalten sich erhebend, bis zu dem Piz Pròmascel empor.

Die Schutthalden dieses Kalkes quer durchschreitend, gelangten wir an die Ostseite des Gebirges, in den obersten Hintergrund der Tobel, die gegen Surava und Filisur auslaufen. Hier liegt auf dem vorigen Kalk ein grauer, sehr spröder *Kieselkalk*, wie Glas klingend, in dünnen Splittern durchscheinend. Härte 4,7, dicht, mit ausgezeichnet muschligem, im kleinen splitterigem Bruch, stark aufbrausend, mit Hinterlassung eines

beträchtlichen, die Form des Stückes behaltenden Rückstandes. Von den sehr zerspaltenen Felsen dieses Kieselkalkes stammen vorzugsweise die Trümmer und Blöcke her, die hier den obersten Gebirgsabhang bis an die Waldgrenze bedecken.

In südöstlicher Richtung vorwärts dringend, gelangten wir, nach Umgehung eines ersten Tobels, in einen felsigten Thalkessel, der sich nach dem P. Promascel hinaufzieht, mit sparsamen Weidplätzen, die als Schafalp benutzt werden. Das herrschende Gestein ist hier ein dunkel rauchgrauer *Kalk*, deutschem Muschelkalk ähnlich, dicht oder feinschuppig, mit Zwischenlagern von grauem Flyschschiefer. In solchem Kalk würde das Vorkommen organischer Ueberreste nicht auffallen; und wirklich fanden wir auch, auf der rechten Seite des Kessels, am Abfall des schmalen Ausläufers, der ihn von einem südlicheren Tobel trennt, Trümmer der in der Nähe eingestürzten Schichten, die fast nur aus einem Aggregat von Petrefacten bestehen. Die Mehrzahl derselben sind kleine Bivalven, *Modiolen* und *Astarten* ähnlich, aber so enge unter sich und mit dem Stein verwachsen, dass es uns nicht gelang, ein deutlich charakterisirtes Exemplar herauszuschlagen. Mit ihnen fand sich auch ein *Belemnit*.

Auch das nächste, immer in Kalk eingeschnittene Tobel wurde quer durchwandert, und mit beträchtlicher Anstrengung gelangten wir über einen dritten, ziemlich hohen und nach beiden Seiten steil abfallenden Ausläufer in einen neuen Felskessel, aus dem wir hoffen durften, nach Unten hin, einen Ausweg nach Filisur zu finden. Der Hintergrund dieses weiten Tobels steigt gegen einen Sattel an, der den P. Promascel mit dem Tinzerhorn verbindet, und erhebt sich beinahe bis zur Höhe dieses, auf der Westseite schroff abgestürzten Felskammes. Schutthalden und Schneeflächen bedecken, ohne Unterbrechung, die tieferen Gehänge der beiden Felsstöcke. Nachdem wir, ungefähr eine halbe Stunde weit, meist durch Wald, die rechte Seite des Tobels auswärts verfolgt hatten, ohne stark zu fallen, fanden wir, nahe am vorderen Ende desselben, wieder anstehenden Fels, theils dünngeschichteten *Kalk*, theils schwärzlich grauen *Dolomit*, theils gelbe und röthliche *Rauchwacke*. Die Höhe über der

Albula mag hier immer noch bei 3000 F. betragen. Von Alveneu aus sieht man deutlich das Lager von hochgelber Rauchwacke in der Höhe der vorderen Abstürze durch, ungefähr horizontal, bis gegen Surava fortstreichen, und es lässt sich annehmen, dass dasselbe mit der Rauchwacke oberhalb Burwein unmittelbar zusammenhänge.

Ein äusserst jäher Felsweg, zum Schleifen des Holzes nach der Eisenhütte von Bellaluna angelegt, führte uns auf eine schmale, von Wald entblösste Terrasse. Wir wunderten uns, dieselbe mit Blöcken von *rothem Conglomerat*, dem Gestein des Kummerbergs und der Alpen von Wiesen, ganz bedeckt zu finden. So hoch hatten wir diese Steinart, die bei Bellaluna beide Thalwände des Albulatobels bildet, nicht erwartet. Auch zeigten die wenigen anstehenden Felsen nur dunklen, dichten *Kalkstein* und *dolomitischen Kalk*, in verticalen, oder steil, bald nördlich, bald südlich fallenden Schichten; und der Stammort jener Blöcke muss weiter südwärts liegen.

Von Bellaluna aus stiegen wir an der linken Thalseite ungefähr 1500 F. hoch aufwärts nach einem verlassenen Stollen, der auf Eisenglanzerze war getrieben worden. Die Steinart, vom Thalgrunde an, ist *rother Sandstein*, deutlich geschichtet, in N66O streichend mit NW Fallen. Der *Eisenglanz* und *Eisenglimmer* finden sich, wie am Rothenberg und in Ferrera, auf den Schichtungs- und Kluftflächen, theils als leichter Anflug, theils als dickerer Ueberzug, theils in zolldicken Zwischenlagern. Die letzteren haben einen Versuchbau veranlasst, dem jedoch einstweilen, wegen Ueberfluss an Erzen aus anderen Gegenden, nicht weitere Folge gegeben wird. Auch am rechten Ufer der Albula zeigen sich, eine Viertelstunde oberhalb Bellaluna, ähnliche Einmengungen von Eisenglimmer im grünen Sandstein.

Einige hundert Fuss über jenem Stolleneingang wird der rothe Sandstein überlagert von *Rauchwacke* und *Kalk*. Gegen den Ausgang des Thaies senkt sich die Grenze zwischen Sandstein und Kalk immer tiefer, und, in der Nähe von Filisur erreicht sie den Thalgrund und schneidet den Sandstein ganz ab.

Auch gegen Mittag wird der Sandstein auf beiden Seiten des Thales von Kalk begrenzt, dessen Schichten vertical neben ihm niedersetzen. Hier verengt sich nun das vorher schon schluchtähnliche Thal zu einer Spalte, durch welche die Albula in kleinen Katarakten schäumend herunterstürzt; die Strasse muss sich in der Höhe Raum suchen, und hat auch hier noch in den Kalkfels eingesprengt werden müssen. Wie das Urserenthal beim Austritt aus den Schöllenen, liegt, am Ende dieses Felsweges, die schöne Thallfläche von Bergün vor uns ausgebreitet.

Die Schichtung des *Kalks* ist hier sehr verworren. Unten am Stein haben wir sie vertical gesehen; in der Höhe, wo man den Felspass verlässt, ist sie horizontal, und der Kalk selbst ist so wenig spröde, so frei von krystallinischer Tendenz, in so deutliche, wenig mächtige Schichten abgesondert, dass man sich in grosser Entfernung von allen umwandelnden und störenden Verhältnissen glauben möchte.

Derselbe Wechsel in der Fallrichtung und dem mineralogischen Charakter des Kalkes zeigt sich auch oberhalb Bergün, wo die Albula, und an ihrer Seite die Strasse, die Hauptmasse des Kalkgebirges durchschneiden. Es zeigt sich zuerst ein schwärzlich grauer, stänglicht zerfallender *Kalkschiefer*, der mit *dolomitischem Kalk* wechselt, in S 730 streichend und S fallend, wahrscheinlich dem unteren Schenkel des Ragnutz angehörend. Weiterhin folgt schwarzer, feinkörniger *Dolomit*, sehr zerspalten und bei jedem Schlag des Hammers sich zerstückelnd. Diese schwarzen Dolomite und dolomitischen Kalksteine bilden die Hauptmasse der Kette. — Nahe am Austritt gegen die Maiensässe zeigen sich Einlagerungen von rothem und grünem *Thonschiefer*, die dünne Straten von weissem und farbigem krystallinischem Kalk umschliessen, vertical, oder steil N fallend; ein *Galestro*, der ohne Zweifel mit demjenigen des Rothenbergpasses in Verbindung steht. Aber bald wird der dunkle Kalk und Dolomit wieder allein herrschend, bis man das Profil der grossen Kalkkette ganz verlässt, und in das Längenthal des Weissensteins eintritt.

---

*Schlussbemerkungen.*

Vom Septimer und Silsersee bis an die Albula, bei Tiefenkasten und Alvaschein, haben wir, fast ohne Unterbrechung, den *Serpentin*, die *grünen Schiefer* und *Galestrogesteine* verfolgen können. In den Umgebungen des Septimer und von Stalla, wo der Thalboden sich bis auf 6000 F. erhebt und die ihn einschliessenden Gebirgsreihen näher zusammentreten, finden wir den Serpentin im Thalgrunde selbst anstehend und sehen ihn deutlich von der einen Thalseite in die andere übersetzen. Aber schon unterhalb Stalla und immer auffallender, je mehr das Thal sich senkt, vertheilt er sich auf zwei Linien, die beiden Thalabhängen folgen, und selbst bis auf den obersten Kamm ansteigen, nirgends aber, weit über diesen hinaus, an die jenseitigen Abhänge vordringen; während im tieferen Thalgrunde nur gewöhnlicher Flysch das herrschende Gestein ist. Es liegen indess die Serpentinfelsen bei Ziteil und am Prömascel immer noch unter denjenigen am Longhin, oder auf Giuils; nicht der Serpentin hat sich erhoben, obgleich das SO Fallen im unteren Oberhalbstein allerdings eine geringe Hebung erklären kann, es ist aber vorzüglich der Thalboden gesunken, und, wenn man die geringe Festigkeit der Flyschbildung, der grünen Schiefer und des Serpentin's selbst berücksichtigt, so wird man kaum uns Unrecht geben, wenn wir der Erosion einen sehr bedeutenden Antheil an dieser Tieferlegung des Thalbodens zuschreiben. Die auf beiden Seiten fortstreichenden Serpentine halten wir für die Ueberreste einer oder mehrerer Serpentinlagen, die, vor der heutigen Thalbildung, sich über ganz Oberhalbstein und Stalla forterstreckten. Die Seitenketten haben wahrscheinlich, wie wir es schon bei der Fallergruppe bemerkten, dieser Erosion nur widerstanden, weil festere Gesteine von benachbarten Gebirgsmassen her in sie eingreifen und ihnen einen haltbaren Kern geben; es sind nicht Hebungs-, sondern Erosionsketten.

Aber auch, wenn wir die Serpentine beider Thalseiten uns zu Einer Masse vereinigt denken, bleibt dennoch die *lineare Erstreckung* dieser Steinart, und das Zusammenfallen dieser Linie mit der Richtung des



Thales nicht weniger merkwürdig. Welcher Art auch der Process gewesen sei, der die Umwandlung der Flyschgesteine in grünen Schiefer und Gabbro und die Entstehung von Serpentin und Gabbro, vielleicht auch des Juliergranits zur Folge gehabt hat; auf die Gesteins- und Terrainbeschaffenheit von ganz Mittel-Bündten hat er jedenfalls einen sehr grossartigen Einfluss ausgeübt. — Dass die allgemeine *Anschwellung des Bodens* in dieser Gegend, so verschieden von den, mit tiefen Thälern abwechselnden Hebungsketten, die im Gefolge der Centralmassen auftreten, jenem nicht alpinischen Process beigemessen werden könne, wird man kaum bezweifeln. — Auch die *Eisensublimationen*, die, auf beiden Seiten der Serpentinzone, diese begleiten, in Schams und Ferrera auf der Westseite, bei Bellaluna, auf Rothenberg und Tischalp auf der Ostseite, stehen offenbar mit der Serpentinbildung in nahem Verhältnisse. — Es ist ferner kaum Zufall, dass an so vielen Stellen mit dem Serpentin zugleich *Gyps* hervortritt; so in Nandrò, auf dem Kamm von Schmoras und Nezza, bei Tiefenkasten, auch ausserhalb unseres Gebietes, bei Parpan und am Casanna bei Klosters, vielleicht auch in Val d'Agnei und bei St. Moritz, sofern das Saluvergestein, wie wir glauben, von dem grünen Schiefer nicht wesentlich verschieden ist. Wer erinnert sich nicht hiebei der ähnlichen Verwandtschaft, die sich in den Pyrenäen zwischen dem Gypse und den Ophitmassen äussert?

Eine noch allgemeinere Bedeutung erhält unsere Serpentinzone, wenn wir auf die angrenzenden, westlichen Gebirge Rücksicht nehmen. Die Richtung der Zone fällt zusammen mit der Streichungslinie des *Adulasyntemes*, und wo, südlich und nördlich, am Silsersee und bei Tiefenkasten, die Serpentine sich verlieren, da sehen wir auch im Westen, bei Chiavenna und in Savien, die alpinische Schichtenstellung wieder die Oberhand gewinnen. Auf die Stratification der Oberhalbsteiner Masse selbst, die eine allgemeine Aufblähung erlitt, hat die Serpentinruption keinen merklichen Einfluss ausüben können; nur ausserhalb derselben dürfen wir Veränderungen in der inneren Structur zu finden erwarten. Und so verhält es sich wirklich. Das den Alpen sonst so fremde NO und

O Fallen erhält allein durch die Verbindung mit dem Auftreten abnormer Gesteine auf der Linie, der das Fallen sich zuwendet, einige Aufklärung; sei es, dass, nach H. v. Buch's Deutung gleicher Verhältnisse in Südtirol, die ursprünglich weit höher aufgeblähte Masse im Rückzuge die anstossenden Schichtensysteme mit in die Tiefe gezogen habe; oder dass überhaupt das Auftreiben und die starke Massenbewegung des Bodens am Rande desselben von Zerspaltungen und Einsenkungen begleitet worden sei. Mit diesem Anknüpfen der westlichen Structurverhältnisse an das Auftreten der Serpentine in Oberhalbstein stehen auch unsere früher versuchten Altersbestimmungen beider Phänomene nicht im Widerspruch. In der Einleitung haben wir die Schichtenstellung des Adulasyntektes der Thal- und Kettenbildung des Alpensyntektes vorangehen lassen; in der Beschreibung der Gravesalvasgruppe glaubten wir die Serpentinruption für älter erkennen zu sollen, als die Hebung der anstossenden Centralmassen. Beide Resultate gewinnen demnach verstärktes Gewicht, wenn neue Betrachtungen uns nun veranlassen, die Schichtenstellung der Adulaketten mit der Serpentinbildung in engere Verbindung zu setzen.

Das höhere Alter der Serpentine von Oberhalbstein erklärt uns vielleicht auch, warum in diesem Theile von Bündten die Sedimentbildungen nicht, wie man es im Kern der Alpen erwarten sollte, zu Gneisen und Gneisgraniten umgewandelt worden sind, warum die krystallinischen Centralmassen hier so weit auseinander liegen. Man muss glauben, die subterranean Thätigkeiten, welche das Aufsteigen der Centralmassen zur Folge gehabt haben, seien in der Gegend von Oberhalbstein auf Hindernisse gestossen, die ihrem Vordringen und ihrer Einwirkung auf die Steinarten jener Gegend eine Grenze gesetzt haben; und, welche Verhältnisse sind wohl eher geeignet, einen solchen Widerstand zu leisten, als ältere plutonische Massen, deren Hauptrichtung die der neueren Ausbrüche senkrecht durchschneidet, und deren Bildung die Urstoffe, von denen vielleicht alle diese Umwandlungen und Terrainveränderungen ausgehen, bereits früher erschöpft haben mag?

Obgleich die Hauptmasse der Serpentine sich deutlich auf die Gegend zwischen Maloja und Tiefenkasten beschränkt zeigt, so ist es doch nicht ohne Interesse, ihrer ferneren *Verbreitung gegen Mitternacht und Mittag*, auch ausserhalb der Grenzen unseres Gebietes, nachzuforschen. Die Resultate, zu denen wir durch diese Untersuchung gelangt sind, zeigen indess so viel Schwankendes und lassen der Willkühr einen so beträchtlichen Spielraum, dass wir sie beinahe eher zur Warnung vor diesem gefährlichen Wege der geologischen Speculation, als um unter die Zahl neu gewonnener Thatsachen aufgenommen zu werden, anführen wollen.

In der nördlich anstossenden *Gebirgsmasse von Davos* scheint die Zone des Serpentin's plötzlich eine ganz neue Richtung einzuschlagen, indem sie, von Parpan bis Klosters, der Nordgrenze des Kalkgebirges und, mit ihr, dem Hauptstreichen der Alpenkette folgt. Weiter nördlich zeigt sich keine Spur mehr dieser Gesteine. Nebst der veränderten Richtung bieten aber die Davoser Serpentine noch andere wesentliche Differenzen gegen diejenigen von Oberhalbstein dar. Die grünen Schiefer fehlen in ihrer Umgebung ganz, und, statt der Gabbro, haben sich in ihrem Gefolge Hornblendgesteine, Diorite, Voriolithe und Mandelsteine entwickelt, die in Oberhalbstein dagegen sich gar nicht, oder nur sehr beschränkt, zeigen. Dieser abweichende Charakter lässt uns einstweilen bezweifeln, dass die Davoser Serpentine wirklich als die Fortsetzung der Oberhalbsteiner zu betrachten seien. Sollte man die entgegengesetzte Ansicht für die wahrscheinlichere halten, und es naturwidrig finden, zwei so nahe liegende Serpentinbildungen zu trennen, so würde sich allerdings aus dieser Biegung der Zone um die Selvrettamasse herum, und der engen Verbindung des Serpentin's mit dem Sedimentringe, der jene Masse umschliesst, ein gewichtiger Einwurf gegen unsere Altersbestimmungen und die versuchte Trennung der Serpentinruption von dem Aufsteigen der Centralmassen ergeben.

Andererseits zeigt sich die natürliche Fortsetzung des Thalgrundes von Oberhalbstein in dem Hochthale der *Lenzerhaide*, und man möchte,

wenn man von einem geeigneten Standpunkte aus die Gegend überschaut, allerdings glauben, dass, vor dem Durchbruch des Schyns durch die Albula, der Oberhalbsteiner Rhein in gerader Richtung durch jenes Thal dem Rheinthale von Chur und Meyenfeld zugeströmt sei. Geognostische Anhaltspunkte, aus denen ein Einfluss der in Oberhalbstein thätig gewesenen Agentien auf den Boden von Lenz und Parpan gefolgert werden könnte, finden sich jedoch zu wenige, als dass wir berechtigt wären, die Uebereinstimmung in der Richtung beider Thäler für mehr, als eine Wirkung der Erosion, zu halten.

Wir können endlich, indem wir vorzugsweise der früheren Richtung der Serpentinlinie folgen, die Verlängerung derselben auch durch *Domleschg* ziehen, indem die centrale Axe der Serpentinzone, von *Gravesalvas* mitten zwischen Tiefenkasten und Ziteil durch geführt, allerdings durch dieses westliche Thal streicht. Wirklich finden wir auch im *Rotelser-Bühel* die grünen Schiefer wieder, identisch mit den Gesteinen von *Rofna* und *Stalla*. Und, wenn wir es wagen, die Linie noch weiter fortzuziehen, so treffen wir, vielleicht zufällig, auf die Gegend des *Spitzmeilen* und des *Murgthales*, in welcher ein Eruptionsheerd anomaler Bildungen nicht zu verkennen ist \*). Weniger Gewicht legen wir auf das Zusammentreffen der Linie mit dem Spaltenthal des *Toggenburg's* und mit den Phonolithbildungen des *Hegau's*.

Gegen Süden zu haben wir früher schon der Spuren von Serpentin am *Muretpasse* und im *Malenkerthale* erwähnt. In diesem tritt, zwischen *Chiareggio* und *Torre*, der Serpentin in grosser Mächtigkeit auf. Die Gebirge zu beiden Seiten des *Lanternathales* und die *M. della Disgrazia* bestehen grösstentheils aus diesem Gestein. Aber der Charakter der Bildung ist hier, mitten im Gebiete des Glimmerschiefers, wieder bedeutend von demjenigen des Oberhalbsteiner Serpentin's verschieden. Häufig nähert sich das Gestein dem Chloritschiefer, oder dem Lavezstein, und geht auch wirklich in diese Steinarten über, oder wechselt damit;

\*) S. Studer, in Leonh. Zeitschr. 1827.

grössere Massen von reinem Serpentin zeigen schiefrige Absonderungen, als wahre Serpentin-schiefer; es ist endlich das Streichen der Serpentinmassen und der sie begleitenden weissen Marmorlager, so wie das des Glimmerschiefers, wieder parallel dem Hauptstreichen der Alpen, und der Serpentin erscheint überhaupt mehr als eine normal dem Glimmerschiefer untergeordnete und nicht als eine unabhängig auftretende, massig das Sedimentgebirge durchbrechende Steinart.

Merkwürdig genug trifft die Verlängerung der Linie jenseits der Lombardischen Ebene ziemlich nahe zusammen mit den Serpentinmassen der *Par-mesanischen Apenninen*, von *Spezzia*, den *Apuanischen Alpen* und von *Elba*. Wie wir uns, theils durch eigene Ansicht, theils aus den Beschreibungen der Herren *Pareto* und *Savi* überzeugt haben, zeigen in allen diesen Gegenden die Verhältnisse des Serpentin's zu dem Macigno oder Flysch und zu den umgewandelten, oder Galestrogesteinen eine so auffallende Analogie mit denjenigen der Bündtnergebirge, dass eine Felsarten-sammlung aus den italienischen Gegenden sich von einer aus Oberhalbstein kaum unterscheiden liesse, und eine Beschreibung jener südlichen Verhältnisse mit geringer Veränderung auf die Verhältnisse in Graubünden übertragen werden könnte.

---

## DIE GEBIRGSMASSE SELVRETTA.

*Selvretta* heisst, nach *Ul. v. Salis* \*), der hohe, von einem mehrere Stunden langen Gletscher bedeckte Gebirgsrücken, der den Hintergrund des Prättigau's vom Engadin scheidet, und wir erlauben uns, die Benennung auszudehnen, auf die ganze Gebirgsmasse, deren Gestaltung und

\*) S. N. Bündtn. Sammler VI. p. 343.

Gesteinsverhältnisse sich von der Centralmasse abhängig zeigen, die in jenem Rücken und den ihm benachbarten Gipfeln ihre grösste Erhebung erreicht. Oestlich von dem Selvrettagletscher folgt das ausgedehnte Alpenrevier des *Fermunt*, das in topographischer und botanischer Beziehung durch die Reise von *Pol* \*) bekannt geworden ist. Zu gleichem Zwecke ist vor einigen Jahren das abgelegene Thal *Samnaun* von H. Prof. *Heer* untersucht worden. In geologischer Hinsicht sind uns die Gebirge, die vom Flüelapasse sich ostwärts gegen *Landeck* zu erstrecken, so viel als ganz unbekannt.

Es muss in dieser Gebirgsmasse das innere krystallinische Fächersystem von dem äusseren Ringe von Sedimentgesteinen unterschieden werden, der aus *Montafun*, durch *Prættigau* und *Davos*, bis an die Vereinigung des *Landwassers* mit der *Albula* fortstreicht, hier in das Gebiet unserer Karte eintritt und bis in das *Engadin*, dem Albulapasse folgend, quer durch dasselbe sich durchzieht, von *Scanfs* aus dann über *Casanna* nach *Livigno* übersetzt, und, über *Forno* und *Scharl*, durch *Unterengadin*, bis unterhalb *Finstermünz* verfolgt worden ist. So wie von der Centralmasse können wir auch von dem Sedimentringe nur den innerhalb unserer Karte fallenden Theil berücksichtigen. Den ersteren werden wir als *Gruppe der Scaletta*, den letzteren als *Gruppe der Val Tuors* beschreiben. Die Grenze zwischen beiden Gruppen ziehen wir, mehr die geologischen, als die Formverhältnisse berücksichtigend, vom Ausgang des *Sulzammathales*, hoch über *Scanfs* und *Zutz* weg, über den *Eschiapass* nach den *Maiensässen von Tuors*, von da durch *Ravesch* nach *Sertyg*, und, das *Sertygerthal* hinaus, an das *Landwasser*.

\*) Aelt. Sammler, III. p. 33.

## 1. GRUPPE DER VAL TUORS.

Obgleich die Albulastrasse, welche die Selvrettamasse, und also auch die Gruppe von Tuors, von der Masse von Oberhalbstein scheidet, keineswegs genau die westliche Grenze des Sedimentwalles bezeichnet, wie schon die äussere Form des Thales lehrt, das alle Charaktere eines wahren Querthales trägt; so ist doch wieder die Gebirgsgestaltung zu beiden Seiten dieses Querthales eine so wesentlich verschiedene, dass unsere Trennung der beiden Gebirgsmassen nach dieser Linie durch die Natur hinreichend gerechtfertigt wird. Ja es dürfte schwer fallen, im alpinischen Hochgebirge eine Gegend aufzufinden, in welcher deutlicher, als in dieser hier, die Nothwendigkeit hervorträte, das Alpensystem in gesonderte Massen abzutheilen, wenn eine klare Vorstellung von der Structur dieses verwickelten Gebirgszuges erzielt werden soll. Während nämlich, auf der Westseite des Albulathales, der Hauptkamm des Gebirges dem Thale selbst, und mit ihm dem Adulasysteme, parallel läuft, und auf einer breiten, wenig eingeschnittenen Plateaumasse zu so bedeutender Höhe sich erhebt, dass die Bergüner Thalschaft fast ganz vom Verkehr mit Oberhalbstein abgeschnitten wird; tritt dagegen, auf der Ostseite, eine Zertheilung in mehrere verhältnissmässig schmale Ketten ein, die, senkrecht auf die vorige Richtung, von West noch Ost, im System der Alpen fortstreichen und deutlich ausgebildete Längenthäler einschliessen. Und noch viel greller tritt der Unterschied zwischen den Gebirgen beider Seiten hervor, wenn wir auch die geologische Beschaffenheit berücksichtigen; denn alle Verhältnisse der Lagerung und der Schichtenstellung sind verschieden, die herrschenden Steinarten sind andere, und ihre Vertheilung folgt ganz neuen Gesetzen. Nur im südlichsten Theile der vorigen Gebirgsmasse, in dem Beversthale und seiner Umgebung, erkennt man noch das Gesetz der östlichen Bodengestaltung, und die Kette, die das Beversthal vom Albulapasse scheidet, könnte auch wirklich dem System von Parallelketten der Gruppe von Tuors beigeordnet werden, wenn nicht

ihre Felsart die Trennung von einer Sedimentgruppe nothwendig verlangte und sie in weit nähere Verbindung mit den Gebirgen des Juliers brächte.

Das Tuorsthal theilt die Gruppe in zwei ziemlich gleiche und symmetrisch gebildete Hälften. Zwei Ketten von bedeutender Länge bilden, in Süden und Norden, die äussere Einfassung der Gruppe; die erste, die wir *Kette des Albulahorns* nennen wollen, von dem Engpass oberhalb Bergün bis zu der Kapelle am Ausgang des Sulsannathales; die andere, oder die *Kette des Silberbergs*, von Filisur bis Sertyg. Zwei kleinere, innere Ketten umschliessen das Thal von Tuors; die kurze *Tischalpkette* auf der Mittagseite; die durch ein Quertobel zertheilte Kette des *Latschberges* und der *Raveschalp* auf der Mitternachtseite. Beide Kettenpaare endlich entfernen sich immer mehr von einander, je weiter sie vom Albulathale aus gegen Ost fortsetzen, ganz so, als ob sie von da her durch einen Keil wären aus einander getrieben worden; und wirklich glaubt man diesen Keil in der Spitze der Centralmasse zu erkennen, die zwischen den beiden inneren Ketten bis zu den Maiensässen von Tuors vordringt und sich sogar noch mit der Tischalpkette zu vereinigen scheint. In wiefern die Structur und die Gesteinsverhältnisse der Ketten diese Ansicht rechtfertigen, wird sich aus einer näheren Untersuchung derselben ergeben.

#### *Die zwei südlichen Ketten.*

Die Ansicht Tab. IV, fig. 4 zeigt diese zwei Ketten von der Nordseite.

Die *Kette des Albulahorns* kann, ungeacht der Trennung, die wir zweckmässig fanden festzuhalten, nur als eine östliche Fortsetzung der Ragnutzmasse betrachtet werden. Wie diese besteht sie aus dunklem *Kalk*, *Dolomit* und *Flysch*. Allein die auffallende Schichtenbiegung des Ragnutz und die Verhältnisse des Kalks zum Flysch, die, besonders auf der Westseite der Tinzerhorngruppe, eine Auflagerung des ersten Gesteins auf das letztere zu bestätigen scheinen, finden sich auf dem rechten Ufer der Albula nicht wieder. Die Kette des Albulahorns ist auf beiden Seiten



mauerähnlich schroff, und ihre Schichten stehen vertical, oder fallen sehr steil gegen N 10 O. Nur am Passe des Rothenbergs zeigt sich auch in der Ragnutzmasse diese verticale Schichtenstellung; so wie dagegen, längs dem Albulapasse aufwärts bis Weissenstein, die Vorkette von grauem Flysch fortsetzt, ebenfalls mit verticaler Schichtung, die, bei den Bergüner Maiensässen und auf Città, den Kalk vom Granit trennt.

Der Flysch scheint jedoch in der Albulahornkette zum Kalk nicht nur in dem einfachen Verhältniss der Anlagerung zu stehen. Wie in der Fallergruppe und in anderen Gegenden der Alpen, ist er die allgemeine Grundmasse der Kette, und der Kalk oder Dolomit ist, bald so viel als ganz unterdrückt, bald schwillt er an zu mächtigen Stöcken, die allen Flysch abwerfen, und, in nackten, schroffen Felsmassen, die grössten Erhebungen bilden. So, in unserer Kette, das *Albulahorn*, oberhalb Weissenstein, mit steilem, von Vegetation entblösstem Absturz, aus dem, als ein bereits starker Bach, die Quelle der Albula entspringt und einen kleinen Wasserfall bildet. Auf dem Panorama von Schaffner sieht man das Albulahorn, oberhalb der Nummern 27—29, sich noch über die granitische Kette erheben, die den Albulapass südlich begrenzt, so dass es diese jedenfalls an Höhe übertrifft. Bald aber gewinnt, in der östlichen Fortsetzung der Kette, der Flysch wieder das Uebergewicht, und, immer mehr sich erniedrigend und an Mächtigkeit verlierend, als ein Zug rundlicher Flysch- und Rauchwackehügel, begleitet die Kette den östlichen Abfall des Passes, und scheint sich, gegen Madulein zu, ganz zu verlieren. Man findet jedoch, östlich vom Eschiathale, ihre Fortsetzung in der breiten, mit Weide bedeckten Terrasse, die, von Madulein bis Scanfs, dem Thalgrunde die Ansicht der hinteren krystallinischen Kette verbirgt. Zwischen Scanfs und Sulsanna zeigt sie noch einmal einen felsigten Charakter, indem der Kalk wieder vorherrschend wird, und, auf dem rechten Ufer des Inn, wächst sie nun schnell an Mächtigkeit und Höhe, und erhält in den Umgebungen von Livigno und Fræle eine Entwicklung, gegen welche selbst die bedeutende Masse der Tinzerhorngruppe weit zurückbleibt.

Die Contactverhältnisse des Flysches und Kalkes mit dem südlich anstossenden Granit sind leider auf der ganzen Linie, von den Bergüner Maisensässen bis Ponte, durch die Thalausfüllung verdeckt. Beide Bildungen scheinen vertical neben einander niederzusetzen. — Ueber eine hohe Stufe von Flysch und Kalk steigt man, aus dem flachen Weidgrunde der Maisensäse (5430') nach dem Weissenstein und dem dabei liegenden Alpsee (6320'). Die beiden Ketten treten hier bereits nahe genug zusammen, dass die Stelle des Contacts von Kalk und Granit wenig ungewiss sein kann. Wo man diese Grenze vermuthen darf, an der östlichen, circusartigen Einfassung des See's, ist aber in grosser Mächtigkeit *Gyps* anstehend, hellweiss, feinkörnig, zum Theil ockergelb punctirt, in steil N fallende Schichten abgesondert. Nothwendig muss dieser Gyps, wenn nicht auf der Grenze selbst, doch derselben sehr nahe liegen. Auf der oberen Fläche, deren westlichen Absturz die Gypsmasse bildet, wird das Gestein wieder verdeckt durch die Schutt- und Trümmermassen, die von beiden Seiten, mit stets sich erneuernden Halden, im Thalboden zusammenstossen, so dass die Strasse nur wenig sicher sich zwischen den Haufwerken von Kalk- und Granitblöcken durchzieht. Ueber eine letzte Stufe erreicht man die oberste Höhe des Passes (7200'), eine lange anhaltende, mit reicher Weide bedeckte Hochfläche, die weniger noch, als selbst die Julierhöhe, an andere, wenn auch niedrigere Alpenpässe erinnert. Bevor man noch anfängt, auf der Ostseite niederzusteigen, erscheint im Thalboden *Rauchwacke*, in sehr beträchtlicher Ausdehnung, und setzt bald auch auf die linke Thalseite über. Sie zeichnet sich zum Theil aus durch glänzend talkige Ueberzüge aller Zellen und Poren, zum Theil sind die Höhlungen auch ausgefüllt mit schuppigem Talk. Auf ihr liegt, wie sie mit steilem N Fallen, theils blauer, dichter, theils weisser, körniger Dolomit. Tiefer abwärts bilden diese Steinarten, besonders aber die Rauchwacke, sehr auffallende Uebergänge in einen *quarzitartigen Talkschiefer*, indem der Kalk, oder Dolomit, allmählig durch Quarz verdrängt wird, und mit wenigen Schritten kann man aus der Rauchwacke in vollkommen ausgebildeten *Talkschiefer* gelangen. Es hält dieses Ge-

stein, am Ostabhange des Passes, längere Zeit an, zum Theil in *Chlorit-schiefer* übergehend, auch wohl Adern und Nester von salinischem Dolomit einschliessend; und es wäre nicht unmöglich, dass der *Gneis*, der nun, auf der rechten Seite des Abhanges, den Granit verdrängt, sich enge demselben verbunden zeigte.

Eben so steil und sogar felsigter, als die Südseite, zeigt sich die Nordseite der Kette, im Thale der *Tischalp*. Besonders in der Gegend des Albulahorns, von dem hier ein kleiner Gletscher sich hinabsenkt, bildet sie hohe und schroffe Felswände, welche den Hintergrund von *Plazbi* kesselartig umschliessen. Ueber steile Grashalden, dann über Fels-trümmer, sowohl von Kalk, als von Gneis, und einzelne Schneefelder stiegen wir von Plazbi auf den 8770 F. hohen *Eschiapass*, einer Angabe in Tuors vertrauend, dass man ohne Mühe über diese Einsattlung nach Madulein gelangen könne. Nachdem jedoch die Höhe erreicht war, sahen wir, nicht ohne Bestürzung, eine ununterbrochene Schnee- und Gletscherdecke von der einen Seite des östlichen Abhanges bis zur anderen und weit gegen das Eschiathal hinunter sich ausbreiten. Auf den unbekannten, in der Tiefe stark zerspaltenen Gletscher uns zu wagen, schien nicht rathsam, und schon dachten wir an Rückkehr nach Tuors, als eine nähere Prüfung erwies, dass der Gletscher an der Albulakette seinen Ursprung nehme, und daher auf der linken Seite, am Fuss des Piz Asca, nur Schneefelder zu vermuthen seien. Es war so, und leicht glitten wir über den Schnee bis auf die Trümmerhalden und Felsen, die, zwischen dem Gletscherrande und den Abstürzen des P. Asca, allein es möglich machen, in das ausge-dehnte Weidland des Eschiathales hinabzusteigen. Die Albulakette trägt hier bereits eine Flyschdecke, nur ein schwaches Kalkriff zeigt sich noch als letzter Ausläufer des Albulahorns und setzt, unter dem Gletscher durch und klippenweise aus demselben hervorragend, gegen die linke Thalseite fort. Doch tritt in grösserer Tiefe der Kalk noch einmal und in grösserer Mächtigkeit auf und bildet eine hohe Felswand, über die der Gletscherbach in einem Wasserfall herunterstürzt. Der untere Theil von Eschia ist ganz in Flysch eingeschnitten.

Die Zusammensetzung der kurzen *Tischalpkette* ist weniger einfach, als die der vorigen Kette, und es ist uns nur zum Theil gelungen, damit in's Klare zu kommen. Die Abhänge sind weniger steil, besonders gegen SW und S, wo vorzugsweise die Weiden der Alp liegen. Die tieferen Gehänge der W und N Seite sind meist dicht bewaldet, und schroff abfallend; doch finden sich auch hier noch mittlere Terrassen, die gute Weide tragen.

Immer von Kalkstein umgeben, erreicht man, in etwa  $2\frac{1}{2}$  Stunden, von Bergün aus das 7200 F. hoch liegende Huthaus der *Eisensteingruben* von *Tischalp*. Die Gruben selbst sind, etwas höher und durch einen Graben davon getrennt, im steilen mittäglichen Abfall der Tischalpkette angelegt; ebenfalls in Kalkstein, der herrschend hellgrau, und von vielen talkigen Ablösungen durchzogen ist. Er hat grosse Aehnlichkeit mit dem dolomitischen Kalk der Zwischenbildungen\*), mit dem er auch in Hinsicht seiner Lagerungsverhältnisse verglichen werden kann, da er, theils zunächst an Gneis angrenzt, theils durch einen sandsteinartigen *Quarzit*, eine *Arkose*, davon getrennt wird. Seine Schichten stehen so viel als vertical, mit schwacher Neigung zum Fallen nach N 20 W.

In diesem, meist sehr zertrümmerten Kalkstein findet sich der schönste *Eisenglimmer* und *Eisenglanz*, in einer zahllosen Menge der Schichtung paralleler Blätter und Lager, von  $\frac{1}{2}$  Linie bis, nach Behauptung des Steigers, 2—4 Fuss Mächtigkeit. Der Anbau wird erschwert durch das, bis in eine noch unbekannte Breite, zerstreute Vorkommen dieser meist dünnen Zwischenlager. Die geförderten Erze müssen durch mühsame Handarbeit vom ansitzenden Kalkstein getrennt werden. Auf Klüften enthält dieser eisenführende Kalk nicht selten *Arragonit*, zum Theil deutlich auskrystallisirt.

Von den Gruben stiegen wir dem Hintergrund des Thales zu, indem wir uns zugleich immer mehr dem obersten Gebirgskamm näherten. Es

\*) *Studer*, westl. Alpen, p. 169.

folgt, nördlich von dem Kalkstein und über ihm ausgehend, ein Streifen von *rothem Conglomerat*, und bald nachher findet man *Glimmerschiefer* und *Gneis*, der, mit ebenfalls verticaler Schichtenstellung, den oberen Rücken und den Abhang der Kette gegen Val Tuors bildet. Das Conglomerat schwillt in der Gegend des Sattels, der nach Plazbi führt, zu grosser Mächtigkeit an und bildet daselbst einen furchtbar zerrissenen Felskamm, so wie den schroffen Absturz des Gebirges gegen Plazbi bis zu den Kalk- und Flyschwänden der Albulakette. Seine Farbe ist hier meist grün, wie am Gestein unter Stuls, und die Structur neigt sich zum Schieferigen, so dass man oft einen talkigen Quarzitschiefer vor sich zu haben glaubt.

In diesem Schiefer findet man Spuren von einem alten, sehr beträchtlichen Bergbau, dessen Unternehmer und Zeitepoche unbekannt sind. Das Erz, auf dem er geführt wurde, ist ein grob- und feinspäthiger *Spath-eisenstein*, häufig von Quarzgängen durchzogen und Quarzdrusen enthaltend. Auch dieses Eisenerz scheint lagerweise und nicht als Gang vorzukommen. Etwas südlicher ist in den letzten Jahren ein Versuchbau auf *Rotheisenstein* und *Eisenglimmer* gemacht worden, mit welchen gelblicher Kalkspath und Quarz brechen, und, zahlreichen eisenfarbigen Streifen nach zu schliessen, scheint noch an vielen anderen Stellen das Gebirge hier sehr eisenhaltig zu sein.

Bei vollkommen klarem Himmel genossen wir auf dem oberen Rücken der Tischalpkette eine der grossartigsten, wildesten Aussichten, die jedoch, wie meist in Bündten, eher einen düsteren, schauerlichen, als erhebenden Eindruck machte. In keinem der nahen oder entfernten Thäler erkannte man menschliche Wohnungen, das ganze weit ausgebreitete Gebirgsland schien öde, von allen lebenden Wesen verlassen, auch kein Wassergeräusch unterbrach die allgemeine Stille; nur raue Gebirge, oft in ganzen Ketten den nackten Fels zeigend, die höheren mit Schnee bedeckt, an mittleren und tieferen Gehängen einförmige Weiden oder dunkle Nadelholzwaldungen tragend, boten sich dem Auge dar, wohin auch der Blick sich wandte.

*Die zwei nördlichen Ketten.*

Durch eine enge Felsschlucht, eine Spalte im schwarzen Kalk- und Flyschgebirge von Bergün, betritt man die lange *Val Tuors*. Kaum findet der Weg neben dem Thalbache, bald auf dem einen, bald auf dem anderen Ufer Raum, und eine Strecke lang scheinen die Felsen in der Höhe beinahe sich schliessen zu wollen. Der *Kalk* ist dünn geschichtet, mit *Flysch* wechselnd, der besonders am Eingang vorherrscht, seine Schichten sind vielfach gebogen und regellos mit dem Schiefer verflochten. Das herrschende Fallen ist steil südlich. Wo, tiefer einwärts, die Schlucht sich etwas öffnet, zeigt sich, auf der rechten Seite, in undeutlichen Verhältnissen *Talkschiefer*, mit dem anstossenden Kalk, wohl local nur, W fallend. Dann erscheint *Gyps*, weiss und feinschuppig, beträchtlich hoch ansteigend, und wahrscheinlich auch, der Bach hindert die Untersuchung, auf das linke Ufer sich verbreitend; mit dem Gyps, in grosser Ausdehnung, *Rauchwacke*. Hoch über diesen Gesteinen, und tiefer das Thal einwärts, ist der *Latschberg* felsigt aufgerissen und bildet einen grausigen Absturz, von dem sich Schutthalden bis an die Strasse herabziehen.

Der Thalgrund steigt, vom Eintritt an, nur langsam und ist stets enge, beinahe schluchtartig, zwischen die steilen Seitenwände eingeschlossen. Erst jenseits dem ganz in Rauchwacke eingeschnittenen Tobel, das den Latschberg von der *Raveschkette* trennt, tritt der Hauptkamm der letzteren mehr zurück, es bildet sich eine aus rothem Conglomerat, dann aus flasrig krystallinischen Gesteinen bestehende Vorterrasse, das Thal wird offener und gewinnt ein weniger düsteres Ansehen. Das *Conglomerat* besteht theils aus schiefrigen und körnigen rothen Sandsteinen, theils aus groben Conglomeraten, in denen Quarzbrocken und talkartige Thonschieferstücke, eckigt, oder gerundet, eingebacken sind. Die dicken Lager der wohl einige hundert Fuss mächtigen Bildung fallen südlich, während der Gneis der linken Thalseite steil nördlich fällt. Nachdem man von Bergün etwa zwei Stunden Weges zurückgelegt hat, erweitert sich auch der

tiefere Thalgrund zu einer freundlichen, ziemlich breiten Fläche (5350'), auf der, in drei verschiedenen Häusergruppen, die Maiensässe stehen. Hier nimmt das gleichmässige, schwache Ansteigen ein Ende, und die rauheren Formen der Abhänge, das lautere Sprudeln der Wildbäche, die nahen Schneehalden erinnern uns, dass wir das krystallinische Hochgebirge betreten haben. Die Fläche der Maiensässe ist ganz von Glimmerschiefer und Gneis umschlossen, deren Schichten vertical stehen und in N55O streichen.

Die Val Tuors theilt sich hier in drei Thalwurzeln. — Zur Rechten, oder gegen Mittag, dringt der wenig ansteigende Kesselgrund *Plazbi* bis an die Albulakette ein. In der früheren Richtung des Hauptthales steigt, schroff und von Felssätzen unterbrochen, die *Tuorseralp* nach einem 7970' hohen Joche, über das man, auf kürzestem, aber sehr beschwerlichem Wege, nach der *Val Fontana*, oder dem *Schafboden* gelangen kann, wo der Weg von Bergün nach Sulsanna mit demjenigen, der von dem Scalettapasse herkommt, sich vereinigt. In der Nähe jenes Joches stösst der grosse Gletscher des P. Asca, wie der Steinberggletscher am Sustenpass, über den Thalgrund weg an den nördlichen Abhang an, und längere Zeit ist man im Ansteigen seinem Nordrande ganz nahe; doch erreicht man die Höhe, ohne Eis- und Schneeflächen betreten zu müssen, und auch das Joch selbst und der jenseitige Abhang sind davon frei (S. die Ansicht Tab. IV, fig. 1). Das westlichste Thal, der *Raveschalpen*, führt von den Maiensässen in etwa 2 Stunden zu den auf der Wasserscheide befindlichen Seen von *Ravesch* (7950'), und auch über diese Einsattlung kann man, obgleich in längerer Zeit, doch bequemer als durch Tuors, nach dem Schafboden gelangen. Beide Thalwände und der Thalboden bestehn auch hier aus vertical stehendem Gneis und Glimmerschiefer. Ueber der breiten Weidstufe der rechten Seite sieht man hinter diesen Gesteinen den *rothen Sandstein* aufsteigen, und hinter diesem erhebt sich, in einer ganz nackten, und zackigten Mauer, der *Dolomit*, zunächst am Sandstein als gelbliche Rauchwacke, höher und in der Hauptmasse grau und dicht, oder feinkörnig. Selbst die Albulakette erreicht nicht den



hohen Grad von schreckhafter Rauheit dieses dolomitischen Raveschgrathes.

Die Steinarten der *Raveschkette* lassen dieselbe noch als dem äusseren Sedimentgebirge angehörend erkennen. Sie ist auch allerdings, mit Ausnahme der vorgelagerten Gneisstufe und des Streifens von rothem Sandstein, die Fortsetzung des Latschberges, obgleich sie, sowohl an Höhe, als an Wildheit der Formen diesen weit übertrifft. Wenn man, am oberen Rande des Tobels, der die Raveschkette gegen Westen abschneidet, dem Querschnitte derselben gegenübersteht, so erhebt sie sich wohl noch bei 1500 F. über den Standpunkt auf der oberen Fläche des Latschberges. An dem ganzen steil aufsteigenden Abhang hat fast keine Spuren von Vegetation sich festzuhalten vermocht; fürchterlich rauhe Felsen, ein verworrenes Gemenge von bräunlicher Rauchwacke und grauem Dolomit, meist bedeckt von stets frischen Trümmerhalden, bilden die Profilansicht; man könnte den Abhang eines kühn aufgeworfenen vulkanischen Kegels zu sehen glauben.

Die Zusammensetzung des *Latschberges*, der gegen das Tuorsthal zu nur aus Kalk und Gyps zu bestehen scheint, zeigt sich, bei genauerer Untersuchung, wohl eben so verwickelt, als die der Tischalpkette (siehe Tab. III, Fig. 3). Von Bergün bis Latsch und auch unter der Terrasse durch, auf der dieses Dorf steht, sieht man nichts, als *Kalk* und *Kalkschiefer*, an welche, bei Stuls und in der tiefen Schlucht des Steins, durch welche die Albula herabbraust, der grüne *porphyrtartige Sandstein* von Belaluna anstösst. Gleich über beiden Dörfern aber zeigt sich anstehender *Gneis*, von derselben Beschaffenheit, wie wir ihn weiter nördlich wiederfinden werden. Er bildet den steilen Absturz des höheren Latschberges gegen W und N und herrscht bis nahe an die obere Fläche desselben. Auch im Stulsthal verbreitet er sich, über dem grünen Sandstein, im Thalgrund und an beiden Abhängen tief einwärts gegen den Hintergrund des Thales hin. Den Gneistrümmern mengen sich, oberhalb Latsch, häufig auch Trümmer von *rothem Sandstein* bei, ohne dass jedoch dieser sich anstehend zeigte. Hat man endlich, etwa 1 Stunde über Latsch, die Höhe



des oberen Plateau's erstiegen, so lassen alle Anschürfungen und Fels-trümmer wieder nur *Kalk* erkennen, und man muss sich überzeugen, dass eine Kalklage, von nicht grosser Mächtigkeit, die ganze obere Fläche bedeckt. Da an der Südseite des Berges, im vorderen Tuorsthale, der Gneis nicht hervortritt, so scheint er sich im Kalk auszukeilen, und vielleicht darf der Talkschiefer in der Nähe des Gypses von Tuorsthal als seine äusserste Spur betrachtet werden.

Im Hintergrund des *Stulsthales* erreicht die rauhe Natur der Dolomit-bildung ihre höchste Entwicklung. Die beiden Ketten, die es einschliessen, sind vollkommen nackt, und auch der Thalgrund ist von aller Vegetation entblösst; eine afrikanische Wüste kann nicht öder sein. Nur ein kleiner Gletscher, der sich, nahe an der Wasserscheide des Thales, an der Raveschkette angesetzt hat, unterbricht die Einförmigkeit der hellgrauen Dolomitfelsen und ihrer im Thalgrund zusammenstossenden Schutthalden. Dennoch gewährt dieses lange und einsame Thal den bequemsten Uebergang von Bergün nach Sertyg, da das Längenjoch nur etwa die Höhe der Raveschsee'n haben mag, über welche die zwei Raveschpässe sich noch um 270 F. erheben. Man gelangt über das Joch zunächst in die Alpen von *Ducàn*, immer von Dolomit und Kalk umgeben, und eine hohe Felsstufe, über die der Ducanerbach einen Wasserfall bildet, der in dem an pittoresken Schönheiten armen Bündten Auszeichnung verdient, führt nach Sertyg. In der Nähe des Wasserfalles ist in bedeutender Mächtigkeit *Gyps* anstehend.

Obgleich es schwer hält, von den Lagerungsverhältnissen des grünen Gesteins von Stuls, des Gneises im Stulsthale und des Dolomits sich eine klare Vorstellung zu bilden, so kann man doch, in Stuls selbst, an der Auflagerung des Gneises auf dem grünen Gestein, und also auch auf den damit verbundenen, sonst über dem Gneise liegenden rothen Sandstein nicht zweifeln. — Eben so evident scheint, im hinteren Stulsthal und an den Seitenwänden die Auflagerung des Dolomits auf dem Gneis. Im vorderen Stulsthal aber glaubt man auch zu beobachten, dass das rothe Conglomerat von Bellaluna über dem Gneis in die Höhe steige, zwischen

diesen und den Dolomit, der den Kamm der nördlichen Kette bedeckt, eindringe und hier demnach seine natürliche Stellung zwischen Gneis und Dolomit wieder erhalte.

Noch verwickeltere Verhältnisse scheinen am nördlichen Abhang der *Silberbergkette*, statt zu finden. Leider vermögen wir nicht, dieselben vollständig aufzuklären, da uns diese Seite des Gebirges nur durch eine einzige Reise bekannt geworden ist.

Etwas unterhalb *Glaris* stiegen wir an das linke Ufer des Landwassers, um über *Monstein* (Mostey ausgesprochen) nach Stuls zu kommen. Längs dem breiten, meist bewaldeten Abfall des Gebirges, zwischen dem Ausgang der Sertyg- und Monsteinthäler, zeigen alle Herabrollungen nur *Glimmerschiefer*, *Hornblendschiefer* und *Gneis*, und, in einem kleinen, in diese Bergseite eingeschnittenen Tobel findet man den letzteren auch anstehend: ein undeutlich flasriges, beinahe körniges Gemenge von weissem und grauem Quarz und Feldspath, grünlichem und silberweissem Glimmer, Quarz und Feldspath stark verwachsen, so dass letzterer nicht deutlich hervortritt; der Glimmer in getrennten Partien, bräunlich gefärbt durch Eisen. Die Gneisschichten stehen vertical und streichen in N80O.— In der näheren Umgebung des hoch über dem furchtbaren Schlund des Monsteinbaches liegenden beträchtlichen Dorfes sind nur Schuttmassen entblösst, die man auf sehr unsicherem, bei jedem Regengusse einstürzendem Pfade quer durchschneiden muss, um nach den Weiden und dem Alpdorfe der *Hinteralp* zu gelangen. Den vorigen Steinarten mengen sich hier nun auch Trümmer von schwarzem *Kalkstein* und *Dolomit* bei, die, theils aus der *Hinteralp*, theils aus dem tief in's Gebirge, gegen Ducàn, sich hineinziehenden Thale der *Oberalp* herkommen, als Herabrollungen der mächtigen Kalk- und Dolomitmasse, die, von Filisur bis Sertyg, den obersten Kamm des Gebirges bildet.

In der westlichen Ecke der *Hinteralp*, wo man, nach langem Ansteigen, einen meist mit Gebirgstrümmern bedeckten, hoch liegenden Kesselgrund erreicht, ist man der Grenze von Gneis und Dolomit ganz nahe. Der

*Gneis* ist hier, fast auf der obersten Höhe des Gebirges, immer noch dasselbe Gestein, wie unterhalb Monstein, nur zeigt der Feldspath sich etwas deutlicher entwickelt. Der *Dolomit* ist im Innern dunkelgrau, sehr feinkörnig bis dicht, von vielen Spathäderchen durchzogen, an der Aussenfläche hellgrau, wie mit Staub bedeckt. Er liegt dem *Gneis* auf und krönt die Wände des Kessels auf allen drei Seiten, gewölbartig nach beiden Abhängen des Gebirges sich umbiegend. Auch in dem östlichen Hintergrund der Alp glaubt man diese Auflagerung zu beobachten, obgleich hier die Dolomit- und Kalkschichten so vielfach gekrümmt sind, dass die Auffassung der Lagerungsverhältnisse sehr schwer fällt. Deutlich bildet indess der nördlichste mächtige Kalkstock ein Gewölbe, dessen nördlicher Schenkel dem *Gneis* aufliegt, während der südliche fast senkrecht steht, und, wie ein Bündel auf sich zurückfallender Bänder, wellenförmig gebogen erscheint. Dieser südliche Schenkel allein ist es, dessen Fortsetzung zwischen diesen Felsen und dem westlichen, höchsten Theile der Alp, die fürchterlich schroff abgebrochenen Wände bildet, welche das ganze Alpthal gegen Mittag begrenzen. Es scheint das Gewölbe in seinem mittleren Theile gesprengt und die zertrümmerte Dolomitdecke weggeführt worden zu sein.

Eine lange Schneelehne führte uns auf den, wohl über 8000 F. hohen Grath, und nicht ohne Schwierigkeit stiegen wir von demselben, über äusserst steile Halden von Dolomit- und Kalktrümmern hinab auf eine terrassenartige Unterbrechung des Abhanges, die bereits Weiden trägt, und von diesen an den noch bedeutend tiefer liegenden Stulsbach. An diesem tieferen Abhange tritt bereits wieder *Gneis* hervor, und er ist es auch wohl, der, längs dem Abhange, gegen den Ausgang des Thales, die Grundlage des ausgedehnten Weidbodens bildet. Nur wenig westlicher, als die Stelle, wo man die Dolomitkette übersteigt, erhebt sich der *Gneis* sogar bis zur obersten Gebirgshöhe, indem er den Dolomit gegen Mitternacht abwirft. Das erkennt man schon aus dem mageren Graswuchs, der von da weg die oberste Höhe bekleidet, da der Dolomit immer ganz nackt bleibt.

Ueber die Verhältnisse des in der Geschichte des Bündtnerischen Bergbau's berühmten *Silberbergs* finden sich in den Mss. von *C. Escher* sehr ausführliche Nachrichten, die wir im Auszuge mittheilen wollen.

« Auf der linken Seite des Landwassers erhebt sich das Gebirge, vom schluchtartigen Ausgange des *Monsteinthales* an abwärts, sehr steil und hoch empor. Einige Bäche haben sich tief in den Abhang eingeschnitten und fliessen durch steile Tobel, die nur theilweise vom Landwasser her zugänglich sind, an ihren schroffen Felswänden aber sehr lehrreiche Aufschlüsse über die geologische Beschaffenheit dieses Gebirges geben. Das unterste dieser Tobel ist das *Tiefetobel*, und trennt den südwestlich liegenden *Jenisberg* von dem *Silberberg*. Nördlich vom Tiefentobel wird dieser vom *Tiefzügli*, und dann vom wieder höher ansteigenden *Schwabentobel* durchzogen, auf welches das *Monsteinthal* folgt. »

« Das *Fallen* der Schichten ist, an dem ganzen Abhang des Silberbergs und Jenisbergs, mit ungefähr 45°, auch wohl stärker, bis 75°, nach S65O. Dasselbe zeigt sich, etwas höher im Thal, auch auf dem rechten Ufer des Landwassers, während in den Zügen, durch eine merkwürdige Schichtenbiegung, das Fallen in SW und W übergeht. »

« Eine mächtige, deutlich geschichtete *Kalksteinbildung* erscheint, längs dem ganzen Fuss des Gebirges, als Grundlage desselben. Ihre schroff zum Landwasser abgestürzten Felsmassen und die Tiefe der Tobel, die in sie eingeschnitten sind, haben gezwungen, die Landstrasse in den Zügen wohl 1500 F. hoch über dem Thalgrund durchzuführen, und noch grössere Schwierigkeiten hätte man auf dem linken Ufer, am Abhange des Silberbergs, gefunden. Der Kalkstein ist in der Tiefe blass rauchgrau, feinkörnig bis dicht, an einigen feinkörnigen Abänderungen oft mit auffallend starkem Glanz, zuweilen mit Thon gemengt. In der Höhe ist die Hauptmasse schwarz und dicht. Das *Erzlager*, auf welchem der Bergbau geführt worden ist, gehört der tieferen Schichtenfolge an, und besteht aus dunkel rauchgrauem bis schwarzem, feinkörnigem bis dichtem Kalk, mit eingesprengten Körnern von Kalkspath, und kleinen Poren, die eine Aus-

witterung eines anderen früher eingesprengten Bestandtheils andeuten. Das *Erz* zeigt sich in höchst unregelmässigen Gängen, die im Allgemeinen dem Streichen der Schichtung folgen, sich aber häufig zertrümmern und von vielen Klüften durchschnitten, verworfen oder auch abgeschnitten werden, bald aber auch sich wieder zu grösseren Nestern vereinigen. Die Ablosungen gegen den Kalkstein sind ziemlich scharf, aber ohne Saalbänder. Im *Tiefen Stollen* des Tiefentobels lassen sich alle Trümmer auf zwei Hauptgänge zurückführen von 2 bis 6 Zoll Mächtigkeit und ungefähr 6 F. von einander abstehend. Die Hauptmasse dieser Erzgänge besteht aus *silberhaltendem Bleiglanz*; in geringerem Verhältniss ist öfters *gelbe Blende* beigemengt, häufiger in den oberen, als in den unteren Teufen. Der Bleiglanz ist meist feinkörnig, die Blende ziemlich grobkörnig, wachsgelb, selten braun, meist unregelmässig mit dem Bleiglanz verwachsen. Noch zeichnet sich der Kalkstein dieses Erzlagers aus, durch das Einschliessen hellgrauer, spitziger Bogen von sehr geringer Dicke, die nicht ohne Wahrscheinlichkeit für organische Ueberreste gehalten werden könnten.»

«In den obersten Lagern mengt sich der Kalkstein immer mehr mit Thon und Kiesel, bis diese wirklich überwiegend werden und die Kalkerde verdrängen. Die frühere schwarze Farbe geht zugleich durch's dunkel Aschgrau über in's gelblich Hellgrau. Es folgt nun, mit gleichförmigem SO Fallen, eine ebenfalls sehr mächtige *Sandsteinbildung*, dem *Quarzit* nahe stehend, von C. E. als *Grauwacke* beschrieben. Das Gestein ist, in den tieferen Massen, blass gelblich grau, sehr feinkörnig in's Dichte, versteckt dickschiefrig, mit starkem Thongehalt; der Hauptbestandtheil aber scheint Quarz. An der Aussenfläche hat sich dieser Sandstein, wahrscheinlich durch Verwitterung fein eingesprengter Schwefelkiese, mit einer festen ockerbraunen Kruste überzogen. In der Höhe wird die ganze Masse des Quarzit-Sandsteins dunkel braunroth, bleibt aber immer feinkörnig, mit splittrigem Bruch, sehr fest.»

«Verfolgt man die verschiedenen Tobel des Silberbergs noch höher aufwärts, so findet man über dem rothen Sandstein eine neue Bildung ent-

wickelt, die bis in die obersten Höhen des Gebirges anzuhalten scheint. Im Schwabentobel wird der Sandstein, nahe an seiner oberen Grenze, conglomeratartig, indem die braunrothe, thonige Grundmasse erbsengrosse graue Quarzkörner und verwitterte erdige Körner, gelblich braun, eckigt, mit Kalkgehalt, einschliesst. Nur wenige Schritte höher erscheinen Lager einer graulich weissen, auch grünlich und röthlich grauen Steinart, schwach schimmernd, weniger hart als Quarz, die C. E. mit *dichtem Feldspath*, oder *Weissstein* vergleicht. Sie erscheint deutlich flasrig durch unvollkommen entwickelten silberweissen Glimmer, der sich nur durch seinen Glanz von der übrigen Grundmasse unterscheidet, auf deren Schieferungsflächen er einen sehr dünnen, nicht davon zu trennenden Anflug bildet. An einzelnen Stellen glaubt man auch undeutlich krySTALLINISCHE Feldspathpartieen wahrzunehmen. Die Schichtung ist derjenigen des Sandsteins vollkommen parallel. Je höher man in dieser Bildung ansteigt, desto deutlicher entwickelt sie sich zu einem wahren *Gneis*. Der silberweisse, auch wohl tombackbraune Glimmer zeigt sich in schärfer getrennten Blättchen, oder in zusammenhängenden Blättern, die dem Gestein das Ansehen eines Glimmerschiefers geben; der gelblich graue Feldspath scheidet sich vom Quarz ab, und beide Mineralien nehmen ihre gewöhnlichen Charaktere an; die Steinart wird stellenweise sogar grobkörnig. In einer östlichen Verzweigung des obersten Tiefentobels, dem *Brunnentobel*, finden sich in diesem *Gneis* Nester von rothem *Thoneisenstein*, auf die früher auch geschürft worden ist, und in ihrer Nähe grosse Nieren von blass braunem Feldspath.»

Diese höchst merkwürdige, von C. Escher, während eines fünftägigen Aufenthalts im Schmelzboden im Jahr 1813, beinah von Schicht zu Schicht untersuchte Lagerfolge muss als die erste, mit wissenschaftlichem Sinn in den Alpen gemachte Entdeckung der Auflagerung mächtiger *Gneis*-massen auf Flötzkalk betrachtet werden \*). Es ist dieselbe Erscheinung, die im Jahr 1828 von H. Hugi im Roththale und an den Gebirgen des

\*) Eine Notiz davon steht in Leonh. Taschenb. VIII. 612.

Berner-Oberlandes beobachtet worden ist, nachdem auch schon im Jahr 1788 die lehrreichste dieser Stellen, im Urbachthale, von dem älteren *Prof. Studer* in sein Tagebuch war eingezeichnet worden \*). Durch jene mühsame Detailuntersuchung wird die von uns in den Berneralpen gemachte Beobachtung, dass die aufgelagerte Masse erst in beträchtlicher Entfernung von der unteren Grenzfläche sich krystallinisch entwickle und in wahren Gneis, oder Gneis-Granit übergehe, vollkommen bestätigt; es erscheint ferner auch hier der Gneis in seiner unteren Masse deutlich der Auflagerungsebene parallel geschichtet; die mächtige Sandsteinbildung endlich, die sich zwischen den Gneis und den Kalk einlagert, zeigt sich in den Berneralpen ebenfalls als ein Hauptglied der Zwischenbildungen, sowohl an der unteren, als an der oberen Grenze der Kalkkeile.

Verfolgen wir die Sandsteinbildung des Silberbergs nach ihrem Streichen gegen SW, so treffen wir auf die grünen und rothen Sandsteine von Bellaluna, so dass der Zusammenhang der Gesteine dieser beiden Stellen nicht bezweifelt werden kann. Es ist ferner klar, dass der am Silberberg dem Sandstein aufliegende Gneis kein anderer ist, als der, den wir durch ganz Monstein, und, jenseits dem Gebirge, im Stulsthale gefunden haben; und es ist kaum zu erinnern nöthig, dass er hier zu dem Gestein von Bellaluna in durchaus gleichem Verhältnisse steht, wie am Silberberg zu dem dortigen Sandstein. Der Kalk des Stulsthales dagegen ist diesem Gneis aufgesetzt, und auch gegen Filisur zu scheint auf dem obersten Gebirgskamm Kalk oder Dolomit aufzuliegen; man möchte demnach sich für berechtigt halten, diese Kalkmasse als eine sehr viel jüngere Formation, von dem Kalk, der das Erzlager des Silberbergs einschliesst, zu unterscheiden, und den letzteren als die älteste der in diesen Gegenden hervorgetretenen Bildungen zu betrachten. Die Berücksichtigung der weiteren Verbreitung dieser Kalkbildungen erregt aber wieder nicht geringe Zweifel gegen diese Resultate. Der obere Kalk des Latschberges ist offenbar von dem Kalk

\*) Hugi Alpenreise, p. 151.



und Dolomit des Stulsthales nicht verschieden; und derselbe hängt, am Ausgang von Tuors, unmittelbar zusammen mit dem Kalk der den Gneis des Latschberges unterteuft, und den wir demnach mit dem Kalk des Erzlagers zusammenstellen können. Noch klarer zeigt sich der Zusammenhang des oberen und unteren Kalks bei Filisur. Auf der Nordseite des Gebirges fand ferner C. Escher den rothen Sandstein noch anstehend am Ausgang des Monsteinthales, unterhalb dem Dorfe, und er setzt ihn in Verbindung mit den rothen Sandsteinen, die am rechten Ufer des Landwassers vorkommen. Nach dem Profil 4, Tab. III der Davosermasse würde demnach der Kalk des Erzlagers demjenigen des Welsch-Tobels entsprechen, der ebenfalls den Sandstein unterteuft, während der obere Kalk, der Züge und des Bärentobels, demjenigen von Stuls zu vergleichen wäre. Dieser obere Kalk, der Kalk, durch den man aus den Zügen nach Wiesen kommt, ist aber wieder nur durch die Schlucht des Landwassers von dem Kalk des Erzlagers getrennt, und kann nicht als verschieden von demselben betrachtet werden, so dass es scheinen möchte, der zwischen beiden Kalkbildungen liegende Sandstein habe sich hier ausgekeilt, und die durch ihn getrennte Kalkmasse sei wieder zusammengetreten. Da wir jedoch nur einmal den Weg von Glaris nach Wiesen gemacht haben, und damals die grosse Verwicklung dieser Verhältnisse nicht ahnen konnten, so dürfte leicht eine neue Untersuchung dieser Gegend den Zusammenhang der Gesteine beider Ufer des Landwassers anders ansehen lehren. Es scheint auch wirklich eine verschiedene Auffassung aus der Notiz sich zu ergeben, die Hr. *Sprecher von Bernegg* mittheilt \*), dass der mehr als 100 Klafter mächtige Kalkstein des Erzlagers vom rothen Sandstein, sowohl unterteuft, als bedeckt werde. Nach dieser Angabe muss offenbar der Sandstein des Silberbergs, als oberer, von dem der Züge, als unterem, getrennt werden, und der Kalk des Erzlagers tritt so mit der oberen Kalksteinmasse, dem Kalk von Alveneu, Schmitten und Bärentobel, in Ver-

\*) S. Verhandl. der schweiz. Gesell. in Chur 1826, p. 21.



bindung, ohne dass es nöthig würde, auch mit dem Kalk des Welschtobels einen Zusammenhang anzunehmen.

---

Es ist auffallend, wie das in der Längenrichtung der vier Ketten deutlich hervortretende, nach NO gekehrte Auseinandergehen fast noch stärker in dem Streichen der Steinarten sich äussert, deren Richtung auch hier wieder nicht ganz mit derjenigen der Ketten übereinstimmt. Der Kalk der Albulakette, der am Ausgang von Tuors mit dem der Ravesch- kette nur Eine Masse bildet, ist auf der Linie von Sertyg und Sulsanna durch mehrere Stunden breite Gneis- und Glimmerschiefergebirge davon getrennt. Die rothen Sandsteine des Raveschpasses nähern sich immer mehr dem Tuorserthal, je weiter sie westlich fortsetzen, und bevor noch die Kette das Tobel erreicht, das sie vom Latschberg scheidet, haben sie sich an ihrer Mittagseite ganz verloren. Man glaubt sie dagegen an der Tischalpkette, auch hier auf der Grenze von Kalk und Gneis, wiederzu- sehen; und vielleicht treten sie auch an der SW Ecke derselben wieder hervor, die Kette schief durchschneidend, da man, im Ansteigen von Bergün, diese Gebirgsseite mit Trümmern von rothem Sandstein ganz bedeckt sieht. Vergleicht man das Streichen der Schichten in der Albulakette mit demjenigen im Silberberg, so laufen beide Linien gegen W unter einem Winkel von  $75^{\circ}$  zusammen.

Von noch grösserer Wichtigkeit ist uns aber die höchst merkwürdige Schichtenstellung dieser Gebirge. Als ob man sich bereits in der Axe des krystallinischen Fächersystems befinde, herrscht in beiden mittleren Ketten, mit Ausnahme des Latschbergs, verticale Schichtung. Die Steinart hat keinen Einfluss, Kalkschichten, Sandstein- und Conglomerat- schichten stellen sich senkrecht, wie Gneis und Glimmerschiefer. Die Schichten der Albulakette aber fallen nördlich, diejenigen des Silberbergs südlich, und auch diese zwei Ketten scheinen demnach bereits integri- rende Theile des Fächers zu bilden.

Ein ganz ähnliches Fortsetzen des Gotthardter-Fächers in das anstossende Sedimentgebirge hinein, hat C. Escher an der Greina und im Petersthale wahrzunehmen geglaubt<sup>\*)</sup>; jedenfalls ist es aber in dieser Gegend weniger klar und nicht so grossartig ausgesprochen, als in unserer Tuorsergruppe, da dort nur die Schichtung dem Fächersysteme folgt, nicht aber die Kettenbildung, die zum Theil noch unter dem Einfluss des Adulasytems steht. In den Umgebungen der westlichen Centralmassen, am Tödi, an der Gemmi, am Morclesstocke, herrschen ganz andere Verhältnisse, und nur die vertical stehenden Sandsteine und Conglomerate von Diablot und Valorsine können vielleicht auf eine analoge Bildungsform zurückgeführt werden. Gesetzt aber auch die Tuorsergruppe stünde mit ihren merkwürdigen Structurverhältnissen ganz vereinzelt im Systeme der Alpen, so ist doch wohl die Beziehung dieser Structur auf diejenige der centralen Selvrettamasse zu offenbar, als dass wir die Uebereinstimmung des sedimentären mit dem krystallinischen Fächer einem Zufall beimessen könnten. Wir dürfen nicht bezweifeln, dass beide Structurformen durch den nämlichen Process, durch dieselben Kräfte, hervorgebracht worden seien. So wie daher Saussure aus der verticalen Stellung der Puddinge von Valorsine auch auf die Aufrichtung der mit ihnen verbundenen Gneisschichten schloss, so müssen wir in der Ausdehnung der Fächersysteme auf die angrenzenden sedimentären Bildungen ein starkes Argument für die Ansicht finden, die in den aus Glimmerschiefer und Gneis bestehenden Fächern der Centralmassen nicht eine der krystallinischen analoge Structur, durch unbekannte Molecularkräfte erzeugt, sondern ein Product mechanischer Bewegungen erblickt, so unvermögend wir uns auch bekennen müssen, die Entstehung der Fächer durch Aufrichtung früher horizontaler Schichten uns klar machen, und zu solchen Bewegungen uns Ursachen denken zu können. Im Grunde scheint dieses Resultat auch unmittelbar aus der Annahme hervorzugehen, dass die Gneise und Glimmerschiefer selbst nur modificirte Sedimentgesteine seien;

<sup>\*)</sup> Fröbel und Heer Mitth, p. 200.

da jedoch die räthselhaften und durch diese neuen Fölgerungen noch dunkler gewordenen Verhältnisse am Mettenberg und auf Albinalp in der Curvergruppe eine Umänderung der Structur, bei dem Uebergang der Sedimentgesteine in Gneis, zu beweisen schienen, so war es nothwendig, durch eine neue Beobachtungsreihe, gleichsam eine instantia crucis, zwischen beiden Erklärungen der Fächerstructur zu entscheiden.

---

## 2. GRUPPE DER SCALETTA.

Der Theil der centralen Selvrettamasse, den wir noch zu beschreiben haben, bietet in seiner geologischen Structur, wie in seinen Formen weit weniger Mannigfaltigkeit dar, als die vorige Gruppe. Er ist uns auch, theils wegen der Schnee- und Gletscherbedeckung des mittleren Rückens, theils wegen der beschränkten Ausdehnung zu Tag gehender Felsen in den drei langen Thälern der Nordseite, weniger bekannt geworden.

Die westliche Spitze der keilförmig in die vorige eingreifenden Gruppe, liegt, wenn man nur die äusseren Formen berücksichtigt, bei den Raveschseen, indem erst von hier an der mittlere Kamm des Gebirges fast ohne Unterbrechung Gletscher und Schnee trägt. In geologischer Beziehung, haben wir gesehen, erstreckt sich aber der aus Gneis bestehende Mittelkamm beträchtlich weiter westwärts, obgleich er sich bald nicht mehr als selbstständiges Gebirge zu behaupten vermag. Wir haben diesen Gneis noch bei den Maiensässen von Tuors gefunden, und selbst bis tief in die Tischalpkette hinein verfolgen können.

Auch die Lage des Mittelkamms trifft nicht genau mit dem Streichen der geologischen Axe des Fächers zusammen. Es scheint die letztere etwas südlicher, als die Linie der grössten Erhebung, aber derselben parallel, angenommen werden zu müssen; ungefähr im Streichen des hohen *Piz*

*Asca*, oder doch nur wenig nördlich von demselben. Längs dieser Linie stehen, in einer Zone von etwa einer halben Stunde Breite, die Schichten vollkommen vertical, südlich von ihr fallen sie steil nördlich, nördlich von ihr steil südlich, im Allgemeinen mit desto geringerem Winkel, je weiter sie sich von der mittleren Axe entfernen. Am Ausgang der nördlichen Thäler, besonders des Dischmàthales, scheinen jedoch, so viel die Vegetation zu sehen gestattet, weniger regelmässige Verhältnisse, und gegen W fallende Schichten vorzukommen.

Die herrschenden Steinarten sind *Glimmerschiefer*, *Gneis*, zuweilen mit grossen Feldspathkrystallen, und *Hornblendschiefer*. Der Gneis erscheint besonders im Mittelkamm grossflasrig und vollkommen krystallinisch ausgebildet, während er gegen den Rand zu sich mehr dem Glimmerschiefer, oder Quarzit nähert. Der Hornblendschiefer zeigt sich in grosser Mächtigkeit, sowohl am Rande der Gruppe, als in der Axe, und möchte wohl den beiden anderen Gebirgsarten das Gleichgewicht halten. Sehr wahrscheinlich würde sich, wenn das Gebirge specieller untersucht wäre, und man den Karten vertrauen könnte, für die ganze Gruppe und auch weiter ostwärts eine sehr einfache Zusammensetzung aus wenigen parallelen Zonen jener drei Steinarten ergeben.

---

Durch das ganze *Sertygerthal* einwärts zeigt sich bis zum Dorfe nirgends an den unteren Gehängen eine Anschüfung von anstehendem Fels; reiche Weiden oder Wald bedecken beide Thalseiten. Die Herabrollungen bringen, am Eingange des Thales, Hornblendschiefer, weiterhin auch Glimmerschiefer und Gneis, und auch die äusseren Formen deuten auf die ausschliessliche Verbreitung dieser Gesteine. Die rechte Thalseite ist bis auf die Höhe des breiten Rückens mit Wald und Weide bewachsen, ohne schärfere Umrisse. Auf dem Kamm der linken Thalseite glaubt man Gneis - oder Glimmerschieferfelsen mit N Fallen zu er-

kennen. Tiefer im Thale lagert sich demselben Kalkstein auf, der bald zu hohen Stöcken anwächst und durch nacktes Gestein und schroffe Gestalten sich auszeichnet, aber nur bis zur hinteren Theilung des Thales anhält.

Immer auf der rechten Seite des Thales uns haltend, drangen wir, durch die *Kühalp*, bis in den hintersten Grund desselben, ohne genau zu wissen, wohin die eingeschlagene Richtung uns führen würde. Wie überall in diesen Gebirgen, wenn man das Weidland verlässt, verlor der Pfad sich bald in dem Steingetrümmer. Die vergletscherte Hauptkette, an deren Fuss wir uns befanden, schien an drei Stellen einen Uebergang zu gestatten. In der südöstlichen Thalecke muss ein sehr mühsamer Gletscherweg, der sogleich steil in das Hochgebirge aufsteigt, nach Schafboden führen. Wir möchten indess denselben, da wir ihn nicht aus Erfahrung kennen, Niemanden anempfehlen. Gegen SW zieht sich das Thal, immer ansteigend, tiefer einwärts, und auch da zeigen sich zwei nicht tief in den Gebirgskamm eingeschnittene Einsattelungen (8220'), über die man, in ungefähr gleicher Zeit, nach *Ravesch* gelangt. Wir wählten von den drei Wegen den mittleren, und, über Trümmerhalden und Schneelehnen aufwärts steigend, erreichten wir die Höhe des wenig breiten, gegen W in sehr steilen Grashalden abfallenden Rückens. Alles um uns her war Glimmerschiefer, in *h* 7 streichend und vertical, oder steil N fallend. Etwas südlich vom Passe zeigte sich Hornblendschiefer und noch südlicher, wahrscheinlich die linke Thalseite des hinteren Schafbodens bildend, sehr grobflaseriger Gneis mit grossen Feldspathkrystallen, sich in wild zerrissenen Felsen zu bedeutender Höhe erhebend.

Die Aussicht auf die vor uns liegende, einsame Gebirgsgegend gab uns unerwarteten Aufschluss über die Thalverzweigung, die damals noch, sowohl uns, als den Karten so viel als ganz unbekannt war \*). Zwei kleine See'n lagen bei 300 F. tief zu unseren Füßen, getrennt durch ein

\*) Man vergleiche über diese Gegend unsere Karte mit Wörl und Keller.

Felsriff, der südlichere etwas höher, als der grössere nördliche; jener gegen SO, nach Schafboden, dieser nach Ravesch und Bergün abfliessend. Auch hier wiederholt sich, wie auf dem Albula und Julier, die Lage der Wasserscheide in einem Hochthale, welches quer das ganze Gebirgssystem durchschneidet; an dieser Stelle um so auffallender, da unmittelbar am Ufer der See'n die Centralkette in voller Stärke aufsteigt. Uns gegenüber erhob sich, höher als alle umliegenden Gebirge (s. Taf. IV, Fig. 1), der *Piz Asca* mit seinem grossen Gletscher; und eine Reihe ebenfalls vergletscherter Gebirge setzte von ihm, auf der rechten Seite des Schafbodens, ostwärts fort, als ob die Centralkette hier gegen Mittag verworfen worden wäre. Auf keiner Karte, in keiner Beschreibung ist dieser mächtige Felsstock bezeichnet und genannt worden; auf dem Panorama von Schaffner steht er, ebenfalls unbenannt, gerade im Nordpunkt.

Im Raveschthale, gegen die Maiensässe von Tuors zu, ist verticaler Gneis, weisser Feldspath und Quarz, mit Blättern von silberweissem, oder grünlichem Glimmer, die herrschende Steinart. Auf der linken Thal-seite schliesst er Orthoklaskrystalle ein, die eine Grösse von zwei Zoll erreichen. Das Fallen ist eher etwas nördlich, auf dem Tuorserjoch dagegen, am Fuss des Piz Asca, bestimmt südlich, gegen S35O. Erst in den östlicheren Profilen wird die Fächerstructur regelmässiger.

Gleiche Einförmigkeit wie im Sertygerthal findet man im Thale von *Dischmà*; man müsste den Kamm der Seitengebirge ersteigen und verfolgen, um über die geologische Beschaffenheit derselben in's Klare zu kommen. Die geringe Mannigfaltigkeit in den Herabrollungen ermuntert indess nicht zu diesem Unternehmen. Ausser Gneis und Hornblend-schiefer findet man keine andere Steinart. — Nahe am Eingang zeigt sich der Gneis feinflasrig, der Feldspath tritt zurück und das Gestein nähert sich dem Glimmerschiefer. Die Schichten scheinen im Meridian zu streichen und gegen W zu fallen; aber die Stratification ist so undeutlich, dass man stets im Zweifel bleibt, ob man sich nicht geirrt habe. In der Mitte ungefähr des Thales, der Stelle gegenüber, wo auf der linken Seite sich

ein mit schönen Weiden bedeckter Einschnitt gegen Sertyg öffnet, bricht auf der rechten Seite ein sehr ausgezeichneter Gneis mit grossen Feldspathkrystallen, und stark glänzenden, tobackbraunen Glimmerblättchen mit weissem Talk zu grösseren Lagen vereinigt. Mit ihm wechseln feinkörnige Hornblendschiefer. Das Fallen scheint immer westlich, das Streichen in  $\hbar 1—2$ . C. Escher dagegen glaubte schon hier SSW Fallen zu bemerken.

Die Gebirgsansicht in dem schönen Thalgrunde des *Dürrenbodens* (6180') ergreift uns um so mehr, je weniger wir auf dem drei Stunden langen Wege durch die Natur verwöhnt worden waren. Die Gletschermasse des *Thaelhorn's* bildet, wie die Blümelisalp im Kienthale, den Hintergrund. Rechts von ihr greift ein enges Felsthal tief in die Kette ein und führt an den Absturz des Scalettajoches, auf dessen Westseite sich die Gletschergebirge des Gefrorenhorn's erheben, die den Scalettapass vom Sertygerpass trennen. In der südöstlichen Ecke des Hintergrundes zieht sich ein mit Weide und Schutt bedecktes Längenthälchen nach dem Flüelapass. Erst nördlich von diesem Seitenthale, in dem langen Rücken, der Dischmà vom Flüelathale trennt, erhebt sich die steile Pyramide des *Schwarzhorn's* (9700'), ein Hauptpunkt der schweizerischen Triangulation, der, ungeacht seiner nicht centralen Lage, die meisten Gipfel der Hauptkette überragt.

Gleich hinter dem Dürrenboden zeigt sich die anstehende Gebirgsart sehr ausgedehnt am Tage, und besteht aus ziemlich dickflasrigem Gneis, der sich zum Theil dem Glimmerschiefer annähert; tobackbrauner, oder silberweisser Glimmer in anhaltenden Blättern, grauer Feldspath und Quarz, verwachsen, in ungefähr gleichem Verhältnisse. Das Fallen ist hier bestimmt südlich, und auch am Schwarzhorn und in seiner ganzen Umgebung bemerkt man allgemein herrschendes Südfallen. So noch am Nordabfall der Hauptkette selbst.

Der Weg nach dem kleinen Schirmhause auf der Höhe des Passes (8100') führt in schiefer Richtung über breite und sehr hohe Halden von

Schutt und grossen Trümmern, die von den Gletschern des Thälihorn's herkommen, und mag, besonders im früheren Sommer, durch Einstürze der in der Höhe abgebrochenen Gletscher sehr bedroht werden. Der vorige Gneis ist auch die vorherrschende Steinart dieser Halden; sehr häufig ferner sieht man Stücke von Hornblendschiefer, meist von Pistacitadern durchzogen; auch einige Blöcke eines dunkel graulich grünen Gesteins, dem dichten Feldspath der Pissevache ähnlich, v. d. L. zum grauen Glase schmelzend, wahrscheinlich ein durch Hornblende gefärbter dichter Feldspath.

Auf dem Scalettajoche selbst stehen die Schichten beinahe vertical und streichen nach N 60—70 O; doch ist an den Felsstöcken, auf beiden Seiten des Passes immer noch steiles Südfallen bemerkbar. Es ist grünlich grauer, oder tombackbrauner, dem Glimmerschiefer genäherter Gneis in welchem nur wenige Feldspathblättchen bemerkt werden; dieselbe Steinart, die wir in Sertyg, Monstein und Stuls kennen gelernt haben. Mit ihm wechselt, jenseits dem Schirmhause, feinkörniger Hornblendschiefer, sehr zäh und nur unvollkommen schiefrig, verwachsen mit Pistacit. Besonders ehe der Weg, nachdem er längere Zeit zwischen den von beiden Seiten niedersteigenden Gletschern und ihrem Schuttauswurf sich auf der Höhe gehalten, nun steil nach dem Schafboden hinabführt, wird der Gneis durch diesen Hornblendschiefer beinahe verdrängt. Etwas tiefer am Abhange gewinnt jedoch bald wieder der Gneis die Oberhand und verliert auch immer mehr sein Glimmerschiefer ähnliches Aussehen.

Das Schafbodenthal ist flach und ziemlich breit, auf beiden Seiten von hohen vergletscherten Gebirgen eingeschlossen, die im Hintergrund des Thales in Zusammenhang zu stehen scheinen. Es kam uns sehr gewagt vor, durch diese öden Eisgebirge einen Weg zu suchen, als wir, von Scans her, in dem Thale angekommen, von dem Bergamasker Schäfer erfuhren, dass dort durch ein Pfad nach Bergün führe. Wie wir bereits erwähnt haben, ist indess, sowohl über Ravesch, als über Tuors, der



Weg ganz frei von Gletschereis und im hohen Sommer auch vollkommen von Schnee entblösst.

Ein spaltenartiges, stark fallendes Querthal führt aus dem Schafboden in das tiefere Sulsannathal. Zur Rechten des Weges hat man, in senkrechter Tiefe, den wild tosenden Thalbach, der malerische Fälle bildet, zur Linken nackte Felsen. Der Gneis steht hier ganz vertical, unterscheidet sich indess nicht wesentlich von dem früheren südlich fallenden, und enthält stets nur wenig Feldspath. Bevor man noch das Sulsannathal erreicht, auf der Thalstufe, von der man erst in das flache tiefere Thal steil hinuntersteigt, geht die Schichtenstellung bereits in das steile Nordfallen über, das die südliche Hälfte des Fächers auszeichnet, und auch hier ist es stets derselbe Gneis, mit grauem Quarz, silberweissem, tobackbraunem bis schwarzem Glimmer und wenigem graulich weissem Feldspath. Auch das Thal auswärts bis zum Dorfe und ausserhalb desselben hält, so viel man an den, theils bewachsenen, theils mit Gebirgsschutt bedeckten Abhängen sehen kann, das steile Nordfallen an.

Bei *Ponte alto* sieht man einen ausgezeichneten Gneis mit grossen Feldspathkrystallen, der nach N 10 W fällt. Der dem Glimmerschiefer genäherte Gneis bleibt aber immer die herrschende Steinart, und erst jenseits Fenili erscheint wieder Hornblendschiefer, zuerst nur unter den Geschieben der Seitentobel, dann auch anstehend in der Tiefe. Die Thalecke, über die man nach *Zernetz* (4500') hinuntersteigt, besteht ausschliesslich aus einem sehr zerspaltenen, ungeschichteten Hornblendfels, den man indess nur als einen massig gewordenen Hornblendschiefer betrachten kann. Pistacitadern sind auch hier häufig; und an mehreren Stellen zeigt sich das Gestein sehr ochrig, von verwitterten Schwefelkiesen. — Auf beiden Seiten des Thales deuten die gerundeten Gebirgsformen auf krystallinisch flasrige Gesteine. Bis in mittlere Höhe sind die Abhänge fast ohne Unterbrechung bewaldet, über dem Walde ziehen sich Weidgehänge und einzelne röthliche Schutthalden bis auf die obersten Rücken.

Aus der erweiterten, aber durch ihre finsternen Umgebungen wenig freundlichen Thalfläche von Zernetz tritt der Inn wieder in ein enges Querthal, gegen welches die durchbrochenen Schichtensysteme coulissenartige Vorsprünge bilden. Die Steinart ist ausschliesslich, theils massiges, theils schiefriges Hornblendgestein, steil N fallend, bis vertical. Erst wenn man aus dem langen, nur bei der Ausmündung des *Sursurathales* sich etwas offener gestaltenden Engpasse gegen *Süss* austritt, wechselt mit dem Hornblendschiefer Glimmerschiefer, mit weissen und schwarzen Blättchen. Aber nur vorübergehend, das schwarze Gestein verdrängt ihn bald wieder, und noch weit unterhalb *Süss* bis in die Nähe von *Ardetz* bildet es die Hauptmasse des tieferen Abhanges. Das Fallen bleibt constant nördlich, und an dem hoch über *Lavin* aufsteigenden *Piz Gonda* lässt sich deutlich dieselbe Schichtenstellung beobachten.

Wir sehen das Fächersystem sich immer vollkommener entwickeln, je mehr wir gegen Osten fortschreiten. Im Profil von *Tuors* zeigt sich zwar bereits in der Axe desselben der vollständig ausgebildete Gneis mit grossen Feldspathkrystallen, aber nur sehr beschränkt, und niemals dem Granit sich nähernd, in den übrigen krystallinischen Gesteinen tritt der Feldspath beinahe zurück, und die grössere Masse der Gebirge besteht aus Sedimentfelsarten. Durch *Dischmà* und *Sulsanna* finden wir den ausgezeichneten Gneis nur in der Nähe des Schwarzhorn's, ungefähr im Streichen von *Ravesch* und *Tuors*, die Sedimentgesteine sind zwar verschwunden, aber der krystallinische Charakter gelangt nicht zu voller Entwicklung, und die meist schiefrigen Felsarten erinnern an Glimmerflysck und die aus ihm hervorgehenden unvollkommenen Gneise. Ueber *Flüela* dagegen führt uns der Weg durch ein Gebirge vollkommen ausgebildeter krystallinischer Gesteine, und die äussere Natur nicht allein, sondern die Felsarten auch erinnern uns an die Pässe des Gotthardts und der Grimsel.

Wenn man, von *Davos* her, in das *Flüelathal* eintritt, findet man an der Thalecke *Dolomit*, noch zur Dolomitdecke des Scheienhorn's und der

Strela gehörend, die an dieser Stelle auch auf der linken Thalseite sich zeigt, bald aber mit verticaler Trennungsfläche am Gneis abbricht. Die Schichten des Dolomits sind sehr gewunden und in einander verschoben, und eine Menge Spalten durchsetzen das Gestein bis in die kleinsten Theile.

Der *Gneis* fällt constant gegen S200. Es ist dieselbe Steinart, die am Davosersee ansteht; auch wohl feinflasrig, als ein undeutlich schiefriges, stark verwachsenes Gemenge von hellgrünem Feldspath, grauem Quarz und wenig Glimmer. Mit ihm wechselt ziemlich häufig stark glänzender, tobackbrauner *Glimmerschiefer*.

Nur wenig ansteigend erreicht man die Thalstufe des *Tschuggen* (5900') etwa der Mitte des Dischmàthales gegenüberliegend. Hier erscheint auch *Hornblendschiefer*, mit eingeschlossenen rothen *Granaten* von Erbsengrösse, und über den ganzen Pass kehren diese schwarzgrünen Zwischenlager, häufig von gelblich grünem *Epidot* begleitet, immer wieder.

Erst über Tschuggen fängt man an, stärker zu steigen, und tritt nun auch in das Streichen einer neuen Steinart, des grobflasrigen *Gneises* mit grossen Feldspathkrystallen, den wir schon von Ravesch und Dischmà her kennen. Er ist hier zu einem wahren, dem Gotthardter Granit nahe verwandten Granit-Gneis geworden, und hat eine grosse Mächtigkeit erhalten; denn über die ganze Höhe des Passes und bis tief an die Südseite hinunter ist man von ihm umgeben. Nur Hornblendschiefer wechseln auch hier mit demselben, und die Gandecken der Gletscher, die, auf der Höhe des Passes, sich gegen die wüste Fels- und Schuttfläche und den See herabziehen, enthalten nebst diesen Gesteinen nur noch die dunkelgrünen dichten Feldspathe, die, auf derselben Streichungslinie, am Scalettapasse, dort aber in Verbindung mit feinkörnigem, Glimmerschiefer ähnlichem Gneis, vorkommen.

Das Fallen ist bis zum See unverändert südlich gewesen, mit immer steilerem Fallwinkel, zuletzt in's Verticale übergehend. An der Südseite des Gebirges tritt man nun in das System der nördlich, gegen N40W

fallenden Schichten, und noch tiefer geht das Fallen in N 70 W über. Statt Gneis erscheint nun wieder Glimmerschiefer, der nicht selten Granat einschliesst; mit ihm wechselt auch hier häufig Hornblendschiefer, und bis nach Süss bleiben diese Gesteine die herrschenden.

Kaum eine Stunde oberhalb Süss enthält eine grosse Trümmerhalde, die von den Gipfeln der linken Thalseite sich herabzieht, eine beträchtliche Mannigfaltigkeit von Mineralien, die Einschlüsse in dem tobackbraunen, quarzführenden Glimmerschiefer bilden. In der kurzen Zeit, die wir, am Ende der Tagreise, dem Sammeln widmen konnten, fanden wir: 1. *Granat*, braunroth, in undeutlichen Rhombendodekaedern, mit stark abgerundeten Kanten. 2. *Andalusit*, in zum Theil zolldicken vierseitigen Säulen, deren Flächen meist mit stark glänzendem weissem Talk bedeckt und verwachsen sind; zuweilen sind mehrere Säulen durch einander gewachsen; dunkel grünlich grau, fast schwarz, und pfirsichblüthroth, beide Farben oft am nämlichen Individuum. Der tobackbraune Glimmer hat sich an diesen Stücken in grössere Nester zusammengezogen. 3. *Cyanit*, lange, nadelförmige, oder eher schmal strahlige Prismen, blass grünlich oder blaulich grau, v. d. L. unschmelzbar. Dieses dem Rhäticit ähnliche Mineral ist, zum Theil unvollkommen ausgesondert, mit einem gleichfarbigen dichten Mineral verwachsen, das ein Gemenge desselben mit Quarz zu sein scheint und Adern im Glimmerschiefer bildet. In diesen Adern auch viele kleine eingesprengte Granaten, theils als Körner, theils als Rhombendodekaeder. 4. *Turmalin*, schwarze nadelförmige Prismen, v. d. L. ziemlich leicht und mit Aufwallen zu einem hellgrauen Email schmelzend.

In den uns unbekannt gebliebenen östlichen Gebirgen mögen wohl die granitischen Gneise und andere krystallinische Felsarten der Centralmassen eine noch grössere Entwicklung erhalten, indem erst in diesen Gegenden die Selvrettamasse ihre grösste Breite erreicht. Um ihre Verbindung mit den Gebirgen von Oberhalbstein und Davos in's Klare zu setzen, und zugleich die Structurverhältnisse der alpinischen Central-

massen überhaupt an einem noch wenig bekannten Gebirge zu erläutern, glauben wir dieselbe weit genug verfolgt zu haben.

---

## SCHLUSSBEMERKUNGEN.

### 1. *Ueber das Alter des Sedimentgebirges in Bündten.*

Die Seltenheit organischer Ueberreste setzt einer sicheren Altersbestimmung der Schiefer und Kalksteine, welche die Grundmasse der Bündtnergebirge bilden, vielleicht unübersteigliche Schwierigkeiten entgegen; und doch wäre gerade in diesem Theile der Alpen, wo die Sedimente sich quer über das ganze Gebirge ziehen, und den schweizerischen Alpenkalk mit dem Kalk des Monte Baldo verbinden, wo ferner ein weit innigerer Zusammenhang, als sonst wo, zwischen den Sedimentmassen und den Feldspath- und Glimmerbildungen besteht, die Nachweisung jener Epoche besonders wünschbar. Was wir an Material zu einer künftigen Lösung dieser Aufgabe besitzen, wollen wir, zu besserer Uebersicht, noch einmal hier zusammenstellen.

Sehen wir uns vorerst nach Analogieen um in den anstossenden Sedimentgebirgen, so können wir nach drei Richtungen dieselben aufsuchen.

Gegen Mitternacht steht das Kalk- und Flyschgebirge von Bündten in unmittelbarem, oder nur durch das Rheinthal unterbrochenem Zusammenhang mit den Gebirgen des *Prättigau's*, von *Pfeffers* und *Glarus*, und zu Folge der organischen Ueberreste, die wir aus diesen Gebirgen kennen, gehört ihre Hauptmasse der *älteren Kreide* an. Nur sehr beschränkt scheinen im Kalfuserthal, in der Basis dieser mächtigen Kreidebildung, wie in den westlichen Schweizeralpen, unmittelbar über den Feldspathgesteinen, noch Jura- oder Liaslager vorzukommen.

In den Gegenden des *Monte Baldo* und des *Etschthales* erreichen, sowohl die Oolith- als die Kreidebildungen eine grosse Mächtigkeit. Wir kennen die ersteren durch die Petrefacten der Steinbrüche von Roveredo, die letzteren aus der mächtigen Folge von Nummulitenkalk und Scaglia am Monte Baldo und in den östlichen Gebirgen. Aeltere Sedimentbildungen (Muschelkalk) scheinen erst gegen Schio hin aufzutreten, sich aber im Etschthale und westlich, gegen Brescia und Bergamo zu, ganz zu verlieren.

Verfolgen wir endlich den Bündtnerflysch gegen Abend, auf beiden Seiten der Gotthardtmasse durch, in's *Wallis*, so finden wir nur Anhaltspunkte in den *Belemniten* des *Lucmanier* und der *Nufenen*, und den *Oolith-Ammoniten* von *Chamoson* und *Trient* \*). Noch mehr westlich treffen wir, nach Umgehung der Montblancmasse, auf die Talkkalkgebirge der *Tarentaise*, die Hr. Elie de Beaumont als Lias bestimmt hat, oder auf die damit zusammenhängenden von *Aosta*, die Hr. Sismonda als jüngeren Jurakalk betrachtet. \*\*)

Nach keiner Seite grenzen demnach die Bündtner Sedimente an eine Petrefacten führende Bildung, die mit einiger Wahrscheinlichkeit für älter als Lias gehalten werden könnte, und, nach Analogieschlüssen, müssen wir daher auch jene als Jura, oder als Kreide bestimmen, oder annehmen, dass beide Formationen in den Bündtnergebirgen zugleich vorkommen. Die letztere Ansicht findet in geologischen Verhältnissen keine Unterstützung. Von Chur bis Bormio, von Splügen bis Davos zeigen die Kalksteine und Dolomite eine so vollkommene Gleichförmigkeit in allen mineralogischen Charakteren, dass, wenn je noch in demselben Gebirgssysteme von der Steinart auf das Alter geschlossen werden darf, man sie für gleichzeitig entstanden halten muss. Wir haben auch häufig darauf aufmerksam gemacht, dass selbst an Stellen, wo das Kalkgebirge sich in

\*) *Lardy* in den Verhandl. von Basel 1838, p. 106.

\*\*) *Sismonda* in den Mem. di Torino. T. 39.

ein oberes und in ein unteres zu theilen scheint, wie am Landwasser und bei Bergün, beide Theile bald wieder zusammentreten und nur Eine Masse bilden; dass endlich auch der Flysch, bald über dem Kalk, bald unter ihm erscheine und sich als die allgemeine Grundmasse zeige, in welcher die Stöcke von Kalk und Dolomit eingewickelt liegen. Es bleibt daher, wenn wir jener Analogie wirklich vertrauen wollen, nur noch zwischen Kreide und Jura zu entscheiden übrig.

Von den wenigen, nach vieler Bemühung in Bündten aufgefundenen Petrefacten gestatten nur die folgenden eine genauere Bestimmung.

1. *Fucoides intricatus* (s. die Abbild. in Davos. Gebirgsm. T. III. fig. 5). Der citirten Species jedenfalls sehr nahe stehend, wenn je die Identität bestritten werden sollte; von den gemeinen Fucoiden der Fährnern, des Gurnigels, von Siefiring bei Wien u. s. w. in Nichts verschieden. Im Flysch, oder Kalkschiefer.

Fundorte: Alp *Partnun* im Prättigau; *Peist* im Schalfick; Alp *Persenna* bei Davos; *Erosa* bei Davos; *Agneialp* am Julier (p. 136).

2. *Belemnites*. Hr. *Volz*, der kürzlich die Belemniten des Berner Museums untersucht hat, bestimmt den besterhaltenen unserer Bündtner Belemniten als *B. semicanaliculatus* Bl. oder *plicatus* Bl., beide aus dem Néocomien. Derselbe stammt her vom *Weisshorn*, auf der Grenze von Fondéy und Casanna. Das Bruchstück von *Alpascel* (p. 70), so wie diejenigen vom *Piz Beverin* (p. 118) und von der *Agneialp* am Julier (p. 136) scheinen ihm dagegen mehr den Charakter der Liasbelemniten zu tragen.

2. *Pentacrinites*. Ueber die, unter dieses Geschlecht gehörenden, zur Einsicht nach Neuchâtel gesendeten Ueberreste erhalten wir von unserem Freunde *Agassiz* folgende gefällige Mittheilung.

«Besonders interessant war mir das eine *Pentacrinus*-glied, über welches sich vor der Hand allein etwas Bestimmteres sagen lässt. Bekanntlich treten die *Pentacriniten* zuerst im Lias auf; was aus älteren Schichten in dieses Genus eingereiht worden ist, gehört sicher anderen Geschlechtern an. Im

Lias sind sie am zahlreichsten und alle in diesen Lagern vorkommenden Arten sind ziemlich gross; der Durchschnitt des Stiels derselben beträgt meistens mehrere Linien. Eben so verhält es sich mit den Arten aus den mittleren Stockwerken der Juraformation; nur im Oxfordthon und darüber kommt eine kleinere Art vor (*P. subteres*), die durch geringere Dicke des Stiels, so wie durch die beinahe kreisförmige Gestalt der Stielglieder ausgezeichnet ist. Aus der Kreidegruppe sind ebenfalls Pentacriniten bekannt, die an Grösse denjenigen des Lias nicht nachstehen. Aehnlich verhält es sich mit einer Art aus dem Londonthon und mit dem lebenden *P. caput medusæ*, deren Stiel auch eine ansehnliche Dicke hat. Der kleine Pentacrinus aus Graubünden gehört somit nicht zu den bekannten Arten; denn es ist erwiesen, dass der Stiel dieser Thiere mit dem Alter wenig an Dicke zunimmt, und zwar geht diess hervor, theils aus dem Umstand, dass die Stücke derselben Art, die man an einer Localität findet, in ihrem Durchmesser wenig variiren, theils und hauptsächlich daraus, dass die jüngeren Sprossen schon ziemlich dieselbe Dicke haben, wie die ausgewachsenen. Es wäre also keine Hoffnung an dem Bündtner-Pentacrinus einen Anhaltspunkt zur Bestimmung der Formation, aus der er her stammt, zu haben, wenn nicht Gressly in unserem Neocomien, und zwar in den oberen Schichten des gelben Kalks bei Neuchâtel, eine noch unbeschriebene Art Pentacrinus gefunden hätte, die so genau mit der Bündtnerischen übereinstimmt, dass ich beide unbedingt für identisch erklären würde, wenn an dem letzteren einige Structurverhältnisse beobachtet werden könnten, die an dem Neuchâteler deutlich sichtbar sind. Aber trotz dem stehe ich nicht an, dieselben vor der Hand für so ähnlich zu erklären, dass man sie eben so wenig unterscheiden, als mit gutem Gewissen identificiren könnte. In dem speciellen Fall ist aber diese Annäherung wichtiger, als sonst wohl. Der Neuchâteler-Pentacrinus ist nämlich, wie der Bündtner, kleiner als alle bis jetzt bekannten Arten dieses Genus und beide stimmen in ihrer Grösse vollkommen überein, ein Charakter, der, wie aus Obigem hervorgeht, bei diesen Thieren von Bedeutung ist; bei beiden ist die Gestalt der Stielglieder sternförmig, was nicht alle Arten haben, z. B. *P. subangularis* und *subteres* haben es nicht; bei beiden gehn aus dem Centralloche, der Fortsetzung des Darmcanals, kleine Furchen nach den fünf Spitzen des Sterns, was mir in dem Maasse noch bei keinem Pentacrinen vorgekommen ist. Wäre an dem Bündtner Exemplare die Gelenkfläche besser erhalten, so könnte die Vergleichung in allen Punkten durchgeführt werden, und es bliebe über die Identität desselben mit demjenigen des Neocomien gar kein Zweifel übrig.»

Das Pentacrinusstück, von dem im Vorigen die Rede ist, stammt vom *Corno bianco*, bei den Bernina-Wirthshäusern. In den Schutthalden dieses merkwürdigen Kalkstocks, der früher schon in so hohem Grade die Aufmerksamkeit des Hrn. v. Buch erregt hatte, finden sich ziemlich viele, aber meist noch weniger gut erhaltene Ueberreste von Crinoideen. Bei einer späteren Sendung fand Agassiz denselben Pentacrinus in Stücken von folgenden Fundorten wieder: Schutthalden des *Weisshorn's* bei Parpan; *Kalfeuserthal*, *Spitzmeilen* und *Mühlehorn* in der Gruppe des Sernfthales; *Altenalp* und *Gartenalp* in der Gruppe des Sentis in Appenzel; *Engstlenalp* im Berner-Oberland. «Die Crinoidenbreccie dieser



Fundorte, schreibt Agassiz, ist so übereinstimmend mit Stücken vom Mail (Néocomien bei Neuchâtel), dass man sie damit verwechseln könnte.

So beschränkt die Anzahl dieser organischen Ueberreste ist, so erheben sie doch unsere frühere Folgerung, dass die Stelle des Bündtnerischen Kalkgebirges nur in der jüngeren Secundärfolge gesucht werden könne, über jeden Zweifel, denn, weder Belemniten, noch Pentacriniten steigen unter den Lias hinunter. Die Frage, ob wir dasselbe den Lias- und Jurabildungen, oder den Kreidebildungen beordnen sollen, scheint auch eher zu Gunsten der letzteren entschieden werden zu müssen, da, sowohl die Fucoiden, als die Crinoideen für Kreide sprechen. Die Gebirge, die vor wenig Jahren noch als primitive galten, die weissen Marmor von Splügen und Ferrera, die Schiefer, die in Glimmerschiefer und Gneis übergehen, die mit körnigen Feldspathgesteinen auf's Engste verflochtenen Kalkmassen der Centralalpen wären demnach gleichzeitig entstanden mit dem gelben Kalk von Neuchâtel, mit der jüngsten Decke des Jura, und, wenn wir nach der Grundlage dieser Sedimente fragen, so sehen wir uns an die räthselhaften krystallinischen Bildungen von Val S. Giacomo und Bedretto, oder von Scaletta und Flüela gewiesen.

---

## 2. *Ueber die Umwandlung des Sedimentgebirges in Bündten.*

Es sind die Flötzlager in Bündten ursprünglich als gewöhnliche Kalksteine, Mergel-, Thon- und Sandmassen abgesetzt worden, die Lager waren horizontal und von hohem Meere bedeckt. Woher dann die gegenwärtige Beschaffenheit der Steinart? woher die schiefe oder verticale Stellung der Schichten? woher die grosse Erhebung über die heutigen Meere? durch welche Kräfte, mit einem Worte, ist die jetzige Gestalt des Bodens in Mittel-Bündten entstanden?

Eine erschöpfende Behandlung dieser Fragen müsste zu einem geologischen Systeme werden, und zu einem Unternehmen von solcher Bedeutung fühlen wir uns weder Muth noch Kräfte. Nur was sich aus den im Vorigen niedergelegten Beobachtungen von selbst zu ergeben schien, wollen wir hier, als *Endresultate*, noch einmal zusammenstellen.

1. Das wichtigste dieser Resultate wird durch die neuere Geologie von allen Seiten her bestätigt, und die Grundlagen, auf die es sich stützt, sind auch Saussure \*) und älteren Beobachtern keineswegs unbekannt geblieben. Es verlangt diess Resultat die Aufhebung des Gegensatzes, den die Systeme zwischen Sediment- oder neptunischen und krystallinischen oder plutonischen Gesteinen festhalten wollen, und behauptet, dass die massig krystallinischen Steinarten sich aus gewöhnlichen Sedimentgesteinen entwickeln; dass demnach die ersteren nicht als Ursache der Umwandlung, sondern als letzte Stufe derselben betrachtet werden müssen. Als solche *Umwandlungsreihen* haben wir in Bündten kennen gelernt:

1) Kalkstein — krystallinischer Kalkstein — dolomitischer Kalk — Dolomit — Rauchwacke — Talk führende Rauchwacke — Feldspath führende Rauchwacke — Gneis — Gneisgranit — Granit.

2) Kalkstein — krystallinischer Kalkstein — Cipolinmarmor — Talkschiefer — Gneis.

3) Mergelschiefer — talkiger Mergelschiefer — Chloritschiefer — Lavezstein — Serpentin — Gabbro und Diorit.

4) Sandstein — Galestro — Quarzit — Gneis — Granit.

2. Sind die massigen Steinarten nur epigenirte Sedimente, so dürfen wir die *Umwandlung* ganzer Mergelschiefergebirge in Glimmerschiefer und Gneis, oder in grünen Schiefer und Gabbroschiefer, nicht, etwa als Contactverhältnisse, dem Einfluss jener massigen Gesteine zuschreiben.

\*) Saussure, Voy. § 967, 1005 u. a.

Es sind die krystallinisch flasrigen Gesteine nur die Mittelstufe des allgemeinen Processes, der sich in der Ausbildung der massig krystallinischen Gesteine abschliesst.

3. Eben so wenig dürfen wir die *Hebung des Bodens*, sei es in Hochflächen, oder in Kettensystemen, dem Aufsteigen massiger Gesteine aus dem Erdinnern beimessen. Sie kann dagegen eine Wirkung sein der beträchtlichen Zunahme des Volumens der umgewandelten Gesteine, durch Aufnahme neuer Stoffe, Veränderung der Cohäsionsverhältnisse, oder, wenn auch vorübergehende, Erhöhung der Temperatur; oder, sie kann durch dieselben primären Processe entstanden sein, die auch die Umwandlung bewirkt haben, durch den Druck von Dämpfen z. B.; oder es können beide Ursachen zugleich, die erstere beschränkter, die letztere allgemeiner, zur Hebung der aufliegenden Massen über das Niveau der Meere sich vereinigt haben.

4. Aus der Vermehrung des Volumens der durch Wärme flüssigen Gesteine ist auch das *gangartige Eindringen* derselben in die aufliegenden Sedimente und ihr *Ueberströmen* an der Oberfläche zu erklären. Diese Gangbildungen können, unter begünstigenden Umständen, von den gewöhnlichen Contactverhältnissen begleitet gewesen sein.

5. Das *Ausbleiben aller älteren Sedimente* bis auf die Kreide in Bündten lässt sich herleiten, entweder aus dem Trockenliegen des Bodens während der früheren geologischen Perioden, oder durch eine Umwandlung der älteren Sedimente in krystallinische Gesteine. Die letztere Erklärung scheint naturgemässer, da selbst ein grosser Theil der Kreidelager von jener Umwandlung sich ergriffen zeigt; da ferner keine scharfe Grenze zwischen dem Flysch und seiner Unterlage von Glimmerschiefer und Gneis gezogen werden kann; da endlich zwischen der Kreide und den krystallinischen Schiefern nirgends abweichende Lagerung statt findet. Bewegungen des Bodens, die vor der Entstehung der Kreide sich ereignet haben mögen, lassen sich in Bündten nicht deutlich erkennen und nachweisen.

6. *Nach der Bildung der Kreide* haben vorzüglich zwei *Process*e, durch Umwandlung und Hebung, auf die Gestalt des Bodens in Bündten eingewirkt. Ob dieselben gleichzeitig, oder zu verschiedenen Epochen statt gefunden haben, geht nicht vollkommen klar hervor; doch sprechen mehrere Verhältnisse für die letztere Annahme.

7. Der eine dieser *Process*e, derjenige, den wir als den *älteren* betrachten, hat Spuren in der Richtung von S30 O nach N30 W hinterlassen, in der Richtung des Systems des Monte Viso von H. Elie de Beaumont, oder des Pindischen Systems in Albanien. Auf der Linie von Oberhalbstein wird sein Einfluss bezeichnet durch eine allgemeine Hebung des Bodens, ohne beträchtliche Störung der horizontalen Lagerung, durch Umwandlung des Flysches in grüne Schiefer und Ausbrüche von Serpentin, Gabbro, Hornblendgestein, Syenit und Granit. Westlich von Oberhalbstein zeigt er sich in einer weithin herrschenden Einsenkung der Schichten nach NO, und der davon abhängigen Bildung von Meridianketten und Meridianthälern.

8. Der andere *Process* ist der Richtung der Alpenkette, von S60—70W nach N60—70O gefolgt, und hat nur zu beiden Seiten und im Süden von Oberhalbstein stärkeren Einfluss gewonnen. Es hat sich dieser geäußert durch die Aufrichtung *fächerförmiger Centralmassen*, deren Kern aus krystallinisch flasrigen Gesteinen besteht. Die Aufeinanderfolge dieser Steinarten in den Centralmassen steht sichtbar zu der Fächerstructur in enger Beziehung, so dass man die Umwandlung der Sedimente in Glimmerschiefer, Gneis und Gneis-Granit und die Aufrichtung der Fächer wohl nur als gleichzeitige, oder doch als von einander abhängige Phänomene wird betrachten können. Aus dem krystallinischen greift die Fächerstructur in das Sedimentgebirge ein; sie kann daher nur durch eine mechanische Bewegung früher horizontaler Lager in stark geneigte und verticale Stellungen, und nicht durch krystallinische, oder Cohäsionsverhältnisse entstanden sein.

9. Jünger als beide Processe erscheint grösstentheils die Bündnerische *Thalbildung*. Nur im Gebiet der Centralmassen, wo steil geneigte Schichtung herrscht, findet man gleichzeitig entstandene, durch die Schichtenstellung bedingte *Hebungsthäler*; auch hier jedoch durchschneiden spätere *Quer- und Spaltenthäler* selbst die im Sinn der Alpen streichenden Ketten. Im höheren Oberhalbstein, in Schams, auch wohl in Oberengadin und Bergell scheint das Zurücksinken des Bodens grossen Einfluss auf die Thalbildung ausgeübt zu haben; man erkennt in jenen Vertiefungen der Oberfläche einzelne, oder an einander gereihte *Kessel- oder Einsenkungsthäler*. In allen diesen Thälern, vorzugsweise aber im Gebiete von Oberhalbstein, hat unstreitig die Auswaschung eine wichtige Rolle gespielt, und mehrere Thäler von bedeutendem Umfang müssen grösstentheils als *Erosionsthäler* betrachtet werden.

---

Zu pag. 93.

Der *Serpentin* von Marmels zeigt ein sp. Gew. = 2,634; Härte = 3,8. V. d. L. unschmelzbar, sich weiss brennend; beim Glühen brenzlich riechendes, schwach säuerliches Wasser gebend. Das Resultat zweier nahe übereinstimmender Analysen gab als dessen Bestandtheile:

Kieselerde	.	.	38,886	.	.	20,204	Sauerstoff
Thonerde	.	.	4,672	.	.	2,482	
Talkerde	.	.	36,410	.	.	14,093	
Eisenoxydul	.	.	8,636	.	.	4,966	
Wasser	.	.	11,372	.	.	10,108	
			<hr/>		99,976.		

Die nach den Sauerstoffverhältnissen gebildete Formel,  $2 \frac{\text{mg}}{\text{fe}} \left\{ \begin{matrix} \text{Si} \\ \text{Al} \end{matrix} \right\} + \text{Mg Aq}^2$ , ist wesentlich dieselbe, die Lychnell gefunden hat.

Vergleicht man diese Zusammensetzung des Serpentin's mit derjenigen des Gabbro, so zeigt sich sogleich, dass, nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Chemie, der Gabbro keineswegs als eine körnige Entwicklung des Serpentin's betrachtet werden darf, so bestimmt auch die geologischen Verhältnisse einen innigen genetischen Zusammenhang beider Steinarten nachzuweisen scheinen. — Bei der Mehrzahl der Gesteinsübergänge, auf welche die Geologie ihre Theorie der Umwandlungen gründet, betrifft, von Seite der Chemie, ein Haupteinwurf die Kalkerde, die man, zum Theil, oder gänzlich, aus den Verbindungen verschwinden sieht, ohne dass man genügend nachzuweisen vermöchte, was aus derselben werde. In gleichem Verhältniss, in welchem der Kalkerdegehalt abnimmt, sieht man gewöhnlich denjenigen der Kieselerde, oder der Talkerde zunehmen.

---

---

## Übersicht

### DER IN BÜNDTEN GEMESSENEN HÖHEN.

---

Eine Zusammenstellung von bündtnerischen Höhenmessungen wurde zuerst von dem verdienstvollen *Ulysses von Salis* versucht, im B. Sammler von 1811. Sie enthält ungefähr hundert Bestimmungen, die aber grösstentheils verworfen werden müssen. Die Mehrzahl beruht auf den barometrischen Messungen von *Scheuchzer*, aus dem Anfang des 18<sup>ten</sup> Jahrhunderts, und auf trigonometrischen Bestimmungen, die von den Bearbeitern des *Meyer'schen* Atlas, den Ingen. Weiss und Müller, herrühren sollen, von neueren Angaben aber zum Theil bis gegen tausend Fuss abweichen. Die barometrischen Bestimmungen von *Ul. v. Salis* beruhen auf den Messungen, die er gemeinschaftlich mit *C. Escher*, auf einer Reise im J. 1806, ausgeführt hat, und deren Resultate wir unten nach neuer Berechnung mittheilen. Die trigonometrischen Messungen von *Mag. Roesch*, dem die Topographie von Bündten so Vieles verdankt, haben wir ebenfalls aufgenommen, seine Resultate aber, nach der neueren Bestimmung der Höhe von Chur, um 60 F. erniedrigt.

Die Grundlagen unseres Verzeichnisses sind, mit der für das Folgende gewählten Bezeichnung, aus bereits in Druck erschienenen Schriften :

R, die trigon. Messungen von *Mg. Ræsch*

O, die trigon. Messungen des K. K. östreich. Generalquartiermeisterstabes, mitgeth. im Atlas des Lomb. Venet. Königr.

B und E, die trigon. Messungen der Hrn. *Buchwalder* und *Eschmann*, in Auftrag der schweizer. Militärbehörde, mitgetheilt in einer kleinen Schrift, Zürich 1838.

v B, barom. Angaben von *H. von Buch*, in der Reise über den Bernina. Berl. Akad. 1818, nach corresp. Beob. in Zürich.

K, barom. Angaben von *H. Kasthofer*, in seiner Reise durch Bündten, im J. 1822, nach corresp. Beob. in Bern. Die Höhen sind meist nur in Hunderten von Fuss angegeben.

Hg, barom. Angaben von *H. Hegetschweiler*, in seiner Reise auf die Tödikette. Zürich 1825.

Zum erstenmale erscheinen ferner die folgenden, ausschliesslich barometrischen Bestimmungen, von

CE, *Conrad Escher von der Linth*, aus den Originalbeobachtungen sämmtlich neu berechnet, für 1806 durch *Hofmeister* und *Wolf* in Zürich, für die folgenden Jahre, 1811 bis 1819, durch *B. Studer* in Bern. Die corresp. Beobachtungen wurden, für die früheren Reisen in Marschlins oder Chur, für alle späteren in Zürich, veranstaltet.

AE, *Arnold Escher von der Linth*, Beobachtungen auf unserer Reise im J. 1835, durch A. E. berechnet nach corresp. Beob. in Zürich und Mailand.

H, Hr. *Professor Heer*; diese zahlreichen, während den Jahren 1833 bis 1835 gemachten Messungen wurden, nach corresp. Beobachtungen in Zürich, theils durch Hn. *Heer* selbst, theils durch Hn. *Hofrath Horner*, theils durch *Arnold Escher* berechnet und revidirt.

Hr, Hr. *Hofrath Horner*, Messungen im Jahr 1813, von ihm selbst berechnet.



JH, Hr. *Jakob Horner*, Messungen im Jahr 1829, berechnet durch H. Hofr. *Horner*.

U, Hr. *Melch. Ulrich*, Messungen im Jahr 1834, berechnet durch H. Hofr. *Horner*.

MB, Hr. *Bayer K. Preuss. Major*, Messungen im Jahr 1824, von ihm selbst berechnet nach den corresp. Beob. in Zürich, Genf und dem St. Bernhard.

St, *B. Studer*, Messungen im Jahr 1838, nach corresp. Beob. in Zürich, von ihm selbst berechnet.

Bei Höhen, die durch mehrere Messungen bestimmt worden sind, haben wir vorerst den trigonometrischen Resultaten unbedingt den Vorzug vor den barometrischen eingeräumt; aus nur barometrischen Resultaten ist das arithmetische Mittel genommen worden; wenn jedoch einige dieser Resultate auf derselben Reise und mit dem nämlichen Instrument waren erhalten worden, so haben wir diesen, in der Berechnung des Mittels, nur das halbe Gewicht gegeben. Die kleinen Zahlen hinten über den Mittelresultaten aufeinander folgender Beobachtungen bezeichnen die Anzahl einzelner Beobachtungen.

Die Höhen sind in französischen Fussen über dem Meere angegeben. Die absolute Höhe des Zürich-See's, bei tiefstem Wasserstand, = 1250 F. angenommen. Da weder die Genauigkeit der grossen Mehrzahl der Messungen die Angabe der Höhen bis auf einzelne Fusse gestattet, noch auch irgend ein naturwissenschaftliches oder topographisches Bedürfniss eine so scharfe Bestimmung verlangt, so sind wir in unseren letzten Angaben bei der runden Zahl der Zehner stehen geblieben.

Mit den innerhalb der Bündtnerischen Grenzen befindlichen Höhen haben wir auch viele aus den zunächst angrenzenden Gebirgsgegenden vereinigt.

Aus der Anzahl und den Differenzen der einzelnen Bestimmungen lässt sich der Grad der Zuverlässigkeit beurtheilen, der dem Mittelresultat

beizumessen ist, und künftige Reisende werden hieraus ersehen, welche Höhen vorzugsweise noch einer schärferen Bestimmung bedürfen.

Berechnet man, zur Schätzung der absoluten und relativen Genauigkeit der zahlreichsten Bestimmungen, die Differenzen der Resultate der Herren *von Buch*, *Kasthofer*, *Conr. Escher* und *Heer* von den Mittelresultaten, die durch mehr als drei Bestimmungen gegeben sind, so ergibt sich Folgendes:

Unter 9 Resultaten von *H. von Buch* stehen 4 über dem Mittel, mit einer Mitteldifferenz  $= + 162$ , die übrigen 5 unter dem Mittel, mit der Mitteldifferenz  $= - 124$ . Hiebei ist jedoch die offenbar fehlerhafte Höhe des Juliers  $= 7634$  mit berücksichtigt worden, während sie zur Berechnung des Mittels nicht beigezogen wurde, das einzige Mal übrigens, da wir uns eine Elimination erlauben haben. Lässt man diese Höhe auch hier weg, so reducirt sich die positive Mitteldifferenz auf  $+ 46$ , und die negativen Differenzen erhalten ein beträchtliches Uebergewicht. Von 8 Differenzen steigen 4 über 100, keine auf 180. Unter 7 Resultaten von *H. Kasthofer* steht 3 über dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= + 50$ ; 3 unter dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= - 47$ ; 1 trifft ganz überein. Von den Differenzen steigen 4 über 50, keine auf 100. Unter 20 Resultaten von *C. Escher* stehen 8 über dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= + 45$ ; 12 unter dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= - 43$ ; 9 Differenzen steigen über 50, 2 über 100, keine auf 140. Unter 22 Resultaten von *H. Heer* stehen 14 über dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= + 81$ ; 7 unter dem Mittel, die Mitteldifferenz  $= - 37$ ; 1 stimmt genau überein; 13 Differenzen, alle positiv, übersteigen 50, 7 übersteigen 100; keine 180.

Nach diesen Ergebnissen kann der mittlere Fehler bei einer einzelnen barometrischen Messung nicht unter  $\pm 50$  F. angenommen werden; es kann der Fehler aber auch bis gegen 180 F. steigen. Diese allerdings hohen Zahlen werden uns nicht zu sehr befremden, wenn wir die grosse Entfernung der verglichenen Barometer, und ihre Trennung durch hohe Schneegebirge, die Verschiedenheit der Beobachtungszeiten, die Ungleich-

heit der Instrumente, die nicht immer gehobenen Zweifel über die Genauigkeit der Beobachtungen auf Gebirgsreisen, und so viel andere Quellen von Fehlern berücksichtigen, und uns erinnern, dass selbst bei gleichzeitigen Beobachtungen genau verglichener Instrumente, auf Rigikulm und in Zürich \*), oder bei der Berechnung der zehntägigen Mittel von Bern und Basel \*\*), Differenzen von  $\pm 30$  F. vorkommen; obgleich in beiden Fällen die horizontalen und verticalen Distanzen der Instrumente und alle übrigen Verhältnisse weit günstigere Resultate erwarten liessen.

Albula, Höhe des Passes: v B 7238; H 7232;	
U 7167; St 7150	7200
oberste Lerchtannen, S seite: v B 6785.	
St 6560	6670
Alpisellapass, zwischen Livigno und Fräele:	
H 7103; St 7120	7110
oberste Lercht. O seite: H	6630
Altein, westlich von Glaris in Davos: K	7250
oberste Lercht. O seite K	6580
Alvaschein, CE 3151; St 3030	3090
Alveneu, Dorf: CE	3730
Bad: v B 2768; 3100 K	2930
Andeer, CE 2979; 3014 <sup>2</sup> ; K 3100	3030
Rheinhöhe: St	2920
Au, bei Bevers: K	5270
Augstenberg, über Malans: R	7360
Bergün: v B 4264; H 4382; U 4160;	
St 4090	4220
Albulabrücke oberhalb Bergün: v B	4880
Maiensäss, Albulastrasse: v B 5459;	
St 5410	5430
St. Bernhardin, Bad: K 5080; H 5060 <sup>4</sup>	5070
Hohe des Passes H	6540
Pass zw. Misocco und Calanca: H	8320
Bernina, Wirthshäuser: v B 6205; H 6494 <sup>4</sup> ;	
AE 6439; St 6290	6380

Höhe des Passes: v B 7181; H 7028;	
AE 6914	7040
Monte Minur: v B	8920
Iago bianco: v B	6800
La Motta: v B	6140
La Rosa: v B	5770
Pischiadell: v B	4520
piano di Cavaglia: AE	4440
Monteratsch: v B	9440
Brücke am Flatzbach: v B	5670
oberste Lercht. S seite: v B	6930
Nseite: v B 6970; H 7010; 6990	
am Monteratsch: v B	7410
Beverin, Piz: B et E	9233
Bevers: H 5309 <sup>2</sup> ; H 5259 <sup>4</sup> ; St. 5255 <sup>2</sup>	5270
Beversberg: H	8460
östlicher: H	9270
Beverser Alphütte, im Beversthal: H	6970
Bonaduz: CE	2070
Bormio: O	3760
Braila, Kirche, im Engadin: H	5170
Brienzen: v B	3480
Brigels: CE 4040; 4025 <sup>4</sup> ; AE 3972; Hg 4050;	
H 3927; U 4121;	4020
oberste Tannen: AE	6120
Brusio, oberh. Tirano: v B 2648; AE 2397 <sup>2</sup> ; 2520	

\*) Schweiz. Denkschr. 1833.

\*\*) Schweiz. Denkschr. 1838.

Calanda : B	8640	Disgrazia, Mte della : O	11310
Camogasc, in Oberengadin : H	5250	Disruter- (di Saruta) Scheideck, Vrinthal : CE	7590
Serlealp : H 6278 <sup>4</sup> ; 6143 <sup>2</sup> ; 6256 <sup>2</sup>	6240	Dossrotond, Pass von S. Maria nach Fräle, Baumgrenze : H 6869; St 6940	6900
Prünnasalp : H	7080	Dürrenboden, am Scaletta : CE 6071 ; H 6286	6180
Campfeer : K	5650	Emmetpass, von V. d'Emmet nach Splügen- pass : H	7200
Campo, bei Olivone : CE	3740 <sup>2</sup>	Erosa, bei Davos : CE 5697 ; AE 5710	5700
Campodolcino : CE 3324 ; H 3440	3380	See, unter der Schafalp : AE	5990
Campsut, in Avers : H 5282 ; 5127 <sup>2</sup>	5200	See auf der Schafalp	6700
Canicul, in Ferrera : CE 4445; H 4667 <sup>2</sup> ; St 4530	4550	Eroserbach, Mündung in die Plessur bei Langwies : CE	4830
Casaccia, im Bergell: CE 4393; 4553; K 4600; H 4500 ; St 4500	4510	Eschiapass, von Bergün nach Madulein : St	8770
Casaccia, am Lukmanier : CE	5610	Falknis : R	7600
Casannapass : O	8290	höchste Spitze des Kamms über Maien- feld : R	7820
Chiareggio, in Val Malenco : AE	5000	Ende des Kamms über Maienfeld : R	6790
Chiavenna : O	1020	Faller, Kapelle, zugleich Holzgrenze : St.	5790
Chiesa, in Val Malenco : AE	2980 <sup>3</sup>	Fanaserberg, ob Schiers am Rhätikon : R	6340
Chur : B	1780	Ferrera, Eingang von Schams her : H	3810
Churwalden : v B 3767 ; K 3800	3780	Schmelzhütte : CE	3920
Cinascal, bei Scans : CE	4870 <sup>2</sup>	unter dem Dorf am Aversbach : St	3840
Clus, Ausgang des Prättigau's : Hr	1730	das Dorf : H	4160
Combolo Mte, westlich von Tirano : O	8930	Ferro, Piz del, NO von Livigno : O	9350
Compadiels, bei Sumvix : H	3010	Fettan : CE 4900 <sup>2</sup> ; H 5110; 5130 <sup>4</sup>	5070
Compatsch, in Samnaun, Wirthshaus : H	5300 <sup>3</sup>	oberste Lercht. : H	6620
Conters, in Oberhalbstein : v B 3634 ; JH 3666 <sup>2</sup>	3650	Grat Minchuns, oder Fimperspitze : H	9170
Rhein : St	3510	Fideris, Dorf : Hr	2750
Cornamara Mte, zw. Val Malenco und Val Fontana : O	8640	Bad : Hr	3250
Cresta, Kirche in Avers : H 6186 <sup>3</sup> ; 6108 ; AE 6162	6160	Quelle : H	3430
Aversbach : CE	5570	Fienopass, von Bernina nach Livigno : St	7620
Cresta, im Oberengadin : v B	5230	Filisur : v B 3173; K 3200 ; H 3248	3210
Curvér, Gipfel zw. Schams und Oberhalb- stein : St	8650	Bärenboden : K	6220
kleiner, nördlich vom vorigen : St	8480	Finstermünz : CE	2990
Davos, am Platz: CE 4700 <sup>2</sup> ; 4848; AE 4772; 4750 Dörfli : H	4810	Fläscherberg, bei Maienfeld : R	3130
Pass nach Klosters : H 5116; AE 5125	5120	Flims : CE	3470 <sup>3</sup>
Felskamm zw. Schafalp und Thäli : AE	8220	Flix, Cima di : B und E	9870
Disentis : H	3600	Flüela, Höhe des Passes : K	7400
		Tschuggen : K	5900

Forcella, v. Septimer nach Avers : CE 8298 ; AE 8300	8300	Klosters , Prättigau : K 3735 ; Hr 3648 ; H 3720	3700
Foscagno Mte zw. Livigno und Viola : O	9500	Küblis, an der Landquart : Hr	2390
Fürstenau : CE	2000	Kumbels, Lugnetz : CE	3680 <sup>2</sup>
Gallegione, Mte, nördlich im Bergell : O	9640	Kunkelpass, von Reichenau nach Pfeffers : CE	4150
Pass : St	8350	Langwies, Schalfik : CE 4267 ; AE 4245 <sup>8</sup>	4250
Ghirone, N von Olivone : CE	3980	Lavin , Unterengadin , unter der Kirche : H 4430 ; 4338 <sup>2</sup>	4380
S. Giacomo di Fräle : H 6048 ; St 6080	6060	Lenz, Kirche : v B 3909 ; St 4010	3960
Glasscheideck, von Tuis nach Savien : CE 5697 ; U 5813	5750	Lenzerheide, Scheidecke : v B 4592 ; 4621 ; CE 4820	4680
Glurns : CE	2780	Levarone, zw. Camogasc und Val Federia , Alphütte : H	6880
Greinascheideck, von Sumvix nach Blegno : CE 7443 ; H 7065	7250	Pass nach Livigno : H 8818 ; 8900	8860
ebene , N von voriger : CE	6890	höchster Berghintergrund : H	9580
Grono, in Val Misocco : H	1140	Linard, Piz : H	10700
Groppera, Piz , O von Campodolcino : O	9080	Livigno, Hauptdorf : O	5750
Grossotto, im Veltlin : O	2050	Kapelle über demselben : H	6040
Grüsch, im Prättigau : CE 2115 ; H 1980	2050	oberste Lercht. gegen S. Giacomo : H	6820
Guarda, Unter-Engadin : K 5179 ; CE 5085 ; H 5176 <sup>2</sup> ; St 5150	5150	Lüpass, von Scarl nach Münsterthal, zugleich Baumgrenze : St	6950
Guscheralp, bei Luziensteig : R	5570	Lumbrein, Lugnetz : CE	4560
Hinterrhein : CE 4988 ; 5074 ; H 5174	5080	Lun, Piz, am Calanda : CE	4580
Ursprung des Rheins : H	7220	Lüschensee, am Heinzenberg : CE	5960
Hochwang, bei Chur : R	6530	Madrispass, von Madris nach Savogno : AE	8240
Jenaz, Brücke : Hr.	2210	lago di acqua fraggia : AE	6470
Ilanz : K 2200 ; CE 2185 <sup>2</sup> ; 2377 ; 2233 ; H 2182 ; 2240 ; U 2240	2240	Maienfelder-Furkeli, Davos : AE	7560
Isola, in V. S. Giacomo : K 3900 ; CE 3875 ; 3890		Malans : H	1760
Juf, in Avers : CE 6525 ; AE 6396 ; H 6734 ; 6621	6570	Malix : v B	3440
Julier , Höhe des Passes : CE 7113 ; H 7172 ; 7220 ; JH 7067 ; U 7145 ; St. 7000	7120	Malixerberg : R	7540
oberste Lercht. Seite : H 6512 ; St 6500 ; 6510		Maloja : K 5730 ; CE 5622 ; AE 5623 ; H 5634 ; St 5640	5650
Kalfreisen, Schalfik : CE	3870	Mals : CE	3290
Kalkgrind, W von Glaris in Davos : AE	9050	S. Maria, Münsterthal : CE 4270 <sup>2</sup> ; H 4215 : St 4210	4250
Kanalluckli, Pass von Vals nach Rheinwald : CE 8745 ; H 8792	8770	S. Maria, S. Giacomothal, oberste Kastanien- bäume : K	2750
Fläche, N vom Pass : H	7620	S. Maria, Lukmanierscheideck : CE 5940 ; 5956	5950
Kistenpass, zw. Glarus und Bündten : CE 8440 ; Hg 8650 ; AE 8434 ; U 8460 ;	8500	Hospitz : CE 5776 ; 5757 <sup>2</sup>	5770

Marmels, Oberhalbstein : CE 5080 ; St 4930 ; 5000	Insel auf Roseg : H	7150	
Marschlins : R	1712	Porcellizzo, Piz, zw. Bergell und Masino : E 9470	
Martinsbruck : CE 3138 <sup>2</sup> ; H 3248	3190	Porta, Bergell, oberste Kastanienbäume : K 2810	
Martinslochpass ; CE 8176 ; H 8100	8140	Poschiavo, die Stadt : v B	3090
Masuccio Mte, N von Tirano : O	8680	der See : v B 2962 : AE 3030	3000
Mathon, N am Calanda : R	5530	Raveschsee'n, O von Bergün : St	7950
Medels, Kirche S. Martin : CE	4150	pässe, nach Sertyg : St	8220
Misocco : H	2390	grat, zw. Ravesch und Ducan : St	8580
Mittagplatte, bei Marschlins : R	4250	Reichenau, Rhein : MB	1810
Molins, Oberhalbstein : v B 4758 ; St 4580	4650	Schloss : AE	1880
Monteraschkerscheideck, zw. Sumvix und		Reschenscheideck : CE	4490
Blegno : CE	7110	Robialp, über Brigels : CE 6606 ; AE 6702	6650
Thalboden : CE	4530	Tanngrenze : AE	6130
Morbegno : O	800	Roccabella, am Julier : St	8420
S. Moritz, Sauerbrunnen : v B 5391 ; CE 5504,		Rofna, Ebene, in Oberhalbstein : St	4310
H 5654 ; 5560 ; St 5450	5510	Roseinalp, am Tödi : U	6200
Dorf : v B 5571 ; K 5500 ; CE 5673 <sup>2</sup> ;		Rothhorn, bei Parpan : CE	8900
H 5631 <sup>2</sup>	5590		
oberste Lercht. an der Sseite : v B	6980	Saas, im Prättigau : Hr	3000
Muretpass : O	8050	Samaden : K	5300
Mutta, Ober- : St	5760	Samnaunpass nach Remüs : H	8870
Nauders : CE	4090	Sandgrat, Pass am Tödi : Hg 8699 ; U 8670 ;	8680
Nezza, Maiensäss Baul, zugleich Holzgrenze,		Savien, obere Brücke bei der Kirche : CE	3970
Schams : St	6020	Savognin : CE	3640
pass, am Curvér : St	8230	Scalettapass : CE 8015 ; H 8176	8100
Nufenen, Rheinwald : H	4990 <sup>2</sup>	oberste Lercht. S abhang : H	6630
Oberalp pass, Gotthardt : CE	6700	Scalino, Piz, O von Lanzada : O	10250
Ofenpass : CE	6660	Scanfs : St	5070
Ofen-Wirthshaus : H	5610	Scaradrapass : CE 8527 ; H 8580	8550
Olivone, CE 2860 <sup>2</sup> ; 2777	2820	alphütten : H	5490
Panix : CE 4066 ; H 4078 ; 3980 <sup>2</sup> ; U 4019	4040	Scarl, Dorf : K 5580 ; H 5620 <sup>2</sup> ; St 5620	5610
Panixerpass : CE 7375 ; Hg 7349 ; H 7462 ;		Maduleinstollen : K	6500
U 7470	7410	Pass nach Münster, auch oberste Lercht.	
Ranäschkealp, an der Sseite : H	5730	des S abhangs : H	7150
Parpan : v B 4585 ; CE 4471 <sup>2</sup> ; JH 4531 <sup>2</sup> ;		oberste Lercht. des N abhangs : H	6950
AE 4545	4530	Scesaplana : B	9130
Pass zw. Rothhorn und Weisshorn : AE	8150	kleine Furke östl. : CE	7180
Peist, Schalfick ; CE	4140	Lunerscheideck : CE	6940
Pontresina : v B 5400 ; 5666 ; 5620	5560	Scheideck, zw. Lunersee und Rells-	
Alphütte Misemm, Fuss des Roseg-		thal : CE	7390
gletschers : H	6210	Scheiterberg, bei Marschlins : R	5460
		Schiers, Prättigau : Hr	2040

Schleuis, bei Ilanz : K	2300	Sumvix, Kirche : CE 3262 <sup>2</sup> ; H 3252	3260
Schmelzboden, Davos : CE 4145 <sup>6</sup> ; K 4200	4160	Thal, Kapelle : H	3730
Schmitten, bei Alveneu : CE	4010	Bad : CE 3977; H 3981	3980
Schuls : CE 3752 <sup>2</sup> ; H 3630	3690	Hintergrund : H	5140
Schwefelquelle : H	4290	Surrhein : CE	2740
Schwarzhorn, in Dismà : B u. E	9700	Süss : K 4300; St 4440	4370
Schweizerthor : CE	6810	Flessalp : H	7570
Ofenjoch, zw. Rellsthal u. Gauerthal : CE 7230		Suvrettasee, oberhalb Campfeer : St	8040
Schyn-Kapelle, Albulathal : CE	3600		
Scopigipfel : CE	9850	Tambohorn : B u. E	10120
scheideck in's Boverinothal : CE	7580	Tarasp, Dorf : H	4000
Sedrun, in Tavetsch, Rhein : CE	3970	Salzbrunn : H	3760
Dorf : K	4360	Tiefenkasten : v B 2612; CE 2640; JH 2707; 2650	
Höhe zw. Tavetsch und Medels : CE	5080	Tinzen, Einfluss des Errbachs in den Rhein :	
Seewis, Prättigau : CE	2960 <sup>4</sup>	St	3770
Goldrosenpass, zw. Seewis- und Schiers-		Mühle am Errbach : v B	3830
thal : CE	6600	Tirano : O	1410
Selva, Tavetsch : K	4790	Madonna : v B	1440
Septimerhospitz : CE 7101; 7166; AE 7147	7140	Ponte del Diavolo : v B	2430
Serneusbad, Prättigau : H	3100	Tischalp, Huthaus, oberh. Bergün : St	7200
Sertyg : K	5650	Pass nach Tuors : St	7970
Sils, Oberengadin : K 5600; CE 5577; H		Trafoi, Wirthshaus über Trafoi im Wald :	
5574; AE 5628 <sup>3</sup> ; St 5580	5600	H	6180
Silvaplana : v B 5469; CE 5628; H 5798;		Trons : K 2700; H 2653; U 2665	2670
JH 5622; St 5560	5620	Tschapin, Ober-, am Heinzenberg : CE	4830
Soazza, Kapelle, Misocco : H	1940	Tschingel, westl. von Scesaplana : CE	7980
Soglio : St	3360	furke, östl. vom Tschingel : CE	7330
Solis, Albula : St	2160	Tuorser-Maiensäss, ob Bergün : St	5350
Dorf : St	3450	Pass nach V. Fontana : St	7970
Sondrio : O	1070	Tusis : CE 2255 <sup>2</sup> ; U 2345	2300
Sovranaalp, im Madristhal : St	6060		
Splügen, Rhein : MB	4430	Umbrailpass : O	9180
Dorf : CE 4481; 4472 <sup>2</sup>	4480	oberste Lercht. N seite : H	6530
Pass : O	6510	Urschialp, oberh. Fettan in Tasna : H	6870
Pian della Casa : CE 5859; K 5850	5850		
Spondalunga, Wirthshaus, Stilsferstrasse :		Valendas, Vorder-Rhein : CE	2580
H	6160 <sup>3</sup>	Vallettapass, von Stalla nach Avers : CE	
Stalla : v B 5457; CE 5559 <sup>2</sup> ; H 5624; 5466;		8080; H 8144	8110
JH 5477; U 5492; St 5467	5500	Vals, am Platz : CE 3895; H 3855 <sup>2</sup> ; MB	
Stilsferjochpass : O	8610	3794.	3850
Strelapass : v B 7251; CE 7437, 7378	7350	Valserberg, Pass nach Rheinwald : CE 7673;	
Sulsanna, bei Scanfs : H	5420	H 7771; MB 7680	7710
		oberste Tannen, SW abhang : H	6100

Valzeinerberg, bei Marschlins : R	4280	Wiesen, unterh. Davos : K 4400 ; CE 4642	4520
Vaz , Unter- : CE	1770	Wormserjoch : H	7750
Versam , Vorderrheinthal : CE	2780		
Vettis : AE	2910	Zaportalphütte, Rheinw. : H 6218 <sup>2</sup> ; 6101	6160
Vicosoprano , Bergell : K 3380; H 3285 ;		Zerfreila , hinter Vals : CE 5426; H 5545 <sup>2</sup>	5490
St 3280	3310	Zernetz, Engadin : K 4440 ; CE 4448 ; H	
Vogelberg, Mte Vingello , Rheinwald : H	8590	4600 ; St 4520	4500
Vrin : CE	4650 <sup>3</sup>	Ziteil, Oberhalbstein : St	7520
		Zitzers : U	1790
Weissenstein, am Albula : v B6282; H 6434;		Zutz : K 5300 ; H 5337	5320
St 6240	6320	Zwei Brüder, oberh. Vaz : R	4480



## ERKLÄRUNG DER TAFELN.

### TAB. I.

Die Karte von Mittel-Bündten schliesst sich an diejenige der Davoser Gebirgsmasse an, die wir im ersten Bande der Denkschriften n. F. mitgetheilt haben. Die Punkte Calanda, Schwarzhorn, P. Beverin, Cima di Flix, Tambo, P. Porcellizzo, sind nach den Resultaten der neuen schweizerischen Vermessung, die Richtungen der Hauptthäler, theils nach Wörl, theils nach dem österreichischen Atlas der Lombardie, theils nach den neuen Strassenplanen, theils nach Boussoleangaben eingetragen worden. Eine beträchtliche Anzahl Messungen mit dem Spiegelsextant, die jedoch nicht hinreichen, um ein secundäres Dreiecknetz zu bilden, haben uns gezeigt, dass in jenen Richtungen und in der Lage der Mehrzahl der Gipfel keine groben Unrichtigkeiten zu befürchten sind. Der Detail der Thal- und Gebirgsverzweigung beruht auf mehrfachen eigenen Situationszeichnungen, und, obgleich Vieles noch fehlerhaft sein mag, da wir die topographische stets der geologischen Untersuchung nachsetzen mussten, so dürfen wir doch behaupten, dass, auch in ersterer Beziehung, die Karte besser sei, als alle, die bis jetzt über Graubündten erschienen sind. Wer mit dem Lande durch eigene Ansicht bekannt ist und die Partien von Val Tuors, Cima di Flix, Faller, Fianell nach unserer Darstellung mit derjenigen von Wörl, Keller, Amstein, oder gar Meyer vergleichen will, dürfte dieses Zeugniß uns nicht versagen können. Die wesentlichsten Fehler möchten immer noch auf die Gegend der Bevers- und Flixgletscher, und die Gruppe zwischen Avers und Stalla fallen. Der Thalhintergrund von Juf bis zur Forcella z. B. liegt nicht in der Verlängerung von Avers; auch die Lage des Piz Morter stimmt mit unseren Zeichnungen und das höhere Oberhalbstein mit den Strassenplanen nicht ganz überein.

### TAB. II.

Die *Ansicht von Gravesalvas* ist von einer Höhe oberhalb Isola, von der aus jedoch der See Longhin nicht erblickt wurde, diejenige des *Curvér* von dem Passe aus gezeichnet worden, der, neben dem P. Beverin durch, aus Schams nach Savien führt. Beide machen nicht Anspruch auf mathematische Genauigkeit und sollen nur die Erläuterung der geologischen Verhältnisse unterstützen.

### TAB. III.

Die Ansichten der beiden Seitengebirge von *Oberhalbstein* sind aus Zeichnungen zusammengesetzt, deren Standpunkte, für die Ostseite, am Ausgang von Faller und auf

Roccabella, für die Westseite, auf dem Rothenberg und oberhalb Sees, gewählt wurden. In Folge dieser Entstehung erscheinen die hinteren Höhen, im Verhältniss zu den vorderen, die unter dem Standpunkt lagen, zu gross, z. B. die Errstöcke gegen die Höhen der Flixeralp, im Verhältniss zu den näher liegenden Gebirgen dagegen zu klein, z. B. das Fallerhorn gegen den P. Surparé.

Die perspectivische Ansicht der Thäler *Tuors* und *Stuls* soll die verwickelten Verhältnisse zwischen Gneis, rothem Sandstein und Kalk in dem Sedimentringe der Selvrettamasse darstellen.

#### TAB. IV.

Die Ansicht des *Piz Asca* und *Albulahorn's* ist, theils auf dem Passe von V. Tuors nach dem Schafboden, theils auf der Tischalpkette, gezeichnet worden, und soll vorzüglich die Gestalten der zwei Hauptgipfel kennen lehren.

In den vier Profilen sind die Höhen und horizontalen Entfernungen, nach gleichem Maassstabe, den wahren entsprechend. Der Maassstab ist derjenige der Karte.

#### TAB. V.

Es soll diese Uebersichtskarte nur die Lage der krystallinischen *Centralmassen* und des sie umschliessenden Sedimentgebirges angeben. Da, nach unserer Ansicht, zwischen den Gesteinen beider Classen von Gebirgen nur der Unterschied grösserer oder geringerer Umwandlung besteht, so lassen sich an vielen Stellen die Grenzen nicht scharf bestimmen, weil die Natur selbst sie nicht scharf gezogen hat. In den südlichen Alpen, besonders gegen Piemont zu, sind uns die Verhältnisse noch zu wenig bekannt, als dass wir es hätten wagen mögen, die grosse Massen krystallinischer Gesteine in einzelne Massen zu zerlegen. Dass eine solche Theilung später auch gelingen werde, geht aus dem Vorkommen von Kalk im Innern jener Gebirge und aus den neueren Untersuchungen von H. Sismonda am südlichen Rande derselben zuverlässig hervor.




# Erklärung der Farben

1. Ötztalische, Montebianche, Gneis
2. Flysch, Baulthausische, Mergel
3. Aulicite, weißer Marmor
4. Basalt, Rindwache
5. Gyps
6. Gneis, Schiefer, rother, Jaspis, Gestein, Schieferstein
7. Napfstein, Gellie
8. Gneis, Spitz, Schieferstein
9. Rother, Gneis, Sandstein, u. Conglomerat

# Erklärung der Zeichen

- A. Alp  
M. Mauerma  
P. P.



## GEOLOGISCHE KARTE

des MITTLEREN THEILES

VON

Graubünden

Maasstab = 1:130000 der wahren Größe

Borchardt = 10000 Barfüß

Schweizerstunde = 1000 Schweizerfuß = 1000 Metres




# Erklärung der Farben

- 1. Glimmerschiefer, Hornfels, Gneise
- 2. Dyak, Basalt, Andesit, Mergel
- 3. Basalt, andesit, Mergel
- 4. Basalt, andesit, Mergel
- 5. Basalt, andesit, Mergel
- 6. Basalt, andesit, Mergel
- 7. Basalt, andesit, Mergel
- 8. Basalt, andesit, Mergel
- 9. Basalt, andesit, Mergel
- 10. Basalt, andesit, Mergel
- 11. Basalt, andesit, Mergel
- 12. Basalt, andesit, Mergel
- 13. Basalt, andesit, Mergel
- 14. Basalt, andesit, Mergel
- 15. Basalt, andesit, Mergel
- 16. Basalt, andesit, Mergel
- 17. Basalt, andesit, Mergel
- 18. Basalt, andesit, Mergel
- 19. Basalt, andesit, Mergel
- 20. Basalt, andesit, Mergel
- 21. Basalt, andesit, Mergel
- 22. Basalt, andesit, Mergel
- 23. Basalt, andesit, Mergel
- 24. Basalt, andesit, Mergel
- 25. Basalt, andesit, Mergel
- 26. Basalt, andesit, Mergel
- 27. Basalt, andesit, Mergel
- 28. Basalt, andesit, Mergel
- 29. Basalt, andesit, Mergel
- 30. Basalt, andesit, Mergel
- 31. Basalt, andesit, Mergel
- 32. Basalt, andesit, Mergel
- 33. Basalt, andesit, Mergel
- 34. Basalt, andesit, Mergel
- 35. Basalt, andesit, Mergel
- 36. Basalt, andesit, Mergel
- 37. Basalt, andesit, Mergel
- 38. Basalt, andesit, Mergel
- 39. Basalt, andesit, Mergel
- 40. Basalt, andesit, Mergel
- 41. Basalt, andesit, Mergel
- 42. Basalt, andesit, Mergel
- 43. Basalt, andesit, Mergel
- 44. Basalt, andesit, Mergel
- 45. Basalt, andesit, Mergel
- 46. Basalt, andesit, Mergel
- 47. Basalt, andesit, Mergel
- 48. Basalt, andesit, Mergel
- 49. Basalt, andesit, Mergel
- 50. Basalt, andesit, Mergel
- 51. Basalt, andesit, Mergel
- 52. Basalt, andesit, Mergel
- 53. Basalt, andesit, Mergel
- 54. Basalt, andesit, Mergel
- 55. Basalt, andesit, Mergel
- 56. Basalt, andesit, Mergel
- 57. Basalt, andesit, Mergel
- 58. Basalt, andesit, Mergel
- 59. Basalt, andesit, Mergel
- 60. Basalt, andesit, Mergel
- 61. Basalt, andesit, Mergel
- 62. Basalt, andesit, Mergel
- 63. Basalt, andesit, Mergel
- 64. Basalt, andesit, Mergel
- 65. Basalt, andesit, Mergel
- 66. Basalt, andesit, Mergel
- 67. Basalt, andesit, Mergel
- 68. Basalt, andesit, Mergel
- 69. Basalt, andesit, Mergel
- 70. Basalt, andesit, Mergel
- 71. Basalt, andesit, Mergel
- 72. Basalt, andesit, Mergel
- 73. Basalt, andesit, Mergel
- 74. Basalt, andesit, Mergel
- 75. Basalt, andesit, Mergel
- 76. Basalt, andesit, Mergel
- 77. Basalt, andesit, Mergel
- 78. Basalt, andesit, Mergel
- 79. Basalt, andesit, Mergel
- 80. Basalt, andesit, Mergel
- 81. Basalt, andesit, Mergel
- 82. Basalt, andesit, Mergel
- 83. Basalt, andesit, Mergel
- 84. Basalt, andesit, Mergel
- 85. Basalt, andesit, Mergel
- 86. Basalt, andesit, Mergel
- 87. Basalt, andesit, Mergel
- 88. Basalt, andesit, Mergel
- 89. Basalt, andesit, Mergel
- 90. Basalt, andesit, Mergel
- 91. Basalt, andesit, Mergel
- 92. Basalt, andesit, Mergel
- 93. Basalt, andesit, Mergel
- 94. Basalt, andesit, Mergel
- 95. Basalt, andesit, Mergel
- 96. Basalt, andesit, Mergel
- 97. Basalt, andesit, Mergel
- 98. Basalt, andesit, Mergel
- 99. Basalt, andesit, Mergel
- 100. Basalt, andesit, Mergel


## Erklärung der Zeichen

- A: Alp
- M: Mergel
- P: P.



**GEOLOGISCHE KARTE**  
des  
**MITTLEREN THEILES**  
VON  
**Graubünden**

Maassstab = 1:130,000 der wahren Grösse  
Bernsteine • Rösser • Bressan  
Schweizerische • Koo • Schweizerische • 100 Metres




WES

Pizdella Grotta Longjun See  
Pass von Septimer nach Maloja


Su

Gratschewls



Maloja

GRAVESALVAS GER SEES .



# WESTSEITE DES CORVIER-GEBIRGES IM SCHNITT

Piedella Grada Longhin See  
Fass von Schumacher nach Maloja

Sur Alpasrei

Pass von Gravesalvas  
Graves Alvas

Piz de Graves

Cratscheola



Maloja

Silser See

GELBES GEBIRGE VON DER SÜDOST-SEITE DES SILSER SEES.



Tiefenkasten.

Piz di Gandälva.

Julier See. Piz Monteratsch.

Silva plana.




Fig. 3.

Septimer Pass.

Landvasserthal.

Stülsthal.

Tuorsthal. Eisengrube. Huthaus.

Filisur. Bellaluna. Stuls.


Latsch.

Tischalp.



Ansicht von Stuls und Tuors


Fig. 1.



Ost Seite des Oberhalbsteinthales

Fig. 2.

Fig. 3.



Westseite des obern Oberhalbsteinthales

Ansicht von Stuls und Tuors



Fig. 5.

Andeer Baül Nezza A. P. Curve

Schwarzhorn  
Dürrenboden

Thälihorn  
Scaletta

V. Barlase Engadin  
Ponte alto Inn





Fig. 1

Davos  
Schmelzboden

Stuls-thal Piz Asca Eschia Pass

Plazbi Albulahorn Fisch Alp Tuors Thal



en des Piz Asca und Albulahorns



Fig. 3.





Fig. 5.



Fig. 1



Fig.1



Ansicht von Norden des Piz Asca und Albulahorns


# Die krystallinischen Centralmassen der SCHWEIZER ALPEN

Tab. N.

 Granitgneis der Centralmassen

 Kalk und Flysch

 Serpentin




# Die krystallinischen Centralmassen der SCHWEIZER ALPEN

Tab. V.

 Granitgneis der Centralmassen

 Kalk und Flysch

 Serpentin



Description des Echinodermes fossiles de la Suisse L. Agassiz. Vol. 3.  
 1<sup>re</sup> partie: Spatangoides et Clypeastroides.  
 2<sup>e</sup> partie Cidarides. " 4  
 Iconographie des coquilles tertiaires de L. Agassiz " 7





**DESCRIPTION**

DES

**ECHINODERMES FOSSILES  
DE LA SUISSE;**

PAR

**L<sup>s</sup> AGASSIZ.**

---

**PREMIÈRE PARTIE,**

**SPATANGOIDES ET CLYPÉASTROIDES.**

---



## **OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.**

---

En publiant une description détaillée des Echinodermes fossiles de la Suisse, j'ai eu deux choses en vue : 1° de faciliter aux Géologues l'étude des terrains fossilifères de notre pays, dont l'âge n'est pas encore déterminé d'une manière précise ; 2° de préparer les voies à une étude comparative de l'ensemble de nos terrains, avec leurs analogues dans d'autres pays. Ce double point de vue me semble en effet commandé par la position géographique de la Suisse, qui embrasse d'une part les chaînes du Jura avec leurs terrains rigoureusement déterminés, et d'autre part la masse des Alpes, labyrinthe immense, où toutes les formations semblent confondues et mêlées au hasard.

Peut-être s'étonnera-t-on que j'aie choisi les Echinodermes de préférence aux Mollusques. Voici les raisons qui m'y ont déterminé. Les Echinodermes fossiles, quoique à peine connus de la plupart des Géologues, ont une importance aussi grande et, en plusieurs circonstances, bien plus grande que les Mollusques. Leur test offre une variété de caractères qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres Testacés,

par la raison toute simple qu'il n'est point une simple sécrétion calcaire par lames superposées, comme dans les Mollusques. Il fait au contraire partie de l'animal lui-même, et, participant de sa vie intime, il est naturel qu'il reflète d'une manière plus complète les caractères particuliers qui caractérisent chaque espèce ; aussi, dans beaucoup de cas, suffit-il d'un très-petit fragment de test, pour déterminer l'espèce dont il provient. C'est surtout dans l'étude des fossiles alpins que l'on apprend à apprécier les débris d'Echinodermes. Le petit nombre de fossiles des Alpes qui permettent une détermination rigoureuse sont pour la plupart des Oursins ; et c'est à l'aide de ces débris que je suis parvenu à confirmer, d'une manière qui ne souffre plus aucun doute, l'opinion émise par plusieurs Géologues, que la plupart des terrains des Alpes sont d'origine bien plus récente qu'on ne le pensait auparavant.

Une autre raison en faveur des Echinodermes, c'est l'ignorance générale dans laquelle on a été jusqu'ici à leur égard, ignorance que rien ne saurait justifier, car beaucoup d'espèces sont aussi répandues et ont des limites aussi précises dans la série des terrains que les Mollusques les mieux connus ; et il en est beaucoup que l'on peut invoquer avec autant de sûreté que les fossiles les plus caractéristiques. Je citerai comme exemple le *Hemicidaritis crenularis* (*Cidaritis crenularis* Goldf.) qui caractérise l'étage oxfordien ; l'*Ananchytes ovata* Lam. qui appartient en propre à la Craie supérieure ; le *Pentacrinites subangularis*, qui caractérise une puissante assise du Lias ; l'*Encrinites moniliformis* qui est le cachet le plus authentique du Muschelkalk. Enfin quel fossile caractérise mieux le Néocomien que le *Holaster complanatus* ?

Ce mémoire étant essentiellement destiné aux Géologues, on ne devra pas s'attendre à y trouver des renseignemens nouveaux sur les rapports

zoologiques et anatomiques des familles, des genres et des espèces. Ces questions ne peuvent être discutées convenablement que dans des ouvrages traitant de l'ensemble d'une classe ou d'une famille\*); elles figureraient mal dans un mémoire qui a pour but principal d'appeler l'attention sur les différentes espèces d'Echinodermes qui se trouvent dans nos terrains, en décrivant leur forme et leurs caractères, afin de les faire servir à la détermination de ces mêmes terrains; car nous savons maintenant que chaque formation géologique a ses espèces qui lui sont propres et qui ne se rencontrent pas dans d'autres terrains; les faits que l'on citait encore naguère pour prouver le contraire disparaissent chaque jour à mesure qu'on les soumet à une critique éclairée et sévère.

Si, partant de là, nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des Echinodermes qu'on rencontre chez nous, nous serons frappés de voir que non-seulement les espèces, mais aussi jusqu'à un certain point les genres sont limités à certaines formations. C'est ainsi que le type des *Disaster* est presque exclusivement propre à la formation jurassique. Les genres *Acrocidaris*, *Acrosalenia* et *Hyboclypus* sont exclusivement jurassiques. Les vrais *Cidaris* et les *Hemicidaris* ne comptent que quelques espèces plus récentes. En revanche toute la famille des *Spatangoïdes* est étrangère à la formation jurassique, sauf une seule espèce, le *Holaster intermedius* Ag., qu'on trouve dans l'étage supérieur de cette formation. Les *Ananchytes*, qui appartiennent à la même famille, sont essentiellement crétacés. Les vrais *Spatangues* sont crétacés et tertiaires à la fois.

Il résulte de ces aperçus que dans beaucoup de cas les caractères génériques d'un fragment d'Echinoderme suffisent pour prévoir l'âge de la

\*) Je me propose de développer le résultat de mes recherches sur ce sujet, dans les généralités de l'ouvrage dont je viens de commencer la publication, sous le titre de : *Monographies d'Echinodermes vivans et fossiles*; et dont la première livraison a déjà paru.

formation qui le recèle. Supposons que l'on trouve quelque part un fragment de *Disaster* trop peu conservé pour permettre une détermination spécifique, mais qui ne laisse pas de doute sur le genre auquel il appartient, on pourra, presque sans crainte de se tromper, admettre que le terrain dont il provient appartient à la formation jurassique. Si le fragment en question est au contraire un *Ananchytes* ou un *Micraster*, ou même un *Holaster*, on aura une grande probabilité en faveur d'un terrain crétacé. Ces résultats, très-importans en eux-mêmes, acquièrent une valeur inappréciable dans l'étude des Echinodermes alpins. Nous savons en effet que la plupart des fossiles des Alpes sont très-mal conservés, au point de ne pas pouvoir être déterminés spécifiquement; et même dans les collections les plus renommées de notre pays, il en est beaucoup qui sont dans ce cas. A l'avenir, ces mêmes fossiles acquerront, à l'aide des résultats que je viens d'énoncer, une importance bien plus grande, quand les faits ci-dessus indiqués seront généralement constatés. Mais pour que l'on ne se fasse pas illusion sur la facilité de reconnaître les caractères génériques des Oursins fossiles, je dois rappeler que dans mon *Prodrome d'une monographie des Echinodermes*, inséré dans le 1<sup>er</sup> Vol. des *Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Neuchâtel*, ainsi que dans le présent mémoire, j'ai établi un assez grand nombre de nouveaux genres, qui par conséquent rendent les déterminations des caractères génériques d'autant plus difficiles. Dans plus d'un cas, ces caractères se tirent de particularités de structure en apparence très-insignifiantes et très-déliques. C'est ainsi que le genre *Pedina* ne diffère du genre *Cyphosoma* que par ses tubercules perforés; et cependant le premier est exclusivement jurassique, tandis que l'autre appartient aux terrains de la craie supérieure. Le même caractère distingue aussi le genre *Acrosalenia*, qui est jurassique, du groupe des *Salénies*, qui appartient à la formation de la craie.

Le titre de ce mémoire : *Description des Echinodermes fossiles de la Suisse*, ne doit point être entendu dans le sens des limites politiques de notre pays. La science heureusement n'a rien de commun avec les lignes de douane. Aussi n'ai-je pas hésité à admettre comme suisses plusieurs espèces provenant de la continuation de nos chaînes jurassiques et alpines dans les pays adjacens, et qui n'ont point encore été trouvées dans le sol suisse.

Le nombre d'espèces d'Echinodermes, décrites et figurées dans ce travail, sera très-considérable, en comparaison de ce qu'il a été jusqu'ici. Les seules familles des Spatangoides et des Clypéastroïdes, qui font le sujet de cette première partie du mémoire, comptent 65 espèces, dont 39 nouvelles. Les différences entre ces espèces ne sont pas toujours très-sensibles, et il faut dans beaucoup de cas une grande habitude pour les saisir au premier coup-d'œil. Afin d'en faciliter l'étude, j'ai eu soin de faire figurer chaque espèce de trois côtés, de dessus, de dessous et de profil, toutes les fois que l'état de conservation des individus que j'avais à ma disposition me le permit ; et lorsque certains caractères étaient de nature à ne pouvoir pas être reproduits d'une manière suffisamment claire par le dessin, je n'ai pas négligé de les relever d'une manière toute particulière dans la description. Toutes les figures étant de grandeur naturelle, j'ai cru inutile d'indiquer les dimensions de chaque espèce dans la série des descriptions.

Il me reste encore à offrir l'expression de ma sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont bien voulu me faciliter ce travail, en mettant leurs collections à ma disposition. Je dois des remerciemens tout particuliers à M. Gressly, qui m'a confié toute sa belle collection de fossiles du Jura, l'une des plus riches de Suisse ; à MM. Studer et A. Escher de la

Linth, qui m'ont envoyé leurs collections entières d'Echinodermes alpins; à M. Célestin Nicolet, qui m'a fourni un grand nombre d'espèces jurassiques, et les seules espèces de la molasse qui soient connues; enfin à MM. Coulon père et fils et A. de Montmollin, pour la communication des nombreuses espèces nouvelles qu'ils ont découvertes dans le Néocomien.

Grâce aux indications précises qui accompagnaient toutes les espèces, j'ai été à même d'en signaler d'une manière rigoureuse l'origine et le gisement; et je me flatte que, sous ce rapport, mon mémoire l'emportera sur beaucoup d'autres descriptions de fossiles, qui se bornent aux caractères zoologiques. Puissent les Géologues suisses, auxquels je le destine en particulier, ne pas le trouver indigne de leur attention!

Ce travail sera divisé en trois parties, qui paraîtront successivement dans le Recueil des Mémoires de la Société helvétique des Sciences naturelles. La première comprend les familles des *Spatangoïdes* et des *Clypéastroïdes*. La seconde contiendra la famille des *Cidarides*, et la troisième enfin l'Ordre des *Crinoïdes*. Chacun de ces Mémoires sera accompagné d'un *Conspectus generum et specierum*, indiquant sommairement les caractères diagnostiques des genres et des espèces. (Voir pour la première partie p. 95.)



---

# DESCRIPTION

DES

## ECHINODERMES FOSSILES DE LA SUISSE.

---

1<sup>er</sup> Genre. **DISASTER** Ag.

Syn. *Spatangus* Lam. Goldf., etc. *Collyrites* DesM.

Le genre *Disaster* est, sans contredit, de tous les types d'oursins, celui dont les caractères sont les plus fixes et les plus tranchés. Tandis que tous les autres genres présentent une convergence uniforme des ambulacres vers un seul point, le sommet du disque, les *Disaster* font seuls exception à la règle : leurs ambulacres se réunissent sur deux points différens de la face supérieure du test, de manière à présenter deux sommets ambulacraires plus ou moins éloignés suivant que les ambulacres postérieurs sont plus ou moins rapprochés de l'ouverture anale. Ce singulier caractère leur a valu le nom de *Disaster*; et je crois qu'en les détachant du genre *Spatangue* pour en faire un type à part, je n'ai fait que suivre une coupe que la nature elle-même nous indique d'une manière évidente. M. Charles DesMoulins a sans doute été guidé par les mêmes considérations en établissant son genre *Collyrites*, qui correspond dans ses principaux caractères à mon genre *Disaster*; cependant il y range, en s'appuyant sur la forme arrondie de la bouche, quelques espèces qui ne montrent pas cette disposition des ambulacres. J'ai établi le genre *Disaster* dans mon *Prodrome d'une mo-*

*nographie des Radiaires*, inséré dans le 1<sup>er</sup> vol. des Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel.

Tous les *Disaster* ont l'ouverture buccale arrondie et située à la partie antérieure de la face inférieure, dans une dépression formée par la réunion des cinq ambulacres. L'ouverture anale est constamment placée à la face postérieure, tantôt marginale, tantôt submarginale. La face supérieure du test est lisse et surtout dépourvue d'ondulations; le sillon antérieur, dans lequel se loge l'ambulacre impair, ne commençant ordinairement qu'au milieu de la circonférence. La face inférieure est au contraire le plus souvent fortement ondulée; l'aire interambulacraire impaire en particulier est toujours très-bombée. L'appareil oviducal, fort difficile à reconnaître dans la plupart des espèces, forme un disque allongé; les plaques interovariales, sauf celle de l'aire interambulacraire postérieure, sont percées d'un trou.

Le genre *Disaster* est essentiellement jurassique. On en connaît jusqu'ici quatorze espèces, dont deux seulement sont crétacées, suivant Goldfuss, le *D. excentricus* et le *D. bicordatus*. Or, on ne saurait douter, d'après les figures qu'il en donne, que ce ne soient de véritables *Disaster*. Ce qui paraît plus douteux c'est l'indication du gisement. La chaîne de notre Jura a fourni jusqu'ici cinq espèces de *Disaster*, qui, pour la plupart, caractérisent les stations vaseuses (\*); circonstance qui s'explique d'ailleurs par la ténuité de leur test, qui ne leur eût pas permis de supporter le choc des vagues dans des parages coralligènes très-agités.

### I. DISASTER PROPINQUUS Ag.

Tab. I, fig. 1-3. (Sous le faux nom de *Dis. capistratus*).

Cette espèce n'est pas très-fréquente dans nos terrains jurassiques. Je n'en connais qu'un petit nombre d'exemplaires, trouvés, pour la plupart,

(\*) Voir le Mémoire de M. Gressly, dans les Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des sciences naturelles. Vol. II.

par M. Gressly dans le terrain à Chailles du Fringeli (Canton de Soleure). Sa ressemblance avec plusieurs autres espèces du même genre, plus fréquentes et plus généralement connues, m'a engagé à lui donner le nom de *D. propinquus*. En effet sa forme générale est à-peu-près celle du *D. analis*, tandis que les détails de structure du test le rapprochent plutôt du *D. ovalis* (*Spatangus ovalis* Park.), figuré dans l'ouvrage de J. Phillips sur la Géologie de Yorkshire, Tab. 4, fig. 23, et du *D. truncatus* Du B., figuré par lui dans son voyage autour du Caucase. Tab. I, fig. 4, sér. Géol. Il se pourrait même qu'elle fût identique avec ce dernier, mais j'estime qu'avant de se prononcer définitivement, il faut attendre que l'on connaisse des exemplaires plus parfaits que celui de M. DuBois, qui n'est qu'un fragment dont la face supérieure est seule conservée.

Les dimensions du *D. propinquus* sont à-peu-près celles du *D. analis*; mais sa forme est moins déprimée et partant plus allongée. Les aires ambulacraires sont très-larges; les ambulacres postérieurs convergent à une distance considérable de l'anus, à tel point que l'espace qui les sépare des ambulacres antérieurs, égale à-peu-près l'espace compris entre leur point de convergence et l'ouverture anale. Les pores ambulacraires sont très-petits, mais fort distincts. Toutes les plaques sans exception sont pourvues de petits tubercules d'égale dimension sur toute la surface du test. Les plaques interambulacraires sont convexes à leur base et concaves à leur sommet, tandis que les plaques ambulacraires s'articulent par des lignes droites. L'ouverture buccale, tant soit peu ovale dans le sens du diamètre longitudinal de l'animal, est reportée fort en avant et située dans une dépression formée par la réunion de cinq ambulacres. Les aires interambulacraires sont planes, sauf l'aire interambulacraire postérieure, qui est renflée en forme de quille assez saillante. L'ouverture anale est au bord supérieur de la face postérieure. N'ayant découvert les pores oviducaux que postérieurement au tirage de cette planche, sur un exemplaire plus parfait que celui qui a servi de modèle à ces figures, je n'ai pu les représenter ici. Il y en a deux en deçà et deux en delà des ambulacres antérieurs, formant entr'eux un carré rhomboïdal régulier.

## II. DISASTER CARINATUS Ag.

Tab. I, fig. 4-6.

- Syn. *Disaster carinatus* Agass. (Prodr. 1 vol. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel.)  
*Ananchytes carinata* Lam. (Syt. III, p. 26, n° 6).  
*Echinus carinatus* L. Gmel. (p. 5299).  
*Spatangus carinatus* Leske (n° 84, p. 245, pl. 51, fig. 3, 4). — Gldf. (n° 8, p. 150. Tab. 46, fig. 4, a. b. c. d.).  
*Spatangus pyriformis* Gratel. (Dax, n° 14, pl. 2, fig. 16).  
*Collyrites carinata* DesM. (Tabl. synopt. p. 366, n° 8).  
*Echinus cordatus* Encycl. méth. (Tab. 158, fig. 1-2).  
*Echinites cordatus* Baier, (Oryct. nor. Tab. 3, fig. 43).  
*Echinus paradoxus* Schl. (Petr. p. 518).  
*Oursin en cœur* Bosc. (Déterv. XXIV, p. 282).

Quoique la synonymie de cette espèce constate sa présence dans les terrains jurassiques des diverses parties de l'Europe, elle ne paraît cependant pas être très-fréquente dans notre Jura, et pour ma part je n'en connais que deux exemplaires d'origine suisse, provenant du Lias de l'évêché de Bâle.

Le nom de l'espèce en indique le caractère saillant, qui est d'avoir la partie postérieure de la face supérieure renflée en forme de quille, caractère qui la distingue surtout du *Disaster capistratus*. La bouche est petite et ronde; l'anus, situé à l'extrémité postérieure, a les mêmes dimensions et la même forme. Les aires ambulacraires sont larges, surtout les postérieures, dont la réunion sur le sommet s'opère à une distance assez considérable de l'anus. Mais ce qui mérite surtout de fixer l'attention, c'est l'éloignement considérable des paires de pores, en particulier sur la face supérieure, où ordinairement ils sont très-rapprochés. Toutes les plaques sans exception présentent une très-fine granulation, du milieu de laquelle s'élève un certain nombre de tubercules un peu plus gros; mais il est rare de les rencontrer parfaitement conservés. Le plus souvent ils sont entièrement oblitérés, ou bien on ne peut les reconnaître qu'avec une forte loupe.

Les pores oviducaux ne peuvent également se voir qu'à la loupe. On en distingue comme ordinairement quatre; mais ils sont plus rapprochés que dans aucune autre espèce et situés au sommet du test, là où les trois ambulacres antérieurs se réunissent.

### III. DISASTER RINGENS Ag.

Tab. I, fig. 7-11.

Syn. *Disaster ringens* Agass. (Prodr. 1 vol. des Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel. *Collyrites ringens* DesM. (Tabl. synopt. p. 368, n° 15.)

On reconnaît facilement cette espèce aux inégalités de sa face inférieure : tous les ambulacres sont dans une profonde dépression, tandis que les aires interambulacraires, et notamment l'aire interambulacraire postérieure, sont fortement bombées. Autant la face inférieure est inégale, autant la face supérieure est régulière, uniforme, et l'on pourrait presque dire plane. Comme les ambulacres postérieurs sont fortement arqués, de manière à venir converger immédiatement au-dessus de l'ouverture anale (fig. 7), on voit naître à côté des deux séries de plaques des aires interambulacraires postérieures paires, dans l'angle des ambulacres postérieurs, plusieurs autres petites plaques triangulaires que je n'ai point encore observées dans d'autres espèces. Les ambulacres sont en général étroits, proportionnellement à ceux d'autres espèces, particulièrement les antérieurs, qui se réunissent au sommet du disque. Un dernier caractère enfin, le plus frappant de tous, et celui qui a valu à l'espèce son nom, gît dans l'aspect de la face postérieure (fig. 10). L'anus s'ouvre au bord supérieur, au commencement d'un sillon très-évasé et très-apparent, qui s'élargit sensiblement de haut en bas. L'ouverture buccale est petite, ronde, subcentrale et légèrement reportée en avant. Les pores oviducaux forment un carré rhomboïdal, comme dans le *D. propinquus*, mais plus allongé. Deux pores sont situés en avant de la réunion des ambulacres antérieurs; les deux autres à une certaine distance, en arrière. Les jeunes individus sont plus allongés et

plus renflés que les vieux. Cette espèce est fréquente dans les terrains oolitiques de Suisse. M. Gressly en a trouvé bon nombre d'exemplaires dans l'étage supérieur de l'oolithe inférieur de Goldenthal (Canton de Soleure); MM. Hugi et Strohmeier en ont également recueilli dans les mêmes terrains.

#### IV. DISASTER ANALIS Ag.

Tab. I, fig. 12-14.

Syn. *Disaster analis* Agass. (Prodr. 1 vol. des Mém. de la Soc. des Sc. nat. de Neuchâtel.)  
*Collyrites analis* DesM. (Tab. synopt. p. 568, n° 14).

Possédant toute une série d'exemplaires de cette espèce, trouvés en partie par MM. Gressly dans l'oolithe inférieure de Goldenthal et de Fringeli, canton de Soleure, en partie par MM. Hugi et Stromeyer, dans le même terrain, j'ai été par là même en état d'étudier scrupuleusement toutes les variations de formes et d'aspect qu'ils peuvent présenter aux différens termes de leur développement. Généralement le *D. analis* est déprimé, sa face inférieure est plane, et, même dans les exemplaires les mieux conservés, la saillie sous-anale de l'aire interambulacraire impaire n'est pas très-sensible. L'ouverture buccale, de forme circulaire et légèrement rentrante, est placée au premier tiers de la face inférieure, à partir du bord antérieur. L'ouverture anale, de forme à-peu-près elliptique, est au bord supérieur de la face postérieure. Les deux ambulacres postérieurs viennent converger presque immédiatement au-dessus de cette ouverture; les trois antérieurs, au contraire, se réunissent à la face antéro-supérieure, un peu en avant du point culminant du disque, de manière que l'espace intermédiaire entre ces deux points de convergence est très-grand, proportionnellement à ce qu'il est dans d'autres espèces. L'aire ambulacraire impaire, qui occupe le sillon antérieur, est plus large que les autres. Ce qui mérite surtout d'être remarqué, c'est que les plaques de toutes les aires ambulacraires diminuent sensiblement de hauteur, à mesure qu'on les poursuit de la bouche à l'anus; et comme à chaque plaque correspond une paire de pores, il s'en suit que ceux-ci aussi sont beaucoup plus serrés à la face supérieure qu'à la face in-

férieure. Les aires interambulacraires sont fort larges, et leurs plaques sont toutes courbées en forme de croissant, le bord inférieur étant convexe, tandis que le bord supérieur est plus ou moins concave. A raison de la distance des ambulacres postérieurs aux ambulacres antérieurs, les plaques des aires interambulacraires paires postérieures sont beaucoup plus larges sur toute la face supérieure du disque que leurs analogues des aires interambulacraires antérieures. Les tubercules, quoique assez uniformément répartis sur toute la surface du test, sont cependant plus nombreux à la face inférieure qu'à la face supérieure. L'épiderme qui recouvre le tout présente un aspect finement granulé. Les quatre trous oviducaux sont très-petits; leur position n'est pas régulière; généralement celui qui correspond à l'aire interambulacraire postérieure droite est plus en arrière que celui de l'aire interambulacraire gauche.

Je suis porté à croire que les *Ananchytès elliptica* Lam. et *A. bicordata* Lam. ne diffèrent pas spécifiquement l'un de l'autre; cependant je n'oserais l'affirmer positivement, ne possédant pas des termes de comparaison assez précis; mais je suis sûr qu'ils diffèrent de mon *D. analis*.

#### V. DISASTER CAPISTRATUS Ag.

Tab. IV, fig. 1-3.

Syn. *Disaster capistratus* Agass. (Prodr. 1 vol. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel.)

*Spatangus capistratus* Goldf. (n° 9, p. 151, tab. 46, fig. 5).

*Collyrites capistrata* DesM. (Tabl. synopt. p. 366, n° 7).

*Ananchytes bicordata* Desm. (Non Lam.)

La forme générale de cette espèce la rapproche beaucoup du *D. carinatus*, avec lequel on pourrait aisément la confondre, si elle n'était à-peu-près dépourvue de ce renflement de l'aire interambulacraire postérieur qui est le caractère essentiel du *D. carinatus*. Les pores ambulacraires sont aussi beaucoup plus nombreux que dans l'espèce mentionnée. Le côté antérieur du *D. capistratus* est tronqué et arrondi, le côté postérieur saillant. La face inférieure est à-peu-près plane, l'aire interambulacraire impaire

ne formant qu'une légère saillie. L'ouverture buccale est circulaire, placée au premier tiers de la face inférieure, à l'extrémité du sillon antérieur. La réunion des deux ambulacres postérieurs s'opère à une distance considérable de l'anús, de manière que l'espace compris entre les ambulacres de devant et ceux de derrière est ici plus rétréci que dans aucune autre espèce. Les pores sont très-apparens, plus serrés à la face supérieure qu'à la face inférieure. Les tubercules, répartis d'une manière uniforme sur toute la surface du test, sont plus grands que dans les autres espèces de ce genre. L'on distingue en même temps très-clairement la structure granuleuse de toutes les plaques. Les quatre pores oviducaux sont assez rapprochés et placés en quinconce. Je possède plusieurs exemplaires de cette espèce provenant des terrains jurassiques de Suisse et appartenant au musée de Carlsruhe. Un autre exemplaire m'a été communiqué par M. Gressly. Dans tous l'anús est distinctement marginal, à-peu-près comme dans la figure de Goldfuss.

M. Ch. DesMoulins fait observer à ce sujet que dans ses exemplaires il est situé plus haut. Si cela est, j'estime qu'ils devront être séparés comme espèce à part. M. Ch. DesMoulins cite, comme localité où cette espèce se trouve, le département de la Meuse et Besançon, en ayant soin cependant de les faire suivre d'un point d'interrogation. L'exemplaire décrit et figuré par Goldfuss est de Bayreuth.

## VI. DISASTER VOLTZII Ag.

Tab. IV, fig. 11-13.

On distingue aisément cette espèce à sa forme toute circulaire qui lui donne, jusqu'à un certain point, l'aspect d'un *Echinus*. L'ouverture buccale est grande; elle occupe le centre du disque; les ambulacres, de largeur moyenne, sont parfaitement visibles à la face inférieure; l'on ne remarque entre eux aucune différence ni dans leur forme, ni dans leurs dimensions, et même le sillon dans lequel se loge habituellement l'ambulacre impair, n'existe pas. Les pores de tous les ambulacres se resserrent sensiblement à l'approche de l'ouverture buccale; l'anús, placé au bord inférieur de la face



postérieure, s'ouvre au sommet du renflement que forme l'aire interambulacraire impaire. Malheureusement la surface inférieure est seule conservée dans les deux exemplaires que je possède; ce qui tient sans doute à l'extrême ténuité du test. Je n'hésite cependant point à rapporter cette espèce au genre *Disaster*, à cause de la direction des ambulacres postérieurs qui convergent au-dessus de l'anus, et ne se dirigent point en avant, comme cela devrait être s'ils se rapprochaient du même point que les ambulacres antérieurs, au sommet du disque. Ces deux exemplaires m'ont été communiqués par M. Voltz, qui les a trouvés dans le terrain portlandien des Voirons, en Savoie.

## 2<sup>e</sup> Genre. **HOLASTER** Ag.

Syn. *Spatangus* Auct.

Les *Holaster* appartiennent presque exclusivement à l'époque crétacée, dans laquelle ils semblent avoir remplacé leurs prédécesseurs de l'époque jurassique, les *Disaster*. Sur vingt-cinq espèces que je connais de ce genre, une seule, le *Hol. intermedius* appartient à la série jurassique; Marcel de Serres en cite, en revanche, deux espèces dans le calcaire moëllon du sud de la France, qu'il identifie, l'une, avec le *Hol. lævis*, et l'autre avec le *Hol. complanatus*, qui sont deux espèces de la craie. Quoique je n'aie pas eu l'occasion de les voir, soit en nature soit figurées, je ne puis cependant m'empêcher d'élever des doutes sur cette identité. Ce seraient en effet les premiers fossiles qui se rencontreraient ainsi dans ces deux formations si différentes par tous leurs caractères pétrographiques et paléontologiques.

En défalquant les *Holaster* des *Spatangus*, comme je l'ai fait dans mon *Prodrome d'une monographie des Echinodermes*, inséré dans le 1<sup>er</sup> vol. des *Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Neuchâtel*, pour en faire un genre à part, j'ai été guidé par les considérations suivantes :

Les *Holaster* sont des Oursins en forme de cœur de carte; leurs ambulacres ne sont ni déprimés, comme dans les *Schizaster* et les *Micraster*, ni

pétaloïdes comme dans les vrais Spatangues ; mais ils convergent uniformément vers un seul point du disque qui est habituellement le sommet ; dans quelques espèces on remarque une légère courbure des ambulacres à l'approche de l'appareil oviducal. Les pores, tantôt simples, tantôt allongés, suivant les espèces, ne sont ordinairement bien visibles que jusqu'à une certaine distance du sommet, où ils commencent à s'effacer plus ou moins, en même temps qu'ils s'éloignent davantage les uns des autres. L'ouverture buccale, allongée dans le sens du diamètre transversal, est placée à la partie antérieure de la face inférieure, dans une dépression qui résulte de la convergence des aires ambulacraires vers ce point. L'ouverture anale est invariablement placée à la face postérieure, et ordinairement plus rapprochée de la face supérieure que de la face inférieure. Elle affecte constamment une forme elliptique de haut en bas. Le test des *Holaster* est habituellement mince, et uniformément recouvert d'une fine granulation et de tubercules un peu plus gros qui recouvrent toutes les plaques. C'est sur les aires interambulacraires de la face inférieure qu'ils acquièrent leur plus grand développement ; les aires ambulacraires sont, au contraire, privées de ces tubercules, ou, s'il y en a, ils sont toujours moins apparens.

La Suisse nous a fourni jusqu'ici dix espèces de *Holaster*, dont un du Portlandien, le *Hol. intermedius* ; trois du Néocomien, le *Hol. complanatus*, *H. L'Hardy* et *H. Couloni* ; deux du grès vert, le *H. lævis* et le *H. Sandoz*, et quatre des terrains alpins, le *H. subglobosus*, *H. altus*, *H. suborbicularis* et *H. transversus*. Si l'on considère que parmi ces quatre espèces alpines il y en a deux qui sont communes à la craie marneuse du nord et du centre de la France, et que l'une d'elles, le *H. suborbicularis*, en est l'un des fossiles caractéristiques, on ne pourra guère douter que les terrains qui les renferment n'appartiennent au même horizon géologique, alors même que leur nature pétrographique diffère considérablement.

I. *HOLASTER SANDOZ DuB.*

Tab. II, fig. 1-3.

C'est à M. DuBois de Montpéreux qu'est due la connaissance de cette belle et grande espèce trouvée par lui dans le grès vert de Souaillon (Canton de Neuchâtel), et figurée dans son voyage autour du Caucase, Tab. I, fig. 11, 12 et 13. J'ignore si elle a été reconnue depuis dans d'autres localités; mais de toute manière elle mérite de fixer l'attention des naturalistes, comme espèce très-bien caractérisée : 1° par ses dimensions plus considérables que celles qu'affectent habituellement les *Holaster*; 2° par sa forme régulière et uniformément bombée à la face supérieure. L'ouverture buccale est en forme de croissant, assez rapprochée du bord antérieur et située dans une dépression résultant de la réunion des ambulacres. L'ouverture anale, placée à-peu-près à l'extrémité de la face inférieure-postérieure, est allongée dans le sens du diamètre longitudinal. Le sillon de l'aire ambulacraire antérieure est large et assez profond; mais les pores y sont moins rapprochés que dans les autres ambulacres, par la raison toute simple que les plaques dans lesquelles ils s'ouvrent sont plus hautes. Les ambulacres pairs forment tous une légère inflexion avant d'atteindre le sommet. L'appareil oviducal qui, malheureusement, n'est pas très-distinct, occupe l'espace compris entre le point culminant des ambulacres postérieurs et celui des ambulacres antérieurs. On remarque quatre petites ouvertures, deux en avant et deux en arrière des ambulacres antérieurs; ce sont évidemment les pores oviducaux. La surface de toutes les plaques, y compris celles de l'appareil oviducal, présente une fine granulation très-homogène. Le test lui-même est très-mince, comme dans la plupart des genres de cette famille.

Le gisement de grès vert de Souaillon, où cette intéressante espèce a été découverte, repose sur le calcaire jaune de notre néocomien; mais il est maintenant inaccessible, et recouvert de murs et d'une route construite récemment.

II. *HOLASTER L'HARDY DuB.*

Tab. 2, fig. 4-6.

Le *Holaster L'Hardy* est, comme le *Hol. complanatus*, un fossile propre aux marnes néocomiennes; mais on le rencontre moins fréquemment que ce dernier, et c'est là, sans doute, ce qui a fait que l'on a pendant longtemps confondu les deux espèces sous un même nom, malgré les différences très-notables qui existent entre elles. En effet, le *Hol. L'Hardy* ne présente point cet affaissement remarquable de la face supérieure vers la région buccale, qui est l'un des caractères saillants du *Hol. complanatus*; son sommet est, au contraire, à-peu-près uniformément bombé, sauf un léger renflement de l'aire interambulacraire impaire en forme de quille, qui ne se retrouve point dans le *Hol. complanatus*. Si, en outre, on examine attentivement la structure des ambulacres, on verra que les pores sont simples dans le *Hol. L'Hardy*, tandis que ceux de la rangée externe sont allongés dans le *Hol. complanatus*. Tout cela ressort parfaitement des figures ci-dessus indiquées et de celles que M. DuBois de Montpéreux a données de la même espèce, dans son voyage au Caucase, Tab. I, fig. 8, 9 et 10. Il est plus facile de confondre le *Hol. L'Hardy* avec le *Hol. intermedius* du Portlandien. La principale différence entre ces deux espèces consiste dans la conformation de la face postérieure qui est presque verticale dans le *H. L'Hardy*, tandis qu'elle est très-inclinée dans le *Hol. intermedius*. La bouche est de grandeur moyenne et de forme arrondie. L'anus, qui s'ouvre au bord supérieur de la face postérieure, est à-peu-près de même grandeur, mais de forme elliptique. Les sommets des ambulacres postérieurs et antérieurs sont assez rapprochés, moins cependant que dans le *Hol. complanatus*, de manière qu'il reste encore un certain espace pour l'insertion de l'appareil oviducal, qui est d'ailleurs disposé, comme dans toutes les espèces de *Holaster*, c'est-à-dire qu'il y a deux pores oviducaux en avant des ambulacres antérieurs et deux en arrière. L'aire ambulacraire impaire qui occupe le sillon antérieur est plus large que les quatre aires ambulacraires paires. Il

n'en est pas de même des aires interambulacraires dont les deux antérieures paires sont de beaucoup plus larges que les trois autres; caractère qui se retrouve, d'ailleurs, plus ou moins prononcé dans toutes les espèces de ce genre. Le fond de toutes les plaques offre une fine granulation du milieu de laquelle s'élèvent de plus gros tubercules, dont les dimensions augmentent en approchant de la face inférieure.

### III. *HOLASTER SUBGLOBOSUS* Ag.

Tab. 2, fig. 7-9.

Syn. *Holaster subglobosus* Agass. Prod. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, p. 185.  
*Spatangus subglobosus* Leske, (n° 81, p. 240. Tab. 54, fig. 2, 3). — Defr. (Dict. Sc. nat., tab. L. p. 94). — De Bl. (Zooph., p. 185). — Gldf. (Petref., n° 2, p. 148. Tab. 45, fig. 4). — E. Desl. (Enc. II, p. 689, n° 19). — Encycl. méth. (Tab. 157, fig. 7, 8). — DesM. (Tabl. synopt., p. 398, n° 38). non. Lam.  
*Echinus subglobosus* Lin. Gm. (p. 3198, n° 96).

Je rapporte à cette espèce, si fréquemment mentionnée par les auteurs, plusieurs exemplaires de *Holaster* trouvés par M. Studer, à Neueneck, dans la chaîne du Sentis. On ne saurait, en effet, pour peu que l'on se donne la peine de comparer attentivement, douter de leur identité avec les exemplaires de *Hol. subglobosus*, que l'on trouve si fréquemment dans la craie marneuse de la montagne de Sainte-Catherine, près de Rouen. Tous les traits caractéristiques de l'espèce, tels que sa forme circulaire et bombée à la face inférieure, l'épaisseur remarquable du test et le peu de profondeur du sillon antérieur, se retrouvent dans les exemplaires de M. Studer, qui sont dans un état de conservation rare pour des fossiles alpins (voir les figures). La bouche est de moyenne grandeur, légèrement allongée dans le sens du diamètre transversal. L'anus est situé à la face postérieure, plus rapproché du bord supérieur que du bord inférieur. Les aires ambulacraires sont proportionnellement étroites et très-pointues. Les pores sont assez rapprochés et réunis par un très-petit sillon qui les fait paraître allongés. Toute la surface du test est uniformément recouverte d'une fine gra-

nulation présentant un aspect très-homogène. Il n'y a guère que les aires ambulacraires qui soient un peu plus lisses à la face inférieure. L'appareil oviducal n'est pas suffisamment conservé pour pouvoir être décrit rigoureusement; cependant l'on remarque les ouvertures de quelques-unes des plaques oviducales entre le sommet des aires ambulacraires postérieures et celui des aires ambulacraires antérieures.

#### IV. HOLASTER COMPLANATUS Ag.

Tab. II, fig. 10-12.

Syn. *Holaster complanatus* Agass. Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, p. 183, et Notice sur les fossiles crétacés. Ibid. p. 128.

*Spatangus complanatus* De Bl. (Zooph. p. 185).

*Spatangus retusus* Lam. (Syst. III, p. 55, n° 16). — Gldf. (p. 149, n° 6. Tab. 46, fig. 2). — E. Desl. (Enc. II, p. 689, n° 18). — Defr. (Dict. sc. nat. L. p. 94. — Gratel. (Dax n° 5). — DesM. (Tabl. synopt. p. 408, n° 54).

*Spatangus helvetianus* Defr. (Dict. Sc. nat. L. p. 87).

*Spatangus argillaceus* Phill. (Geol. of. York. Tab. 2, fig. 4).

*Echinospatangus cordiformis* Breyn (Echin. p. 61. Tab. 5, fig. 3, 4).

*Echinus complanatus* L. Gm. (p. 5198, exclus. synonym.).

*Spatangus oblongus* De Luc. (Coll.). — Al. Br. (Annal. des Mines, 1821, p. 555. T. 7, fig. A, B, C.).

Il n'est aucun fossile qui ait été cité plus fréquemment et sous des noms plus divers que le *Hol. complanatus*; la liste des synonymes eût occupé à elle seule plusieurs pages, si je n'avais cru devoir me borner à mentionner les auteurs les plus modernes et les plus connus. Cette prolixité s'explique, au reste, facilement, si l'on songe que, se trouvant ordinairement en nombre considérable dans les couches qui le recèlent, il n'a guère pu échapper à l'attention des géologues. Il existe dans l'argile de Speeton, dans les marnes bleues de Wiltshire et de Sussex, dans le grès vert supérieur de Wiltshire, dans le département de l'Aube et sur différens autres points de la France. Goldfuss le cite également dans le calcaire jurassique de Souabe; mais cette citation repose sans doute sur une fausse appréciation du terrain,

comme nous en avons fait l'expérience à l'égard du terrain néocomien de Suisse, que l'on a aussi envisagé comme appartenant à la série jurassique. Mais il n'est aucun terrain dans lequel le *H. complanatus* se trouve plus fréquemment que dans les marnes du néocomien. Les marnières de Haute-rive et de Cressier, dans le canton de Neuchâtel, en fournissent un très-grand nombre; et ce qui mérite d'être remarqué, c'est qu'on les trouve ordinairement par nichées de six et dix, et même davantage, d'où l'on peut conclure qu'ils vivaient par troupes comme tant d'autres animaux marins. Enfin, MM. Studer, de Berne, et A. Escher de la Linth, l'ont aussi trouvé dans plusieurs localités des Alpes suisses.

Les caractères spécifiques du *H. complanatus* sont assez tranchés pour qu'on n'ait pas à craindre de le voir souvent confondu avec d'autres espèces. Je ne reviendrai point ici sur tous les détails de structure indiqués dans ma *Notice sur les Fossiles du terrain crétacé du Jura neuchâtelois*, insérée dans le 1<sup>er</sup> vol. des *Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel*. Il me suffira de rappeler que ce qui le distingue surtout de ses congénères, c'est la structure des ambulacres, dont les pores, au lieu d'être simples comme dans les espèces précédentes, sont réunis par un sillon, ou plutôt les pores externes sont allongés dans le sens horizontal, de manière à paraître réunis aux internes. Le sommet ambulacraire est subcentral, plus rapproché du bord supérieur que du bord antérieur. Les pores ambulacraires ne sont pas visibles sur une égale étendue dans les divers ambulacres; ceux des ambulacres postérieurs disparaissent, ou, du moins, se réduisent à très-peu de chose avant d'avoir atteint le tiers de l'espace qui sépare le sommet du bord inférieur; les antérieurs, au contraire, s'étendent jusqu'aux deux tiers de cet espace (fig. 40). On remarque, en outre, que les ambulacres pairs, et notamment les antérieurs, forment, avant de se réunir au sommet, une courbe assez prononcée. L'appareil oviducal est restreint à un très-petit espace, à raison de la faible distance des ambulacres postérieurs aux ambulacres antérieurs, d'où il résulte que les pores oviducaux sont ici plus serrés que dans d'autres espèces. La surface entière du test est recouverte d'une fine granulation à peine visible à l'œil nu, du

milieu de laquelle naissent de plus gros tubercules, qui recouvrent également toutes les plaques et ne manquent que sur les aires ambulacraires postérieures, aux abords de la bouche. Goldfuss indique comme caractère essentiel de cette espèce l'affaissement considérable de la face antérieure. Il est vrai que cet affaissement existe dans un grand nombre d'individus; mais il en est d'autres, dont la face supérieure est à-peu-près uniformément bombée. Cette différence tient, sans doute, ainsi que je l'ai fait observer dans la notice ci-dessus mentionnée, à la mobilité du test, qui a dû être très-grande, autant, du moins, qu'il est permis d'en juger par la variété de formes qu'il affecte. Il est fort rare, en effet, de trouver deux exemplaires de forme parfaitement semblable. J'en conclus que l'on ne doit pas attacher une trop grande importance à ce caractère. Peut-être aussi les variétés que l'on observe à cet égard sont-elles le résultat de l'âge; il paraît constant, au moins, que les petits exemplaires, qui sont sans doute les jeunes, affectent moins cette forme inclinée de la face antérieure supérieure, que les plus grands.

De ce que nous venons de dire en commençant, il résulte que le *Hol. complanatus* appartient exclusivement à l'étage inférieur de la craie, et qu'il en est l'un des fossiles caractéristiques. En effet, je ne sache pas qu'on l'ait jamais cité dans la craie blanche; et nous avons vu que l'indication de Goldfuss est très-probablement erronée, d'autant plus qu'il le cite aussi à Saint-Blaise, dans le calcaire jurassique, lequel est notre calcaire néocomien. La présence de ce fossile dans les terrains des Alpes, à Därlingen, dans l'Avare-Alp, au Lohner, à Strunneck, près du Schrattenberg, au Salève, dans la chaîne du Sentis, etc., acquiert dès-lors une importance majeure, et en s'aidant de la présence d'autres fossiles, également particuliers aux terrains néocomien et du grès vert, tels que le *Discoidea macropyga* et autres, on peut sans doute en conclure que les couches qui les recèlent sont non seulement crétacées, mais aussi qu'elles font partie de l'étage inférieur de la craie.



V. *HOLASTER LAEVIS* Ag.

Tab. III, fig. 1-3.

Syn. *Holaster laevis* Ag. Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 185.  
*Spatangus laevis* De Luc. — Al. Br. (Descr. géol. p. 97, 399, T. 9, fig. 12). —  
 Defr. (Dict. Sc. nat. L. p. 96). — E. Desl. (Encycl. II, p. 689, n° 85). — DeBl.  
 (Zooph. p. 186); — DesM. (Tabl. synopt. p. 406, n° 52).

Un caractère saillant distingue cette espèce de toutes ses congénères : c'est l'aplatissement extrême de sa face inférieure, au point que, vue de profil, sa base présente une ligne à-peu-près droite. Le même caractère se rencontre, il est vrai, dans le *Hol. suborbicularis* ; mais il y a cette différence entre les deux espèces, c'est que l'aire interambulacraire impaire forme, dans le *Hol. suborbicularis*, un petit renflement à la face supérieure, d'où il résulte que l'ouverture anale n'est point visible d'en haut, comme c'est le cas du *Hol. laevis*.

La bouche est assez grande et allongée transversalement. La face postérieure, au milieu de laquelle s'ouvre l'anus, est plus élevée que la face antérieure, et présente une troncature assez prononcée. Le sillon antérieur est très-peu sensible, et ne commence guère que vers la base ; aussi la face supérieure du test est-elle très-régulière et sans aucune ondulation. Les ambulacres pairs se courbent légèrement avant d'atteindre le sommet. Leurs pores sont beaucoup plus serrés que ceux de l'ambulacre impair, qui est logé dans le sillon antérieur. La surface de toutes les plaques, y compris celles de l'appareil oviducal, paraît avoir été recouverte d'une fine granulation dont on ne reconnaît cependant que de faibles traces dans l'exemplaire figuré. L'original appartient au Musée de Berne, et a été trouvé par M. Studer, dans le grès vert de la Perte du Rhône.

VI. *HOLASTER TRANSVERSUS* Ag.

Tab. III, fig. 4-5.

Le caractère saillant de cette espèce gît dans sa forme comprimée d'avant en arrière, de manière que le diamètre transversal est plus grand que le diamètre longitudinal. Peut-être m'objectera-t-on que ce n'est point là la forme naturelle de l'oursin, qu'elle n'est que le résultat d'une pression. Sans vouloir soutenir le contraire d'une manière absolue, je pense cependant que la régularité de toutes les parties du test et la parfaite symétrie des aires ambulacraires et interambulacraires paires doivent exclure, au moins pour le moment, cette supposition.

A part sa forme générale, le *Hol. transversus* se rapproche, par les détails de sa structure, du *Hol. suborbicularis*, avec lequel il se rencontre dans les mêmes terrains alpins. Si donc il y avait lieu de l'identifier avec une espèce quelconque, ce serait, avant tout, au *Hol. suborbicularis* qu'il faudrait songer. En effet, comme dans cette espèce, la face inférieure est presque plane; le sillon antérieur est large et peu profond. L'ouverture anale, de forme elliptique, est placée à la face postérieure, et assez éloignée de la base. Les ambulacres, composés de pores simples, convergent en droite ligne de la base au sommet; l'aire ambulacraire impaire, qui occupe le sillon antérieur, est sensiblement plus large que les autres. Le test est très-mince, et paraît avoir été uniformément garni de petits tubercules et d'une fine granulation, comme dans la plupart des espèces de ce genre. La face inférieure n'est pas assez bien conservée pour avoir pu être représentée.

Je ne connais qu'un seul exemplaire de cette espèce. Il provient de la montagne des Fis, où il a été trouvé par M. Studer. Son aspect est charbonné comme le sont un grand nombre de fossiles alpins, en particulier ceux de cette localité.

VII. *HOLASTER INTERMEDIUS* Ag.

Tab. III, fig. 6-8.

Syn. *Holaster intermedius* Ag. (Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 183).  
*Spatangus intermedius* Mstr. (Gold. Petr. p. 149, n° 5. Tab. 46, fig. 1). —  
 DesM. (Tabl. synopt. p. 398, n° 36).

Deux exemplaires du *Hol. intermedius*, trouvés par M. Aug. de Montmolin, dans le roc compacte de la gorge du Seyon, qui est une cluse ouverte dans le terrain portlandien, m'ont fourni la preuve incontestable que cette espèce appartient à l'époque jurassique. Elle mérite dès-lors une attention toute particulière, comme le plus ancien représentant, aujourd'hui connu, du type des *Holaster*. C'est en même temps l'une des espèces les plus régulières par sa forme et sa structure, et par conséquent aussi l'une des plus difficiles à caractériser. La ressemblance est surtout frappante entre le *Hol. L'Hardy* (Tab. II, fig. 4-6) et notre *Hol. intermedius*, à tel point qu'il faut une très-grande habitude pour pouvoir se prononcer sans hésitation entre ces deux espèces. Il importe dès-lors d'en bien étudier tous les caractères afin de ne pas courir le risque de confondre, comme on l'a fait si souvent, le néocomien avec le portlandien, en s'appuyant sur une prétendue identité des fossiles qu'ils renferment.

Le seul caractère un peu saillant par lequel le *Hol. intermedius* diffère du *Hol. L'Hardy*, c'est l'inclinaison plus marquée de la face postérieure, de manière que, vue d'en haut, l'ouverture anale paraît plus éloignée de la base que dans l'autre espèce. La structure des ambulacres est la même dans les deux; les pores sont disposés par paires simples, assez rapprochés et visibles jusque près de la base. Le sillon antérieur est large et profond, mais ses bords sont un peu plus renflés dans le *Hol. intermedius* que dans le *Hol. L'Hardy*. L'ouverture buccale est assez éloignée du bord; sa forme paraît être subcirculaire. Enfin la surface du test est couverte d'une fine granulation et de tubercules, comme toutes les espèces que nous avons décrites jusqu'ici. Le test lui-même est très-mince.

VIII. *HOLASTER ALTUS* Ag.

Tab. III, fig. 9-10.

Le nom que je donne à cette espèce a trait à l'un de ses principaux caractères, la hauteur extraordinaire du test. Cependant tous les exemplaires ne sont pas proportionnellement aussi élevés que celui qui est ici figuré. A part cette particularité, le *Hol. altus* se distingue encore de ses congénères par l'extrême largeur de ses aires ambulacraires, dont les plaques débordent de beaucoup les ambulacres proprement dits, ou les lignes des pores; ce second caractère est surtout sensible dans les moules intérieurs (fig. 9). Il existe deux sillons assez prononcés, l'un à la face antérieure, dans lequel se loge l'aire ambulacraire impaire, et l'autre à la face postérieure; ce dernier est moins distinct dans notre figure. Les aires interambulacraires, à raison de la grande largeur des ambulacraires, n'occupent proportionnellement pas autant d'espace que dans les autres espèces de *Holaster*, en particulier l'aire interambulacraire impaire et les deux paires antérieures, dont les dimensions égalent à peine celles des aires ambulacraires. L'exemplaire figuré provient de Schratten, dans l'Oberland bernois, d'où il a été rapporté par M. Studer. D'autres exemplaires, faisant partie de la collection du Musée de Neuchâtel, ont été trouvés à la Montagne des Fis. Je n'hésite pas à identifier avec cette espèce plusieurs exemplaires provenant, selon toute apparence, de la craie marneuse de France, et appartenant, l'un à M. Deshayes, et l'autre à la collection du Muséum de Neuchâtel. A l'aide de ces exemplaires, beaucoup mieux conservés que les exemplaires des Alpes, on parvient à restaurer cette espèce dans sa parfaite intégrité, en ajoutant les caractères suivans à ceux qui viennent d'être énumérés : l'ouverture buccale est allongée transversalement et surmontée d'une lèvre très-prononcée, formée par la saillie de l'aire interambulacraire impaire. L'ouverture anale est elliptique dans le sens du diamètre vertical. Le test est assez épais et recouvert d'une fine granulation et de petits tubercules qui ont disparu dans les exemplaires alpins.

IX. *HOLASTER SUBORBICULARIS* Ag.

Tab. III, fig. 11-13.

Syn. *Holaster suborbicularis* Ag. (Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 183).

*Spatangus suborbicularis* Defr. non Mstr. (Dict. Sc. nat. L. p. 95). — Gldf. (Petref. p. 148, n° 3, Tab. 45, fig. 5). — Al. Br. (Descr. géol. p. 84 et 589, Tab. 5, fig. 5). — DeBl. (Zooph. p. 186). — E. Desl. (Enc. II, p. 687, n° 12). — DesM. (Tabl. synopt. p. 400, n° 39).

*Ananchytes carinata* Lam. (Syst. III, p. 25, n° 5).

Après le *Hol. complanatus*, le *Hol. suborbicularis* est l'espèce qui mérite le plus de fixer l'attention des géologues, à raison de sa fréquence dans tous les terrains de l'étage crétacé supérieur, et parce qu'elle confirme d'une manière évidente l'opinion émise plus haut, savoir, que les terrains des Alpes sont en grande partie de la craie, appartenant tantôt à l'étage inférieur de cette formation (ceux qui renferment le *Hol. complanatus*), tantôt à l'étage supérieur (ceux dans lesquels on trouve le *Hol. suborbicularis*).

J'ai sous les yeux une série d'exemplaires provenant, les uns, de la craie marneuse de Normandie; les autres, des Alpes, entre autres, de la Montagne des Fis, du Buet et du Reposoir. Goldfuss signale la même espèce dans la craie de Maastricht. DesMoulins la cite en Champagne, et Dufrénoy la mentionne dans la craie de Biarritz. En comparant l'exemplaire figuré, l'un des mieux conservés que les Alpes nous aient fournis, avec les exemplaires de la craie de Rouen, on ne saurait méconnaître leur identité spécifique. Les mêmes caractères que Goldfuss (non pas Munster) signale comme propres à l'espèce se retrouvent dans les uns et les autres, de manière qu'il n'y a pas lieu de douter que les exemplaires de Maastricht n'appartiennent également à la même espèce. Voici quels sont les caractères spécifiques du *Hol. suborbicularis*: sa forme est allongée avec une tendance à se rétrécir vers

le côté postérieur. La face inférieure est plane ou à-peu-près (\*). Le test est mince, recouvert d'une très-fine granulation, à peine visible à l'œil nu, et pourvu, en outre, d'un certain nombre de plus gros tubercules, assez irrégulièrement répartis à la face supérieure, mais qui n'existent point dans l'exemplaire figuré, qui est un moule. Les trois ambulacres se réunissent un peu en avant du sommet, celui-ci étant occupé par l'espace compris entre les ambulacres antérieurs et les postérieurs. Le sillon antérieur est large et assez profond ; il est occupé, comme dans toutes les espèces, par l'aire interambulacraire impaire, dont les plaques sont beaucoup plus hautes que celles des autres aires ambulacraires ; d'où il résulte que les pores y sont aussi plus éloignés ; car il n'y en a jamais qu'une paire pour une plaque. L'ouverture buccale est grande et légèrement allongée dans le sens du diamètre transversal. L'ouverture anale est située à la face postérieure, immédiatement au-dessous de la saillie formée par l'aire interambulacraire impaire, de manière qu'elle n'est jamais visible d'en haut.

#### X. HOLASTER COULONI Ag.

Tab. IV, fig. 9-10.

Cette espèce, récemment découverte par M. Coulon, dans le calcaire néocœmien du Mormont (Canton de Vaud), n'a encore été mentionnée nulle part. Elle présente une assez grande ressemblance avec le *Hol. complanatus*, dont elle est cependant distincte par ses ambulacres beaucoup plus larges, et par sa forme plus déprimée et plus uniformément bombée à la face supérieure. Le test est d'une ténuité extrême. Les ambulacres, aussi larges que les aires ambulacraires qu'ils embrassent, convergent en droite ligne vers le sommet, de manière cependant à y laisser, comme d'habitude, un certain espace libre entre les ambulacres postérieurs et les antérieurs, espace qui est occupé par une partie de l'appareil oviducal. La face inférieure n'est

(\*) Ce caractère ne ressort pas, il est vrai, de la figure de Goldfuss, mais il est formellement indiqué dans sa description.

pas assez bien conservée dans les exemplaires que possède le Musée de Neuchâtel, pour que j'aie cru devoir la figurer.

### 3<sup>e</sup> Genre. **MICRASTER** Ag.

Le genre *Micraster*, tel que je l'ai établi dans mon *Prodrome*, n'existe point dans les terrains antérieurs à la craie ; on n'en connaît pas non plus dans les terrains tertiaires, ni dans l'époque actuelle, les quelques espèces mentionnées sous cette rubrique dans mon *Prodrome* ayant dû passer dans le genre *Schizaster*. La plupart des *Micraster* appartiennent à l'étage supérieur de la craie ; quelques-uns seulement au grès vert. Parmi les espèces que la Suisse nous a fournies, deux proviennent du calcaire alpin, et une du grès vert de la Perte du Rhône.

On distinguera toujours très-facilement le genre *Micraster* du genre *Holaster* à ses ambulacres déprimés à la face supérieure. La différence est également très-tranchée entre le genre *Micraster* et celui des vrais *Spatanges*, dont le caractère principal est d'avoir des ambulacres pétaloïdes ; comme aussi entre les *Micraster* et les *Schizaster* ; cependant il est quelques espèces placées, pour ainsi dire, aux confins de ces deux genres, qui peuvent présenter quelques difficultés dans la distinction générique. Les *Micraster* sont généralement moins allongés que les *Schizaster*, leurs ambulacres sont déprimés à la face supérieure, mais jamais au point de déterminer des sillons bien profonds ; et ce qui, à cet égard, mérite surtout d'être remarqué, c'est que tandis que l'ambulacre impair ou antérieur forme le sillon le plus large et le plus profond dans les *Schizaster*, il est, au contraire, peu sensible, quelquefois même entièrement plane, et toujours moins profond que les autres ambulacres dans les espèces du genre *Micraster*. Je n'insisterai point ici sur un autre caractère distinctif des *Schizaster*, qui est d'avoir l'étoile des ambulacres cernée par une dépression lisse, très-marquée dans les espèces vivantes, mais qui, la plupart du temps, est moins visible dans les espèces fossiles.

L'ouverture buccale, située invariablement à la partie antérieure de la

face inférieure est bilabiée comme dans les vrais *Spatangues*. L'ouverture anale est marginale et située à la partie supérieure de la face postérieure. La surface entière du test est recouverte de tubercules plus ou moins développés; les plus gros sont sur l'aire interambulacraire impaire à la face inférieure. L'appareil oviducal n'occupe qu'un très-petit espace au sommet du disque; sa présence est ordinairement indiquée par quatre pores oviducaux très rapprochés les uns des autres.

### I. *MICRASTER COR-ANGUINUM* Ag.

Tab. III, 14-15.

Syn. *Micraster cor-anguinum* Ag. (Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 184).

*Spatangus cor-anguinum* Lam. (Syst. III, p. 52, n° 15). — DeFr. (Dict. Sc. nat. L. p. 95). — DeBl. (Zooph. p. 185). — Al. Br. (Descr. géol. p. 388, Tab. 4, fig. 11 optima). — Gldf. (Petref. p. 157, n° 25. Tab. 47, fig. 6, a-c). — Leske (apud Klein. Tab. 23, fig. C.). — DesM. (Tabl. synopt. p. 402, n° 44). — E. Desl. (Enc. II, p. 688, n° 17). — Encycl. méth. (Tab. 155, fig. 4-6).

*Echinus cor-anguinum* L. Gm. (p. 5195, var. b. c. d. e.)

*Oursin cœur d'anguille* Bosc. (Déterw. XXIV, p. 282).

*Echinites corculum* Schl. (Petref. p. 511).

*Ananchytes spatangus* Lam. (Syst. III, p. 26, n° 9). E. Desl. (Enc. II, p. 65, n° 9).

*Spatangus ananchytoïdes* DesM. (Tab. synopt. p. 406, n° 48).

*Ananchytes cordata* Gratel. (Dax. n° 9. Tab. 2, fig. 2, non. Lam.)

*Spatangus ananchytes* DeBl. (Zooph. p. 185).

*Spatangus pentaphyllites* Lam. (Etiquette du Museum de Paris).

*Spatangus punctatus* Lam. (Syst. III, p. 52, n° 14). — DeFr. (Dict. Sc. nat. L. p. 95). — E. Desl. (Enc. II, p. 688, n° 16). — DeBl. (Zooph. p. 185). — DesM. (Tabl. synopt. p. 404, n° 46).

La multitude de noms que l'on a donnés à cette espèce caractéristique des terrains crétacés supérieurs est une preuve évidente de sa fréquence dans les différentes localités où ces terrains ont été explorés. Lamarek lui-même, trompé sans doute par l'aspect très-variable qu'elle présente, suivant que le test est plus ou moins bien conservé ou qu'il n'existe que le moule, lui a



donné des noms divers qu'il importe de faire disparaître. C'est ainsi que je me suis convaincu, par un examen attentif des exemplaires originaux du Muséum de Paris, que son *Sp. punctatus*, son *Sp. pentaphyllites*, son *Sp. semiglobosus* et son *Sp. ananchytes*, ne sont point des espèces différentes du *Micraster cor-anguinum*. Le *Sp. ananchytes* n'en est que le moule.

D'un autre côté, il faut convenir aussi que depuis Lamarck on a confondu sous la même dénomination plusieurs espèces qui, plus tard, ont été reconnues pour distinctes, ou qui devront l'être à l'avenir. Goldfuss a détaché du *M. cor-anguinum* son *Sp. cor-testudinarium*, caractérisé, selon lui, par sa bouche moins marginale et par un nombre moins considérable de tubercules sur l'aire interambulacraire impaire de la face inférieure. J'ignore jusqu'à quel point cette différence est constante; mais je pense que l'on devra maintenir cette distinction jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il existe des passages incontestables de l'un à l'autre. L'exemplaire figuré, trouvé par M. Studer dans le calcaire alpin, a malheureusement la face inférieure très-détériorée; cependant quelques traces indistinctes de l'ouverture buccale m'engagent à l'assimiler de préférence au *M. cor-anguinum*. De toute manière, et comme qu'on le détermine, sa présence dans les Alpes de la Suisse sera toujours un fait d'une haute importance, puisque les deux espèces, le *M. cor-testudinarium* et le *M. cor-anguinum*, sont caractéristiques de la craie supérieure.

Les caractères spécifiques du *M. cor-anguinum* sont d'avoir les aires ambulacraires concaves; celles de devant, jusqu'à la moitié environ de l'espace qui sépare le sommet du milieu de la circonférence; celles de derrière, jusqu'à un tiers de cet espace. Au-delà de cette limite, elles sont toutes, sauf l'aire ambulacraire impaire, à fleur du test, comme dans les *Holaster*, et les pores, qui jusqu'ici étaient très-distincts, s'effacent de plus en plus. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les dépressions des aires ambulacraires qu'ailleurs; ceux de la rangée externe sont allongés transversalement, de manière à faire paraître les deux rangées réunies par un sillon; disposition qu'on aperçoit moins distinctement dans l'exemplaire

figuré, qui est un moule, que dans ceux qui ont conservé leur test. Le sillon antérieur est de largeur moyenne, mais peu profond, surtout à l'approche de l'ouverture buccale. L'ouverture anale, de forme elliptique, est située à la partie supérieure de la face postérieure. L'ouverture buccale est allongée transversalement et surmontée d'une forte saillie de l'aire interambulacraire impaire qu'on désigne communément sous le nom de lèvre. Le test, lorsqu'il est conservé, est assez épais et uniformément recouvert de tubercules assez serrés, entourés chacun d'un cercle de plus petites granules qu'on ne peut apercevoir qu'à la loupe. Les tubercules atteignent leur maximum de grosseur sur l'aire interambulacraire impaire de la face inférieure; ils sont, au contraire, petits et peu nombreux sur les aires ambulacraires. L'appareil oviducal a laissé quelques traces de sa présence dans les quatre pores qu'on aperçoit au sommet du disque.

On n'a trouvé jusqu'ici que deux exemplaires de cette espèce dans les Alpes: l'un, qui n'est qu'un fragment, à Mutterschwanden, dans l'Oberland bernois, et l'autre, au Reposoir. L'un et l'autre font partie de la collection du Musée de Berne.

## II. MICRASTER MINIMUS *Ag.*

Tab. III, fig. 16-18.

Cette espèce se rapproche beaucoup, par sa forme et par son aspect, du *Micraster Bufo*, qu'on trouve assez communément dans la craie blanche; et je l'eusse moi-même envisagé comme un jeune de cette espèce, si je n'étais parvenu à dégager la face supérieure du test, de manière à pouvoir étudier avec soin les détails de structure des ambulacres. En effet, les pores, malgré la petitesse de l'exemplaire que j'ai sous les yeux (le seul authentique que je connaisse), sont sensiblement plus gros, plus allongés, et moins nombreux que dans le *Mic. Bufo*. Je regrette que le dessin n'ait pu rendre complètement ces petits détails, qui sont cependant très-importants, puisqu'ils constituent le principal caractère de l'espèce. Les ambulacres

pairs antérieurs comptent chacun dix paires de pores dans le sillon ambulacraire ; les ambulacres pairs postérieurs en comptent treize paires , et l'ambulacre impair, au plus dix : ces derniers sont beaucoup plus petits et plus éloignés les uns des autres que ceux des ambulacres pairs ; aussi a-t-on de la peine à les découvrir, même avec une forte loupe. Dans le *M. Bufo*, au contraire, je compte quatorze paires de pores dans les ambulacres pairs antérieurs, et au moins vingt paires dans les ambulacres pairs postérieurs. A part cette différence, le *M. minimus* ne diffère pas d'une manière sensible de son congénère. Dans les deux espèces, le sommet est à l'extrémité de la face postérieure, à raison de l'élévation considérable du côté postérieur. Celui-ci est à-peu-près vertical, tandis que la face supérieure ne présente qu'un seul plan incliné. L'ouverture buccale est placée au premier tiers de la face inférieure ; celle-ci est sensiblement bombée par suite du renflement de l'aire interambulacraire impaire ; l'ouverture anale est au haut de la face postérieure. Les sillons ambulacraires sont très-peu profonds, surtout celui de l'aire ambulacraire impaire. Le test est très-mince.

L'exemplaire figuré a été trouvé par M. Studer, dans le grès vert de la Perte du Rhône. Je rapporte provisoirement à la même espèce un autre exemplaire , moins bien conservé, trouvé par le même géologue, au Reposoir.

### III. MICRASTER HELVETICUS *Ag.*

Tab. III, fig. 19-20.

L'oursin que j'ai figuré sous ce nom est des plus défectueux, à tel point que bien des naturalistes, j'en suis sûr, ne se donneraient pas la peine de l'emporter, s'ils le trouvaient quelque part sur leur chemin. Et cependant je l'envisage comme un exemplaire très-précieux, par la raison que les quelques débris du test qui sont conservés à la face supérieure suffisent pour démontrer jusqu'à l'évidence que c'est le type d'une nouvelle espèce, d'autant plus digne d'attention qu'elle est d'origine alpine. En effet, dans aucune autre espèce de *Micraster* à moi connue, le sommet ambulacraire

n'est aussi rapproché du bord antérieur, et dans aucune les sillons ambulacraires ne sont aussi peu profonds. En passant en revue les autres espèces du genre, on trouve que c'est du *M. acutus* DesH., de la craie des Pyrénées, que notre *M. helveticus* se rapproche le plus. La position de l'ouverture anale et la forme de la face postérieure ont une très-grande analogie; les dimensions sont aussi à-peu-près les mêmes. Le test était d'une épaisseur moyenne.

On voit, par cet exemplaire, que dans cette classe du règne animal, aussi bien que dans les autres, il est possible de déterminer des espèces d'une manière rigoureuse d'après des fragmens très-imparfaits. Je dirai plus, il est urgent que les paléontologistes s'habituent à ne plus rejeter les débris incomplets d'animaux inférieurs, comme insuffisans et non susceptibles de déterminations exactes. Cela est surtout nécessaire à l'égard des fossiles provenant de terrains altérés et tourmentés postérieurement à leur déposition, comme ceux des Alpes, où il est rare que l'on trouve un fossile entier.

C'est à M. Studer, de Berne, qu'est due la découverte de cette nouvelle espèce, trouvée par lui à Einsiedeln.

#### 4<sup>e</sup> Genre. **ANANCHYTES** Lam.

Il n'est guère possible de confondre les Ananchytes avec un autre genre quelconque de la famille des Spatangues, tant leurs caractères sont tranchés et constans. En effet, ils sont, entre tous les Spatangues, les seuls qui aient l'ouverture anale placée à la face inférieure. Leur forme est toujours très-élevée, tantôt conique, tantôt bombée, et quelquefois cunéiforme. Leur test est d'une épaisseur considérable, comme on le rencontre dans peu de genres d'Echinites. La bouche est bilabiée et très-rapprochée du bord antérieur. L'anus, de forme elliptique dans le sens du diamètre longitudinal, s'ouvre ordinairement dans un renflement de l'aire interambulacraire impaire, à l'extrémité postérieure de la face inférieure. Les ambulacres sont simples et convergent en droite ligne de la base au sommet. Ce

caractère, joint à l'absence complète du sillon à la face antérieure, les distingue, au premier coup d'œil, du genre *Hemipneustes*, confondu naguères encore avec les *Ananchytes*. L'appareil oviducal est ordinairement grand et très-apparent dans les *Ananchytes*. Il se compose de quatre plaques ovariales et de cinq interovariales occupant l'espace qui sépare, au sommet, les ambulacres antérieurs des ambulacres postérieurs. Toutes ces plaques sont percées d'un trou.

Autant les caractères génériques des *Ananchytes* sont tranchés, autant les caractères distinctifs des espèces sont difficiles à saisir. Goldfuss a distingué plusieurs espèces, figurées dans son grand ouvrage sur les pétrifications d'Allemagne, en s'appuyant uniquement sur les différences de largeur et de hauteur des différentes plaques du test. Comme j'avais à ma disposition un nombre assez considérable d'exemplaires de localités diverses, j'ai essayé de vérifier ces différenciations. J'ai reconnu des variations trop nombreuses entre des individus dont l'identité spécifique n'était pas douteuse, pour ne pas les attribuer à des différences d'âge plutôt que d'y voir des espèces différentes. Je n'admets dès-lors qu'un très-petit nombre d'espèces d'*Ananchytes*, qui toutes appartiennent aux terrains de la craie, et dont l'une, l'*A. ovata*, est, sans contredit, le fossile le plus caractéristique de l'étage supérieur de cette formation. C'est aussi celle qu'on rencontre dans les terrains crétacés supérieurs de la chaîne des Alpes.

Non seulement les *Ananchytes*, tels que je les ai limités dans mon Pro-drome, sont caractéristiques de la formation crétacée, mais bien plus ils paraissent restreints aux terrains de cette époque. Jusqu'ici, au moins, on n'en a trouvé aucune trace ni dans les terrains plus anciens du Jura, ni dans ceux plus modernes de l'époque tertiaire. L'époque actuelle en est entièrement dépourvue.

## ANANCHYTES OVATA Lam.

## Tab. IV, fig. 4-6.

Syn. *Ananchytes ovata* Lam. (Syst.) III, p. 25, n° 1. — (Dict. class. I, p. 517). — Defr. (Dict. Sc. nat. II, p. 40, n° 1). — DeBl. (Zooph. p. 187). — Al. Br. (Descr. géol. p. 15, 390; Tab. 5, fig. 7). — Gldf. (Petref. p. 145, n° 1, Tab. 44, n° 1). — Gratel. (Dax, n° 1). — DesM. (Tabl. synopt. p. 568, n° 1). — Agass. (Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. I, p. 183).

*Echinus ovatus* var. a. L. Gm. (p. 3185).

*Echinocorytes ovatus* Leske (n° 42, p. 178, Tab. 53, fig. 5).

*Echinocorys ovatus* Mant. (Tr. S. Geol. L. 2<sup>e</sup> série III, p. 201).

*Echinites scutatus major* Schl. (Petr. p. 309).

*Echinocorys scutatus* Park. (Org. Rem. III, Tab. 2, fig. 4).

*Oursin ovale* Bosc (Déter. XXIV, p. 282, Tab. G. 25, fig. 5).

*Ananchytes pustulosa* Lam. (n° 4). — E. Desl. (Enc. II, p. 62, n° 4). — Encycl. méth. (Tab. 154, fig. 16, 17). — DeBl. (Zooph. p. 187). — Gratel. (Dax. n° 8, Tab. 2, fig. 10, 11). — Desm. (Tabl. synopt. p. 572, n° 5).

*Echinocorys pustulosus* Leske (n° 43, p. 180. Tab. 16, fig. A. B.).

*Echinus pustulosus* L. Gm. (p. 3185).

*Ananchytes semi-globus* Lam. (Syst. III, p. 25, n° 10). — E. Desl. (Enc. T. 2, p. 63, n° 10).

*Echinus minor* var. a. *papillosus* L. Gm. (p. 3186).

*Ananchytes minor* DeBl. (Zooph. p. 187).

*Echinocorytes minor* var. a. *papillosa* Leske (n° 45, p. 183. Tab. 16, fig. C. D.).

L'*Ananchytes ovata* a été cité à-peu-près partout où l'on a constaté la présence de l'étagé supérieur de la craie. Les auteurs lui ont donné une foule de noms, comme on le voit par la liste des synonymes ci-dessus, dans laquelle je n'ai cependant compris que ceux dont j'ai eu l'occasion d'examiner moi-même les originaux, et ceux que tous les auteurs s'accordent à envisager comme identiques. J'ai tout lieu de croire qu'il en est de plusieurs espèces de Goldfuss comme d'une partie de celles de Lamark; c'est-à-dire que ce sont ou des jeunes, ou des moules, ou bien des exemplaires détériorés; mais n'en ayant point vu les originaux, je m'abstiendrai, pour

le moment, de les identifier. Voici quels sont les caractères spécifiques de l'*A. ovata*. Sa forme est ovale et bombée; sa surface est à-peu-près lisse, les diverses plaques du test n'étant pourvues que de tubercules très-peu saillans. Les ambulacres sont composés de simples paires de pores non réunies par un sillon. A mesure qu'ils approchent du sommet, ces pores se resserrent, et comme il n'y en a qu'une paire pour chaque plaque de l'aire ambulacraire, il en résulte que ces plaques doivent être ici beaucoup moins hautes que vers la région buccale. C'est, en effet, ce qui a lieu, tandis que les plaques interambulacraires conservent, au contraire, la même hauteur depuis la base jusqu'au sommet. Quant à la largeur des plaques, elle est à-peu-près la même dans les aires interambulacraires et dans les aires ambulacraires; mais comme les pores sont au milieu de ces dernières, on se laisse souvent induire en erreur en supposant qu'ils forment, comme dans d'autres genres, la limite de l'aire ambulacraire. L'ouverture buccale est allongée transversalement et très-rapprochée du bord antérieur; on remarque tout à l'entour un cercle de tubercules assez apparens, disposés en croix, formant, à ce qu'il paraît, l'un des caractères distinctifs de l'espèce. L'ouverture anale est petite et de forme ovale; elle est située à l'extrémité de la face inférieure, dans un léger renflement de l'aire interambulacraire impaire. Je n'ai jamais pu distinguer, dans l'appareil oviducal, plus de neuf plaques, cinq interovariales placées au sommet des ambulacres, et quatre ovariales; ces dernières sont les plus grandes.

La présence de l'*A. ovata* dans les terrains alpins est un fait très-important pour la détermination de l'âge de ces mêmes terrains. Quoique les exemplaires trouvés par M. Studer, à Mutterschwanden, soient très-imparfaits, comparativement aux beaux exemplaires de la craie blanche des environs de Meudon, j'ai préféré les figurer tels quels, par la raison qu'ils sont un peu plus petits que la plupart de ceux que l'on rencontre ordinairement dans les collections, et que, d'un autre côté, leur imperfection même est, pour ainsi dire, inhérente à leur nature de fossiles alpins. La description, d'ailleurs, suppléera au dessin.

5<sup>e</sup> Genre. **SPATANGUS** AGASS. (*non Auct.*)

Pour la plupart des auteurs, la famille des Spatangues ne se compose que de deux genres, le genre *Ananchytes* et le genre *Spatangus*. Ce dernier est alors très-nombreux en espèces, puisqu'on y fait habituellement entrer toutes celles de forme allongée qui ont l'anús à la face postérieure, c'est-à-dire les *Holaster*, les *Hemipneustes*, les *Schizaster*, les *Micraster*, les *Brissus*, les *Amphidetus* et les vrais Spatangues. Aussi, M. Ch. DesMoulins compte-t-il dans son genre *Spatangus* plus de soixante espèces.

Le genre *Spatangus*, restreint aux limites que je lui ai assignées dans mon *Prodrome*, se trouve à la fois, dans l'époque actuelle, dans les terrains tertiaires et dans les terrains crétacés. Il n'en existe point, que je sache, dans les formations plus anciennes. La plupart des espèces tertiaires se rapprochent beaucoup des vivantes; ce qui a fait qu'on les a long-temps confondues avec ces dernières; et, de nos jours encore, l'on voit beaucoup d'auteurs citer mainte espèce simultanément dans les terrains tertiaires et dans nos Océans. Désirant savoir jusqu'à quel point ces identités sont réelles, j'ai passé soigneusement en revue ces espèces et je me suis assuré, par la comparaison d'un grand nombre d'exemplaires, qu'il n'existe pas plus d'identité entre les espèces vivantes et les espèces tertiaires, qu'il n'en existe entre les fossiles tertiaires et ceux des époques antérieures.

Le caractère générique le plus saillant du genre *Spatangus* est d'avoir les ambulacres pétaloïdes. Les pores de la rangée externe sont légèrement allongés, tandis que les internes sont ronds. Les deux rangées sont réunies par un sillon très-apparent. Le test est d'une épaisseur moyenne, habituellement recouvert, à la face supérieure des aires interambulacraires, d'un certain nombre de gros tubercules perforés et mammelonés qui lui donnent un aspect très-élégant. L'ouverture buccale, située à la face inférieure, près du bord antérieur, est grande, bilabiée et dépourvue de dents. L'ouverture anale est invariablement à la face postérieure.



## SPATANGUS NICOLETI Ag.

Tab. IV, fig. 7-8.

Avant que M. Cél. Nicolet n'eût commencé ses études sur les hautes vallées tertiaires du Jura, études qui déjà ont fourni de si précieuses données à la géologie de ces contrées, on ne possédait aucun débris d'Oursin provenant de la molasse. Au nombre des découvertes dont la science est redevable à notre savant compatriote, se trouve le fragment de Spatangue auquel j'ai donné son nom.

De toutes les espèces de vrais Spatangues, celles dont le *Sp. Nicoleti* se rapproche le plus sont, le *Sp. ornatus* Defr. (nec Gldf.) qu'on trouve dans le premier étage tertiaire de Bordeaux, et le *Sp. ocellatus* Defr., fréquent à ce qu'il paraît dans le terrain tertiaire de St. Paul-trois-Châteaux. Il a les ambulacres de l'un et les tubercules de l'autre. Sa forme est allongée et déprimée. Les aires interambulacraires sont munies d'un nombre assez considérable de très-gros tubercules mamelonnés et perforés à leur sommet, surgissant d'une dépression très-profonde comme dans le *Sp. ocellatus*, avec cette différence cependant que la dépression qui entoure le mamelon est plus profonde. Les parties qui ne sont point recouvertes par ces gros tubercules présentent une fine granulation, dont les grains augmentent progressivement de dimension vers la face inférieure.

Les aires ambulacraires sont larges et finement granulées comme dans le *Sp. ornatus* Defr. Les ambulacres eux-mêmes sont fort espacés et les pores très-dilatés; il n'y en a guère que vingt-cinq à vingt-huit paires dans les ambulacres pairs postérieurs et vingt-deux à vingt-quatre dans les ambulacres antérieurs. Les pores sont réunis par un sillon très-profond. Le test est mince.

L'exemplaire figuré, le seul qui existe à ma connaissance, a été trouvé dans la molasse de la vallée de La Chaux-de-Fonds.

6<sup>e</sup> Genre. **CLYPEUS.**

Ce genre fut établi par Klein, qui y fit sans doute entrer toutes les espèces de la famille des Clypeaster, qui ont les ambulacres réunis et l'ouverture anale située dans un sillon à la face supérieure. Les auteurs qui vinrent après lui ne tinrent pas compte de ce genre ainsi délimité, les uns l'envisageant comme identique avec les Nucléolites, les autres avec les Galérites, etc. Persuadé pour ma part que les Clypeus constituent réellement un type à part de la famille des Clypeaster, je les ai réintégrés dans leurs droits en les plaçant dans mon *Prodrome* etc., à côté des Nucléolites. Depuis la publication de ce mémoire j'ai eu l'occasion d'en étudier et d'en comparer un certain nombre qui m'étaient entièrement inconnus auparavant, et j'ai cru devoir détacher du genre Clypeus plusieurs espèces, tels que le *Cl. Scutella* (Nucleolites Scutella Gldf.) et le *Cl. testudinarius* (Nucl. testudinarius Mstr.), pour les réunir sous le nom de *Pygorhynchus*, à certaines espèces d'Echinolampas et de Nucléolites que l'ensemble de leurs caractères semblent associer. Ainsi réduit, le genre Clypeus peut être caractérisé de la manière suivante. Ce sont des oursins de forme circulaire, ayant l'ouverture anale à la face supérieure dans un sillon plus ou moins profond de l'aire interambulacraire impaire; les ambulacres convergent vers le sommet et vers la périphérie du disque; la face supérieure est uniformément bombée et, à part le sillon anal, on ne remarque aucune différence de niveau entre les aires ambulacraires et les aires interambulacraires, tandis qu'au contraire la face inférieure est fortement ondulée par suite de la dépression des ambulacres. L'ouverture buccale est centrale ou légèrement subcentrale, de forme pentagonale et protégée par de forts bourrelets formés par le renflement de l'extrémité des aires interambulacraires. La plupart des espèces sont de grande taille.

Ainsi caractérisés, les Clypeus ne courront pas le risque d'être confondus avec les Pygorhynchus, à cause de leur forme essentiellement circulaire, ni

avec les Nucléolites à cause de la nature de leurs ambulacres et de la forme de l'ouverture buccale.

Les Clypeus sont, à ce qu'il paraît, un type essentiellement jurassique ; au moins je n'en connais aucune espèce qui provienne soit de terrains plus anciens, soit de terrains plus récents. Sur six espèces que je connais de ce genre, quatre se trouvent dans le Jura suisse.

# I. CLYPEUS SOLODURINUS Ag.

Tab. V, fig. 1-3.

Un caractère essentiel de cette espèce c'est la forme anguleuse et tronquée de la face postérieure. Outre cette particularité, il en est d'autres non moins fixes et exclusives qui méritent aussi de fixer l'attention et qui servent également à la différencier de ses congénères, lorsque, comme il arrive souvent, les bords du test sont ébréchés. Et d'abord l'ouverture anale est bien plus rapprochée du sommet que dans le *Cl. patella*, figuré sur la même planche. Les aires ambulacraires, composées, comme les ambulacres eux-mêmes, de plaques très-étroites, sont en revanche moins larges et se rapprochent davantage, par leur forme effilée, des ambulacres du *Cl. angustiporus*, autre espèce jurassique qu'on trouve en Normandie ; en sorte que, sous le rapport des ambulacres, le *Cl. solodurinus* tient le milieu entre les deux espèces que je viens de mentionner. Sa forme générale est assez déprimée. La face inférieure est régulièrement ondulée par suite de la dépression des ambulacres. La bouche, légèrement subcentrale du côté antérieur, est régulièrement pentagonale, entourée de cinq bourrelets saillants, formés par le renflement de l'extrémité des aires interambulacraires. L'appareil oviducal n'est malheureusement pas conservé dans l'exemplaire figuré, le seul que je connaisse entier. Le test est assez épais et recouvert d'une granulation assez uniforme sur toutes les parties intactes.

Je dois la communication de cette espèce à M. Strohmeier, curé à Obergösschen (Canton de Soleure), qui l'a trouvée dans le voisinage de

son habitation. Le terrain d'où elle provient n'a pu m'être indiqué d'une manière bien précise, mais l'on voit par la brisure du sommet (fig. 1) que c'est une roche très-oolitique, probablement de l'Oolite inférieure.

## II. CLYPEUS PATELLA Ag.

Tab. V, fig. 4-6.

Syn.: *Clypeus patella* Ag. (Prodr. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 186).

*Galerites patella* Lam. (n° 14). — E. Desl. (Enc. t. 2. p. 434 n° 14). — Encycl. méth. (pl. 143. fig. 1. 2.)

*Nucleolites patella* Defr. (Dict. sc. nat. Vol. 35. p. 213). — DesM. (Tabl. synopt. p. 354. n° 3).

*Echinoclypeus patella* De Bl. (Zooph. p. 189.)

Cette grande et belle espèce appartient à l'étage oolitique inférieur. Quoique assez souvent mentionnée par les auteurs, elle n'est cependant pas fréquente dans nos chaînes jurassiques. Nous avons vu, en parlant du *Cl. solodurinus*, qu'elle se distingue de cette espèce par des ambulacres plus larges et plus arrondis. En outre sa forme générale est plus bombée et l'ouverture anale, située dans le profond sillon de l'aire interambulacraire impaire, est moins rapprochée du sommet. L'ouverture buccale a la forme d'une étoile pentagonale, dont les cinq angles correspondent aux cinq aires ambulacraires. Celles-ci sont sensiblement déprimées à la face inférieure; et les pores y sont très-petits et bien moins serrés qu'à la face supérieure. En les examinant attentivement à la loupe on remarque qu'ils sont disposés par triples paires obliques, à-peu-près comme dans les vrais *Echinus* et les *Pédines*, caractère qui n'a pas été rendu assez distinctement dans le dessin de fig. 5, où l'on n'en voit que quelques rangées simples. Les fins sillons qui unissent les pores à la face supérieure disparaissent à partir du bord de la circonférence du test et sur toute la face inférieure on n'en remarque plus aucune trace. L'appareil oviducal n'occupe pas précisément le sommet du test; il penche légèrement vers

le bord postérieur. On remarque quelques-uns des trous oviducaux entourant un corps d'aspect spongieux, comme dans les Discoïdées et plusieurs autres genres de cette famille. La structure du test rappelle celle des vrais Clypéastres, en ce que sa surface entière est recouverte de petits tubercules surgissant du milieu d'une dépression circulaire qui les entoure; ceux de la face inférieure sont plus apparens que ceux de la face supérieure. Le test lui même est épais.

L'original de mes figures fait partie de la collection du Musée de Neuchâtel. Il provient de l'oolite inférieure des environs de Porrentruy.

### III. CLYPEUS HUGI *Ag.*

Tab. X, fig. 2-4.

Le sillon de l'aire interambulacraire impaire est proportionnellement très-court dans cette espèce, de manière qu'il se trouve en grande partie occupé par l'ouverture anale. Cette circonstance, jointe à la petitesse de sa taille suffit pour la faire distinguer au premier coup-d'œil des *Cl. solodurinus* et *Cl. patella* figurés sur la Pl. 5. Les ambulacres convergent complètement vers le sommet. Leur structure est la même que dans les autres espèces du genre, c'est-à-dire que la rangée de pores interne est composée de simples petits trous ronds, tandis que dans la rangée externe les pores sont allongés transversalement. Cette disposition n'existe cependant qu'à la face supérieure; elle disparaît près du bord de la circonférence, pour faire place à deux rangées de pores simples ou de petits trous ronds, disposés par paires, qui se montrent de plus en plus espacées, à mesure qu'on les poursuit du bord de la circonférence à la bouche. Ce n'est qu'au contact de l'ouverture buccale que les pores redeviennent plus nombreux; au lieu de deux doubles rangées il y en a quatre. L'ouverture buccale elle-même est de forme pentagonale, sensiblement rapprochée du bord antérieur; mais elle n'est pas entourée de bourrelets aussi renflés que dans les espèces précédentes. Enfin un dernier caractère qu'il importe de signaler, gît dans

l'aspect de la face inférieure, qui est beaucoup plus ondulée que dans aucune des espèces précédentes; c'est la conséquence naturelle de la forte dépression des ambulacres. La surface supérieure, en revanche, est parfaitement égale, et de même que la face inférieure, elle est uniformément recouverte de très-petits tubercules surgissant du milieu d'une dépression circulaire. L'appareil oviducal est représenté par un bourrelet d'aspect spongieux, placé au sommet du disque et entouré de quatre pores oviducaux très-apparens, ouverts au haut des aires interambulacraires; l'aire interambulacraire impaire en est seule dépourvue. Le test a une épaisseur moyenne.

J'ai vu un grand nombre d'exemplaires de cette espèce, provenant de l'Oolite inférieure du canton de Soleure, qui m'ont été communiqués par M. Hugi, à qui je me fais un plaisir de dédier ce fossile; la collection du Musée de Berne en renferme également des exemplaires provenant de l'Oolite inférieure de l'Evêché de Bâle.

#### IV. CLYPEUS ACUTUS *Ag.*

Tab. X, fig. 1.

Cette espèce ne m'est encore connue que par quelques fragmens très-mutilés mais suffisans cependant pour justifier l'établissement d'une nouvelle espèce que j'appelle *Cl. acutus* à raison de la forme retrécie et pointue des aires interambulacraires au voisinage du sommet. Les aires ambulacraires sont par contre d'autant plus larges en cet endroit. C'est l'inverse de ce que nous avons vu dans les autres espèces où les aires ambulacraires se rétrécissent considérablement à l'approche du sommet tandis que les aires interambulacraires sont constamment plus larges. Les zones porifères ou ambulacres proprement dits ont la même largeur que dans le *Cl. solodurinus*; les pores sont distincts, très-serrés et réunis par un sillon qui, comme d'habitude, est plus prononcé du côté externe que du côté interne. La structure du test n'offre rien de particulier. On y remarque de petits

tubercules surgissant d'une dépression circulaire comme dans les autres espèces. Le test n'est pas très-épais. Quant à ses dimensions, il résulte de la comparaison des divers fragmens que je possède, qu'elles égalent au moins celles du *Cl. solodurinus*.

C'est au zèle de M. Gressly qu'est due la découverte de cette nouvelle espèce; elle provient du terrain portlandien de la vallée de la Birse près de Laufon.

### 7<sup>e</sup> Genre. **NUCLEOLITES** Lam.

Syn. : *Echinobrissus* Breyn.

Il n'y a pas long-temps que l'on donnait le nom de Nucléolites à la plupart des petites espèces d'oursins qui aujourd'hui constituent les genres *Catopygus*, *Pygaster*, *Cassidulus*, *Clypeus*, *Disaster*, etc.; et il n'est aucune liste de fossiles où les Nucléolites ne figurent pour une bonne part. Mais à mesure que le nombre des espèces s'augmenta, le besoin de les restreindre dans des cadres génériques plus étroits se fit vivement sentir. Déjà dans mon Prodrôme j'ai détaché des Nucléolites les genres *Pygaster* et *Catopygus*, auxquels viennent se joindre aujourd'hui les *Pygorhynchus* que l'on comptait soit parmi les Nucléolites soit parmi les Echinolampas. On comprend que, composé d'espèces aussi différentes, le genre Nucleolites n'ait point été susceptible d'être caractérisé d'une manière rigoureuse; aussi la diagnostique du genre, dans la plupart des auteurs ne porte-t-elle que sur la forme, l'aspect ou les dimensions générales.

Voici quels sont les caractères du genre Nucleolites dans les nouvelles limites que je lui assigne : ce sont des oursins de petite taille, généralement arrondis en avant et tronqués en arrière, ayant l'anus situé dans un sillon de la face postérieure et plus ou moins rapproché du sommet du disque. Les ambulacres, dont les pores sont réunis par un petit sillon, sont étroits et tendent plus ou moins à converger vers le sommet et vers la périphérie. L'ouverture buccale est subcentrale, de forme pentagonale, mais dépourvue de ces bourrelets qui caractérisent les *Clypeus*. Le test est d'une

épaisseur moyenne ; sa structure est la même que dans les Clypeus, les Echinolampes et les Clypeaster, c'est-à-dire qu'il est à-peu-près uniformément recouvert de petits tubercules, entourés d'une dépression circulaire. L'appareil oviducal se compose d'un bourrelet central autour duquel sont placées les plaques interovariales et ovariales.

Ainsi caractérisé, mon genre *Nucleolites* correspond à la division *C* des *Nucleolites* de Goldfuss, dont le type est son *N. scutatus* (*N. Goldfussii* DesM.).

La pluralité des espèces appartiennent à l'époque jurassique et aux terrains crétacés inférieurs. Une seule espèce est tertiaire et une vivante. Au nombre des huit espèces suisses figurées sur la pl. VII, cinq proviennent des terrains jurassiques et trois du terrain néocomien.

### I. *NUCLEOLITES LACUNOSUS* Gldf.

Tab. VII, fig. 4-6.

Syn. : *Nucl. lacunosus* Gldf. (Petr. p. 141. n° 11. tab. 43. fig. 8 a. b. c.). — Ag. (Notice etc. Mém. soc. d'hist. nat. de Neuchâtel p. 132). — DesM. (Tabl. synopt. p. 360. n° 17). — Bourguet (Pétrif. Tab. 51. fig. 331, 332). — Dujard. (Soc. géol. II. p. 220).

D'après les citations des auteurs cette espèce paraît être très-répandue dans l'étage inférieur de la craie. Goldfuss l'indique dans la craie marneuse d'Essen sur la Roer ; Dujardin la cite dans la craie tufau de Touraine, et Des Moulins dans la craie du Périgord, de Royan, d'Avignon, etc. Enfin on la trouve aussi assez fréquemment dans les marnes bleues du Néocomien suisse, mais moins bien conservée que l'exemplaire figuré par Goldfuss.

Ayant donné une description détaillée du *N. lacunosus* dans ma *Notice sur les fossiles du terrain crétacé du Jura Neuchâtelois*, insérée dans les *Mémoires de la soc. d'hist. nat. de Neuchâtel*, Vol. I, p. 132, je me bornerai à en reproduire ici sommairement les principaux caractères. Le bord antérieur est plus étroit et plus arrondi que le bord postérieur, qui est tronqué carrément et légèrement incliné. L'anus s'ouvre dans le profond sillon de



l'aire interambulacraire impaire ; ce sillon n'est pas très-large à son origine, mais il s'agrandit insensiblement pour s'effacer au bord de la circonférence. Les ambulacres sont étroits et forment une étoile régulière autour du sommet. Au voisinage de la circonférence les pores des rangées extérieures cessent d'être allongés transversalement ; mais l'on peut néanmoins en suivre les traces jusqu'au pourtour de la bouche, laquelle est placée vis-à-vis du sommet, dans une dépression très-marquée de toute la face inférieure. Les tubercules que l'on aperçoit sur toute la surface du test sont très-petits et très-serrés. Chacun de ces petits tubercules est entouré d'une aréole lisse et déprimée, et l'espace compris entre ces aréoles est entièrement recouvert d'une quantité d'autres tubercules, beaucoup plus petits encore, qui servaient sans doute de points d'insertion à de petits piquans soyeux, comme il en existe chez certains Spatangues.

## II. NUCLEOLITES SUBQUADRATUS *Ag.*

Tab. VII, fig. 1-3,

Cette espèce, dont la découverte est due au zèle de feu M. Renaud-Comte, est remarquable par la large tronquature de la face postérieure, qui la rend à-peu-près anguleuse de ce côté. Elle est en outre fortement aplatie ; les ambulacres sont étroits, par la raison que les pores de la rangée externe ne sont que très-faiblement allongés. Les ambulacres pairs postérieurs se recourbent légèrement en dehors au voisinage de l'anus. L'ouverture buccale est sensiblement rapprochée du bord antérieur, qui est plus étroit, plus arrondi et en même temps plus élevé que le bord postérieur. Le sillon de l'aire interambulacraire impaire, dans lequel s'ouvre l'anus, commence un peu au delà du sommet dorsal et s'étend jusqu'au bord de la circonférence où il se termine par une légère échancrure. La réunion des ambulacres s'opère à l'opposite de la bouche, par conséquent beaucoup plus près du bord antérieur que du bord postérieur. Le test est d'une épaisseur

moyenne, recouvert comme dans tous les *Nucleolites*, de tubercules très-homogènes sur toute sa surface.

Cette espèce appartient, jusqu'ici, exclusivement au calcaire jaune de l'étage néocomien, qui, sur plusieurs points du Jura, atteint un développement plus ou moins considérable et qui pour la plupart du temps est très-fossilifère. Les exemplaires trouvés par Renaud-Comte proviennent des environs de la Chaux-de-Fonds. M. Auguste de Montmollin en a également trouvé à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois.

### III. *NUCLEOLITES OLFERSII* Ag.

Tab. VII, fig. 7-9.

Syn.: *Nucl. Olfersii* Ag. (Notice etc., Mém. soc. d'hist. nat. de Neuchâtel, Vol. 1. p. 133, Tab. 14, fig. 2 et 3). — DesM. (Tabl. synopt. p. 362, n° 32).

La différence de forme et d'aspect entre le côté antérieur et le côté postérieur est moins sensible dans cette espèce que dans toutes les autres. Le côté postérieur n'est surtout point tronqué comme dans le *Nucl. subquadratus*, mais arrondi à-peu-près comme le côté antérieur, quoique un peu plus large. Le sommet n'est que légèrement subcentral, mais l'inclinaison est un peu plus prononcée en arrière qu'en avant. Le sillon anal ne commence qu'au milieu de l'aire interambulacraire impaire et se continue, mais d'une manière peu sensible, jusqu'à la base, où il occasionne une légère échancrure. L'ouverture buccale est plus rapprochée du bord antérieur que le sommet des ambulacres, qui coïncide à-peu-près avec le sommet dorsal. Les ambulacres sont un peu plus larges que dans les deux espèces précédentes; les pores allongés des rangées externes sont visibles jusqu'à quelque distance de la périphérie, où les ambulacres tendent à converger; plus loin, et jusqu'au pourtour de la bouche, la distance augmente sensiblement entre toutes les paires de pores et il n'est plus guère possible de les voir autrement qu'à l'aide d'une forte loupe. Toute la surface du test est recouverte de tubercules à-peu-près homogènes.

Cette espèce paraît particulière à l'étage des marnes bleues du néocomien. On la trouve assez fréquemment dans les marnières de Hauterive et de Cressier, et derrière le château de Neuchâtel.

#### IV. NUCLEOLITES LATIPORUS Ag.

Tab. VII, fig. 13-15.

La largeur considérable des ambulacres est le caractère distinctif de cette espèce et celui qui lui a valu son nom; il sert surtout à la distinguer du *N. Goldfussii* DesM. (*N. scutatus* Gldf. non Lam.) avec lequel elle a la plus grande ressemblance de forme et d'aspect. En effet tous deux ont le côté supérieur postérieur fortement incliné, et le sillon dans lequel est percée l'ouverture anale suit la même inclinaison; seulement le bord postérieur est un peu plus rostré dans le *N. latiporus* que dans le *N. Goldfussii*. L'ouverture buccale, située dans une dépression formée par les ambulacres, est légèrement subcentrale en avant. Le sommet ambulacraire est situé à l'opposite et entouré de quatre pores oviducaux, qu'on ne distingue qu'à la loupe.

Il est digne de remarque que cette espèce, dont la découverte est due à M. Gressly, n'a été trouvée jusqu'ici que dans l'oolite inférieure de Meltingen (canton de Soleure), tandis que le *N. Goldfussii* est très-fréquent dans un banc du calcaire à polypiers de Normandie, appelé caillasse, ainsi que dans l'oolite du nord de l'Allemagne.

#### V. NUCLEOLITES MICRAULUS Ag.

Tab. VII, fig. 16-18.

Ce qui frappe tout d'abord dans cette espèce, c'est la brièveté du sillon postérieur, qui est pour ainsi dire borné à l'ouverture anale. Il ne commence en effet qu'au milieu de l'aire interambulacraire impaire et n'est que très-

insignifiant au-dessous. Cette circonstance m'a engagé à lui donner le nom ci-dessus.

Les ambulacres sont proportionnellement larges et très-apparens, sur toute la surface du test, bien que les pores allongés de la rangée externe de chaque ambulacre ne soient visibles que jusqu'à la moitié de la circonférence, ce qui est au reste le cas de toutes les espèces de Nucléolites. Les ambulacres pairs postérieurs sont légèrement recourbés en dehors, au voisinage de l'ouverture anale, à-peu-près comme dans le *N. subquadratus*. L'ouverture anale est subcentrale en avant, ainsi que le sommet ambulacraire qui est placé à l'opposite. Une granulation tuberculeuse très-homogène recouvre les aires ambulacraires tout comme les aires interambulacraires.

Cette espèce n'a été signalée jusqu'ici que dans le terrain à chailles du département du Haut-Rhin, où l'exemplaire figuré a été trouvé par M. Gressly, près des frontières de la Suisse. Je n'en connais pas d'exemplaire qui provienne de la Suisse proprement dite; mais comme le même terrain existe chez nous, il est probable qu'on y découvrira aussi quelque jour les mêmes fossiles. C'est ce qui m'a engagé à envisager par avance le *Nucleolites micraululus* comme indigène.

## VI. NUCLEOLITES GRACILIS Ag.

Tab. VII, fig. 10-12.

Cette espèce mérite à plusieurs égards le nom qu'elle porte, d'abord à cause de la forme grêle et très-rétrécie du côté antérieur, et en second lieu à cause de l'extrême étroitesse des ambulacres, qu'on pourrait au besoin prendre pour des ambulacres de Galérite, s'ils ne tendaient à converger vers la circonférence, comme chez tous les Nucléolites; les ambulacres des Galérites au contraire vont en s'élargissant uniformément du sommet à la circonférence. Il n'y a donc pas lieu de craindre que cette espèce soit jamais confondue avec d'autres. L'ouverture buccale est sen-

siblement rapprochée du bord antérieur, à-peu-près comme dans le *N. subquadratus*. L'ouverture anale est située au fond du sillon de l'aire interambulacraire impaire. Ce sillon part du sommet et s'étend jusqu'au bord de la circonférence, en augmentant progressivement de largeur. Le sommet ambulacraire n'est point placé, comme dans la plupart des espèces, à l'opposé de l'ouverture buccale; il n'incline que très-insensiblement vers le côté antérieur. Les tubercules qui recouvrent toute la surface du test sont, proportion gardée, plus grands et plus apparens que dans d'autres espèces; surtout à la face inférieure.

Il en est de cette espèce comme du *N. micraulius*; les seuls exemplaires que j'en connais proviennent de Rædersdorf (département du Haut-Rhin), d'un banc à coraux faisant partie du Portlandien. C'est à M. Gressly qu'en est due la découverte. La Suisse proprement dite n'en a pas encore produit.

## VII. NUCLEOLITES SCUTATUS Lam. nec Gldf.

### Tab. VII, fig. 19-24.

- Syn.: *Nucleolites scutatus* Lam. (Syst. III. p. 36 n° 1). — E. Desl. (Enc. II. p. 570 n° 1). — DeBl. (Dict. XXXV, p. 213). — Defr. (ibid). — Encycl. méth. (tab. 157, fig. 5 et 6). — Gratel. (Dax n° 3). — DesM. (Tabl. synopt. p. 356, n° 5).  
*Oursin écusson* Bosc. (Déterv. XXIV, p. 281.)  
*Nucleolites depressa* DeBl. (Zooph. p. 188.)  
*Echinus depressus* Schl. (Petr. p. 315.)  
*Spatangus depressus* Leske (p. 238 n° 80 pro parte.)

C'est une espèce très-répandue dans les terrains jurassiques moyens, notamment dans le *Calcareous grit* du nord de la France; j'en ai recueilli moi-même de nombreux exemplaires à Trouville, en Normandie. Les chaînes de notre Jura suisse en ont, à ce qu'il paraît, moins fourni, et pour ma part je ne connais que peu de localités où l'on en ait signalé. L'exemplaire figuré, dont on ne saurait contester l'identité spécifique avec ceux

de Normandie, a été trouvé en Suisse. M. Voltz en a également trouvé des exemplaires à Chamsol, département du Doubs. En revanche je pense avec M. DesMoulins que Goldfuss a identifié à tort l'espèce qu'il a décrite sous le nom de *N. scutatus*, avec le *N. scutatus* de Lamarck, dont nous nous occupons en ce moment. Ce dernier en effet n'affecte nullement cette dépression de la face supérieure postérieure qui est très-saillante dans les figures de Goldfuss; c'est au contraire la face antérieure qui est la plus inclinée. Le sillon anal est très-profond de manière à occasionner une échancrure très-sensible au bord postérieur. Les bords du sillon ne présentent point de crêtes tranchantes, mais sont mollement arrondis. Les ambulacres sont étroits, et c'est à peine si l'on s'aperçoit que les pores de la rangée externe sont allongés transversalement. L'ouverture buccale est légèrement subcentrale ainsi que le sommet ambulacraire, du milieu duquel s'élève un bourrelet d'aspect spongieux, entouré des pores oviducaux. Le test est uniformément recouvert de petits tubercules à la manière des Nucléolites en général.

Afin de distinguer le *N. scutatus* Lam. du *N. scutatus* Gldf. (qui n'a point encore été trouvé en Suisse), M. DesMoulins a donné à ce dernier le nom de *N. Goldfussii*.

#### VIII. NUCLEOLITES MAJOR Ag.

Tab. VII, fig. 22-24.

C'est la plus grande de toutes les espèces de Nucléolites à moi connues et en même temps la seule que nous ait fourni jusqu'ici le terrain portlandien, en Suisse; elle est d'autant plus précieuse que les fossiles en général et les Oursins surtout, sont habituellement très-mal conservés dans ce terrain. La taille du Nucleolites major et sa forme allongée le feront toujours aisément reconnaître entre tous ses congénères. Comme la plupart des Nucléolites, il est plus large en arrière qu'en avant. L'ouverture buccale, dont il m'est impossible d'indiquer les contours exacts, bien que j'aie eu

toute une série d'exemplaires sous les yeux, est sensiblement rapprochée du bord antérieur. Le sommet ambulacraire est en revanche placé au milieu du disque. Le sillon de l'aire interambulacraire impaire, dans lequel s'ouvre l'anous, est large et évasé; il s'étend en s'élargissant graduellement depuis le sommet jusqu'à la base, où il forme une échancrure très-prononcée, à-peu-près comme dans le *N. scutatus*. Les ambulacres sont de largeur moyenne et tous, sauf l'ambulacre impair, légèrement recourbés. Le test est uniformément recouvert de petits tubercules très-homogènes.

La découverte de cette espèce, comme celle de tant d'autres, est due au zèle de Monsieur Gressly, qui en a recueilli un nombre considérable d'exemplaires dans le terrain portlandien de la vallée de la Birse, près de la verrerie de Laufon.

#### 8<sup>e</sup> Genre. **CATOPYGUS** Ag.

Syn. : *Nucleolites* Auct.

Le genre *Catopygus* tel que je l'ai caractérisé dans mon *Prodrome*, etc. pag. 185, comprend toutes les espèces de *Nucleolites* qui ont le disque ovale, l'anous à la face postérieure, et dont les ambulacres convergent uniformément vers le sommet. Depuis, l'étude d'un grand nombre d'espèces qui auparavant m'étaient inconnues m'a fait sentir le besoin de préciser davantage mon nouveau genre, en ayant aussi égard à la structure des ambulacres. Je retranche en conséquence du genre *Catopygus* toutes les espèces qui ont les ambulacres simples pour les reporter soit dans le genre *Galérites* tel que le *C. Castanea* (*Nucleolites Castanea* Al. Br.), soit dans le genre *Pyrina*, tel que le *Nucleolites Ovulum* Lam., ne conservant parmi les *Catopygus* que les espèces qui ont les ambulacres pétaloïdes et les pores des deux rangées ambulacraires réunis par un sillon, en même temps que ceux de la rangée externe sont allongés transversalement.

Les *Catopygus* sont en général de petite taille, comme les *Nucleolites*; et le côté antérieur est habituellement plus étroit que le côté postérieur. Tous ont la face inférieure à-peu-près plane et la bouche centrale ou

légèrement subcentrale, entourée de bourrelets plus ou moins sensibles, qui sont formés, comme dans les Clypeus, par le renflement de l'extrémité des aires interambulacraires. La forme de l'ouverture buccale elle-même est pentagonale, comme dans presque tous les genres de cette famille, mais avec cette seule différence qu'elle est allongée dans le sens du diamètre longitudinal. L'ouverture anale est constamment placée au bord supérieur de la face postérieure, tantôt visible en entier d'en haut, tantôt complètement cachée, suivant que la face postérieure est déclive ou tronquée. L'appareil oviducal, fort difficile à distinguer dans la plupart des espèces, se compose, comme dans les Nucleolites et les Clypeus, d'un bourrelet central entouré des plaques oviducalcs; les quatre plaques paires sont percées d'un trou. Enfin un dernier caractère de ce genre, c'est la forme renflée du test, caractère qui, joint à la position longitudinale de la bouche, sert surtout à le différencier du genre *Pygorhynchus*.

Le test est habituellement mince. Mais les tubercules dont il est recouvert sont un peu différens de ce que nous les avons vus dans les Nucléolites; ce sont de petites granules dont les dimensions augmentent à mesure qu'elles approchent de la face inférieure. Chaque plaque porte ordinairement un ou plusieurs tubercules plus saillans que les autres.

Resserré dans ces limites, le genre *Catopygus* n'est plus commun à la fois aux terrains jurassiques crétacés et tertiaires, comme il l'était dans l'origine, avant que j'en eusse détaché les espèces à ambulacres simples. Il appartient au contraire exclusivement à la formation crétacée. Plusieurs espèces se rencontrent dans le néocomien de nos chaînes jurassiques; d'autres, tels que le *C. alpinus* et le *C. depressus* (Nucleolites depressus Al. Br.), n'ont été trouvés jusqu'ici que dans les terrains calcaires des Alpes. La craie blanche en recèle également plusieurs espèces qui lui sont propres ou dont les représentans n'ont point encore été trouvés dans les terrains de Suisse.



I. CATOPYGUS GRESSLY *Ag.*

Tab. VIII, fig. 1-3.

C'est la moins renflée de toutes les espèces du genre; sa hauteur n'égale guère que les deux tiers de sa largeur, tandis que dans nombre d'autres espèces, ces deux dimensions sont à-peu-près égales. Les ambulacres ont les pores très-peu dilatés, au point qu'on pourrait être tenté de les prendre pour des ambulacres de Galérites, si au lieu de diverger graduellement vers la base, ils ne tendaient au contraire à converger à moitié chemin. Passé cette limite, ils se r'appetissent et les paires de pores s'éloignent davantage les unes des autres qu'au sommet du disque, ce qui fait que l'on a assez de peine à les reconnaître. L'ouverture buccale, située dans une dépression résultant de la convergence des ambulacres, est subcentrale vers le bord antérieur. L'ouverture anale occupe le milieu de la face postérieure; elle est de grandeur moyenne et de forme elliptique.

Le sommet ambulacraire est placé à l'opposite de l'ouverture buccale; c'est-à-dire qu'il est subcentral vers le côté antérieur. Les ambulacres ne convergent point d'une manière absolue en ce point, mais il reste entre les ambulacres antérieurs et les postérieurs un petit espace occupé par l'appareil oviducal. Celui-ci est composé, comme dans toutes les espèces du genre, d'un bourrelet central, autour duquel se groupent les plaques ovariales et interovariales; les premières, à l'exception de celle qui correspond à l'aire interambulacraire impaire, sont percées d'un trou très-apparent. Les interovariales sont très-petites et difficiles à distinguer.

Cette espèce est particulière, à ce qu'il paraît, aux marnes bleues du terrain néocomien. On la trouve à Hauterive, à Neuchâtel et dans plusieurs autres localités. Je la dédie à M. Gressly, qui l'a découverte, en reconnaissance des grands services que ses recherches ont rendus à la géologie de notre pays.

## II. CATOPYGUS DEPRESSUS Ag.

Tab. VIII, fig. 4-6.

Syn.: *Catopygus depressus* Ag. (Prodr. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1. p. 185.)

*Nucleolites depressa* Al. Br. (Descr. géol. p. 400, Tab. 9, fig. 17) non Mstr. in Gldf. — Dujard. (Soc. géol. II. p. 220)?

*Galerites depressa* Al. Br. (Descr. géol. p. 100, non Lam.)

*Pyrina depressa* DesM. (Tabl. synopt. p. 258. n° 2).

L'espèce dont nous traitons est intéressante en ce qu'elle a été décrite et figurée par un illustre géologue, M. Al. Brongniart, à une époque où l'on n'accordait point encore une bien grande importance aux Échinodermes fossiles. L'exemplaire original de Brongniart provient de la Montagne des Fis; depuis, l'on en a trouvé en plusieurs autres localités de la chaîne des Alpes, entre autres au Reposoir, d'où M. Studer a rapporté le bel exemplaire que j'ai fait figurer.

Ce qui distingue cette espèce de tous ses congénères, c'est la position de l'ouverture anale, qui est marginale à la face inférieure, tandis que dans toutes les autres espèces, elle occupe le milieu ou le haut de la face postérieure. Les ambulacres sont d'une étroitesse extrême, au point qu'on serait tenté de les prendre pour des ambulacres simples comme sont ceux des Galérites, si, au lieu de diverger progressivement, ils ne tendaient au contraire à se rapprocher vers le milieu de la circonférence, et si, passé cette limite, les pores ne devenaient imperceptibles; ce qui, comme il a été dit plus haut, est l'un des caractères qui distinguent les genres à ambulacres bornés des genres à ambulacres simples, comme sont les Galérites et autres genres. Les aires ambulacraires sont larges proportionnellement aux ambulacres, et l'on remarque qu'elles ont une légère tendance à se renfler. L'ouverture buccale, placée à l'opposite du sommet ambulacraire, est presque centrale. Sa forme paraît avoir été celle d'un pentagone allongé. Il n'y a

qu'une légère différence de largeur entre le côté antérieur et le côté postérieur ; comme d'habitude c'est ce dernier qui est le plus large. Le test est fort épais ; on y remarque jusqu'aux tubercules qui garnissaient sa surface, ce qui est très-rare dans les fossiles alpins. Il y a deux sortes de tubercules : de très-petits à peine visibles à l'œil nu, et de plus gros qui surgissent du milieu de ces derniers.

### III. CATOPYGUS RENAUDI *Ag.*

Tab. VIII, fig. 7-9.

Cette espèce a été découverte par M. Renaud-Comte, dans l'étage supérieur du terrain néocomien de la vallée de La Chaux-de-Fonds. M. Renaud-Comte avait entrepris l'étude détaillée des chaînes du Jura français, et dans ses courses, il avait soin de recueillir tous les fossiles qu'il rencontrait. Il s'était ainsi formé une riche collection de fossiles jurassiques, parmi lesquels se trouve un nombre assez considérable d'espèces nouvelles. Ses recherches, poursuivies avec un zèle infatigable et une précision à toute épreuve, nous fournissaient continuellement de précieuses données sur l'ensemble de la géologie des monts Jura, et nous en promettaient de plus précieuses encore pour l'avenir, lorsqu'une mort prématurée vint l'enlever à la science \*).

L'espèce que je dédie à sa mémoire est distincte de toutes les autres par la grande différence de largeur qui existe entre le côté antérieur et le côté postérieur ; ce dernier est très-large et très-renflé, tandis que le côté antérieur est proportionnellement très-rétréci. La face inférieure est plane, autant qu'il est permis d'en juger par ce qui en est resté dans l'exemplaire figuré, le seul que je connaisse. L'ouverture buccale, de forme pentagonale, est légèrement subcentrale en avant. L'anus est très-grand

\*) Son dernier travail est une description géologique de la vallée du Doubs, qui paraîtra dans les Mémoires de la Soc. d'hist. nat. de Besançon.

et de forme ovale ; il s'ouvre dans un sillon de la face postérieure, et, comme le test est incliné ou plutôt arrondi de ce côté, il en résulte que l'ouverture anale est visible en entier d'en haut. Les ambulacres sont étroits ; mais, en revanche, les aires ambulacraires sont larges, et c'est là ce qui rend tout le système ambulacraire si apparent. Il est facile d'en poursuivre la trace depuis la base jusqu'au sommet, quoique les pores ne soient bien visibles qu'à la face supérieure. L'appareil oviducal est composé d'un bourrelet central très-facile à distinguer, autour duquel on aperçoit quatre pores oviducaux, placés au sommet des aires interambulacraires. Le test est mince et recouvert d'une fine granulation d'apparence très-homogène.

#### IV. CATOPYGUS ALPINUS Ag.

Tab. VIII, fig. 10-11.

Quoique mal conservée et seulement à l'état de moule, cette espèce n'en est pas moins digne d'attention, à cause de son origine alpine. Elle provient du calcaire du mont Salève, d'une localité où les fossiles sont en général rares et tellement mutilés que l'on s'estime heureux lorsqu'on y découvre quelque fragment tant soit peu reconnaissable. M. Escher de la Linth l'a aussi trouvée dans les talus d'éboulement de Rautispitz près de Næfels.

Le *C. alpinus* ne ressemble à aucun de ses congénères. Il est plus allongé qu'aucune des espèces connues. Le côté antérieur est étroit et arrondi, tandis que le côté postérieur est large et tronqué. Les ambulacres sont étroits, comme dans la plupart des espèces du genre. Les aires ambulacraires en revanche sont larges et très-légèrement renflées, tandis que les aires interambulacraires paraissent avoir été planes. L'appareil oviducal est placé à-peu-près au centre de la face supérieure ; il n'en existe que quelques traces indistinctes dans l'exemplaire figuré, mais elles sont suffisantes pour faire voir qu'il n'était pas très-grand : ce qui résulte aussi de cette autre circonstance, que les sommets des ambulacres sont très-rapprochés. La face inférieure n'est pas assez bien conservée pour avoir pu

être figurée. Cependant quelques traces de l'ouverture buccale, que l'on aperçoit dans un fragment, indiquent qu'elle était, comme le sommet ambulacraire, légèrement subcentrale en avant.

V CATOPYGUS NEOCOMENSIS Ag.

Tab. VIII, fig. 12-14.

Cette espèce, découverte récemment par M. Gressly, dans le Néocomien de Douanne, sur les bords du lac de Biemme, est jusqu'ici la plus grande du genre. La face supérieure est régulièrement bombée, de manière que le sommet correspond à-peu-près au milieu du diamètre longitudinal. L'ouverture buccale est en revanche légèrement subcentrale vers le côté antérieur; sa forme est pentagonale, comme dans toutes les espèces de *Catopygus*. L'ouverture anale est distinctement ovale, placée à la face postérieure, à l'origine d'un sillon, qui se continue, quoique peu sensible, jusqu'à la base. Les ambulacres sont très-étroits; il faut une bonne loupe pour s'apercevoir que les pores des rangées externes sont allongés transversalement. Ce qui fait ressortir les ambulacres, c'est la largeur des aires ambulacraires, qui est plus considérable que celle des pores eux-mêmes. Cependant ces derniers se rapprochent sensiblement près de la base, ce qui fait diminuer d'autant l'espace intermédiaire. Passé cette limite, on ne poursuit que difficilement la direction des ambulacres, dont les pores sont à la fois plus resserrés et plus petits qu'à la face supérieure. Le test est très-mince.

9<sup>e</sup> Genre. **PYGORHYNCHUS** Ag.

Syn. *Nucleolites* Auct.

Nous avons vu, en parlant des *Nucleolites*, que le nouveau genre *Pygorhynchus* se compose d'espèces que les auteurs rangent, soit dans le genre

Echinolampas, soit dans les genres *Nucleolites* ou *Catopygus*. Il importe donc d'en bien préciser les caractères afin de ne pas courir le risque de le confondre avec l'un ou l'autre de ces trois types. Ce sont des Oursins de forme oblongue et plus ou moins renflée. La bouche s'ouvre au centre de la face inférieure ; elle est allongée transversalement et entourée de cinq bourrelets saillants et d'une rosette très-distincte, formée par les extrémités des ambulacres, dont les pores, après avoir disparu au voisinage de la périphérie, redeviennent ici très-apparens. L'ouverture anale est allongée dans le sens du diamètre longitudinal et placée à la face postérieure, ordinairement plus près du bord supérieur que du bord inférieur. Le test est recouvert sur toutes ses faces d'une granulation très-homogène, composée, comme dans les *Nucleolites* et les *Echinolampas*, de petits tubercules mamelonnés, surgissant du milieu d'une zone lisse et déprimée. L'appareil oviducal occupe le sommet du disque ; il est formé, comme dans la plupart des genres de la famille, d'un bourrelet central, entouré de cinq plaques ovariiales et de cinq plaques interovariiales ; ces dernières sont plus petites que les premières.

En résumant ces caractères, on voit que les *Pygorhynchus* se rapprochent beaucoup des *Echinolampas* par leur forme générale ; mais ils en diffèrent par la forme et la position de l'ouverture anale, celle-ci étant, dans les *Echinolampas*, constamment placée à la face inférieure et allongée transversalement. On ne saurait non plus les confondre avec les vrais *Nucleolites* à cause de l'absence du sillon anal et de la structure de la bouche. Mais les *Catopygus* sont incontestablement ceux qui offrent la plus grande ressemblance avec les *Pygorhynchus*, et j'avoue que lorsqu'il s'agit de déterminer des exemplaires mal conservés d'espèces nouvelles, il peut fort bien arriver que l'on confonde ces deux genres. Cependant la forme et la structure de la face inférieure établissent une différence incontestable entre eux. La face inférieure au lieu d'être concave est entièrement plane dans les *Catopygus*, et la bouche y est dépourvue de ces ornemens, que nous venons de signaler dans les *Pygorhynchus*.

Le genre des *Pygorhynchus* ainsi circonscrit comprend des Oursins de taille variable. Les plus grands atteignent les dimensions des grands *Echinolampas*, c'est à dire environ trois pouces de long, un pouce et demi de large et à-peu-près autant de haut ; les plus petits sont de la taille des *Catopygus*. J'en connais jusqu'à ce jour huit espèces ; la plupart appartiennent aux terrains tertiaires ; les deux espèces indigènes, dont la description suit, proviennent du Néocomien.

### I. PYGORHYNCHUS OBOVATUS Ag.

Tab. VIII, fig. 18-20.

Syn.: *Catopygus obovatus* Agass. (Notice, Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. I. p. 136.)

*Nucleolites obovata* DesM. (Tabl. synopt., p. 362, n° 50.)

Il n'existe, à ma connaissance, qu'un très-petit nombre d'exemplaires de cette espèce ; encore sont-ils en général mal conservés, comme la plupart des fossiles que l'on parvient à extraire du calcaire compacte de l'étage néocomien, appelé *pierre jaune* dans le canton de Neuchâtel. Mais leurs caractères génériques et spécifiques n'en sont pas plus douteux pour cela. Par sa forme générale et ses dimensions le *P. obovatus* se rapproche sensiblement du *P. Scutella* (*Nucleolites Scutella* Gldf.). Le côté antérieur du test est rétréci tandis que le côté postérieur est large et étalé. La face supérieure est légèrement et uniformément bombée ; les bords sont très-arrondis et très-épais, la face inférieure est en revanche à-peu-près plane ; l'on ne remarque qu'une légère dépression, autour de l'ouverture buccale, qui est placée au tiers antérieur du diamètre longitudinal et entourée d'une étoile pentagonale, formée par la réunion des ambulacres. Mais le caractère le plus saillant de l'espèce consiste dans la forme de l'ouverture anale ; celle-ci est placée à la partie supérieure du bord postérieur, à l'origine d'un large sillon vertical assez profond, qui se perd insensiblement vers la face

inférieure. D'en haut, l'ouverture ovale n'est indiquée que par une légère échancrure au bord postérieur. Les ambulacres sont de largeur moyenne ; les rangées de pores ne sont bien visibles que jusqu'au voisinage de la circonférence, où elles se resserrent et ne laissent plus apercevoir que de simples petits trous toujours plus éloignés les uns des autres. L'appareil oviducal n'est conservé dans aucun des exemplaires que j'ai sous les yeux. Le test est épais et recouvert de petits tubercules très-homogènes.

La découverte de cette espèce est due à M. Coulon, qui l'a trouvée dans le calcaire néocomien du Mormont, près de Lasarraz.

## II. PYGORHYNCHUS MINOR Ag.

Tab. VIII, fig. 15-17.

Syn.: *Echinolampas minor* Ag. (Notice, Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1. p. 136). — DesM. (Tab. synopt. p. 352, n° 33).

Ayant limité, depuis la publication de mon Prodrôme, le genre *Echinolampas* aux espèces qui ont l'anus placé à la face inférieure et allongé transversalement, je dois en éliminer l'espèce dont il est ici question pour la reporter dans mon nouveau genre *Pygorhynchus*. C'est en effet un véritable *Pygorhynchus*, par sa forme générale d'abord, qui est large et déprimée, et surtout par la position de l'ouverture anale à la face postérieure. Sa taille est petite si on la compare aux dimensions des autres espèces du genre. La différence de largeur entre le côté antérieur et le côté postérieur est proportionnellement peu sensible. L'ouverture buccale est placée un peu au delà du tiers antérieur du diamètre longitudinal, dans une dépression assez sensible résultant de la réunion des ambulacres. L'anus est oblong dans le sens du diamètre vertical ; et quoique de taille ordinaire, il occupe cependant toute l'épaisseur de la face postérieure, qui est ici plus déprimée que par devant. La face inférieure est très-ondulée par suite des dépressions assez profondes des ambulacres. Les ambulacres



eux-mêmes sont étroits, et c'est à peine si l'on s'aperçoit que les pores des rangées externes sont allongés; les aires ambulacraires sont en revanche assez larges. Le sommet ambulacraire est subcentral en avant, comme l'ouverture buccale, à laquelle il est directement opposé. On y distingue, autour du bourrelet central, les quatre pores oviducaux, placés au sommet des aires interambulacraires. Le test est d'une épaisseur moyenne.

Cette espèce a été trouvée, comme la précédente, par M. Coulon, dans les couches supérieures du calcaire néocomien du Mormont, près de Lasarraz. M. A. de Montmollin l'a également trouvée, à Neuchâtel même, aux Terreaux.

#### 10<sup>e</sup> Genre. **ECHINOLAMPAS** Gray.

Syn.: *Clypeaster* Lam. et Gldf.

Le genre *Echinolampas* est, comme les *Nucleolites*, un de ces genres qui, précis dans l'origine, sont devenus de plus en plus vagues, à mesure que l'on y fit entrer toutes les espèces qui montraient une ressemblance plus ou moins éloignée avec celles qu'on envisage comme les types du genre. Goldfuss est même allé jusqu'à confondre génériquement les *Clypeaster* et les *Echinolampas*. On comprend dès lors combien doit être vague la diagnose d'un genre aussi étendu. Elle ne peut nécessairement s'appuyer que sur des particularités secondaires, quand on ne tient pas compte de l'ensemble des caractères qui constituent cet air de famille qui doit, à mon avis, ressortir de chaque genre convenablement circonscrit. Afin d'arriver à une délimitation rigoureuse, j'ai dû établir plusieurs coupes dans le genre *Echinolampas*, tel qu'il est admis par les auteurs. C'est ainsi que sont nés les genres *Pygurus*, *Conoclypus* et *Pygorhynchus*, que j'envisage comme autant de types distincts. Le genre *Echinolampas* lui-même, restreint dès-lors dans des limites beaucoup plus étroites, peut être caractérisé de la manière suivante. Ce sont des Oursins de forme

allongée et plus ou moins ovale. L'ouverture buccale est allongée transversalement; elle est située au milieu de la face inférieure, entourée d'une étoile de pores très-apparens. L'ouverture anale, constamment transversale, est placée au bord postérieur de la face inférieure; ce caractère est essentiel en ce qu'il sert surtout à distinguer les *Echinolampas* des *Pygorhynchus* qui au reste s'en rapprochent beaucoup par leur aspect général. Les ambulacres sont composés de deux rangées de pores unis par un sillon; dans la rangée externe, les pores sont allongés transversalement; dans la rangée interne ils sont ronds. Les aires ambulacraires sont étroites et le plus souvent renflées à la face supérieure. La face inférieure n'est point ondulée comme dans les *Pygurus*; on n'y remarque qu'une seule dépression centrale, dans laquelle s'ouvre la bouche. L'appareil oviducal est au sommet du disque; il se compose, comme dans tous les genres de la famille, d'un bourrelet central, entouré des cinq plaques ovariales et des cinq interovariales; ces dernières sont placées au sommet des aires ambulacraires, les autres au sommet des aires interambulacraires. Le test est uniformément recouvert de petits tubercules, qui tous sont entourés d'une dépression circulaire très-apparente.

Les *Echinolampas* ainsi circonscrits appartiennent à la craie et aux terrains tertiaires. En Suisse on en connaît jusqu'ici quatre espèces, qui proviennent des terrains crétacés des Alpes. Il n'y en a point dans le néocomien.

### I. *ECHINOLAMPAS* *STUDERI* Ag.

Tab. IX, fig. 4-6.

En dédiant cette espèce à mon ami M. Studer, je me fais un devoir de lui rendre un témoignage public de reconnaissance au nom de la paléontologie, à laquelle il a voué une attention toute particulière dans ses nombreuses courses géologiques. C'est à lui et à M. A. Escher de la Linth que nous devons la plupart des fossiles des Alpes, et si aujourd'hui il nous est permis d'espérer de voir bientôt l'immense labyrinthe des terrains

alpins se débrouiller, c'est au zèle de ces deux intrépides géologues que nous en serons redevables, comme aujourd'hui déjà nous leur devons les notions les plus précises que la science possède sur l'ensemble et la liaison de nos grandes chaînes de montagnes.

L'*Echinolampas Studeri* est un fossile d'autant plus précieux qu'il n'a été trouvé jusqu'ici que dans les terrains crétacés de la Jungfrau. De toutes les espèces d'Echinolampes connues, l'*E. hemisphæricus* Ag. (Clypeaster hemisph. Lam.) est celle dont il se rapproche le plus par sa forme générale. Cependant il n'est guère possible de les confondre, par la raison que notre espèce, bien que plus petite que sa congénère, a cependant les aires ambulacraires proportionnellement beaucoup plus larges. Les ambulacres sont de largeur moyenne; les pores des rangées externes sont allongés obliquement et beaucoup plus apparens que ceux des rangées internes qui sont arrondis; de petits sillons obliques réunissent les deux rangées. L'ouverture buccale est allongée transversalement; elle est située au centre de la face inférieure, dans une dépression assez prononcée. L'anús est marginal au bord inférieur et allongé dans le sens du diamètre transversal. Le test est très-épais et recouvert d'une fine granulation très-homogène.

L'original de ma figure fait partie de la collection du Musée de Berne.

## II. ECHINOLAMPAS ESCHERI Ag.

Tab. IX, fig. 7-9.

Cette espèce appartient comme la précédente au terrain crétacé des Alpes. Je n'en connais jusqu'ici qu'un seul exemplaire; quoique mal conservé, on le reconnaît cependant au premier abord pour un véritable Echinolampas; et, comme il diffère de toutes les espèces connues, j'ai dû en faire le type d'une nouvelle espèce que je dédie à mon ami M. A. Escher de la Linth.

Sa bouche est grande et fortement allongée dans le sens du diamètre transversal. L'anús est, proportionnellement à la taille de l'Oursin, beau-

coup plus grand que dans aucune espèce du genre. La forme générale du test est celle d'un ovale aplati. Le côté postérieur a une légère tendance à s'allonger, tandis que le côté antérieur est semi-circulaire. Tous les ornemens de la surface du test ont disparu à la face supérieure; l'on n'y voit que la trace des ambulacres, qui sont composés de deux rangées de pores, très-petits et sensiblement rapprochés, qu'on peut poursuivre jusque près de la circonférence. Les aires ambulacraires ont à-peu-près le tiers de la largeur des aires interambulacraires; elles n'étaient que très-faiblement renflées. Le test lui-même était très-épais.

L'original fait partie de la collection du Musée de Berne; il a été trouvé par M. Escher dans le terrain crétacé des Alpes.

### III. ECHINOLAMPAS EURYSOMUS *Ag.*

Tab. IX, fig. 1-3.

C'est de toutes les espèces d'Echinolampes la plus aplatie, et en petitesse elle ne le cède qu'à l'*Ech. columbaris* Ag. Vue d'en haut elle ressemble beaucoup au *Pygorhynchus minor* (Tab. 8, fig. 15-17); mais il suffit de jeter un coup-d'œil sur la face inférieure pour reconnaître aussitôt le caractère essentiel des Echinolampes qui, comme il vient d'être dit à l'article du genre, est d'avoir l'anus à la face inférieure et allongé dans le sens du diamètre transversal. L'ouverture buccale est logée au centre de la face inférieure, dans une dépression assez marquée. Les détails n'en sont pas très-saisissables, à cause du mauvais état de conservation de l'exemplaire que j'ai sous les yeux. Les ambulacres sont très-étroits, composés de deux rangées de pores très-rapprochés; ceux de la rangée externe ne sont que très-faiblement allongés; les deux ambulacres pairs antérieurs forment une légère courbure en avant, à quelque distance du sommet. Le test n'est pas très-épais; il est uniformément recouvert de petits tubercules très-homogènes.

Je ne connais encore qu'un exemplaire de cette espèce ; il a été trouvé par M. Studer dans le terrain crétacé (grès-vert) d'Einsiedeln. L'original fait partie de la collection du Musée de Berne.

#### IV. ECHINOLAMPAS DILATATUS Ag.

Tab. XIII bis, fig. 5-6.

J'ai fait représenter sous ce nom un Oursin des Alpes très-défiguré, mais qui cependant me paraît présenter plusieurs caractères qui pourraient fort bien lui être particuliers. Et d'abord sa forme générale est aplatie et très-dilatée ; le test est d'une épaisseur peu commune. La bouche, dont on n'aperçoit que quelques légères traces, est subcentrale en avant. Les ambulacres sont de largeur moyenne ; les pores des rangées externes sont allongés et obliques, ceux des rangées internes, petits et ronds.

Cet Oursin provient, comme l'*Echinolampas Studeri*, du calcaire alpin de la Jungfrau, où il a été trouvé par M. Studer ; il fait partie de la collection du Musée de Berne.

#### 11<sup>e</sup> Genre. CONOCLYPUS Ag.

Syn. : *Galerites* Lam.

*Echinolampas* DesM.— Ag.

*Clypeaster* Gldf.

Le cachet particulier de ce genre gît plutôt dans l'ensemble de ses caractères que dans telle ou telle particularité saillante. Il suffit pour s'en convaincre, de jeter un coup-d'œil sur une série d'espèces ou seulement sur notre Pl. X, où sont figurées quatre espèces différentes de *Conoclypus*, qui toutes proviennent des terrains alpins. — Jusqu'ici on a généralement confondu les *Conoclypus* avec les *Echinolampes* et même avec les *Clypeaster* ; Lamarck les classait en partie dans son genre *Galerites*. L'incon-

vénient qui devait en résulter pour la paléontologie se fit de plus en plus vivement sentir, à mesure que le nombre des espèces augmenta. J'ai cru devoir y remédier en retranchant du genre *Echinolampas* les genres *Pygorhynchus*, *Conoclypus* et *Pygurus*. Le genre *Conoclypus* comprend toutes les espèces de forme circulaire ayant l'anus allongé dans le sens du diamètre longitudinal et dont les aires ambulacraires sont de niveau avec le reste du test. Mais le caractère le plus saillant de ce genre et le seul qui lui soit exclusivement propre, c'est la forme essentiellement plane de la face inférieure. Les *Conoclypes* sont en outre, pour la plupart, des Oursins de grande taille et de forme conique, très-élevée. Dans plusieurs espèces le diamètre vertical égale à-peu-près le diamètre longitudinal. Les ambulacres convergent, mais d'une manière peu sensible, vers le sommet et vers la base; ils sont généralement larges, composés de deux rangées de pores, réunies par des sillons plus ou moins apparens; les pores des rangées externes sont constamment allongés dans le sens du diamètre horizontal, tandis que ceux des rangées internes sont au contraire arrondis. L'ouverture buccale est centrale; elle est protégée par de puissans bourrelets, formés par le renflement de l'extrémité des aires interambulacraires, d'où résulte une étoile pentagonale très-prononcée, à-peu-près comme dans le genre *Clypeus*. L'appareil oviducal forme constamment le sommet du disque. Il est composé d'un bourrelet central, d'aspect spongieux, autour duquel viennent se grouper en cercle les plaques ovariales et interovariales, les unes et les autres au nombre de cinq. Le test est toujours très-épais. Il est recouvert uniformément de petits tubercules analogues à ceux des *Echinolampes* et des *Clypéastres*.

Le genre *Conoclypus* ainsi délimité est propre à la fois aux terrains de la craie supérieure et aux terrains tertiaires. En Suisse, on en a jusqu'ici trouvé trois espèces dans les calcaires des Alpes. Il n'en existe point dans le néocomien du Jura.

## I. CONOCLYPUS ANACHORETA Ag.

Tab. X, fig. 5-7.

L'espèce à laquelle je donne ce nom est essentiellement alpine. M. Studer en a trouvé un certain nombre d'exemplaires dans le terrain crétacé des environs d'Einsiedeln, mais je n'en connais point d'étrangers à la Suisse. Deux caractères distinguent le *Conocl. Anachoreta* d'une manière tranchée de tous ses congénères : c'est sa forme allongée et la petitesse de l'ouverture buccale. Au reste on lui reconnaît tous les caractères des vrais Conoclypes ; le test est épais et recouvert d'une granulation très-homogène, formée par de petits tubercules entourés d'une zone lisse et déprimée. La face inférieure est à-peu-près plane et la bouche elle-même n'est en aucune façon déprimée. Les bourrelets qui forment habituellement l'extrémité des aires interambulacraires ne sont pas non plus bien sensibles. Les ambulacres sont de largeur moyenne, ils se font remarquer par une particularité qu'on ne retrouve dans aucune autre espèce à moi connue ; c'est que les pores des rangées externes, sans être bien allongés, sont inclinés obliquement en bas, comme cela se voit surtout bien sur fig. 7 ; ceux de la rangée interne sont ronds. Les aires ambulacraires se resserrent moins brusquement que dans d'autres espèces, à l'approche du sommet. L'appareil oviducal occupe le sommet du disque ; mais l'on ne distingue, dans l'exemplaire figuré, que le bourrelet spongieux qui est au centre. Les plaques oviducal ont disparu. De même je ne connais aucun exemplaire où l'ouverture anale fût conservée. Ne voulant pas figurer des parties altérées, j'ai cherché à gagner de l'espace en ne reproduisant que les côtés intacts du test. La face antérieure est indiquée par un *a*. — Tous les exemplaires connus de cette espèce font partie de la collection du Musée de Berne.

## II. CONOCLYPUS MICROPORUS Ag.

Tab. X, fig. 8-10.

Cette espèce provient, comme la précédente, du terrain crétacé d'Einsiedeln, où M. Studer en a trouvé plusieurs exemplaires; mais ils sont malheureusement dans un mauvais état de conservation. La forme générale du test est circulaire et conique. La face inférieure est plane; la bouche, qui est beaucoup plus grande que dans l'espèce précédente, est placée au centre et entourée de bourrelets assez peu apparens; sa forme est un pentagone très-prononcé. Les ambulacres sont composés de deux rangées de pores très-distincts. Ceux de la rangée externe sont allongés transversalement; ceux de la rangée interne sont ronds et beaucoup plus petits; ce qui m'a engagé à donner à l'espèce le nom de *C. microporus*. Le test est épais et recouvert de tubercules très-homogènes sur toute sa surface. L'ouverture anale et l'appareil oviducal ne sont conservés dans aucun des exemplaires que j'ai vus. La lettre *a* au bord des figures 8 et 9 indique le bord antérieur. L'original de mes figures fait partie de la collection du Musée de Berne.

## III. CONOCLYPUS CONOIDEUS Ag.

Tab. IX, fig. 14-16.

Syn.: *Galerites conoïdeus* Lam. (Syst. III, p. 22.) non Gldf.

*Echinolampas Agassizii* DuB. (Voyage autour du Caucase. Série géologique.

Pl. 1, fig. 22-24.)

*Clypeus conoïdeus* Leske (apud Klein, p. 159. Tab. 43, fig. 2.)

*Galerites conoïdeus* Al. Br. (Théor. des terr. Tabl. n° 5, p. 13 et Tabl. n° 8, p. 5.

— Gratel. (Dax n° 1. pl. 2, fig. 3.)?

*Echinus conoïdeus* Lin. Gm. (p. 3181.)

*Echinolampas semi-globus* DesM. (Tabl. synopt. p. 544, n° 11.)

*Echinoclypeus conoïdeus* De Bl. (Zooph. p. 189.)

*Echinus conoïdeus* vel *istriacus* Schloth (Petref. p. 311.)

La détermination de cette espèce offre de graves difficultés au paléontologiste, ainsi qu'on peut s'en convaincre, en jetant un coup-d'œil sur la



liste des synonymes ci-dessus. Il importe par conséquent de remonter aux sources premières, si l'on veut ne pas courir le risque de tomber dans de nouvelles confusions.

Le nom spécifique de *conoideus* fut donné par Lamarck à une espèce de mon nouveau genre *Conoclypus*, qu'il caractérise de la manière suivante, en la classant dans son genre *Galerites*: *Galerites maximus, conoideus, assu-latus, ambitu ovato-orbiculari, basi plana, areis ambulacrorum in vertice canaliculatis, ano longitudinali submarginali* (Lam. Syst. III. p. 22). Goldfuss a décrit et figuré, sous le même nom de *conoideus*, mais en le reportant dans le genre *Clypeaster* (*Clypeaster conoideus* Gldf.), une grande espèce de Kressenberg. Cependant il n'est pas certain de son identité avec le *Galerites conoideus* de Lam., et il fait remarquer positivement à ce sujet que le nom de Lamarck pourrait tout aussi bien s'appliquer à une autre espèce, provenant de Dax, et qu'il a vue dans la collection de M. Høeninghaus. DesMoulins ne doute pas que l'espèce de Goldfuss ne soit différente de celle de Lamarck, mais il commet d'un autre côté l'erreur de confondre l'espèce de Goldfuss avec le *Galerites semi-globus* Lam. (*Conoclypus semi-globus* Ag.), qui certainement en est très-différent. Il y a quelques années mon ami M. DuBois de Montpéroux rapporta de son voyage au Caucase et en Crimée une grande et belle espèce de *Conoclype* provenant de la craie à Nummulites. L'ayant comparée attentivement avec des originaux de l'espèce de Goldfuss, nous nous assurâmes qu'elle en différait à plusieurs égards. En conséquence M. DuBois en fit une espèce nouvelle, qu'il a figurée sous le nom d'*Echinolampas Agassizii* dans son *Voyage autour du Caucase*, Série géologique. Pl. I. fig. 22-24. A cette époque nous ignorions tous deux que l'espèce de Goldfuss et celle de Lamarck fussent différentes; mais ayant eu plus tard l'occasion d'examiner les exemplaires originaux de Lamarck, je m'aperçus que l'*Echinolampas Agassizii* de M. DuBois n'était autre chose que le véritable *Galerites conoideus* Lam. Depuis cette époque, M. A. Escher de la Linth a trouvé dans le calcaire alpin de Sewen (canton de Schwitz) un moule d'une grande espèce de *Conoclypus*, qui, par tous ses caractères, se

rapproche beaucoup du *Conoclypus conoideus*, et que je crois en conséquence devoir envisager comme identique avec ce dernier fossile, en attendant que des exemplaires plus parfaits viennent confirmer mon opinion. Il résulte de tout ceci : 1° que le *Galerites conoideus* Lam. et le *Clypeaster conoideus* Gldf. sont deux espèces différentes, l'une appartenant au terrain crétacé, l'autre au terrain du Kressenberg, qui est généralement envisagé comme tertiaire; 2° que l'*Echinolampas Agassizii* DuB. et le *Galerites conoideus* sont identiques. En conséquence, la dénomination de M. DuBois devra être envisagée comme non avenue.

Comme le moule de M. Escher ne saurait donner, à lui seul, qu'une idée imparfaite de l'espèce, j'ai fait figurer les faces supérieure et inférieure (fig. 14 et 15) d'après l'exemplaire de M. DuBois de Montpéreux. Voici quels sont les caractères spécifiques du *Conoclypus conoideus* : sa forme générale est légèrement ovale et assez élevée, et le côté postérieur est un tant soit peu plus étroit que le côté antérieur; l'espèce de Goldfuss est, au contraire, parfaitement circulaire et conique. La face inférieure est plane dans les deux espèces; la bouche qui en occupe le centre est pentagonale. L'anus est marginal à la face inférieure et allongé longitudinalement. Les ambulacres sont très-larges et leurs pores sont réunis par des sillons très-apparens, qu'on poursuit jusque près de la base. La partie des aires ambulacraires, comprise entre les doubles séries de pores, se retrécit sensiblement à l'approche du sommet, où elle devient moins large que les ambulacres eux-mêmes; elle est aussi quelquefois très-déprimée vers le sommet, de manière à présenter de profondes cannelures, résultant de la mobilité des plaques dans cette partie du test. L'appareil oviducal est représenté par un large bourrelet d'aspect spongieux, autour duquel on aperçoit quelques traces des plaques ovariiales. Le test est uniformément recouvert de tubercules très-homogènes. Ses dimensions sont considérables; le diamètre longitudinal atteint de 5 à 6 pouces, le diamètre vertical de 4 à 5 pouces.

IV. CONOCLYPUS DuBois *Ag.*

Tab. X, fig. 11-13.

J'appelle de ce nom, en la dédiant à mon ami M. DuBois de Montpéroux, une espèce de Conoclypus, que cet habile géologue a rapportée de la craie de Crimée. J'ai longtemps hésité à l'envisager comme spécifiquement distincte du *C. conoideus*, et ce n'est qu'après avoir vu un autre exemplaire qui lui est absolument semblable par ses dimensions, sa forme et les détails qu'il est possible d'apercevoir, que je me suis décidé à séparer le *C. DuBois*, du *C. conoideus*. Le second exemplaire a été trouvé dans le calcaire alpin de la Wendematt par M. Escher de la Linth, et c'est à ce titre qu'il figure dans le présent mémoire; mais comme la surface inférieure n'est pas conservée, j'y ai suppléé en donnant le dessin de l'exemplaire de M. DuBois. Le principal caractère par lequel le *C. DuBois* diffère du *C. conoideus*, c'est sa forme circulaire et peu élevée. Il n'atteint pas la moitié de la hauteur de son congénère. Les bourrelets qui entourent la bouche sont aussi moins renflés et le pentagone de l'ouverture buccale par conséquent moins prononcé. Peut-être m'objectera-t-on que ce ne sont là que des différences d'âge; pour ma part, comme je ne connais point les variations d'âges de cette espèce, j'aime autant voir dans ces traits particuliers des caractères spécifiques, d'autant plus que les mêmes formes se reproduisent dans des terrains de contrées très-éloignées les unes des autres. A part les particularités que je viens de signaler, on retrouve dans l'espèce qui nous occupe, la plupart des caractères du *C. conoideus*. Les ambulacres sont larges et leurs pores réunis par des sillons très-prononcés, qu'on peut poursuivre jusque près de la base. Près du sommet, les ambulacres surpassent même en largeur la zone médiane des aires ambulacraires. Le test est d'une épaisseur moyenne, uniformément recouvert de petits tubercules entourés de zones déprimées. L'appareil oviducal est au centre du disque; il se compose d'un bourrelet central, entouré des plaques ovariales et interovariales. L'anús n'est visible dans aucun des exemplaires à moi connus. La lettre *a*, au bord des fig. 11 et 12, indique la face antérieure.

12<sup>e</sup> Genre. **PYGURUS** Ag.Syn. : *Echinolampas*, *Clypeaster* Auct.

Il peut paraître difficile, au premier abord, de formuler d'une manière précise les caractères distinctifs du genre *Pygurus*; mais ce n'est point une raison pour contester sa validité. Il peut être envisagé jusqu'à un certain point comme intermédiaire entre les vrais *Echinolampas* avec lesquels on l'a confondu jusqu'ici et mon nouveau genre *Conoclypus*; mais il diffère des uns et des autres par sa forme généralement déprimée et subanguleuse ou subcirculaire, tandis que les *Echinolampas* sont constamment allongés et les *Conoclypus* très-élevés et coniques. Un autre caractère particulier au genre *Pygurus*, c'est la tendance de la face postérieure à s'allonger en une sorte de bec. Ce prolongement peut n'être pas très-sensible dans certaines espèces, mais l'on en aperçoit au moins toujours quelques traces. Certaines espèces rappellent aussi jusqu'à un certain point les vrais *Clypeaster*; mais il est un caractère essentiel par lequel les deux genres diffèrent d'une manière tranchée, c'est que dans les *Clypeaster* le côté tronqué est en arrière, tandis qu'il forme l'avant dans les *Pygurus*. Tous les *Pygurus* sont d'assez grande taille; il en existe même une espèce qu'on peut appeler gigantesque, le *Cl. Hartmanni* Koch et D., qui n'a point encore été trouvé en Suisse. L'ouverture buccale est centrale et protégée par d'assez forts bourrelets. Ces bourrelets alternent avec des dépressions en forme de pétales, sur lesquelles les pores des ambulacres redeviennent très-visibles, caractère que l'on retrouve aussi dans les *Echinolampas*. L'ouverture anale est placée au bord postérieur de la face inférieure; sa forme est ou circulaire ou quelque peu allongée. La face inférieure est très-inégale à raison de la dépression des ambulacres et du renflement des aires interambulacraires. Sur la face supérieure cette inégalité disparaît à-peu-près complètement, ou si elle existe dans quelques espèces, elle n'est que très-peu sensible. Les ambulacres sont larges avec une tendance très-prononcée à converger

au sommet et vers la périphérie, à-peu-près comme dans le genre *Clypeus*, que nous venons d'étudier plus haut. Ils sont très-apparens à la face supérieure, jusqu'au bord de la circonférence; à la face inférieure, au contraire, les pores eux-mêmes ont disparu et il ne reste que les dépressions dans lesquelles sont logées les aires ambulacraires. L'appareil oviducal est au sommet du disque; c'est un bourrelet d'aspect spongieux, entouré des plaques ovariiales et interovariiales.

Les *Pygurus* appartiennent à l'époque jurassique et à l'étage inférieur de la Craie; les deux espèces que nous possédons en Suisse proviennent du terrain néocomien.

### I. *PYGURUS MONTMOLLINI* Ag.

Tab. XI, fig. 1-3.

Syn. : *Echinolampas Montmollini* Ag. (Notice etc. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 134. Tabl. 14, fig. 4-6).

*Echinolampas triloba* DesM. (Tabl. synopt. p. 350. n° 22).

J'ai décrit et figuré cette espèce, sous le nom de *Echinolampas Montmollini*, dans ma Notice sur les fossiles crétacés du Jura Neuchâtelois, insérée dans les *Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Neuchâtel*, vol. 1, p. 134, Tab. 14, fig. 4-6. Ayant eu depuis cette époque l'occasion d'étudier un certain nombre d'espèces très-voisines de celles-ci, et leur ayant reconnu à toutes un type particulier, je les ai séparées des vrais *Echinolampas*, pour en faire mon nouveau genre *Pygurus*. Le *Pygurus Montmollini* est peut-être de toutes les espèces du genre celle dont le prolongement de l'aire interambulacraire impaire est le moins apparent; on n'aperçoit qu'une légère saillie entre les deux échancrures, qui caractérisent la face postérieure. Aussi le diamètre longitudinal n'excède-t-il pas le diamètre transversal. La forme générale de l'Oursin est plutôt carrée que ronde, et le côté postérieur plus large que le côté antérieur. Ce dernier côté se distingue en outre par la présence d'un large sillon correspondant à l'ambulacre

impair et pouvant servir à orienter les exemplaires, lorsque le côté postérieur a disparu. L'anus est à la face inférieure, à l'extrémité du prolongement anal; il est grand et légèrement ovale dans le sens du diamètre longitudinal. L'ouverture buccale est sensiblement rapprochée du bord antérieur; c'est une étoile pentagonale, protégée par de forts bourrelets résultant du renflement de l'extrémité des aires interambulacraires. Des pores reparaissent d'une manière très-distincte aux abords de la bouche, formant deux rangées, qui ne sont point réunies par des sillons, comme à la face supérieure. Le sommet du disque est diamétralement opposé à l'ouverture buccale, par conséquent subcentral comme celle-ci. Il est occupé par l'appareil oviducal, qui se compose d'un bourrelet central assez petit, autour duquel on remarque, dans les exemplaires que j'ai sous les yeux, quelques traces peu distinctes des plaques ovariiales et interovariiales. Le tout n'occupe qu'un très-petit espace. Mais ce qui mérite surtout de fixer l'attention, c'est la forme effilée des aires ambulacraires, à l'approche de la circonférence; ce qui fait qu'elles ne ressemblent pas mal à des feuilles de saule, tandis que dans d'autres espèces elles sont plus ou moins arrondies. Les ambulacres eux-mêmes sont assez larges, et les pores sont distinctement réunis par un petit sillon, qui correspond sans doute aux sutures des plaques. Comme d'habitude, les pores de la rangée externe sont allongés transversalement, tandis que ceux de la rangée interne sont ronds. Le bord postérieur n'étant pas intact dans l'original de mes figures, j'en ai indiqué le contour par une ligne pointillée (fig. 1).

On trouve assez fréquemment des débris de cette espèce dans le calcaire jaune du Néocomien du canton de Neuchâtel. L'exemplaire figuré, le plus parfait que je connaisse, fait partie de la collection de mon ami M. Aug. de Montmollin, à qui j'ai dédié l'espèce.

C'est à tort que M. DesMoullins a identifié le *P. Montmollini* avec le *Pygurus trilobus* (*Clypeaster trilobus* Defr.). J'ai eu l'occasion de voir les exemplaires originaux de M. Defrance, et j'ai pu m'assurer qu'il existe une grande différence entre ces deux espèces. Dans aucune espèce du genre le

prolongement anal n'est plus prononcé que dans le *P. trilobus*, et dans aucune il n'est moins apparent que dans le *P. Montmollini*.

## II. PYGURUS ROSTRATUS *Ag.*

Tab. IX, fig. 4-6.

Cette espèce a été découverte tout récemment par M. Aug. de Montmollin dans une couche très-ferrugineuse de l'étage néocomien, près de Métabief (Dépt. du Doubs). Le fer est assez abondant dans cette couche pour donner lieu à une exploitation lucrative; ce qui n'empêche pas que les fossiles qui y sont renfermés, ne soient très-bien conservés, comme le prouve l'exemplaire figuré.

Vue d'en haut, cette espèce a assez l'apparence d'un Clypeaster, surtout à cause du léger renflement des aires ambulacraires; mais il suffit de faire attention à l'avant et à l'arrière pour reconnaître aussitôt le type des Pygurus. La bouche est subcentrale en avant et protégée par de forts bourrelets, entre lesquels on voit reparaître les pores des ambulacres, qui présentent ici la forme d'une étoile pentagonale très-élégante (fig. 6). Le prolongement en forme de bec de l'aire interambulacraire impaire est très-sensible, ce qui rend le diamètre longitudinal plus grand que le diamètre transversal. Le sillon antérieur est moins prononcé que dans le *P. Montmollini*. Le côté antérieur est sensiblement plus étroit que le côté postérieur. L'ouverture anale est petite et située à la face inférieure, à l'extrémité du prolongement de l'aire interambulacraire impaire. Les ambulacres sont un peu plus larges et plus arrondis que dans l'espèce précédente, quoique encore très-effilés; les pores y sont très-serrés et ceux de la rangée externe fortement allongés. Le test est épais et recouvert d'une fine granulation très-homogène. L'appareil oviducal est petit; il occupe le sommet du disque; les plaques ovariiales et interovariiales ne sont pas bien visibles dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux.

## III. PYGURUS PRODUCTUS Ag.

Tab. XIII bis, fig. 3-4.

Syn.: *Echinolampas productus* Ag. (Notice etc. Mém. Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 135). — DesM. (Tabl. synopt. p. 352, n° 32).

Cette espèce ne paraît pas être très-répandue dans notre terrain néocomien, car depuis la description que j'en ai donnée, dans ma *Notice sur les fossiles crétacés du Jura*, d'après un exemplaire assez imparfait, je ne sache pas qu'on en ait trouvé de plus complets. L'espèce n'en est pas moins très-caractérisée, d'abord par sa forme allongée et en second lieu par la position de l'ouverture anale, qui n'occupe point l'extrémité du prolongement postérieur, mais qui est séparée du bord par un espace assez considérable. Le test n'est pas très-élevé, mais ses bords sont très-épais; il atteint sa plus grande largeur entre la bouche et l'anus; plus loin il se rétrécit brusquement pour former le prolongement de la face postérieure. La face antérieure est étroite et arrondie. L'ouverture buccale est sensiblement rapprochée du bord antérieur; elle est de forme pentagonale, protégée par cinq bourrelets assez apparens. La face inférieure est légèrement concave; l'on y distingue, outre la bouche qui en occupe la partie la plus enfoncée, cinq légères dépressions dans lesquelles gisent les ambulacres. L'anus, dont je viens de signaler plus haut la position particulière, est de forme oblongue dans le sens du diamètre longitudinal. Le mauvais état de conservation de l'exemplaire que j'ai sous les yeux ne m'a pas permis de donner une figure de la face supérieure. Tout ce que l'on peut en dire, c'est que les ambulacres convergent vers un seul point du disque. Le test est épais; il présente la même granulation que les autres espèces du genre, qui viennent d'être décrites.

L'original de ma figure fait partie de la collection du Musée de Neuchâtel; il provient de la partie supérieure du calcaire jaune de l'étage néocomien, et a été trouvé au Mormont près de Lasarraz, par M. Coulon.



## IV. PYGURUS CONICUS Ag.

Tab. XIII bis, fig. 1-2.

Le fossile figuré sous ce nom est un moule d'une espèce d'Oursin, qui me semble se rapprocher du type des *Pygurus*. Il y a tout lieu de croire que c'est une espèce nouvelle. Je lui ai donné le nom de *Pygurus conicus* à raison de sa forme essentiellement conique, par laquelle il se distingue de toutes les autres espèces du genre. Les ambulacres sont larges et convergent d'une manière très-prononcée vers le sommet et vers la périphérie. Jusqu'à une certaine distance du sommet ils l'emportent même en largeur sur les aires interambulacraires. Quoique très-imparfait, ce fragment n'en est pas moins important à cause de son origine alpine; il a été trouvé par M. Escher de la Linth dans un bloc de grès-vert des environs de Rifferschweil.

13<sup>e</sup> Genre. **FIBULARIA** Lam.Syn.: *Echinoneus* Gldf.

Le genre *Fibularia*, tel que Lamarck l'a caractérisé, se trouve à la fois dans les terrains crétacés, dans les terrains tertiaires et dans l'époque actuelle. Il ne comprend que de très-petites espèces de forme ovale ou sub-pentagonale. Les ambulacres tendent à converger près de la périphérie. A la face supérieure, près du sommet, les aires ambulacraires sont plus larges que les interambulacraires. La bouche, de forme pentagonale, est située dans une cavité au centre de la face inférieure. L'anus, placé entre le bord postérieur et la bouche, est sensiblement rapproché de cette dernière. L'appareil oviducal occupe le sommet du disque; il est composé d'un bourrelet central très-apparent, autour duquel on distingue quatre pores oviducaux. Les tubercules sont les mêmes que dans les *Echinolampes*.

I. *FIBULARIA ALPINA* Ag.

Tab. XIII, fig. 1-3.

Cette petite espèce des Alpes se rapproche beaucoup par sa forme et ses dimensions du *Fib. altavillensis* Ag. (*Scutella altavillensis* Defr.); et c'est ce qui m'a engagé à la ranger dans un même genre avec ce dernier. Au reste on ne saurait la confondre avec l'espèce précitée, à cause de sa forme plus allongée, et parce que l'anús est moins rapproché de la bouche. Celle-ci est placée au centre de la face inférieure, dans une dépression assez marquée. Malheureusement la structure intime du test est complètement altérée, comme cela n'arrive que trop souvent dans les fossiles alpins, de sorte que, pour le moment, nous ne pouvons invoquer pour notre espèce d'autres caractères que les contours et la position des principales parties du corps.

J'ai sous les yeux deux exemplaires de cette espèce, qui proviennent de Bürglen (Canton d'Uri) et qui m'ont été communiqués par M. Studer. La roche dans laquelle ils sont empâtés est une sorte de conglomérat fossilifère noir, dans lequel on remarque une quantité de fossiles de toute espèce, entre autres une grande Nummulite.

14<sup>e</sup> Genre. *HYBOCLYPUS* Ag.

C'est un type nouveau de la famille des Clypeaster; et bien que je n'en connaisse encore qu'une seule espèce, je n'hésite pas à l'envisager comme le représentant d'un genre particulier, d'autant plus remarquable, qu'il tient en quelque sorte le milieu entre les genres à ambulacres pétaïoïdes, tels que les Clypeus, Echinolampes, Nucléolites, etc., et les genres à ambulacres simples tels que les Discoïdées, les Pygaster, les Galerites, etc. Il a les tubercules des premiers et les ambulacres des derniers. Par son aspect général, il se rapproche plus des Nucléolites que tous les autres genres; il a même l'anús placé dans un sillon de l'aire interambulacraire impaire, à la face supérieure. Les ambulacres, ainsi qu'il vient

d'être remarqué, sont simples, c'est-à-dire qu'ils se composent de deux rangées de pores très-rapprochés, homogènes et non réunis par un sillon. Le bord antérieur est caractérisé par un sillon assez apparent, dans lequel se loge l'ambulacre impair. La face inférieure rappelle à plus d'un égard les *Disaster*, et je crois même qu'il serait très-facile de prendre le change sur un exemplaire dont la face inférieure serait seule conservée. Comme dans les *Disaster*, les ambulacres y sont déprimés de manière à former autant de gouttières, qui confluent vers la bouche. Celle-ci est située à-peu-près au premier tiers du diamètre longitudinal, dans une dépression assez marquée. Sa forme est pentagonale, mais dépourvue de bourrelets.

Jusqu'ici le genre *Hyboclypus* est limité au terrain jurassique.

*HYBOCLYPUS GIBBERULUS Ag.*

Tab. XIII, fig. 10-12.

Vue d'en haut, cette espèce se fait remarquer au premier coup-d'œil, par une crête très-saillante de l'aire ambulacraire impaire, à la face supérieure; particularité qui lui a valu son nom. Au bord antérieur cette crête se transforme en un sillon assez profond, qui continue jusqu'à la bouche. Le sillon de l'aire interambulacraire impaire, dans lequel s'ouvre l'anüs, commence tout près du sommet; il est d'abord étroit et profond, puis s'évase de plus en plus pour disparaître complètement au bord postérieur. L'ouverture anale elle-même est située au fond du sillon. Le côté antérieur est beaucoup plus rétréci que le côté postérieur, qui est tronqué et bien moins élevé. Les ambulacres sont visibles depuis l'appareil oviducal jusqu'à la bouche; mais, passé le milieu de la circonférence, les paires de pores sont moins rapprochées qu'à la face supérieure. L'appareil oviducal lui-même n'est pas conservé dans les exemplaires que j'ai sous les yeux; mais l'on peut conclure de la convergence des ambulacres, qu'il n'occupait

pas un bien grand espace. Le test est mince et recouvert, sur toute sa surface, de tubercules homogènes, à la manière des Echinolampes.

Je ne connais que deux exemplaires de cette espèce; ils font partie de la collection du Musée de Carlsruhe; l'étiquette indique comme origine la Suisse et comme gisement le terrain jurassique. Ils ont en effet tout-à-fait l'apparence de fossiles jurassiques de l'oolithe ferrugineuse.

#### 15<sup>e</sup> Genre. **GALERITES** Lam.

Syn. : *Conulus* Klein.

*Echinoconus* DeBl.

Lorsque Lamarck établit le genre *Galerites*, on ne connaissait encore que très-peu d'espèces de ce type, et c'est ce qui explique pourquoi les caractères génériques qu'il lui assigne nous paraissent aujourd'hui si peu précis. Goldfuss en a retranché un certain nombre d'espèces qu'il a transportées dans d'autres genres. Plus tard Gray, revenant sur les traces de Klein, en sépara toutes les espèces analogues au *G. subuculus* Goldf. pour en faire le genre *Discoidea*. Après cette défalcation les espèces de forme circulaire, aplatie, ayant l'anus à la face supérieure et les tubercules disposés en séries verticales, à la manière des Cidarides, ne pouvaient plus rester réunies aux vrais *Galerites*. J'en fis en conséquence mon genre *Pygaster*, qui aujourd'hui compte déjà un nombre assez considérable d'espèces.

Les caractères essentiels et constans du genre *Galerites*, réduits à ces limites plus restreintes, sont : la forme générale, et la forme de l'ouverture buccale. En effet tous les *Galerites* ont une tendance marquée à se rétrécir en arrière, ce qui fait que toutes les espèces sont plus ou moins pentagonales. Ajoutons à cela que la plupart se font remarquer par leur taille élevée. L'ouverture buccale est pentagonale et allongée dans le sens du diamètre longitudinal; l'on ne remarque sur son pourtour aucune trace de ces bourrelets qui sont si apparens dans quelques-uns des genres pré-

cédens, tels que les *Conoclypus*, les *Clypeus*, etc. Enfin on peut encore invoquer comme l'un des caractères propres aux *Galerites*, la forme habituellement plane de la face inférieure. L'an us est placé à la face postérieure, plus ou moins rapproché du bord de la circonférence; les ambulacres sont simples, c'est-à-dire, que les deux rangées de pores dont ils se composent ne sont point réunies par de petits sillons transverses; caractère essentiel qui distingue les *Galerites* des *Catopygus* (v. p. 47). L'appareil oviducal est composé d'un bourrelet central, entouré des plaques ovariiales et interovariiales. La plaque qui correspond à l'aire interambulacraire impaire est seule dépourvue d'un trou oviducal. Les tubercules sont assez uniformément répartis sur toute la surface du test; cependant dans quelques espèces on leur reconnaît une tendance incontestable à former des séries verticales régulières.

Tous les vrais *Galerites* sont de l'époque crétacée. La plupart se trouvent dans la Craie blanche. La Suisse ne nous en a fourni jusqu'ici que deux espèces, une du Néocomien et une des terrains crétacés alpins.

### I. GALERITES CASTANEA Ag.

Tab. XIII, fig. 7-9.

Syn. : *Catopygus Castanea* Ag. (Prodr. etc. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 185).

*Nucleolites Castanea* Al. Br. (Géol. p. 100 et 399. Pl. 9. fig. 14. A. B. C.) —

Defr. (Dict. sc. nat. T. 35. p. 214). — De Bl. (Zooph. p. 188).

*Pyrina Castanea* DesM. (Tabl. synopt. p. 258, n° 3).

L'espèce dont il s'agit a été signalée en premier lieu par M. Al. Brongniart, qui l'a décrite et figurée sous le nom de *Nucleolites Castanea*, dans la *Géologie des environs de Paris*. Par sa forme générale, elle ressemble beaucoup à un *Catopygus*, et, comme je n'en possédais que des exemplaires imparfaits, lors de la publication de mon *Prodrome*, je la rangeai à tort dans ce dernier genre, au lieu d'en faire un vrai *Galérîte*. Nous

avons vu en parlant du genre *Catopygus*, que le principal caractère qui le distingue du genre *Galérîte*, c'est d'avoir les ambulacres pétaloïdes et réunis, tandis que dans les *Galérîtes* ils sont simples et ne convergent nullement près de la périphérie. Or les ambulacres du *Galerites Castanea* sont de vrais ambulacres de *Galérîtes*. Les rangées de pores sont très-rapprochées, et l'on ne remarque aucune liaison entr'elles. Le côté antérieur est beaucoup plus renflé que le côté postérieur. L'ouverture buccale occupe le centre de la face inférieure; elle est grande et légèrement allongée dans le sens du diamètre longitudinal. L'anüs est à la face postérieure, très-rapproché du bord inférieur. La face supérieure est à-peu-près uniformément bombée; cependant les aires ambulacraires sont quelque peu renflées; leur largeur se maintient dans les proportions ordinaires, excepté à l'approche du sommet, où elles se rétrécissent sensiblement. L'appareil oviducal n'est que très-imparfaitement conservé; mais l'on voit, parce qu'il en reste, qu'il était très-petit. Le test est mince; on n'y aperçoit plus aucune trace des tubercules.

De toutes les espèces de *Galérîtes* que je connais, celle qui se rapproche le plus du *G. Castanea* est le *G. rhodomagensis* Ag., qu'on trouve dans la craie de Rouen; mais notre espèce a la face inférieure plus concave et l'ouverture buccale plus grande. Il est digne de remarque que jusqu'ici cette espèce n'a été trouvée que dans les terrains crayeux de la chaîne des Alpes. M. Al. Brongniart cite comme origine la montagne des Fis; parmi les exemplaires que j'ai sous les yeux, il en est qui proviennent de la même localité; d'autres ont été trouvés par M. Studer dans le grès vert du Reposoir.

## II. GALERITES PYGÆA Ag.

Tab. XIII, fig. 3-6.

Il est facile de confondre cette espèce avec le *Catopygus Gressly* Ag., qu'on rencontre dans le même terrain et qui a absolument les mêmes di-

mensions (v. Tab. 8, fig. 1-3). Il importe donc, pour ne pas courir le risque de prendre un genre pour l'autre, de bien examiner la structure des ambulacres et de voir s'ils sont simples comme dans les Galérites ou si les pores sont réunis par de petits sillons, comme dans les Catopygus. Le *Galerites pygaea*, dont nous nous occupons, est à tous égards un Galérite. Ses ambulacres sont très-serrés, et l'on ne remarque en aucune façon qu'ils convergent vers la périphérie. Les pores sont ronds, et il n'existe aucune trace de sillons d'une rangée à l'autre. L'ouverture buccale a la forme d'un pentagone allongé dans le sens du diamètre longitudinal; elle est placée au centre de la face inférieure, qui est à-peu-près plane. A la face supérieure, les aires ambulacraires sont un tant soit peu renflées. Le test est uniformément recouvert de tubercules homogènes, à la manière des Echinolampes, mais très-apparens, proportionnellement à la taille de l'Oursin.

On trouve assez fréquemment des débris de cette espèce dans le calcaire compacte jaune du Néocomien; mais les bons exemplaires sont très-rares. Il en existe des fragmens dans presque toutes les collections de fossiles néocomiens.

#### 16<sup>e</sup> Genre. **PYGASTER** Ag.

Syn.: *Galerites* Lam. . .

*Nucleolites* DesM. (pro parte).

Lorsque j'établis le genre Pygaster, je n'en connaissais qu'une espèce, et encore n'en avais-je vu que le dessin. Mais ses caractères me parurent si tranchés, que je n'hésitai pas à en faire le type d'un nouveau genre. Depuis cette époque, plusieurs autres espèces sont venues prendre place dans ce nouveau cadre, et je crois qu'il n'existe maintenant aucun genre dans tout l'ordre des Echinites dont les caractères soient plus précis que ne le sont ceux des Pygaster. Et d'abord, l'ouverture buccale, au lieu d'être pentagonale comme dans les Galérites, les Clypeus, les Nucléolites, etc., est circulaire et ornée de dix échancrures correspondant aux sutures des

aires ambulacraires avec les aires interambulacraires. Les tubercules sont disposés par séries régulières. L'anus enfin est très-grand et placé à la face supérieure. En résumant ces principaux caractères, auxquels on peut encore ajouter la forme circulaire et déprimée du test, on comprend difficilement comment l'on a pu laisser réunies dans un seul genre des espèces qui n'ont absolument rien de commun entre elles, comme celles qui aujourd'hui forment mon genre *Pygaster* et les vrais *Galérites* ou les vrais *Nucléolites*. Jusqu'ici tous les genres que nous avons passés en revue, à l'exception des vrais *Spatangues*, nous ont présenté une granulation à-peu-près semblable : la surface entière du test était recouverte de petits tubercules surgissant d'une dépression circulaire et répartis d'une manière uniforme sur toute la surface du test. Les *Pygaster* nous présentent pour la première fois une structure et une disposition différentes. Les tubercules sont de petits cônes mamelonnés et perforés, naissant d'une zone lisse, qui elle-même est entourée d'un cercle de très-petites granules. Ils sont disposés par séries verticales et deviennent de plus en plus distincts à mesure qu'on les poursuit du sommet à la bouche. Sur les aires ambulacraires on remarque habituellement quatre de ces rangées ; les aires interambulacraires en ont un nombre beaucoup plus considérable. Les *Pygaster* nous présentent ainsi, dans la structure de leur test et dans la forme de l'ouverture buccale, le premier acheminement vers le type des *Cidarides*.

Je connais jusqu'ici six espèces de *Pygaster*, dont trois proviennent des terrains crétacés de l'Île d'Aix et d'Aix-la-Chapelle, et trois des terrains jurassiques. Ce sont ces dernières qu'on trouve en Suisse ; elles sont beaucoup plus grandes que celles de la Craie.



I. PYGASTER LAGANOIDES *Ag.*

Tab. XII, fig. 13-16.

Le premier exemplaire que j'ai vu de cette belle espèce m'a été communiqué par M. Eudes Deslongchamps, qui l'a recueilli dans le calcaire à polypiers de Ranville en Normandie. Il y a quelques années, M. Gressly en a également trouvé de très-beaux exemplaires dans le Portlandien de notre Jura. Il paraît donc que l'espèce est particulière aux terrains de l'étage supérieur de la formation jurassique.

Sa forme est subcirculaire et sensiblement déprimée. La face inférieure est légèrement concave; l'ouverture buccale, qui en occupe le centre, est circulaire et de grandeur moyenne; les échancrures de son pourtour ne sont pas très-profondes, quoique très-distinctes. L'ouverture anale est grande et de forme allongée; elle commence près du sommet et s'étend en se dilatant jusque près du bord postérieur. L'appareil oviducal n'est pas conservé. Mais ce qui frappe plus particulièrement dans cette espèce, c'est la nature et la disposition des tubercules. On en distingue quatre rangées sur chaque aire ambulacraire et douze rangées sur chaque aire interambulacraire. Toutes ces rangées sont composées de tubercules d'égale grosseur, mais toutes ne sont pas également longues. Fig. 16 est un dessin grossi d'une aire interambulacraire et d'une aire ambulacraire, prises au milieu de la circonférence et destinées à faire ressortir, d'une manière plus complète, la structure de ces parties du test. Dans les aires ambulacraires, il n'y a que les rangées externes qui se prolongent depuis la bouche jusqu'au sommet; dans les aires interambulacraires, ce sont les troisièmes rangées, en partant de la plus extérieure, qui sont les plus longues; les autres s'effacent à mesure que l'aire interambulacraire se rétrécit vers le sommet. A la face inférieure, les tubercules sont plus apparens que sur le reste du test; en les examinant à la loupe on voit qu'ils s'élèvent du milieu d'une zone lisse et déprimée qu'entourent

d'autres petits tubercules, qui, à la face supérieure, forment un cercle autour des tubercules principaux, tandis qu'à la face inférieure ils sont groupés de manière à former un hexagone. L'espace intermédiaire entre les principaux tubercules est parsemé d'une très-fine granulation. Les ambulacres sont simples, composés de deux rangées de petits pores très-serrés et de forme arrondie, qui s'étendent uniformément de la bouche au sommet.

L'exemplaire figuré a été trouvé par M. Gressly dans un banc à coraux du Portlandien, à Rædersdorf (Dépt. du Haut-Rhin).

## II. PYGASTER PATELLIFORMIS *Ag.*

Tab. XIII, fig. 1-3.

Cette espèce appartient, comme la précédente, à l'étage supérieur de la formation jurassique; les principaux caractères qui la distinguent de cette dernière sont, d'une part, ses plus grandes dimensions et sa forme plus circulaire, d'autre part ses tubercules moins nombreux et moins apparens. La face inférieure est sensiblement concave; la bouche, qui en occupe le centre, est de moyenne grandeur et profondément échancrée. L'anus occupe plus de la moitié de l'aire interambulacraire impaire à la face postérieure. Les pores des ambulacres sont très-serrés. Les aires ambulacraires ont à-peu-près la moitié de la largeur des interambulacraires; lorsque le test est intact, elles ont absolument la même apparence que ces dernières; mais lorsqu'il est enlevé, elles sont de beaucoup plus saillantes; caractère que l'on retrouve au reste sur les moules d'une quantité d'espèces d'échinites fossiles. L'on distingue quatre rangées de tubercules principaux sur les aires ambulacraires; les aires interambulacraires en ont au moins quatorze. Mais toute cette masse de tubercules ne ressort pas aussi distinctement que dans le *P. laganoïdes*, si ce n'est à la face inférieure. L'espace intermédiaire entre les rangées principales est occupé par de très-petites granules. Les plaques des aires interambulacraires sont

non seulement plus larges, mais aussi considérablement plus hautes que celles des aires interambulacraires. Le test est très-épais.

Les premiers exemplaires de cette espèce ont été trouvés par M. Gressly dans le Portlandien de la vallée de la Birse, près de la verrerie de Laufon. L'exemplaire figuré fait partie de la collection du Musée de Neuchâtel.

Il existe dans le terrain à Chailles de Suisse une autre espèce de *Pygaster*, très-voisine de celle-ci, dont M. Gressly a trouvé un seul exemplaire au Fringeli; mais il n'est pas assez bien conservé pour avoir pu être figuré avec fruit. J'attendrai pour la décrire que l'on en ait trouvé des exemplaires plus parfaits. Je me bornerai à faire remarquer qu'elle se distingue par la ténuité de son test, par la petitesse de ses pores et par les dimensions considérables de l'ouverture anale. On pourrait l'appeler *P. tenuis*.

### III. PYGASTER UMBRELLA Ag.

Tab. XIII, fig. 4-6.

Syn.: *Galerites umbrella* Lam. (Syst. III, p. 25, n° 15). — E. Desl. (Enc. t. 2. p. 434, n° 15). — Encycl. méth. (Tabl. 142, fig. 7. 8.).

*Nucleolites umbrella* Defr. (Dict. sc. nat. T. 18. p. 87). — DesM. (Tab. synopt. p. 354, n° 2).

*Echinoclypeus umbrella* De Bl. (Zooph. p. 189.)

Lors de la publication de mon Prodrôme, je ne connaissais l'espèce dont il est ici question, que par la figure très-défectueuse de l'Encyclopédie méthodique. M. DesMoulins rapporte à la même espèce le *Clypeus sinuatus* de Leske et de Parkinson; mais comme il ajoute qu'il n'a point vu les originaux, je m'abstiendrai d'identifier ces deux espèces, jusqu'à ce que j'aie eu l'occasion d'acquérir une entière certitude à ce sujet.

Je ne possède qu'un seul exemplaire de cette espèce, trouvé par M. Gressly dans le Portlandien du Jura Soleurois. Le test n'en est pas très-bien conservé, mais sa forme générale ainsi que la position et la structure des principales parties ne laissent aucun doute sur le genre au-

quel il appartient. Il est vrai qu'au premier coup-d'œil on pourrait être tenté de le confondre avec le *Discoïdea speciosa* (Tab. 6, fig. 16), dont il se rapproche à plusieurs égards; mais il suffit de voir la position supère de l'anús pour y reconnaître le type des Pygaster. Le *P. umbrella* est la plus grande espèce du genre; son contour est subpentagonal, par suite de ce que les aires ambulacraires sont un tant soit peu plus longues que les aires interambulacraires. La bouche est au centre de la face inférieure, elle est proportionnellement petite et très-distinctement crénelée. L'anús est aussi, proportion gardée, moins grand que dans les autres espèces; sa forme est celle d'un ovale allongé. Les aires ambulacraires sont de moyenne largeur; les ambulacres en revanche sont étroits; cependant l'on distingue entre les deux rangées de pores un petit espace intermédiaire, qui ne s'aperçoit point dans les autres espèces. Le test est épais; il n'existe, dans l'exemplaire figuré, aucune trace des tubercules; cependant on peut admettre, d'après son aspect et sa structure générale, qu'ils étaient disposés comme dans les espèces précédentes.

#### 17<sup>e</sup> Genre. **DISCOIDEA** *Kl. et Gr.*

Syn. : *Conulus* Leske.

*Galerites* Lam. Gldf.

La création de ce genre remonte à Klein, qui établit les deux genres *Discoïdea* et *Conulus*, ce dernier correspondant au genre des vrais *Galerites*. Quoique très-naturelle, cette division ne fut point admise par les auteurs qui vinrent après lui. C'est à M. Gray qu'appartient le mérite d'avoir réintégré le genre *Discoïdea* dans ses droits. Nous avons vu, en traitant des caractères génériques des Pygaster, que ces derniers, de concert avec les Discoïdées, se rapprochent, par plusieurs particularités de leur structure, du type des Cidarides. En effet les Discoïdées, de même que les Pygaster, ont l'ouverture buccale décagonale ou plutôt circulaire, avec dix échanchures dans son pourtour, et les tubercules disposés en séries verticales absolument comme dans les Cidarides; dans les *Galerites* au contraire

l'ouverture buccale est constamment pentagonale, et les tubercules sont pour la plupart uniformément répartis sur la surface du test. — Les Discoïdées diffèrent des Pygaster par leur forme moins aplatie et par la position de l'ouverture anale à la face inférieure. On peut donc caractériser le genre *Discoidea* de la manière suivante : Ce sont des Oursins de forme circulaire, ayant l'ouverture buccale placée au centre de la face inférieure et ornée de dix crénelures. L'ouverture anale est grande, ovale, ordinairement submarginale, rarement marginale. Les ambulacres sont composés de deux rangées de petits pores ronds et très-rapprochés. Les tubercules, disposés par séries régulières, sont perforés et mamelonnés, et l'espace intermédiaire entre les séries principales est recouvert d'une fine granulation, souvent imperceptible à l'œil nu. L'appareil oviducal est au sommet du disque ; il est formé d'un bourrelet central, entouré de cinq plaques ovariiales et de cinq interovariiales.

Autant les caractères génériques des Discoïdées sont tranchés, autant les caractères spécifiques sont minutieux et souvent difficiles à saisir à cause de la grande uniformité de la plupart des espèces. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup-d'œil sur notre Pl. 6, qui cependant ne comprend qu'une partie des espèces connues.

On trouve le type des Discoïdées répandu dans toutes les formations, depuis l'Oolithe inférieure jusqu'à la Craie blanche inclusivement. Les Alpes nous en ont fourni jusqu'ici deux espèces. Le Néocomien en compte une espèce, et la formation jurassique deux.

# I. DISCOIDEA MACROPYGA Ag.

Tab. VI, fig. 1-3.

Syn. : *Discoidea macropyga* Ag. (Notice etc., Mém. soc. d'hist. nat. de Neuchâtel, Vol. I. p. 137, Tab. 14, fig. 7-9).

*Galerites macropyga* DesM. (Tabl. synopt. p. 256, n° 14). — Bourguet Pétrif. Tab. 51, fig. 334, 335 (male).

Depuis la publication de ma *Notice sur les fossiles crétacés du Jura Neuchâtelois*, il a été trouvé aux environs de Neuchâtel un grand nombre

d'exemplaires de cette espèce, dont plusieurs dans un parfait état de conservation. Je puis donc aujourd'hui en préciser, d'une manière rigoureuse, tous les caractères qui la distinguent de ses congénères, et compléter ainsi par la description ceux que le dessin de mes figures n'a pu rendre d'une manière suffisante.

Si l'on examine un exemplaire bien conservé du *D. macropyga* à la loupe, on est frappé de la finesse des détails, qui surpasse en beauté tout ce que la ciselure la plus finie a jamais produit. Les aires ambulacraires et interambulacraires, qui vues d'en haut paraissent à-peu-près lisses à l'œil nu, se montrent garnies de tubercules de diverses formes et de diverse grandeur, disposés d'une manière très-élégante. Sur les premières on distingue deux rangées de tubercules principaux, mamelonnés et perforés malgré leur petitesse. Chacun de ces tubercules principaux est séparé des autres par deux rangées horizontales de très-petites granules qu'on n'aperçoit qu'à la loupe. La même disposition se reproduit sur les aires interambulacraires, mais avec cette différence, qu'au lieu de quatre rangées de tubercules principaux, nous en avons ici dix; il est vrai que toutes ne s'étendent pas depuis la bouche jusqu'au sommet; ce n'est guère qu'au milieu de la circonférence qu'elles sont aussi nombreuses; et, comme dans le *Pygaster laganoides*, c'est la troisième rangée en comptant de dehors en dedans qui est la plus longue. A la face inférieure les tubercules sont plus gros et les petites granules qui les séparent les uns des autres, moins nombreuses. La forme générale du test est déprimée et très-légèrement pentagonale, par suite d'un petit renflement des aires ambulacraires. L'ouverture buccale occupe une dépression assez profonde au centre de la face inférieure; elle est de moyenne grandeur, circulaire et pourvue de dentelures peu profondes. L'anus est très-grand; il occupe plus de la moitié de l'aire interambulacraire, à la face inférieure; sa forme est celle d'un ovale rétréci vers la bouche. L'appareil oviducal occupe le sommet du disque; il se compose d'un bourrelet central et de cinq plaques ovariales et de cinq interovariales; ces dernières sont un peu plus petites que les autres; on ne les distingue bien les unes des autres qu'à l'aide d'une bonne loupe. Les ambulacres se com-

posent de deux rangées de pores très-serrés et très-petits, qu'il est également difficile d'apercevoir à l'œil nu.

Les localités où cette espèce se retrouve le plus fréquemment sont les marnières de Hauterive, et celles derrière le château de Neuchâtel. On l'a également rencontré dans le calcaire jaune compacte du Néocomien.

## II. DISCOIDES INFLATA *Ag.*

Tab. VI, fig. 4-6.

Cette espèce a été découverte dans le Portlandien du Jura Neuchâtelois. Je n'en connais encore que deux ou trois exemplaires assez imparfaits, mais qui cependant, lorsqu'on les examine attentivement, présentent plusieurs caractères qui nécessitent la création d'une nouvelle espèce. Il est vrai que ces caractères ne sont pas bien saillants, et j'avoue que même avec les dessins de ma planche 6, on peut courir le risque de confondre l'espèce dont il s'agit, avec le *D. macropyga*, que je viens de décrire. L'un et l'autre ont les mêmes dimensions; seulement le *D. inflata* est un peu plus renflé, ce qui m'a engagé à lui donner le nom ci-dessus. L'ouverture anale est proportionnellement très-grande et de même forme dans les deux espèces: c'est un ovale rétréci du côté buccal. La bouche occupe le centre de la face inférieure. A la face supérieure je ne remarque point cette disposition de petites granules en bandes horizontales, qui, dans le *D. magropyga*, séparent les tubercules principaux; elles paraissent au contraire se grouper en cercles autour des gros tubercules. Enfin l'appareil oviducal est plus prononcé dans notre espèce que dans la précédente. On remarque au sommet du disque (fig. 4) un bourrelet assez apparent, d'aspect spongieux, autour duquel sont groupées les plaques ovariales et interovariales.

M. Eudes Deslonchamps a eu l'obligeance de me communiquer une petite espèce de l'oolithe ferrugineuse de Bayeux, voisine à plusieurs égards de la nôtre, et qu'il faut par conséquent se garder de confondre avec le *D. inflata*; elle a à-peu-près la forme de ce dernier, sauf qu'elle est un peu

plus élevée; mais la bouche s'ouvre dans une dépression beaucoup plus profonde, au centre de la face inférieure; ce qui m'a engagé à lui donner le nom de *D. concava*. L'anus est aussi moins grand.

### III. DISCOIDEA DEPRESSA Ag.

Tab. VI, fig. 7-9 et Tab. XIII bis, fig. 7-13.

Syn.: *Discoidea depressa* Ag. (Prodr. etc. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, Vol. 1, p. 186).

*Galerites depressa* Lam. (Syst. III. p. 21, n° 7). — DesM. (Tabl. synopt. p. 254, n° 6). — Phill. (Geol. of Yorkshire. Tab. 7, fig. 4) non Al. Br.

*Galerites depressus* E. Desl. (Enc. II. p. 452, n° 7). — Encycl. méth. (Tab. 152, fig. 7-8). — DeFr. (Dict. XVIII, p. 86). — Gldf. (Petref. p. 129, Tab. 41, fig. 5). — DeBl. (Zooph. p. 204). — Leonh. (Leonh. et Br. 1834, p. 155). — Koch et Dunk. (N. D. Oolit. p. 40, Tab. 4, fig. 2; var. hemisph.).

*Echinus depressus* Lin. Gm. (p. 3182).

*Echinites depressus* Leske (n° 34, p. 164, Tab. 40, fig. 5-6).

*Galerites radiatus* Val. (Enc. méth. Tab. 153, fig. 1-2).

*Echinites orificatus* Schl. (Petref. p. 317).

C'est l'une des espèces qui se trouvent mentionnées dans la plupart des auteurs qui ont écrit sur les terrains jurassiques. Plusieurs d'entr'eux, tels que Goldfuss, Leske, l'Encycl. méth., Koch et Dunker et autres, en ont donné des figures plus ou moins exactes. Mais je doute fort que toutes ces citations se rapportent à la même espèce. Les exemplaires que l'on rencontre dans les collections de Suisse proviennent pour la plupart de l'Oolithe inférieure. L'original de Pl. 6, fig. 7-9, a été trouvé par M. Studer dans ce même terrain, aux environs de Bâle. Sa forme est subcirculaire, par suite du léger renflement des aires ambulacraires; celles-ci ont à-peu-près la moitié de la largeur des aires interambulacraires: l'on remarque à leur surface six rangées principales de tubercules; mais il n'y a que les deux externes qui se maintiennent sur tout le trajet depuis la bouche jusqu'aux sommet; les quatre rangées internes ne sont bien distinctes qu'au milieu



de la circonférence. Les aires interambulacraires portent seize rangées de tubercules principaux, formant à la face supérieure des bandes horizontales très-distinctes. Il est à regretter que la petitesse de l'espèce n'ait pas permis au dessinateur de reproduire toutes ces rangées. A bien plus forte raison n'a-t-il pas pu rendre la fine granulation dont tout l'espace intermédiaire entre les tubercules principaux est recouvert. Pour suppléer autant que possible à cette imperfection des figures de Pl. 6, j'ai fait dessiner à la loupe les diverses parties du test de la grande variété figurée Pl. XIII bis. Fig. 12 représente une aire ambulacraire et fig. 11 une aire interambulacraire, prises au milieu de la circonférence, là où les tubercules de toutes les rangées principales sont à-peu-près d'égale grosseur. Fig. 13 est une portion fortement grossie de l'aire interambulacraire prise à la face inférieure. Comme dans toutes les espèces de ce genre, les tubercules y sont plus apparents et moins nombreux qu'à la face supérieure. Enfin fig. 10 représente l'appareil oviducal, dont toutes les parties sont distinctement conservées. Le bourrelet central est très-apparent et quelque peu saillant; les plaques ovariiales sont plus grandes que les interovariales, de forme pentagonale et percées d'un trou, sauf celle de l'aire interambulacraire impaire; les interovariales sont petites et triangulaires. La bouche est placée au centre de la face inférieure, dans une dépression assez sensible; elle est distinctement décagonale. L'ouverture anale est de forme ovale, plus rétrécie du côté de la bouche que vers le bord de la circonférence; elle occupe à-peu-près toute la longueur de l'aire interambulacraire impaire, à la face inférieure. Les ambulacres sont composés de deux rangées de pores très-petits et très-serrés, visibles depuis le sommet jusqu'à la bouche.

M. Voltz cite la même espèce dans le terrain à chailles de Besançon et de Buxwiller; mais n'ayant pas vu ses exemplaires, je ne saurais affirmer s'ils sont identiques avec ceux de l'oolithe inférieure qu'on trouve chez nous. M. Thirria la mentionne également dans la terre à foulon de Soanne et Navenne dans le Jura français. Quant à l'espèce figurée et décrite avec beaucoup de soin par Goldfuss, je ne doute pas qu'elle ne soit parfaitement identique avec nos exemplaires de l'oolithe inférieure.

L'espèce figurée par MM. Koch et Dunker me paraît au contraire en différer complètement. J'ai déjà fait remarquer ailleurs (*Notice sur les fossiles crétacés du Jura neuchâtelois*, Vol. I des *Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Neuchâtel*, p. 137) que c'est pour avoir confondu le *D. macropyga* avec le *D. depressa*, que quelques auteurs ont signalé cette dernière espèce dans le Néocomien et les terrains crétacés.

Le bel exemplaire figuré Pl. 43, fig. 7-13 provient du calcaire à polypiers de Ranville en Normandie; à part sa plus grande taille, il est absolument semblable à notre *D. depressa*. Ayant reconnu quelques fragmens analogues parmi les fossiles portlandiens de la collection de M. Gressly, je l'ai fait représenter avec les détails ci-dessus mentionnés, afin de compléter les figures de la planche 6, que le dessin au crayon n'a pu rendre d'une manière assez rigoureuse. Tout en reconnaissant la très-grande analogie qui existe entre les exemplaires de Normandie et ceux de notre oolithe inférieure, je ne prétends pas affirmer leur identité. C'est une question sur laquelle je me propose de revenir dans une prochaine livraison de mon *Histoire naturelle* des Echinodermes. Qu'il me soit permis, en attendant, d'envisager l'espèce de Normandie comme une simple variété du *D. depressa*.

#### IV. DISCOIDEA ROTULA Ag.

Tab. VI, fig. 10-12.

Syn. : *Discoidea Rotula* Ag. (Prodr. etc. *Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel*, Vol. 1, p. 186).

*Galerites Rotula* Al. Br. (Descr. géol. p. 599, Tab. 9, fig. 13).

*Nucleolites Rotula* Al. Br. (ibid. p. 100).

*Pyrina Rotula* DesM. (Tab. synopt. p. 258, n° 1).

Cette espèce fut décrite et figurée pour la première fois par M. Alex. Brongniart, qui lui donna le nom de *Galerites Rotula*, sans doute à cause de sa forme essentiellement circulaire. Il paraît cependant avoir eu des

doutes sur sa position générique, puisqu'il la mentionne successivement sous les noms de *Galerites Rotula* et de *Nucleolites Rotula*. En effet l'anus dont la position est décisive dans cette alternative, se trouve rarement bien conservée dans les Oursins de la montagne des Fis. Or les exemplaires originaux de l'illustre auteur de la *Géologie des environs de Paris* provenaient du terrain crétacé de cette localité. Depuis, M. Studer en a recueilli, dans la même localité, d'assez beaux exemplaires qu'il a bien voulu me confier, et qui sont d'autant plus précieux, qu'ils ont en partie conservé leur test. Ayant séparé les Discoïdées des Galérites, j'ai dû nécessairement reporter l'espèce dont il est ici question, dans le nouveau genre dont elle partage les principaux caractères.

Les caractères spécifiques du *D. Rotula* sont sa forme essentiellement hémisphérique; sous ce rapport elle tient le milieu entre les espèces précédentes et le *D. cylindrica* dont nous allons nous occuper. La bouche est placée dans une dépression assez profonde. L'ouverture anale, qui en est très-rapprochée, a, comme d'habitude, la forme d'un ovale, mais avec cette différence, que le côté pointu est tourné en dehors au lieu de l'être en dedans, comme dans le *D. depressa* (fig. 12). Les aires ambulacraires ont la moitié de la largeur des aires interambulacraires. Les ambulacres proprement dits sont très-étroits, composés de deux rangées de pores très-petits et très-serrés. Le test est assez épais; mais il a perdu, dans les exemplaires de M. Studer, toute trace des tubercules. Là où il est enlevé on aperçoit une large dépression sur le milieu des aires interambulacraires et une autre moins sensible sur les aires ambulacraires. Ce caractère ressort aussi distinctement de la figure de M. Brongniart. Cette circonstance jointe à l'identité d'origine de l'exemplaire de M. Brongniart avec ceux que j'ai sous les yeux ne me paraît pas laisser de doute sur leur identité spécifique. Les aires interambulacraires ont en outre, à la face inférieure, deux profonds sillons qui s'étendent depuis la bouche jusqu'au bord de la circonférence et qu'on ne remarque également que dans les exemplaires dépourvus de test. Le même caractère se reproduit à un plus haut degré encore dans les moules du *D. cylindrica*.

## V. DISCOIDEA CYLINDRICA Ag.

Tab. VI, fig. 13-15.

Syn.: *Discoidea canaliculata* Ag. (Prodr. etc., Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1. p. 186).

*Galerites cylindricus* Lam. (Syst. III, p. 23. n° 15). — E. Desl. (Enc. II, p. 433, n° 15).

*Galerites canaliculata* Gldf. (Petref. p. 128, Tab. 41, fig. 1).

*Conulus Hawkinsii* Mant. (Géol. of Sussex, 2<sup>e</sup> Sér. T. III, p. 201).

*Galerites Hawkinsii* DesM. (Tabl. synopt. p. 254, n° 8).

La présence de cette espèce si caractéristique de l'étage supérieur de la Craie, dans les terrains des Alpes, est un fait d'une haute importance pour l'appréciation de l'âge de ces mêmes terrains. L'exemplaire figuré provient de la montagne des Fis, où il a été trouvé par M. Coulon père. Bien que ce ne soit qu'un moule intérieur, les caractères essentiels de l'espèce sont cependant suffisamment conservés, pour ne permettre aucun doute sur son identité avec les beaux exemplaires qu'on trouve à Rouen et en Angleterre.

Les figures que Goldfuss a données de cette espèce, dans son grand ouvrage sur les Pétrifications d'Allemagne, sont d'une rare perfection. Dans sa description il indique, comme l'un des principaux caractères de l'espèce, les dépressions que l'on remarque à la face inférieure et qui s'étendent de la bouche à la circonférence. Or, ces dépressions, au nombre de deux sur chaque aire interambulacraire, sont encore bien plus apparentes sur les moules intérieurs, où elles prennent la forme de véritables sillons (fig. 15). Nous avons vu la même chose, mais d'une manière moins évidente sur notre *D. Rotula*, dont le test est en partie conservé (fig. 12). Au bord de la circonférence, on remarque, en outre, entre ces sillons, deux entailles également profondes, mais qui ne se prolongent pas au delà du bord (fig. 15). L'ouverture anale est proportionnellement petite et de forme ovale; elle occupe le milieu de l'aire interambulacraire impaire entre

la bouche et le bord de la circonférence. La bouche est plus grande que l'anus et régulièrement décagonale; les angles de son pourtour correspondent aux sutures des aires ambulacraires avec les aires interambulacraires. Les aires ambulacraires n'ont pas tout-à-fait la moitié de la largeur des interambulacraires. Les pores ont laissé des traces très-distinctes de leur présence. Ils forment deux rangées très-serrées, absolument comme dans les exemplaires dont le test est parfait. On voit également des traces de l'appareil oviducal. Dans les exemplaires bien conservés, il se compose de cinq plaques ovariales très-grandes et de cinq interovariales beaucoup plus petites.

C'est à tort que M. DesMoulins identifie le *Galerites cylindricus* Lam. (notre *Discoidea cylindrica*) avec le *Clypeaster subcylindricus* Goldf., qui est un vrai *Conoclypus*. En revanche le *D. cylindrica* et le *Galerites canaliculatus* Goldf. sont identiques.

## VI. DISCOIDEA SPECIOSA Ag.

Tab. V, fig. 16.

Syn. : *Discoidea speciosa* Ag. (Prodr. etc., Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Neuchâtel, vol. 1, p. 186.)

*Galerites speciosus* Munst. (in Goldf. Petref. n° 8. p. 150. Tab. 41, fig. 5 a. b.)

La forme générale de cet Oursin et la nature de ses tubercules me font penser qu'il est identique avec le fragment décrit et figuré par M. le comte de Münster dans le grand ouvrage de Goldfuss, sous le nom de *Galerites speciosus*. Quoique imparfait, il n'en est pas moins très-important, par la raison que la bouche et l'anus y sont conservés de manière que désormais il ne pourra plus exister de doute sur la position générique de cette espèce. C'est une véritable Discoïdée; la forme décagonale de l'ouverture buccale et la position de l'ouverture anale à la face inférieure en font foi. L'anus (*a*) est piriforme et plus rapproché du bord du test que de la bouche; le côté rétréci de son ouverture est tourné vers la bouche, son bord extérieur

est très-arrondi. — Les dimensions de notre fragment s'accordent aussi parfaitement avec celles de l'exemplaire de M. le comte de Münster. Sa forme est subcirculaire et sensiblement aplatie. La face inférieure est légèrement concave, et les aires ambulacraires et interambulacraires y sont uniformément recouvertes d'assez gros tubercules mamelonnés et perforés. Entre les tubercules principaux dont j'ai donné deux figures grossies, à côté de la figure principale, l'on distingue une quantité de petites granules qui recouvrent toute la surface du test. Il paraît, d'après l'exemplaire de M. le comte de Münster, qu'à la face supérieure les tubercules sont moins apparens et les aires ambulacraires plus renflées qu'à la face inférieure, comme cela se voit dans la plupart des espèces du genre. Les ambulacres se composent de deux rangées de pores arrondis et très-rapprochés. Enfin ce qui confirme encore l'indentité spécifique des deux exemplaires, c'est qu'ils appartiennent au même terrain. L'original de ma figure a été trouvé par M. Gressly dans le Portlandien de la vallée de la Birse, près de Laufon; celui de M. le comte de Münster provient de l'étage supérieur du calcaire jurassique de Heidenheim en Wurtemberg. Là comme chez nous, l'espèce est fort rare.

---

---

# CONSPECTUS

## GENERUM ET SPECIERUM ECHINODERMATUM FOSSILIIUM

### IN HELVETIA ETUGSQUE REPERTORIUM;

ADJECTIS CHARACTERIBUS DIAGNOSTICIS BREVIBUS, NEC NON INTERPRETATIONE TABULARUM  
IN QUIBUS HÆ SPECIES FIGURIS EXPRESSÆ SUNT.

---

Quum jam dudum mihi probatum sit, diagnosticos ita dictos characteres distinguendis specibus non solum non sufficere, sed etiam qui iis confiderent in graves errores sæpius indicisse, eos in posterum in operibus meis zoologicis et palæontologicis omittere institui, et contra de characteribus omnibus in genere fusius disserere. Tamen in hocce opusculo linguâ gallicâ scripto, breves descriptiones latinas ut addam inductus sum, ne scrutatores rei geologicæ hujus dialecti minus gnaros, descriptione generum et specierum novorum, hic cum iis communicatorum frustrentur.

I. Genus **DYASTER** Ag. Ambulacra simplicia, in vertice disjuncta, tria in summo vertice, duo postice convergentia. Os rotundatum, anticum, vel submedium.

1. *Dysaster carinatus* Ag. Tab. I. fig. 4, a superiore, fig. 5 a laterali, fig. 6 ab inferiore facie visus. Inflatus, elongatus, postice acuminatus, supra longitudinaliter carinatus. — Lias.

2. *Dysaster capistratus* Ag. Tab. IV fig. 1 a superiore, fig. 2 a laterali, fig. 3 ab inferiore facie visus. Inflatus, elongatus, postice acuminatus, supra rotundatus. — Jur. marg. oxford.

3. *Dysaster propinquus* Ag. Tab. 1, (sub falso nomine *Dys. capistrati*) fig. 1 a superiore, fig. 2 a laterali, fig. 3 ab inferiore facie visus. Inflatus, elongatus, postice et supra rotundatus. — Jur. marg. oxford.

4. *Dysaster analis* Ag. Tab. I, fig. 12 a superiore, fig. 13 a laterali, fig. 14 ab inferiore facie visus. Ovalis, subinflatus, postice rotundatus; ambulacris posterioribus supra anteproximis. — Ool. inf.

5. *Dysaster ringens* Ag. Tab. I, fig. 7 a superiore, fig. 8 a laterali, fig. 10 ab inferiore, fig. 11 a posteriore facie visus; fig. 11 specimen junius. Amplus, depressus; area interambulacrali posteriore infra prominente. — Ool. inf.

6. *Dysaster Voltzii* Ag. Tab. IV, fig. 11 a superiore, fig. 12 ab inferiore, fig. 13 a posteriore facie visus. Circularis, depressus. — Jur. Portl.

II. Genus **HOLASTER** Ag. Ambitus cordatus; ambulacra simplicia in vertice convergentia. Anus in face posteriore. Os anticum.

1. *Holaster complanatus* Ag. Tab. II, fig. 10 a superiore, fig. 11 ab inferiore facie, fig. 12 a latere visus. Cordatus, oblongus, inflatus; antice declivus; poris ambulacrorum parium externis oblongis; ambulacris anterioribus paribus flexuosis. — Cret. infer.

2. *Holaster Couloni* Ag. Tab. 4, fig. 9 a superiore facie, fig. 10 a latere visus. Inflatus, antice tumidus; poris ambulacrorum externis oblongis. — Cret. infer.

3. *Holaster intermedius* Ag. Tab. III, fig. 6 a superiore, fig. 7 ab inferiore facie, fig. 8 a latere visus. Cordatus, inflatus, oblongus; facie posteriore decliva, poris simplicibus. — Jur. Portl.

4. *Holaster L'Hardy* DuB. Tab. II, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Cordatus, inflatus, oblongus, postice truncatus; poris simplicibus. — Cret. infer.

5. *Holaster lævis* Ag. Tab. III, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Cordatus, inflatus, postice truncatus, infra planissimus, poris simplicibus, ore magno. — Cret. infer.

6. *Holaster Sandoz* DuB. Tab. II, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Magnus, inflatus, postice rostratus, poris simplicibus. — Cret. infer.

7. *Holaster subglobosus* Ag. Tab. II, fig. 7 a superiore, fig. 8 ab inferiore facie, fig. 9 a latere visus. Subcordatus, semiglobosus, postice truncatus, poris simplicibus. — Cret. super.

8. *Holaster transversus* Ag. Tab. III, fig. 4 a superiore facie, fig. 5 a latere visus. Cordatus, tumidus, brevis, lateraliter valde dilatatus, postice truncatus, poris simplicibus. — Cret. super.

9. *Holaster altus* Ag. Tab. III, fig. 9 a superiore facie, fig. 10 a latere visus. Cordatus, elongatus, tumidus, altissimus, postice attenuatus, poris simplicibus. — Cret. super.

10. *Holaster suborbicularis* Ag. Tab. III, fig. 11 a superiore, fig. 12 ab inferiore facie, fig. 13 a latere visus. Antice emarginatus, cordatus, oblongus, inflatus, postice attenuatus, truncatus, infra planus. — Cret. super.

III. Genus **MICRASTER** Ag. Ambitus cordatus, ambulacra supra depressa, substellata, poris parium sulco conjunctis, imparium simplicibus. Anus in facie posteriore. Os anticum.

1. *Micraster cor-anguinum* Ag. Tab. III, fig. 14 a superiore facie, fig. 15 a latere visus. Cordatus, inflatus, postice truncatus, in medio vertice altissimus. — Cret. super.



2. *Micraster minimus* Ag. Tab. III, fig. 16 a superiore, fig. 17 ab inferiore facie, fig. 18 a latere visus. Parvus, subcordatus, antice declivus, postice altissimus, truncatus, poris creberrimis. — Cret. infer.

3. *Micraster helveticus* Ag. Tab. III, fig. 19 a superiore facie, fig. 20 a latere visus. Subcordatus, tumidus, oblongus, postice attenuatus, ambulacris parum depressis, antice convergentibus. — Crét.

IV. Genus. **ANANCHYTES** Lam. Ambitus ovatus, testa conica; ambulacra simplicia; os transversum anticum; anus oblongus, inferior.

1. *Ananchytes ovata* Lam. Tab. IV, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie (anus in hoc specimine læsus) fig. 6 a latere visus. Ovata, tumida, conica, supra rotundata. — Cret. super.

V. Genus **SPATANGUS** Ag. (non auct.) Ambulacra paria petaloidea, poris sulco conjunctis; impar poris simplicibus. Tubercula majora in facie superiore. Os anticum; anus in facie posteriore.

1. *Spatangus Nicoleti* Ag. Tab. IV, fig. 7 fragmentum a facie superiore, fig. 8 a latere visum. Depressus, oblongus, tuberculis majoribus crebris. — Tert. (Molasse).

VI. Genus. **CLYPEUS** Kl. Ambitus subcircularis, testa depressa; os medium, stellatum, vallatum; anus superior in sulco situs; ambulacra petaloidea, poris sulco conjunctis.

1. *Clypeus Patella* Ag. Tab. V, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Circularis, subinflatus, ambulacris latis, amplissimis, vertice a medio disco parum remoto, ano remotissimo. — Ool. infer.

2. *Clypeus solodurinus* Ag. Tab. V, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Subcircularis, depressus, postice truncatus, ambulacris angustioribus, ano a vertice parum remoto. — Ool. infer.

3. *Clypeus acutus* Ag. Tab. X, fig. 1 fragmentum a facie superiore visum. Areæ ambulacrales amplissimæ; areis interambulacralibus in vertice angustissimis, acutis. — Jur. Port.

4. *Clypeus Hugii* Ag. Tab. X, fig. 2 a superiore, fig. 3 ab inferiore facie, fig. 4 a latere visus. Subcircularis, postice dilatatus, subtruncatus, sulco areæ imparis brevi, ano a vertice remotissimo. — Ool. infer.

VII. Genus. **NUCLEOLITES** Lam. Ambitus antice rotundatus, postice truncatus. Ambulacra stellata, poris supra sulco conjunctis. Anus superior in sulco areæ interambulacralis parvis. Os submedium, stellatum. Differt a Clypeo ambitu, ambulacris et ore non circumvallato.

1. *Nucleolites subquadratus* Ag. Tab. VII, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Depressus, postice quadratus, ambulacris angustis. — Cret. infer.

2. *Nucleolites lacunosus* Ag. Tab. VII, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Inflatus, tumidus, postice truncatus, declivus, angulis rotundatis. — Cret. infer.

3. *Nucleolites Olfersii* Ag. Tab. VII, fig. 7 a superiore, fig. 8 ab inferiore facie, fig. 9 a latere visus. Depressus, postice rotundato-truncatus, sulco anali angustiore. — Cret. inf.

4. *Nucleolites gracilis* Ag. Tab. VII, fig. 10 a superiore, fig. 11 ab inferiore facie, fig. 12 a latere visus. Inflatus, elongatus, postice acuminato-truncatus; sulco anali majore; ambulacris angustissimis. — Jur. Port.

5. *Nucleolites micraulus* Ag. Tab. VII, fig. 16 a superiore, fig. 17 ab inferiore facie, fig. 18 a latere visus. Inflatus, oblongus, postice rotundo-truncatus. Sulco anali brevi. — Jur. marg. oxford.

6. *Nucleolites latiporus* Ag. Tab. VII, fig. 13 a superiore, fig. 14 ab inferiore facie, fig. 15 a latere visus. Subcircularis, inflatus, postice truncatus; ambulacris amplis; sulco anali angustiore. — Ool. infer.

7. *Nucleolites scutatus* Lam. Tab. VII, fig. 19 a superiore, fig. 20 ab inferiore facie, fig. 21 a latere visus. Inflatus, subquadratus, angulis rotundatis tumidis, postice truncatus, emarginatusque; sulco anali amplissimo. — Jur. med.

8. *Nucleolites major* Ag. Tab. VII, fig. 22 a superiore, fig. 23 ab inferiore facie, fig. 24 a latere visus. Inflatus, elongatus, antice rotundatus, lateribus subrectis, postice truncatus emarginatusque. — Jur. Portl.

VIII. Genus. **CATOPYGUS** Ag. Ambitus ovalis. Testa tumida. Ambulacra stellata, poris supra sulco conjunctis. Anus in facie posteriori æquus. Os submedium, circumvallatum, longitudinale. Facies inferior plana.

1. *Catopygus Gressly* Ag. Tab. VIII, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Inflatus, oblongus, ano in media facie posteriori; poris ambulacrorum angustis. — Cret. infer.

2. *Catopygus depressus* Ag. Tab. VIII, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Inflatus, supra depressus, postice subrostratus, ano marginali, ambulacris angustissimis. — Cret. super.

3. *Catopygus Renaudi* Ag. Tab. VIII, fig. 7 a superiore, fig. 8 ab inferiore facie, fig. 9 a latere visus. Inflatus, tumidus, postice dilatatus; ano maximo in sulco faciei posticæ. — Cret. infer.

4. *Catopygus alpinus* Ag. Tab. VIII, fig. 10 a superiore facie, fig. 11 a latere visus. Ovatus, elongatus, antice rotundatus, angustus, postice inflatus, truncatus, ano in media facie posteriore. — Cret. infer.

5. *Catopygus neocomensis* Ag. Tab. VIII, fig. 12 a superiore, fig. 13 ab inferiore facie,

fig. 14 a latere visus. Tumidus, ovato-rotundus, major; ano ovali in parte superiore sulci postici. — Cret. infer.

IX. Genus. **PYGORHYNCHUS** Ag. Ambitus oblongus, antice rotundato-truncatus, postice dilatatus, inde productus. Facies inferior concava. Os submedium, transversum, circumvallatum. Anus posticus.

1. *Pygorhynchus obovatus* Ag. Tab. VIII, fig. 18 a superiore, fig. 19 ab inferiore facie, fig. 20 a latere visus. Marginibus tumidis; ano in parte superiore sulci amplioris faciei posticæ. — Cret. infer.

2. *Pygorhynchus minor* Ag. Tab. VIII, fig. 15 a superiore, fig. 16 ab inferiore facie, fig. 17 a latere visus. Minor, depressus, postice subrostratus; marginibus angustioribus. — Cret. infer.

X. Genus. **ECHINOLAMPAS** Gray. Ambitus ovalis, testa tumida, rotundata; os transversum, submedium, impressum, non circumvallatum; anus transversus, inferus; ambulacra poris sulco conjunctis, areæ ambulacrales angustæ, supra sæpius tumidæ.

1. *Echinolampas Studeri* Ag. Tab. IX, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Hemisphæricus, areæ ambulacrales ampliores, ambulacris mediocribus, poris externis obliquis majoribus, internis rotundis, testa crassissima. — Calc. alp.

2. *Echinolampas Escheri* Ag. Tab. IX, fig. 7 a superiore, fig. 8 ab inferiore, fig. 9 a laterali facie visus. Ovalis, depressus, ore amplo; ano maximo, poris ambulacrorum minimis, approximatis; testa crassissima. — Cal. alp.

3. *Echinolampas eurysomus* Ag. Tab. IX, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore, fig. 3 a laterali facie visus. Parvus, depressissimus; ambulacra angustissima, poris proximis; ambulacra paria subarcuata. Testa mediocri. — Cret.

4. *Echinolampas dilatatus* Ag. Tab. XIII, bis, fig. 5 a facie superiore, fig. 6 a latere visus. Latissimus, depressus; testa omnium crassissima. — Calc. alp.

XI. Genus. **CONOCLYPUS** Ag. Ambitus subcircularis, facies inferior plana; os medium, vallatum; anus longitudinalis inferior; testa alta, subconica, superne rotundata; ambulacra plana, ampla; poris sulco conjunctis.

1. *Conoclypus Anachoreta* Ag. Tab. X, fig. 5 a superiore, fig. 6 ab inferiore facie, fig. 7 a latere visus. Ovalis, lateraliter tumidus, declivus, supra subconicus, ore parvo, poris ambulacrorum externis obliquis. — Cret.

2. *Conoclypus microporus* Ag. Tab. X, fig. 8 a superiore, fig. 9 ab inferiore facie, fig. 10 a latere visus. Circularis, subconicus, rotundatus; ore majori; poris externis transversis, internis minoribus rotundis. — Cret.

3. *Conoclypus conoideus* Ag. Tab. X, fig. 14 a superiore, fig. 15 ab inferiore facie, fig. 16 a latere visus. Subovalis, altissimus, supra rotundatus. — Cret. super.

4. *Conoclypus DuBois* Ag. Tab. X, fig. 11 a superiore, fig. 12 a laterali, fig. 13 ab inferiore facie visus. Circularis, hemisphæricus, supra rotundatus. — Cret. super.

XII. Genus. **PYGURUS** Ag. Antice truncatus, postice productus, os submedium, vallatum; anus inferior, subrotundus; ambulacra petaloidea, poris sulco conjunctis.

1. *Pygurus Montmollini* Ag. Tab. XI, fig. 1 a superiore, fig. 2 a laterali, fig. 3 ab inferiore facie visus. Subquadratus, postice parum productus, latus, subconicus; ambulacris peripheriam versus productis. — Cret. infer.

2. *Pygurus rostratus* Ag. Tab. XI, fig. 4 a superiore, fig. 5 a laterali, fig. 6 ab inferiore facie visus. Pentagonalis, postice rostratus, depressus, ambulacris amplioribus. — Cret. infer.

3. *Pygurus productus* Ag. Tab. XIII, bis, fig. 3 ab inferiore, fig. 4 a laterali facie, visus. Elongatus depressus, postice productus; os submedium, anticum; anus sub rostro, ab ejus apice remotus. — Cret. infer.

4. *Pygurus conicus* Ag. Tab. XIII, bis, fig. 1 a facie superiore, fig. 2 a latere visus. Conicus, altus, parvus; ambulacris latis, in vertice summo convergentibus. — Cret. infer.

XIII. Genus. **FIBULARIA** Lam. Ambitus subovalis, areæ ambulacrales supra interambulacralibus ampliores. Os submedium, depressum. Anus inter marginem posticum et os, cui proximus.

1. *Fibularia alpina* Ag. Tab. XII, fig. 1 a facie superiore, fig. 2 ab inferiore, fig. 3 a latere visus. Parva, oblonga; ano inter os et marginem medio. — Cret. sup.

XIV. Genus. **HYBOCLYPUS** Ag. Ambitus Clypeorum, ambulacris simplicibus, ad peripheriam divergentibus; poris simplicibus; anus superior in sulco areæ interambulacralis imparis.

1. *Hyboclypus gibberulus* Ag. Tab. XII, fig. 10 a superiore, fig. 11 ab inferiore, fig. 12 a laterali facie visus. Area ambulacralis impar altissima, gibba; sulcus dorsalis in rostrum prominentem postice desiens. — Ool. infer.

XV. Genus. **GALERITES** Lam. Ambitus subovalis, postice angustior; os subquingulare, longitudinale; facies inferior plana, anus posticus marginalis; ambulacra simplicia, poris simplicibus, ad peripheriam divergentibus.

1. *Galerites Castanea* Ag. Tab. XII, fig. 7 a superiore, fig. 8 ab inferiore, fig. 9 a laterali facie visus. Pororum seriebus proximis; margine anteriore tumido, ampliore; ano in margine postico; ambulacris intumescens. — Cret. sup.

2. *Galerites pygæa* Ag. Tab. XII, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore, fig. 6. a laterali facie visus. Ovato-oblongus, ano postico, supra marginem inferiorem. — Cret. inf.

XVI. Genus **PYGASTER** Ag. Ambitus circularis, subangularis. Testa depressa. Os circulare, decies incisum, fissulis areas ambulacrales et interambulacrales limitantibus. Anus maximus, superus, sine sulco. Tuberculis seriatis.

1. *Pygaster laganoides* Ag. Tab. XII, fig. 13 a superiore, fig. 14 ab inferiore, fig. 15 a laterali facie visus; fig. 16 pars aucta. Postice subtruncatus, supra depressus, minor; ano latissimo, non producto. — Jur. Portl.

2. *Pygaster patelliformis* Ag. Tab. XIII, fig. 1 a superiore, fig. 2 ab inferiore facie, fig. 3 a latere visus. Omnino circularis, depressus, in vertice tumidus; ano piriformi, tuberculis minus numerosis. — Jur. Portl.

3. *Pygaster umbrella* Ag. Tab. XIII, fig. 4 a superiore, fig. 5 ab inferiore facie, fig. 6 a latere visus. Maximus subquingularis, depressus, subconicus. Ano piriformi. — Jur. Portl.

XVII. Genus. **DISCOIDEA** Kl. et Gr. Ambitus circularis, os medium, rotundum, margine incisum, anus inferior; tubercula seriata.

1. *Discoidea macropyga* Ag. Tab. VI, fig. 1 a facie superiore, fig. 2 ab inferiore, fig. 3 a latere visa. Depressa, lateraliter tumida, ore parvo, ano majore. — Cret. inf.

2. *Discoidea inflata* Ag. Tab. VI, fig. 4 a facie superiore, fig. 5 ab inferiore, fig. 6 a latere visa. Subdepressa, lateraliter inflata, rotundata. — Jur. Portl.

3. *Discoidea depressa* Ag. Tab. VI, fig. 7 a facie superiore, fig. 8 a latere, fig. 9 a facie inferiore visa. Tab. XIII, bis, fig. 7–13 var. major; fig. 7 a facie superiore, fig. 8 ab inferiore, fig. 9 a latere visa; fig. 10 vertex summus, fig. 11 area interambulacris, fig. 12 area ambulacralis, fig. 13 tubercula faciei inferioris. Depressa, subconica, marginibus angustioribus; ore majore. — Ool. inf.


4. *Discoidea Rotula* Ag. Tab. VI, fig. 10 a facie superiore, fig. 11 a laterali, fig. 12 ab inferiore visa. Tumida, supra rotundata; ano piriformi, inverso. — Cret. sup.

5. *Discoidea cylindrica* Ag. Tab. VI, fig. 13 a superiore, fig. 14 a laterali, fig. 15 ab inferiore facie visa. Tumida, supra rotundata, infra plana, sulcata; ano parvo. — Cret. inf.

6. *Discoidea speciosa* Ag. Tab. VI, fig. 16 fragmentum a facie inferiore visum. Maxima depressissima; ano piriformi. — Jur. Portl.

Inde sequitur species sexaginta quinque ad septemdecim genera pertinentes e familiis tantum Spatangorum et Clypeastrorum in Helvetia reperiri. Species e familiis Cidaridum, Asteriarum et Crinoideorum in proximis voluminibus invenies.





*Fig. 1-3.*


*Fig. 4-6*

*Fig. 7-11*

*Fig. 12-14*








Diekmann in lap

Litho de Nicolet &amp; Henschel

*Fig. 3* HOL. STER SANDOZ DUB. *Fig. 4-6* HOL. L'HARIDY DUB.  
*Fig. 7-9* HOL. SUBGLOBOSUS AG. *Fig. 10-12* HOL. COMPLANATUS AG.






Dickinson in lap.

Table 1. *Estimated values of the parameters of the model*

[illegible]






Dielmann, cap.

Bull. de Nicolet a. Trouchatel Suisse

*Fig. 1-3. DISASTER CAPISTRATUS Ag. Fig. 4-6. ALIA (Lam.) Ag. Fig. 7-8. SPATANGUS NICOLLETTI Ag. Fig. 9-10. ALIA (Lam.) Ag. Fig. 11-13. ALIA (Lam.) Ag.*





Donnerstag 11. Sep.

Sam. 30. Dec. 1871. 11. 11.

Fig. 1-3. C. 11. 11.

Fig. 4-6.









Fig. 1-3. DISC. CONOIDALE A. Fig. 4-6. DISC. CONOIDALE A. Fig. 7-9. DISC. CONOIDALE A. Fig. 10-12. DISC. CONOIDALE A. Fig. 13-15. DISC. CYLINDRICA A. Fig. 16. DISC. CONOIDALE A.






Dreiermann 1849

Ed. de Nicolet a. Sem. hater. Suisse

Fig. 1-3. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 4-6. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 7-9. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 10-12. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 13-15. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 16-18. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 19-21. NUCL. *OLLEERSII* A. G. - Fig. 22-25. NUCL. *OLLEERSII* A. G.






Diekmann in 149

Lith de Nicolet a Neuchâtel Suisse

Fig. 1-3. *CA. P. DENTATUS* GARD. *Fig. 4-6. CA. P. PUNCTATUS* GARD.  
*Fig. 7-9. CA. P. PELLUCIDUS* GARD. *Fig. 10-11. CA. P. AMPHIBIUS* GARD. *Fig. 12-14. CA. P.*  
*NEO-SOUTHERNSIS* GARD. *Fig. 15-17. PYG. C. HELIOPHILUS* GARD. *Fig. 18-20. PYG. OBOVATUS* GARD.






Diekmann in lap.

Lith. de Nicolet à Neuchâtel. ( Suisse )

Fig. 1-3. ECHINODERMATA. Fig. 4-6. BRYOZOA. Fig. 7-9. ECHINODERMATA.







Kellammer n. 19

Fig. 1. CLEPTOPORA ACUTA. CONDIT. MUSEI. LITH. A. 2.




Fig. 1. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G. Fig. 2-4. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G. Fig. 5-7. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G. Fig. 8-10. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G. Fig. 11-13. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G. Fig. 14-16. *CLADOPUS ACUTIFRONS* A. G.





Fig. 1-3. *Montmollinella* sp.

Fig. 4-6. *Prosternella* sp.

Fig. 1-3. *Montmollinella* sp. Fig. 4-6. *Prosternella* sp.





Incisionen in lap

Lith. de Nicolet a Vevey, Suisse.

Fig. 1-3.


Fig. 4-6.

Fig. 7-9.

Fig. 10-12.


Fig. 13-16.











Dickmann in sap.

Lith. de Nüchel &amp; Neuchâtel, Suisse.

Fig. 12. *PRORHINUS CONICUS* Ag. = Fig. 3. 4. *PRORHINUS CONICUS* Ag.  
 Fig. 5. 6. *PRORHINUS CONICUS* Ag.  
 Fig. 7-13. *PRORHINUS CONICUS* Ag. (Fig. 7-13. *PRORHINUS CONICUS* Ag.)



Siegfried.



# **DIE PFLANZEN GRAUBÜNDENS.**

*Ein Verzeichniss*

**DER BISHER IN GRAUBÜNDEN GEFUNDENEN PFLANZEN,**

**MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG IHRES VORKOMMENS.**

VON

**ALEXANDER MORITZI.**

---

**(DIE GEFÄSSPFLANZEN.)**

---



## VORBERICHT.

---

Schon im Jahr 1833 hatte ich angefangen, ein Verzeichniss der Pflanzen Graubündens zu entwerfen, wozu die in der Alpina (Jahrgang 1807, zweiter Band) publicirte Aufzählung von ungefähr 200 der bekanntesten Arten den Grund bildete. Als ich im Jahr 1836 im Begriff war, das Land der Heimath und meiner botanischen Excursionen für lange Zeit zu verlassen, ordnete ich das inzwischen fortgeführte Verzeichniss von neuem, um die seither gemachten vielfältigen Entdeckungen bescheidener Freunde, die mich mit ihren Mittheilungen beehrten, sowie auch die selbstgemachten, durch den Druck der Vergessenheit zu entziehen. Das Schicksal wollte jedoch, dass ich die Heimath nicht so bald verlassen sollte, und, gleichsam als Ersatz für getäuschte Hoffnungen, vergönnte es mir zwei Sommer noch Rhätens Gebirge nach allen Seiten zu durchstreifen. Jetzt aber, nachdem ich zum zweiten Male den Osten der Schweiz mit dem Westen vertauscht habe, und es ungewiss ist, ob und wie bald und auf wie lange Zeit ich Graubünden wieder sehen werde, will ich nicht länger anstehen, meinem Vaterlande und dem botanischen

Publikum diesen Catalog, der durch den Aufschub nur gewinnen konnte, zu übergeben.

Da ich in dieses Verzeichniss alle mir bekannt gewordenen Entdeckungen älterer und neuerer Botaniker aufgenommen habe, so halte ich es für angemessen, eine kleine biographische Notiz von denselben vorzuschicken, um hiemit theils die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben festzustellen und um anderntheils anzugeben, welche Gegenden des Landes am häufigsten besucht worden sind. Wenn ich ausserdem noch ein paar Namen berühre, die, streng genommen, nicht hieher gehören, so geschieht diess in der Absicht einen Ueberblick über alles das zu geben, was Graubünden und die Botanik zugleich berührt.

*Hieronymus Tragus* beobachtete um die Mitte des 16<sup>ten</sup> Jahrhunderts bei Chur eine Abart der Erdscheibe.

*Conrad Gesner* von Zürich, mit dem die neue Epoche der Wissenschaften beginnt, bereiste im Jahr 1561 Graubünden und Veltlin. Er hat viele Pflanzen entdeckt, unter welchen auch einige sind, welche später an denselben Stellen nicht wieder gefunden werden konnten. Gesner wurde 1546 geboren und starb 1565.

*J. Fabricius* bestieg den Calanda und theilte seine Entdeckungen Gesnern mit.

*Johann Bauhin*. Er besuchte um das Jahr 1565 Rhätians Alpen (unter andern auch das Wormser Joch), und sammelte viele Alpenpflanzen, die er später in seinen Werken beschrieb und zum Theil mit Abbildungen begleitete. Er wurde in Lyon 1541 geboren und starb zu Mümpelgard 1631.

*Lobelius* beschrieb, mit Pena, Pflanzen, die sie aus Graubünden hatten.



*Kaspar Bauhin*, des obigen jüngerer Bruder, kam nach dem Pfäferser-Bad. Dessen Schüler *Burser* bereiste das bündnerische Oberland. — *K. Bauhin* wurde 1560 geboren und starb 1624.

Hier müssten auch zwei Namen angeführt werden, wenn, wie *Haller* in seiner *Historia stirpium* angibt, sie wirklich Bündnern angehörten. Es ist *Nicolaus Clavena*, ein Geistlicher und Apotheker aus Ober-Italien, und *Pompejus Sprechus* \*) (ob wohl Sprecher?), der in einem zu Venedig erschienenen Opuskel (Anno 1611) nachzuweisen suchte, dass das von *Clavena* beschriebene *Absinthium umbelliferum* (*Achillea Clavenæ*), mit dem *Clusischen* identisch sei. Wir haben jedoch Ursache zu zweifeln, dass hier von einem Bündner die Rede ist, indem *Haller* in seiner *Bibliotheca botanica* die Bemerkung macht: *Vanus homo, neque in montibus conscendendis exercitatus, demonstrat etc.*

*Johann Ray*, ein Engländer, besuchte in botanischer Absicht Rhätien in den Jahren 1663 und 1664.

*Anton v. Clerig*. Wir verdanken ihm eine Dissertation über den Spargel. (*Antonius de Clericis, Curio-Rhetus. Dissertatio de Asparago propugnato in Academia Altorfiensi. Altorfii 1715.*)

*Johann Muralt* bestieg den Lukmanier.

*Johann Jakob Scheuchzer* durchsuchte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Graubünden vielfach und entdeckte viele interessante Pflanzen. Er war auf dem Splügen, Maloja, Julier, Septimer, Crispalt, Lukmanier, im Medelser-Thal, Rheinwald, Kunkels, Pfäfers etc.

*Johann Scheuchzer*, des vorigen Bruder, verlebte einen Sommer (1709) in Schams, und bestieg von dort aus die Cera, den Vogelberg und

\*) Pariter Rhætus (*Haller*).

Surser. Später (1719) gab er eine Agrostographie heraus, die noch jetzt durch die Güte der Zeichnungen und Genauigkeit der Beschreibungen ihren alten Werth behauptet.

*Johann Gesner* besuchte in seinen jüngern Jahren die rhätischen Alpen und wurde nachher der Begleiter Hallers auf mehreren seiner Reisen.

*Albrecht v. Haller*, gross als Staatsmann, Dichter, Arzt und Naturforscher, lebte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts bis über dessen Mitte hinaus (von 1708—1777). Haller hat zwar in Bünden selbst nicht botanisirt (im Jahr 1729 bereitete er sich wohl auf eine Reise dahin vor, wurde aber durch eine Krankheit abgehalten); allein er erhielt durch seine Schüler eine Menge Pflanzen aus Graubünden, die er in seiner *Historia stirpium* namhaft macht. Man wird aus den unter den drei folgenden Namen vorkommenden Localitäten sehen, aus welchen Gegenden Haller von seinen Freunden und Schülern Pflanzen erhielt.

*Johann Jakob Huber* bestieg den Albula und Maloja.

*Jakob Dick* war in Chur, Clefen, Worms, Bellenz, im Veltlin und Misox, auf dem Fräla, Trone, Bernina und Splügen.

*Abraham Thomas*, in Bex sässhaft, kam mit Dick nach Graubünden und bestieg den Bernina, Septimer und das Wormser-Joch. Er ist der Gründer einer Naturalienhandlung, die noch jetzt von einem seiner Nachkommen in Bex fortgesetzt wird.

Bisher waren es blos reisende Naturforscher, die sich um Bündens Pflanzen bemüht haben. Von jetzt an aber sehen wir neben zahlreichen Reisenden auch Männer auftreten, die im Lande selbst wohnten, und von welchen daher wichtige Beiträge zu erwarten sind. Wir eröffnen die Reihe mit

*L. Pol*, Dekan des Zehngerichtenbundes, erst in Fläsch, sodann in Luzein Pfarrer. Sein Herbarium enthält die Pflanzen dieser Gegenden; ich habe jedoch die seltenern Species, die er seinem Freunde Gaudin schickte, vergebens darin gesucht. Es liegt in Luzein bei Herrn Landammann Salzgeber, der auch die entomologischen Sammlungen, sowie auch die hinterlassene Bibliothek seines Schwiegervaters aufbewahrt.

*Magister Roesch*, Lehrer in Philantropie zu Marschlins. Er hat, wie es scheint, viel in Graubünden und namentlich um den Ort seines Aufenthalts herum botanisirt. Sein Herbarium, das ohne Zweifel manche interessante Pflanzen enthalten mochte, und das über die Localität verschiedener Species Aufschluss geben könnte, ist verloren gegangen. Er hat das anfangs erwähnte Verzeichniss der Alpenpflanzen Graubündens für die Alpina verfasst (1807).

*J. Gaudin*, der Verfasser der Flora helvetica, besuchte in den Jahren 1805 und 1812 unsern Kanton; das erste Mal über Schams und Rheinwald nach dem Tessin reisend, das andere Mal nach dem Wormser-Joch den Weg einschlagend. Seine zahlreichen Entdeckungen haben für uns um so grössern Werth, als man sich bei ihm auf richtige Bestimmung verlassen kann. Er starb 1833.

*Schleicher*, ein deutscher Pflanzenhändler in Bex, bereiste ebenfalls Graubünden. Er hat, wie mehrere seiner Vorgänger, das Veltlin und Wormser-Joch ausgebeutet, kam nach dem Albula und Schyn, und reiste, wenn ich nicht irre, durchs Oberland zurück. Seine Localitätsangaben sind jedoch nicht zuverlässig; cultivirte Pflanzen, oder solche, die ihm zugeschickt worden sind, haben oft von ihm falsche Heimathscheine erhalten und sind mit diesen in die Herbarien seiner Correspondenten

übergegangen. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass ein Mann, der die Pflanzen sehr gut kannte und sich das Sammeln zum eigentlichen Beruf machte, manches seltene Gewächs finden musste, das vielleicht andern entging. Schleicher starb 1834.

*A. Tausend*, Chirurg in Chur, sonst aus Schwaben, sammelte in den Zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts auf den Bergen bei Chur herum viele Pflanzen. Im höchsten Grade unzuverlässig und aufschneiderisch in seinen Angaben, wie Herr Hauptmann U. v. Salis und ich oft zu bemerken Gelegenheit hatten, hat Tausend sich das Misstrauen so sehr zugezogen, dass auch in möglichen Fällen seine Ortsbezeichnungen in Zweifel gezogen werden können. Es schien mir daher gerathener seine Angaben bis auf wenige ganz zu unterdrücken, als die Rubrik der zweifelhaften zu vermehren. Ich weiss nicht in welcher Eigenschaft ihm das Bürgerrecht des Kantons geschenkt worden ist, ob als Botaniker oder als Impfarzt. Tausend starb 1827.

Die Reihe der noch lebenden Botaniker, die sich mehr oder weniger mit den Bündnerpflanzen befassen, beginnen wir billig mit

*H. Bovelin*, Apotheker in Bevers, unserm Nestor. Herr Bovelin, aus dem Kanton St. Gallen gebürtig, hält sich seit vielen Jahren in Bevers auf, und macht von hier aus fast jeden Sommer seine Ausflüge auf die benachbarten Berge. Es gelingt ihm vorzüglich gut, die Farben der Pflanzen beim Trocknen zu erhalten, weswegen bei ihm oft von Liebhabern kleine Sammlungen verlangt werden. Auch hat er vor mehreren Jahren einen Versuch angestellt, getrocknete Pflanzen auf feine Zeuge anzubringen, um solche sodann zu Vorhängen oder Tapeten zu gebrauchen.

H. Dr. *Steiner* ebenfalls in Bevers wohnhaft. Er ist daselbst practicirender Arzt und besitzt gute Kenntnisse in der Botanik, über welche er als Mitglied des Sanitätsraths die Aspiranten der ärztlichen Praxis examinirt.

H. Regierungsrath Dr. *Hegetschweiler* in Zürich, der Verfasser der zweiten Ausgabe von Suter's Flora helvetica, der Beiträge der Beschreibung einer in botanischer Absicht unternommenen Reise nach dem Tödi, u. a. W. Er hat Bünden und den anstossenden Theil von Glarus selbst bereist, schickte einmal einen Reisenden auf seine Kosten nach unserm Lande und stand mit mehreren fleissigen Sammlern in Verkehr. H. Hegetschweiler besitzt manches hübsche Pflänzchen aus Graubünden, und ihm verdanken wir viele Lokalitätsangaben; jedoch ist hier zu bemerken, dass ich von den eigenen Beobachtungen Hegetschweilers die Tausend'schen Angaben, die ersterer publicirte, scharf trennte. Wie fast jeder Botaniker ein eigenes Feld der Wissenschaft bearbeitet, so hat sich auch H. Hegetschweiler die Aufgabe gesetzt, den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Species nachzuweisen und wenn auch hie und da die Zusammenstellung etwas gewagt erscheint, so muss man immerhin zugeben, dass er die Idee, die Abänderungen der Pflanzen aus den äusseren Einflüssen zu erklären, bisher am besten durchgeführt hat.

H. *Emmanuel Thomas* in Bex, Sohn des früher erwähnten Abraham Thomas, und wie jener sich mit dem Handel von Naturalien abgebend, hat zu wiederholten Malen unsern Kanton bereist. Seine letzte Reise fand im Jahr 1835 statt, bei welchem Anlass er den *Juncus castaneus* nebst anderen seltenen Pflanzen entdeckte. Man kann bei Em. Thomas die von ihm in Bünden gesammelten Pflanzen käuflich erhalten.

H. Prof. *Oswald Heer*, von Matt im Kanton Glarus, für die Botanik an der Universität in Zürich angestellt, hat den K. Graubünden mehrmals besucht, und zwar nicht blos in der Eile eines Durchreisenden, sondern, indem er sich einige Wochen Zeit dazu nahm, um mit Muse bald die eine und bald die andere Thalschaft botanisch und entomologisch auszuforschen. Sein Augenmerk war dabei vorzüglich auf die Verbreitung und das Vorkommen der Pflanzen auf der Centralkette der rhätischen Alpen gerichtet. Er gedenkt seine Beobachtungen später in einem besondern Werke zu veröffentlichen, wozu jeder, der seine Arbeit über einen Theil des Kantons Glarus kennt und rein wissenschaftliche Forschung zu würdigen weiss, der Wissenschaft und dem Bearbeiter Glück wünschen wird. Ich verdanke H. Heer eine Menge der werthvollsten Localitätsangaben..

H. Hauptmann *Ulysses v. Salis*, in Marschlins, hat, mit gründlichen Kenntnissen in der Botanik ausgerüstet, Graubündens Flora vielfach durchsucht. Die Gegend der Herrschaft und der fünf Dörfer, das Brättigau, das Ober-Engadin, Bergell und andere Thäler des Landes boten ihm den Stoff zu mannigfachen botanischen Beobachtungen. Wenn jedoch in diesem Verzeichniss der Name des H. v. Salis nicht so oft vorkommt, als sein vieljähriger Aufenthalt im Lande und seine Thätigkeit erwarten lässt, so ist solches dem Umstande zuzuschreiben, dass H. v. Salis, seine Erfahrungen auf dem Gebiete der Botanik für spätere Zeiten aufbewahren will. Ich habe hier nur das anführen können, was mir im Verlaufe freundschaftlicher Unterhaltungen mitgetheilt wurde.

H. Pfarrer *Felix* in Nusenen, beschäftigt sich seit mehrern Jahren mit den Pflanzen des Rheinwalds. Ihm verdanke ich viele Pflanzen und Lo-

calitätsangaben aus diesem Theile des Landes, wofür ich ihm auch hier meinen Dank abstatte.

H. Landammann *M. Hæssli*, in Splügen, widmete früher, als er noch in Hinterrhein war, die Stunden seiner Muse, der Flora seines Thals. Hoffentlich wird er auch jetzt, trotz der vermehrten Geschäfte, dem Umgange mit der Natur nicht ganz entsagen und uns der seltenen Pflanzen, wie solche die *Oxytropis lapponica* und *Pulmonaria angustifolia* war, noch mehrere zu Tage fördern.

H. *Muret*, Mitglied des Appellationsgerichts in Lausanne, bereiste im Sommer 1837 in Gesellschaft des H. Pfarrers Leresche Graubünden. Er entdeckte mehrere der seltensten Pflanzen und theilte sie mir mit der dem französischen Charakter eignen Gefälligkeit mit.

Noch hätte ich mehrere Namen hier zu nennen, sowohl von reisenden Botanikern, deren alle Jahre immer mehr nach Bünden kommen, als auch von inländischen Liebhabern, deren sich bereits unter allen Klassen einige finden. So sehr es mich jedoch gefreut hätte, durch namentliche Aufführung mehrerer Aerzte, Pharmaceuten, Forstbeamten, Geistlichen und Rechtsgelehrten zu zeigen, dass der Sinn für Naturstudium auch bei uns erwacht ist, so will ich, um ihrer Bescheidenheit nicht zu nahe zu treten, diesmal ihre Namen mit Stillschweigen übergehen. Zum innigsten Vergnügen gereicht es mir aber, mit der festen Ueberzeugung nicht zu übertreiben, sagen zu können, dass unter den Ungenannten einer und der andere sich findet, der an wirklichen botanischen Kenntnissen und an wissenschaftlichem Sinne den bessern Botanikern an die Seite gesetzt werden kann.

Ich hätte nun noch zum Schlusse zu zeigen, inwieweit ich zur Abfassung dieses Verzeichnisses vorbereitet war. Ich begann im Jahr 1828 meine botanischen Studien in München unter der Anleitung des Prof. Zuccarini. In die Heimath zurückgekehrt, hielt es bei meinen beschränkten literarischen Hilfsmitteln im Anfang schwer, mich in der, damals für mich neuen, Flora der Alpen zurecht zu finden. Weder Abbildungen noch Herbarien erleichterten mir das Bestimmen der Pflanzen, und so war ich einzig an Beschreibungen gewiesen, mit denen ich jede neue Erscheinung genau vergleichen musste. Wenn ich auch auf diesem Wege oft irre gegangen bin, so hatte es den grossen Vortheil, dass ich dabei den Organismus der Pflanzen genau kennen lernte, und dadurch in Stand gesetzt wurde, später um so schneller vorwärts zu schreiten. Vom Jahr 1829 an bis 1834 botanisirte ich viel in Graubünden, kam in alle Thäler des Landes, wenige nur ausgenommen und besuchte auch das Wormser-Joch und den K. Tessin bis an seine südlichsten Grenzen. Wenn ich nun zu den in diese Zeit fallenden Ausflügen und Reisen die des Sommers 1836 und des Jahrgangs 1837 setze, so ergibt sich im Allgemeinen, dass ich, mit Ausnahme des Unter-Engadins, in allen Thälern des Kantons, wenigstens ein Mal gewesen bin, in vielen zwei Mal, wie z. B. im Oberland, Tawetsch, Valz, Vorder-Lugnetz, Ober-Engadin, Brättigau, Schallfigg, Misox, in andern drei Mal, wie im Rheinwald, Schams, Domleschg, Belfort, Gruob und Herrschaft. Unzählige Ausflüge habe ich in der Umgegend von Chur gemacht, die Berge dort herum, den Calanda, Bizockel, Mittenberg, Montellin, Joch, Augsberg bei Parpan, den Augstenberg bei Malins u. a. oft bestiegen, und fast jedesmal die Ausbeute gesehen, wenn andere Botaniker Ausflüge in diesem Revier machten.



In den Jahren 1834 und 1835, in welchen ich in Genf mit einer literarischen Arbeit beschäftigt war, hatte ich das Glück die De Candolle'sche Bibliothek und Herbarium vielfach benutzen zu können. Ich ordnete auch damals die beträchtliche Pflanzensammlung des Conservatoire botanique, eine Arbeit wobei mir fast alle europäischen Species zu Gesichte kamen und die ich diesen Winter (1838) beendigen werde. In den freien Stunden meines früheren Aufenthalts in Genf botanisirte ich in den reichhaltigen Umgebungen dieser Stadt öfters und machte auch zwei Reisen in die Savoiergebirge und zwei nach dem benachbarten Jura. — Diese günstige Stellung in Genf gestattete mir, unsere Bündtnerpflanzen mit einer Menge aus andern Gegenden und mit authentischen Exemplaren zu vergleichen, und sie darnach mit grosser Sicherheit zu bestimmen. — Wenn sich jedoch, trotz dieser Garantie, Fehler in dieses Verzeichniss eingeschlichen haben sollten, die auf die Benennung Bezug haben, so wird es leicht sein, selbige später zu berichtigen, da ich alle hier angeführten Pflanzen, die ich gefunden, in meinem Herbarium durch einige Exemplare repräsentirt und mit einer Etiquette versehen habe, die mit den Angaben dieses Verzeichnisses correspondirt.

Wenn ich mich nicht streng an die politischen Grenzen des K. Graubünden gehalten habe, so glaube ich diess mit folgenden Gründen rechtfertigen zu können. Zum ersten sind die politischen Grenzen in den meisten Fällen etwas willkührliches, mit einer natürlichen geographischen Abmarkung in Widerspruch stehend. Wer daher ein Bild der Pflanzenphysiognomie eines Landes entwerfen will, muss sich, so viel thunlich, an letztere halten. Zum andern liegen einem Botaniker eines Grenzorts die Pflanzen über dem Markstein eben so nahe als die, welche hierwärts desselben wachsen; so dem Bergeller die Clefner-Pflanzen, so dem

Churer die Sarganser und Melser. — Zum dritten ist namentlich das untere Misox so gelegen, dass möglicherweise viele Pflanzen des oberen Italiens dort wachsen können und vielleicht früher oder später auch noch dort gefunden werden. Der Umstand, dass Graubünden an drei Stellen nach Italien hinab seine Arme streckt, gibt freilich unserer Flor etwas vages; aber die italienischen Thalschaften unseres Landes von dieser Arbeit auszuschliessen, wie mir von einer Seite verdeutet wurde, hätte ich, um meiner italienischen Mitbürger willen, nicht über mich bringen können. Und am Ende ist zu bedenken, dass der Zweck jeder pflanzen-geographischen Arbeit nicht das Land sondern die Pflanzen sind: es soll nicht gezeigt werden, welchen Einfluss die Pflanzendecke auf das Land ausübt, sondern umgekehrt; und zu diesem Zweck hätte ich füglich sowohl nach dem Süden als nach dem Norden noch weiter greifen dürfen, wenn es meine Kenntnisse gestattet hätten. Ja es wäre sogar zu wünschen gewesen, dass ich den ganzen Querschnitt aus der Alpenkette, von welchem Graubünden die Mitte bildet, hätte behandeln können.

---

So nimm denn, Rhätien, diese Huldigung, die einer deiner Söhne dir aus der Ferne bringt, nachsichtig hin! Er wollte den Reichthum blos andeuten, den der Schöpfer in dein Kleid gewoben hat, keineswegs ihn erschöpfen!

Genf im November 1838.

*A. M.*

## Charakteristik der Pflanzenphysiognomie Graubündens im Allgemeinen.

Das Hochland des alten Rhätians, der schweizerische Kanton Graubünden, in seinen jetzigen Grenzen, liegt zwischen dem 46 und 47° nördl. Breite und 266—283° Länge, ganz im Alpengebirge vergraben. Es ist ein wahres Netz von Gebirgsrücken und Thalgründen: nirgends ist eine Ebene von einer Stunde in's Gevierte. Nach Norden fällt das Thal bis auf 1530 Fuss (bei Ragatz) ü. M. und nach Süden bis auf 708' (bei Bellenz); die höchsten Spitzen steigen bis auf 12000' Höhe ü. M. (Ortles), mehrere halten sich zwischen 10—11000' (Piz Rosein u. a.) und viele, wohl die meisten, stehen zwischen 8—10000'. Nur das Schiefergebirge \*) im vordern Theil des Landes, die Kette zwischen dem Brättigau und Schalfigg und der Gebirgsstock der Drei-Bünden-Mark (auf welchem die Dörfer Malix, Obervatz, Scheid, Feldis etc. liegen), sowie Schams und Heinzenberg, erreicht diese Höhe nicht; sein Rücken, der ohne bedeutende Hervorragungen ist, hält sich in ungefähr 6000' Höhe ü. M. In keinem Lande ist die Lage der Thäler so mannigfach wie in Graubünden; es gibt keine Richtung, in welcher nicht irgend ein Hauptthal (von den

\*) Nach Prof. Studer Bündner- oder Fucoidenschiefer, eine Formation, die ich oft in dieser Arbeit mit dem Namen Thonschiefer bezeichnete. Seine Verbreitung habe ich ebenso gefunden, wie dieser scharfsichtige Geolog, was ich zu meiner grossen Befriedigung gewahrte, als ich dessen geognostische Arbeit (vorgelesen d. nat. Ges. in Neuchâtel 1837) las.

Nebenthälern kann nicht die Rede sein) dieses Landes striche. Graubünden gibt seine Wasser an den Rhein, die Donau und den Po ab und zerfällt somit in drei Flussgebiete.

Ehe wir jedoch auf die Charakteristik dieser drei Flussgebiete, die, wie wir später sehen werden, mit Verschiedenheiten der Pflanzenbedeckung zusammenhängen, eingehen, wollen wir einen Blick auf die Physiognomie des Landes im Allgemeinen nach den verschiedenen Höhen werfen.

### *Erste Region.*

Die untere Rheinebene, der Landstrich von Fläsch nach Ems und Reichenau, liegt noch in der Region des Weinstocks und wird von demselben eigens charakterisirt. Wenn auch die Weinberge, in der Art wie sie bei uns vorkommen, durch ihre nach der Schnur geordneten Reihen etwas monoton erscheinen, so gewähren sie doch im Sommer durch ihr lebhaftes Grün einen angenehmen Anblick, zumal wo kleine niedliche Weingartenhäuschen in ihnen vorkommen, wie diess bei Chur der Fall ist. Selten sieht man in diesem Gebiete den Weinstock in Lauben gezogen, wo er sich durch seine Ranken an horizontal gelegte Latten anklammert; nur bei Untervatz und weiter unten zwischen Sargans und Wallenstadt wird diese Culturmethode Italiens nachgemacht. Aber noch ist es niemand eingefallen, die schönen Guirlandenreihen die manche Gegenden Savojens zieren, bei uns einzuführen. Unsere Sonne mag aber auch wohl weder für die italienische noch für die savoyische Methode warm genug sein. Obwohl nun der Weinstock an und für sich der Thalebene von Chur keinen besondern Reiz verleihen kann, so ist er doch im Gemisch mit andern Pflanzungen angenehm, und da sein Fortkommen durch klimatische Zustände bedingt wird, die noch einer Menge anderer Gewächse Gedeihen geben, so kommt es, dass diese Gegend in ihrer Mannigfaltigkeit die *lieblichste* Graubündens ist.

*Zweite Region.*

(Montane Region oder Region des Kirschbaums.)

Von der Grenze des Weinstocks an bis zum höchsten Punkte des Fortkommens des Kirschbaums (ungefähr 3500' ü. M.) rechne ich die montane Region. In diese fallen die meisten bewohnten Gegenden des Landes, das Brättigäu bis Klosters, das Oberland bis Disentis, Schalligg, Belfort und der unterste Theil des Unter-Engadins. In reizender Abwechslung umgeben grüne Wiesen und gelbe Getreidefelder, Obstbaumpflanzungen und Laubholzwaldungen die Dörfer dieser Region. Oft steigen auch die finstere Feuchtigkeit verbreitenden Tannenwälder bis in diese Tiefen herab, wo sie dann dem Gemälde der Landschaft den Schatten verleihen. Seltener als zu wünschen ist, sind in dieser Region die Laubholzwaldungen, die doch hier ihre rechte Stelle fänden. Nur das vordere Brättigäu hat deren eine beträchtliche Menge aufzuweisen, so dass sie für die Physiognomie dieses Thals, dem sie einen heitern Charakter ausdrücken, bezeichnend sind.

Der Wiesenteppich ändert seine Farben je nach der Jahreszeit. Erst ist er grün, so lange noch keine Blumen zum Vorschein kommen; bald aber wird er gelb durch das Auftreten der Schlüsselblumen, Ranunkeln und Milchen (*Trapogon*, *Leontodon* etc.); später in manchen Gegenden weiss, durch die Wucherblumen und Umbelliferen. Bei Klosters ist für viele Wiesen die *Agrostis vulgaris* bezeichnend, welche an Individuen-Zahl alle andere Pflanzen zusammengenommen wohl um das zwanzigfache übertrifft.

*Dritte Region.*

(Subalpine Region oder Region der Rothtannen.)

Die Rothtanne steigt bei uns bis ungefähr 5000' weit über das Meer und bis hieher rechnet man gewöhnlich die subalpine Region. In sie

fallen die höhern bewohnten Thäler unseres Kantons, Davos, Rheinwald, Tawetsch, Avers, Valz, Savien, Erosen und der obere Theil des Unter-Engadins. Die Abwechslung der Pflanzungen wird geringer; es streiten sich nur noch Wiesen und etwas Roggen- und Gerstenfelder mit den Tannenwäldern um den Besitz des Bodens. Die Laubhölzer treten zurück, sowohl an Individuen-als an Species-Zahl, oder sie treten nur noch strauchartig auf. Hochstämmige Bäume gibt es blos noch aus den Geschlechtern der Birken, Mehlbeerbäume, Gürgütsch und den Traubenkirschbäumen (*Cerasus Padus*).

Die Wiesen der subalpinen und auch wohl alpinen Gegenden werden besonders durch eine Pflanze charakterisirt, durch die Ochsenzunge der Bündner, *Polygonum Bistorta* L. Wann die Pflanze blüht, so kleiden sich manchmal ganze Thäler in das lieblichste Rosenroth. Weniger häufig, aber doch auch bezeichnend, ist die *Sanguisorba officinalis* L. für die nämlichen Thäler.

### *Vierte Region.*

(Alpine Region oder Region der Alpenweiden.)

Von 5000' an bis in die Höhe von 6500' rechne ich die alpine Region. Sie umfasst das Gebiet der Alpenweiden, wo in den Sommermonaten das Vieh seine Nahrung findet.

Wenn wir einige hochgelegene Thäler, wie das Ober-Engadin, annehmen, so zeichnet sich diese Region von den vorhergehenden durch den Mangel an hochstämmigem Holze aus. An seine Stelle tritt hier das Gestrüpp der Alpenrosen, des Trosses (*Alnus viridis*), und auf Kalkbergen das der Legfohre; stellenweise, jedoch seltener, überziehen strauchartige Weiden (*Salix foetida*, *grandifolia*, *myrsinites*, *helvetica* et *lapponum*) die Abhänge dieser Höhen.

Der grösste Theil aber dieser Region ist Weide. Sie besteht in einem Gemische der mannigfaltigsten Kräuter, unter denen sich jedoch am

meisten die Umbelliferen durch die Mutternen (*Meum Mutellina*) und durch die *Gaya simplex*, die Plantagineen durch *Plantago alpina* und mehrere Compositen und Leguminosen hervorthun. Die gestreckten Alpenweiden bilden, obwohl sie eigentlich Sträucher sind, einen nicht unwesentlichen Theil dieser Weiden; wir nennen hier blos *Salix reticulata*, *retusa* und *herbacea*. Die Monocotyledonen treten in dieser Region sowohl an Specieszahl als in Hinsicht der Menge hinter die Dicotyledonen zurück, manchmal auf eine auffallende Weise. So findet man in der Wiese der Gengel'schen Jochalp nur hin und wieder einen Grashalm unter dem dichten Teppich, den dort die Mutterne und das *Hedysarum obscurum* bildet. Und doch gilt das Heu, das auf dieser Wiese gemacht wird, für das vorzüglichste weit und breit.

Bezeichnend sind ferner für diese Region und namentlich für die Umgebung der Sennhütten die Plakten (*Rumex alpinus*), die Aconiten und die Goldkräuter oder Böni (*Senecio cordifolius*). Letzterer wird in den südöstlichen Alpen durch den *Senecio campestris* vertreten und zwar so ausschliesslich, dass auch keine Spur vom *S. cordifolius* zu sehen ist, wie ich diess in der Zuser Alp auf dem Levirone zu beobachten Gelegenheit hatte. Es wäre des Nachforschens werth, zu erfahren, unter welchen Umständen die eine und die andere dieser beiden Arten auftreten.

Im Ober-Engadin gehen die Lärchen und Arven meist bis an das Ende der alpinen Region, ein Umstand auf den ich später zurückkommen werde.

### *Fünfte Region.*

(Nivale Region, in diesem Verzeichniss auch als subnivale Region bezeichnet.

Vom Ende der alpinen Region bis an die Schneelinie, oder ungefähr 8000' Höhe rechnet man die nivale Region.

Vom Gesträuch ist hier keine Rede mehr, wenn man nicht die kriechenden Weiden so benennen will. Nur fingershohe Kräutchen zeugen hier noch für die unbesiegbare Kraft der Natur. Und diese Kräutchen sind so dicht aneinander gedrängt, dass einem dabei unwillkürlich die Chinesen in den Sinn kommen, von denen berichtet wird, dass sie sich im Winter haufenweise zusammenstellen, um sich durch den gegenseitigen Druck zu erwärmen. Jedem Alpenwanderer müssen die schönen Polster der *Silene acaulis*, der Saxifragen und Aretien auffallen; sie sind es, die in diesen weiten lautlosen Räumen dem Menschen den Trost zusprechen: auch hier ist Leben noch!

### *Sechste Region.*

(Glaciale Region, in diesem Verzeichnisse auch zuweilen als nivale Region bezeichnet.)

Noch über der Schneelinie finden sich in Felsenklüften an geschützten Stellen, wo der Schnee nicht halten kann, Pflanzen. Es sind Aretien, die *Saxifraga oppositifolia* und *bryoides*, *Cerastium latifolium*, nach Heer *Poa laxa*, nach Saussure *Silene acaulis*, var. *exscapa*, nach Hegetschweiler *Cherleria sedoides*, nach H. Nägeli auf dem Sandgrath (8600') ausser den genannten *Potentilla frigida*, eine *Draba*, *Geum reptans*, *Ranunculus glacialis*, *Chrysanthemum alpinum*, *Linaria alpina* etc. Alle diese Pflanzen kommen auch in den unteren Regionen vor und zwar in grösserer Menge als hier, so dass in vegetabilischer Hinsicht diese sechste Region eigentlich wegfällt.

Es sei mir nun noch erlaubt, die Verschiedenheit in der Vegetation nach den drei Flussgebieten hervorzuheben.



## ERSTES FLUSSGEBIET DES RHEINS.

Es begreift weit aus den grössten Theil des Landes in sich und so gehören im Grunde, ausser den Pflanzen, die besonders zur Bezeichnung der beiden andern Flussgebiete angeführt sind, alle in diesem Verzeichniss vorkommenden Gewächse hieher. Ich will jedoch aus dieser Allgemeinheit zwei Thäler hervorheben, die mir einer besondern Aufmerksamkeit werth scheinen.

**Das Bündnersche Oberland.**

Die Thalsole des Oberlandes, von der Rheinschlucht unter Valendas an bis Disentis gerechnet, zeigt eine eigenthümliche Zusammensetzung der Vegetation, die sich weiter unten in der Rheinebene von Chur nicht mehr findet. Pflanzen, die man gewohnt ist für südliche zu halten, oder die in den ausgedehnten Ebenen der unteren Schweiz und des warmen Waadtlandes und Genfs sich finden, erscheinen auf einmal, gleichsam nach einem Sprunge über das vordere Rhätien, im Oberlande wieder. Zu diesen gehören folgende Arten: *Gypsophila muralis*, *Graphalium uliginosum*, *Anagallis coerulea*, *Geranium dissectum*, *Poa pilosa*, *Amaranthus retroflexus*, *Holcus mollis*, *Bidens cernua*, *Hypericum tetrapterum*, *Trifolium agrarium*, *arvense*, *Cyperus fuscus*.

Zwei Ursachen sind es, die nach meinem Dafürhalten, diese Eigenthümlichkeit bedingen. Eine dritte will ich zum Schlusse als eine mögliche andeuten. Die erste ist die *geographische*, welche darin besteht, dass das Thal auf etwa 7 Stunden Länge nicht mehr als 1380' Fall hat, was ungefähr auf die Stunde 200' ausmacht. Was hier in der montanen Region Statt findet, werden wir später bei Anlass des Ober-Engadins in noch grösserm Masse in der alpinen beobachten und dort soll es aus-

fürlicher gezeigt werden, dass, je mehr eine Höhenregion horizontale Ausdehnung hat, desto mehr Pflanzenspecies sich in ihr niederlassen. Die zweite Ursache knüpft sich an diese an und ist klimatischer Natur. Das Oberland hat eine Richtung von Osten nach Westen. Eine hohe Gebirgskette schützt es von Norden vor dem rauhen Boreas, der nur gebrochen von Osten her in dieses Thal gelangen kann. Keine Seitenthäler von Betracht münden vom Norden in das Hauptthal, so dass man schon daraus schliessen kann, wie steil die Abdachung von dieser Seite sein muss. Dagegen verhält es sich auf der Südseite ganz anders, wo drei sechsstundenlange Seitenthäler (Lugnetz, Somvixer-Thal und Medels) sich in das Hauptthal münden. Zudem erleiden die Gebirgsrücken, die diese Seitenthäler von einander trennen, vom Süden her eine Abdachung, in der Art, dass die höchsten Spitzen derselben (Gebirgsrücken) hinten stehen und nach vorne oder Norden graduel abnehmen. Das Thal erhält dadurch eine südliche Stellung, deren Einfluss auf die Vegetation durch den Reflex der Sonnenstrahlen von Norden her noch erhöht wird.

Die dritte mögliche Ursache ist eine geologische. Zwischen Ilanz und Schleuis findet eine marquirte geognostische Scheidung der Gebirgsformationen statt. Während auf der Schleuiser-Seite der secundäre (?) Kalk (d. i. der Kalk, der die zweite Gebirgsreihe, die mit der Central- oder Urgebirgskette sowohl in Bünden als in Bern parallel läuft \*), bildet) auftritt, ist von Ilanz an aufwärts (wie weit weiss ich nicht) eine granitische Formation wahrzunehmen. Ist dieser Stock bei Ilanz nun ein von untenher hinaufgetriebenes plutonisches Gebilde neuern Ursprungs? Sollte vielleicht die Thalsohle des Oberlandes früher tiefer gelegen haben, als jetzt? Ich bin zu wenig Geolog und habe auch zu wenig das Vorkommen der dortigen Formation nach allen Seiten ge-

\*) Was nach Prof. Studer nicht der Fall ist, der in Bünden eine Unterbrechung der normalen Alpenformation zu bemerken glaubt.

sehen, als dass ich weiter als zum Fragen und Vermuthen zu gehen wagte. Aber auch alle diessfälligen Vermuthungen auf die Seite gesetzt, darf man annehmen, dass schon das Beegnen und Vorkommen zweier Formationen in der Pflanzendecke Eigenthümlichkeiten hervorrufen muss.

In das Flussgebiet des Rheins gehört auch der Thalkessel von Tiefenkasten, der von der Albula durchströmt wird. Aus diesem Gebiete, das übrigens mit dem Oberland vieles gemein hat, hebe ich folgende Pflanzen, die ich anderwärts nie gefunden habe, als bezeichnend hervor: *Cephalaria alpina*, *Inula salicina*, *Conium maculatum*, *Armoracia rusticana*, *Campanula glomerata*, *Gentiana germanica*, *Bromus racemosus*, *Centaurea rhætica* M., und *Peucedanum verticillare*, das hier auf Wiesen seine eigentliche Heimath hat und weiter unten nur an Flüssen mehr gesehen wird.

Andere Pflanzen, die sich anderwärts auch finden, aber dieses Gebiet bezeichnen helfen, sind: *Astragalus monspessulanus* und *Cicer*, *Coronilla vaginalis*, *Chondrilla prenanthoides*, *Atamantha Libanotis*, *Lactuca perennis*, *Orobanche Epithymum*, *Epipactis rubra*.

Das Albulathal liegt in der nämlichen Höhe ungefähr wie das Oberland und hat auch fast dieselbe Richtung. Die Berge, die es umfassen, sind Kalk, in dem an zwei Stellen Gyps bricht. Nur der Schyn, an dem die Albula vorbei fliesst, ehe sie in den Rhein fällt, gehört zur Schieferformation.

---

## ZWEITES FLUSSGEBIET DES INNS.

Das Engadin, in nordöstlicher Richtung streichend, gehört, von Schulz an bis Brail in die subalpine und von dort an bis zu seinem obersten Ende in die alpine Region. Es beherbergt eine Menge der interes-

santesten und seltensten Pflanzen, die bisher noch in keinem andern Theile Graubündens gefunden worden sind. Bis hieher und nicht weiter geht die *Centaurea austriaca*, die *Primula glutinosa* und nicht viel weiter westlich geht der *Senecio carniolicus*. Hier allein findet sich auf unsern Alpen das *Thalictrum alpinum*. Das *Sysymbrium strictissimum*, *Astragalus Onobrychis*, *Galeopsis versicolor*, *Cirsium eriophorum*, *Erysimum strictum* und andere Pflanzen bezeichnen durch ihr häufiges Vorkommen die tiefern Gegenden des Engadins. Noch mehr eigenthümliche Arten erscheinen weiter oben, von denen ich, um nicht zu weitschweifig zu werden, bloß die bemerkenswerthesten herausheben will. Es sind *Papaver pyrenaicum*, *Statice alpina*, *Phaca alpina*, *Senecio abrotanifolius*, *Scirpus alpinus*, *Alsine lanceolata* und *biflora*, *Tussilago leucophylla*, *Dianthus glacialis*, *Hieracium chondrilloides*, *prunellæfolium*, *sphærocephalum*, *Galium uliginosum*, *Valeriana supina*, *Koeleria hirsuta*, *Aethionoma saxatile* u. v. a.

Unter den Pflanzen des Ober-Engadins bemerken wir ferner eine Menge Arten, die selbiges mit dem hohen Norden gemein hat, und von welchen ich folgende hier namhaft machen will: *Carex microglochin*, *Kobresia caricina*, *Juncus arcticus*, *Tofieldia borealis*, *Woodsia hyperborea*, *Potentilla frigida*, *Salix Lapponum*, *Linnæa borealis*, *Geranium aconitifolium*, *Gnaphalium alpinum* L. (das wahre), *Androsace septentrionalis* und andere weniger seltene, die auch anderwärts in den Alpen den Norden widerholen.

Im Gegensatze zu diesen erscheinen im Ober-Engadin einige Species, die wir sonst nur auf dem südlichen Abhange der Alpen zu sehen gewohnt sind. Hieher rechne ich *Carduus leptophyllus*, *Erysimum helveticum* var. *pumilum*, *Arabis Halleri*, *Anthyllis Vulneraria* var. *ochroleuca* und *Arenaria loricifolia*. Wenn meine Annahme nicht irrig ist, so hätten wir in diesen Pflanzen ein Beispiel, wie Gewächse auch aufwärts wandern können; denn woher sollten die genannten Arten sonst

herkommen, als aus dem Bergell? Es ist zwar wahr, dass im Westen der Schweiz diese Pflanzen auch auf der Nordseite der Alpen gefunden werden; aber es ist nicht zu vergessen, dass dort der nördliche Abhang dem Zutritt des Südens von Frankreich her offen steht.

Wir wollen nun das Thal, in welchem der Norden sich mit dem Süden gattet, näher in's Auge fassen.

### **Das Ober-Engadin.**

Wie in den beiden Verzweigungen des Visper-Thals, im Saaser- und Nikolai-Thal im Kanton Wallis, von Süden her ein mächtiges Gebirg den Zutritt in diese Thäler, nicht nur den Menschen, sondern auch den Winden verwehrt, so steht im Rücken des Ober-Engadins das Bernina-Gebirg mit seinen Grauen erregenden Eismassen, um jede Verbindung mit Italien abzuschneiden. Von der Forcola di Mezzo an streicht diese Kette in östlicher Richtung, ohne irgend eine beträchtliche Einsenkung, bis zum Berninapass, wo man sie zum ersten Mal durchschneidet, ohne auf Gletscher oder Schneefelder zu stossen. Von Strecke zu Strecke schickt der Eisgürtel von Oben seine Sprossen in die tiefern Thäler, und verbreitet da, wo sonst Blumen blühen sollten, den starren Tod. Nach zwei Seiten öffnet sich das Ober-Engadin gegen Ober-Italien; im Westen durchs Bergell gegen den Thalkessel von Cleven und im Osten durchs Bernina-Thal und Puschlav gegen das Obere Veltlin. Nach dieser letztern Seite erhebt sich das Thal bis auf 6260' ü. M., während es auf ersterer mit dem Uebergangspunkte des Malojapasses in einer Höhe von 5850' zusammen fällt.

Der Einfluss, den das südliche Klima Ober-Italiens auf das Ober-Engadin ausübt, ist, abgesehen von der Wanderungsmöglichkeit der

Pflanzen, deren wir erwähnt haben, besonders in meteorologischer Beziehung wichtig. Der Comersee und hauptsächlich dessen oberer Theil, der Laghetto di Chiavenna, mit seinen seichten Ufern und sumpfigen Umgebungen, entwickelt im Sommer nothwendig eine grosse Masse wässriger Dünste, die sich auf die benachbarten Bergspitzen hinziehen und dort, je nachdem die Winde sind, Niederschläge bilden. Von diesen Ausdünstungen kommt ohne Zweifel ein guter Theil dem Bergell und Ober-Engadin zu, die am nächsten liegen und hier mögen sie einigermaßen die Feuchtigkeit ersetzen, deren die nordische Flor an den Küstenländern sich erfreut. Da ferner der Uebergang des Malöja zu den niedrigsten der ganzen Alpenkette (nur um 100' ist der von Medels niedriger) gehört und im Süden von Cleven keine querstreichenden Gebirge vorkommen, so kann der Sirocco weniger abgekühlt als anderswo in die beiden graubündnerischen Thäler gelangen.

Mehr jedoch als diesen meteorologischen Einflüssen verdankt das Ober-Engadin die eigenthümliche Zusammensetzung seiner Pflanzendecke folgenden geologischen, klimatischen und geographischen Zuständen.

Vom Uebergangspunkte des Malöja an bis nach Scans, in einer Länge von  $6\frac{1}{2}$  Meilen Wegs (ich rechne auf eine Meile die Strecke Wegs, die man gewöhnlich in einer Stunde zurücklegt) ist der Fall der Thalsole 660', was auf die Meile 100 Fuss ausmacht. Nicht beträchtlich ist die Breite des Thals an und für sich, aber gegen andere Alpenthäler gehalten, gehört es zu den breitesten, da man an den meisten Stellen eine gute Viertelstunde braucht um von der einen Seite zur andern zu gelangen. Das Hauptthal des Ober-Engadins bildet jedoch zwei Thal-Ebenen, die von einer kleinern intermediären, auf welcher der St. Moritzer-See und Sauerbrunnen liegen, auseinander gehalten werden. Die St. Moritzer-Ebene hat unten die Schlucht, durch die der Inn aus dem See stürzt, zur Grenze, und oberhalb die Thalverengung am

Ausfluss des Inns aus dem Silvaplaner-See. Dass die obere Thalsole, vom Maloja an bis zum untern Ende des Silvaplaner-Sees grösstentheils mit Wasser angefüllt ist, lehrt der erste Blick auf die Karte. Fast ebenso verhält es sich mit der St. Moritzer-Ebene. Dagegen ist die untere Thalsole, in ihrer ganzen Länge von drei Stunden, sozusagen nur Eine zusammenhängende flache Wiese, deren Fall nur 400 Fuss beträgt. An der linken Seite dieses schönen Wiesengrundes schlängelt der Inn mit seinen klaren Wellen in ruhigem Laufe vorbei.

Dieser ausgedehnte Thalgrund findet sich in einer Höhe von 5490' bis 5850' ü. M. Er bietet vermöge seiner Ausdehnung eine in dieser Region nur selten zusammentreffende Mannigfaltigkeit der Situationen dar, die nothwendig die Ansiedlung einer grossen Zahl von Pflanzen-Arten und Formen bewirken musste. Prof. Heer hat in seinen pflanzengeographischen Beiträgen über Glarus sehr treffend darauf hingewiesen, dass eine grosse Zahl verschiedener Wohnorte (*habitationes* nach De Candolle) eine reiche Flor hervorrufen, und ohne Zweifel ist er auch damit einverstanden, dass, je ausgedehnter ein Wohnort ist, desto eher und sicherer und in grösserer Zahl sich die Pflanzenspecies auf derselben einfinden werden, welche ihrer Natur nach auf dieselbe gehören. Auch mögen manche biegsame Pflanzen, d. h. solche, deren Organisation es gestattet, in verschiedenen Oertlichkeiten sich anzusiedeln, veranlasst werden, ihre Vielförmigkeit hier zu entwickeln.

Es ist zu erwarten, dass in einer ausgedehnten Masse der Einfluss der Erdwärme auf die Vegetation andauernder sei und weniger von der atmosphärischen Temperatur alterirt werden könne als auf einzelnen steilhaldigen Bergen, aus welchem Umstand sodann, wenn er erwiesen ist, das weitere Hinaufreichen der Vegetation in die Höhen einen Erklärungsgrund mehr finden würde. Ich kenne bis jetzt keine Daten über das Ober-Engadin in dieser Hinsicht, die meine Ver-

muthung zur Gewissheit erheben könnten. Angaben über die Bodentemperatur von verschiedenen Orten des Thals, Beobachtungen über das Eindringen des Frostes in die äusseren Humusschichten und über das successive Entfrieren des Bodens, Vergleichen mit der Bodentemperatur des Nordens, bestimmte Zahlen über die Lufttemperatur eines jeden Monats und andere werden hierüber entscheiden.

Da das Ober-Engadin in nordöstlicher Richtung streicht, so ist es ganz dem Zuge des Nordwinds ausgesetzt, der sich auch oft mitten im Sommer auf eine sehr empfindliche Weise bemerkbar macht. Nicht selten sieht man im Juli und August die Curanten von St. Moritz in Mäntel gehüllt bei den heilkräftigen Quelle auf- und abgehen und die Engadiner selbst verschmähen es nicht in der schönen Jahreszeit diese warme Hülle umzulegen wenn sie, zu Wagen ihre Besuche von einem Dorfe zum andern machen.

Da ferner das Thal von dem hier die Rede ist von den drei Hauptgebirgsarten nur die granitische und den Kalk hat, das Schiefergebirg aber ganz fehlt, so dürfen wir auch hier das Auftreten gewisser Pflanzen erwarten, die anderwärts fehlen, so wie wir denn auch die Abwesenheit anderer Species aus diesem Grunde erklären müssen.

Weniger ausgemacht scheint mir dagegen die Behauptung zu sein, dass die Thäler, welche sich unmittelbar an die Centralkette der Alpen anschliessen, aus diesem Grunde eine eigenthümliche Vegetation haben. Freilich haben sie eine etwas abweichende Composition der Pflanzendecke aufzuweisen; ob aber hieran mehr die Gebirgsart und die südliche Lage im Allgemeinen Theil haben, ist nicht entschieden. Indessen mag das Anlehnen der Thäler an einen südlichen Gebirgsrücken, wodurch der Zutritt der Winde und der Einfluss der Sonne modificirt wird, ein Erklärungsmoment dieser Verschiedenheit sein.



Wenn wir nun zu diesen speciellen Ursachen die allgemeinen, die durch die ganze Alpenkette walten und die hauptsächlich in geringerm Luftdruck, viel Licht und wenig Wärme und im trockenen Continental-klima (dem Küstenklima entgegengesetzt) bestehen, hinzunehmen, so möchte die Pflanzenbedeckung des Ober-Engadins ziemlich genügend erklärt werden können.

Fassen wir nun alle speciellen Momente zusammen, so erhalten wir folgende Uebersicht:

*A. Gründe für das Vorkommen der nordischen Pflanzen.*

*Geographische:*

1. Die geographische Breite.
2. Die Lage des Thals, das von Südwest nach Nordost streicht.
3. Die Lage der Berninakette im Süden.
4. Die Erhebung des Thals über der Meerfläche.

*Geognostische:*

Die beträchtliche Ausdehnung der Thalsole in ungefähr gleichem Niveau und die damit verbundene Mannigfaltigkeit der Wohnorte.

*Meteorologische:*

Das Ansammeln wässriger Dünste vom Comersee her und von den Wassern des Thals selbst.

*B. Gründe für das Vorkommen südlicher Pflanzen und für das weitere Hinaufreichen der Vegetation nach der Höhe.*

*Geographische:*

1. Die geographische Breite, die im Vergleich mit andern Thälern Graubündens zu den südlichern gehört.

2. Die geringe Höhe des Uebergangs auf dem Maloja.

*Geognostische :*

Die beträchtliche Ausdehnung des Thals, die nach unserer Vermuthung eine höhere Bodentemperatur zu Wege bringt.

*Meteorologische :*

1. Die aus den Ausdünstungen der Seen herbeigeführten öftern Niederschläge.
2. Der erleichterte Zutritt der südlichen Winde.

*C. Gründe für die Eigenthümlichkeit im Allgemeinen.*

*Geographische :*

Der geographische Längengrad des Thals.

*Geognostische :*

1. Die Gebirgsformation, die entweder granitischer Natur (ehemals Urgebirg) oder Kalk ist.
2. Die Lage des Thals unmittelbar an der Centralkette der Alpen.

*Meteorologische :*

— — — — —

—

## DRITTES FLUSSGEBIET DES PO ODER DER ITALIENISCHEN THÄLER.

Hierher zähle ich, mit Ausschluss des Münsterthals, die Thäler Graubündens, die ihre Wasser dem Po zuschicken.

Das Münsterthal also ausgeschlossen, das in Beziehung auf Vegetation ganz zum Engadin gehört, so charakterisirt sich dieses Gebiet auf eine eigenthümliche und schroffe Weise. Wir finden dort eine Menge Pflanzen, von denen hierseits keine Spur zu sehen ist. Die bekannten Leguminosen, *Sarothamnus*, *Genista germanica* und *tinctoria*, *Cytisus nigricans* mit ihren Parasiten den Orobanchen, unter den Campanulaceen die *Campanula spicata*, *Rapunculus* und *Jasione montana*, das *Sedum reflexum*, *Galium verum*, *Muscari comosum*, *Potentilla recta*, *Molopospermum cicutarium*, *Aira caryophylla*, *Cerastium manticum*, *Andropogon Gryllus*, *Gratiola officinalis*, *Epilobium tetragonum* und viele andere halten sich beständig auf jener Seite. Ja, die ganze Physiognomie des Landes ist von der hierseitigen verschieden.

Sie trägt den Charakter, den die italienischen Alpenthäler im Allgemeinen haben, und den in seinen Einzelheiten zu beschreiben, hier füglich unterlassen werden kann. Ausserdem ist diess der Theil der bündnerischen Flora, der am wenigsten durchforscht worden ist, und der somit einem spätern Bearbeiter aufbehalten bleibt. Ich zweifle nicht, dass die italienischen Thäler, wenn man sich nicht gar zu ängstlich an die politischen Grenzen hält, für sich allein fast ebensoviel Species enthalten, als das übrige Bünden zusammengenommen. — Man nehme nur an was in der Gegend von Cleven allein für eine Menge von Gewächsen gefunden werden müssen, das, in einer Höhe von 650', Seen, Sümpfe, Felsen, Weiden und ein vollkommen italienisches Klima hat. Ich habe aus dieser Gegend nur wenige Pflanzen in dieses Ver-

zeichniss aufgenommen; es sind grösstentheils die Species der alten Angaben. Seither sind mir mehrere andere Pflanzen als daselbst wachsend angegeben worden und welchen ich auch das gleiche Recht hätte widerfahren sollen lassen; da ich aber überzeugt bin, dass auch dann dieser Theil sehr mangelhaft bleiben würde, so habe ich mir einmal diese Grenze gesetzt, bei der ich jetzt zu bleiben gedenke.



## PLANTÆ VASCULARES.

### DICOTYLEDONES.

#### THALAMIFLORES.

##### RANUNCULACEÆ.

###### CLEMATIS.

*Vitalba* L. Ueberall in Hecken, steigt aber nicht hoch in die Berge, höchstens in die montane Region. — Sommer.

*recta* L. Nach Haller bei Riva am Clevner-See. — Juni.

Anmerk. Nach J. Bauhin soll bei Chur die *C. Flamucula* L. zu finden sein, was aber sicher unrichtig ist.

###### ATRAGENE.

*alpina* L. Der einzige Schlingstrauch der Alpen, der an manchen Orten ziemlich weit in die Thäler heruntersteigt, z. B. nach Alveneu (3070' s. m.) und Rothenbrunn (2000'), dagegen sich an 6000' erhebt (oberhalb St. Moritz, am Wege

nach der Celleriner Alp). Gefunden wurde er von älteren und neueren Botanikern im Schyn, auf dem Splügen, Albula, in Schams, Avers, Rheinwald, Brättigau und Unter-Engadin. Scheint sich nicht an eine Gebirgsformation besonders zu binden, sondern kommt an Felsen und in grossem Gesteingerölle, sowohl auf Kalk, granitischem Gestein und Thonschiefer vor. — Juni.

###### THALICTRUM.

*aquilegifolium* L. In Hecken und Gebüsch von der Ebene (des Rheins bei Chur 1800' s. m.) bis in die Höhe von 5000' und darüber (oberhalb Hinter-rhein), so wie auch im Bergell, Ober- und Unter-Engadin. — Juni.

*foetidum* D. C.! Zwei Stunden unterhalb Worms am Wege. Die nämliche Pflanze erhielt ich vom Kunstgärtner Wirth, der sie an der Brücke unterhalb Cresta in Avers sammelte. — Juni. (Die Haare unserer Pflanze sind ohne Glandeln und die Blumen nicht überhängend.)

*angustifolium* Jacq. In Hecken und auf Wiesen der Ebene bei Chur, besonders in Menge auf einer nassen Wiese, auf St. Hilarien oberhalb dieser Stadt. — Mai, Juni.

*minus* L. Findet sich häufig in einer Höhe von 4-6000' s. m. Auf dem Calanda bei Bategna (Kalk), im Rauber'schen Maiensäss (am Bizockel bei Chur, auf Thonschieferformation), bei Samaden etc. — Sommer.

*alpinum* L. Wurde zuerst (1837) in der Schweiz von H. Muret in Lausanne gefunden, und zwar auf dem Joch Joata, welches man besteigt um direkt von Tschierfs nach Scharl zu kommen. Es findet sich dort in Menge, unfern einer Quelle. — Sommer.

#### ANEMONE.

*vernalis* L. Auf dem Calanda (Kalk) in der Haldensteiner-Alp (6000'), auf dem Bizockel (Thonschieferformation), wo sie bis über die Grenze des Kirschaums (3500') herunter steigt, in den Bergeller Bergen (Sienit), auf der Granitspitze oberhalb Samaden in einer Höhe von ungefähr 8000' vom Verfasser be-

merkt, ferner auf dem Augstenberg (bei Malans), in Valzeina, in den Vatzer-Heubergen. — Mai, Juli.

*Pulsatilla* L. Bei Chur, Feldsberg, Reichenau u. a. O. an Halden und auf sonnigen magern Weiden; erhebt sich jedoch nicht in die Berge. — April.

*montana* Hoppe. Nicht selten bei Chur, hinter St. Luzi, am Fusse des Mastrilserbergs an den gleichen Stellen wo die vorige; blüht aber ein Monat später.

*alpina* L. Ueberall in der Alpenregion auf Weiden; die weissblühende auf dem Montellin (Monte Luna bei Chur) und dem Augstenberg (nach M. Rösch); die gelbe häufiger als vorige und auch weiter unten (in der subalpinen Reg.). — Juni und Juli.

*nemorosa* L. Bei Malans und in der Molinära im Gebüsch. Anderwärts sah ich sie nirgends bei uns; wir sind vielleicht zu tief in den Alpen für sie. — März und April.

*baldensis* L. Nach Haller in Rhätien. — Sommer.

*narcissiflora* L. In der Alpenregion und tiefer, auf vielen Bergen, als Joch, Nufenen, Krida etc. — Sommer.

#### HEPATICA.

*triloba* DC. Häufig in der Umgegend von Chur, Felsberg, Malans; steigt kaum in die subalpinen Reg. bei Nufenen nach Pfarrer Felix. Wohnort ist steiniger Boden unter Gebüsch. — Frühling.

## ADONIS.

*æstivalis* L. In Aeckern im Domleschg, bei Bonaduz, Trüns etc., auf kalk- und thonhaltigem Erdreich. Nach Heer bei Fettau, wo sie auch H. Roland \*) fand. — Sommer.

## RANUNCULUS.

*aquatilis* L. In Pfützen und langsam fließenden Bächen der Ebene, bei Ems etc., so wie auch, nach Prof. Heer, im Ober-Engadin. — Sommer.

*rutæfolius* L. Auf dem Septimer (Haller), im Calfeusser-Thal (U. v. Salis), in Schams in der Alp Arosen (Pfr. Felix), auf dem Levirone \*\*) (d. Verf.). An letzterem Orte wächst er auf einer Humusschicht auf kalkiger Unterlage. — Sommer.

*alpestris* L. Auf fast allen Bergen, wie Prof. Heer richtig bemerkt, in Schneethälchen, d. i. Vertiefungen, wo der Schnee länger liegen bleibt. Hält sich in der alpinen und subnivalen Region. — Sommer.

*Traunfellneri* Hoppe. Nach Koch auf dem Wormserjoch. — Sommer.

*aconitifolius* L. Ziemlich gemein. Steigt aus der Alpenregion bis an die Bäche der Ebene, z. B. bei Chur, hinab. Findet sich häufig auf fetten Wiesen

und am Wasser, seltener auf mageren Bergabhängen, wie im Umbrail, wo er seine Gestalt sehr verändert. — Sommer.

*glacialis* L. In der subnivalen Region, selten in der alpinen. Er steht gewöhnlich auf kieselhaltigem (plutonischer Abkunft) oder thonigem Geschiebe. — Juli und August.

*pyrenæus* L. Nach älteren Angaben auf dem Bernina und im Umbrail, nach Scheuchzer in Schams, in der Rheinwalder-Alp (Pfr. Felix), im Heuthal (H. Nägeli), auf dem Maloja und der Forcola (H. Roland); auch ich habe ihn irgendwo im Gebirge gesammelt. — Sommer.

*parnassifolius* L. Nach Bovelin auf den Engadiner Bergen, von wo her ich Exemplare besitze. Nach Heer im Umbrail. — Sommer.

*Flammula* L. Auf sumpfigen Stellen, bei Zizers und anderwärts. — Juni.

*sceleratus* L. Ich fand einmal ein Exemplar bei Untervatz. — Sommer.

*montanus* Willd. Auf Bergweiden im Domleschg und bei Chur herum, wo er sich bisweilen in die Ebene herablässt. Ferner in der Churer Ochsenalp, auf der Albulahöhe (7270' s. m.), auf dem Maloja etc. — Sommer und Frühling.

\*) H. Roland, Naturforscher aus Genf, besuchte Graubünden diesen Sommer (1839) und theilte mir seine Entdeckungen mit einer Gefälligkeit mit, für die ich ihm auch hier meinen Dank abstatte.

\*\*) Der Berg-Uebergang vom Camogasker-Thal nach Livino. Die Engadiner sprechen Lavirun aus, die Liviner Levrun. Auf einer Schweizerkarte finde ich ihn unter der Bezeichnung Lavirone.

*acris* L. Auf allen Wiesen bis gegen die alpine Region, so auf der Lenzer-Heide am See (4920' s. m.). — Mai, Juli.

*lanuginosus* L. Auf dem Bizockel bei Chur, neben dem Maiensäss Schwarzwald, im Verlorenen Loch bei Tüsis, oberhalb Lax, am Heinzenberg bei Präz; immer in Wäldern der montanen und subalpinen Region. Die Haare sind oft nicht fahl. — Sommer.

*polyanthemus* L. Wächst in Laubholzwäldern oberhalb Trimmis und bei Serneus, auf mageren Boden. — Juli.

*repens* L. Bei Chur, Maiefeld etc., an Wegen u. a. O. — Mai.

*bulbosus* L. Häufig in der ganzen Rheinebene, auf berasteten Abhängen. — April und Mai.

*arvensis* L. Auf Aeckern bei Chur, sehr selten. — Sommer.

Anmerk. *R. Thora* L. der nach Muralt bei St. Moritz und im Brättigau vorkommen soll, hat seither niemand gesehen.

#### FIGARIA.

*ranunculoides* Moench. In Baumgärten und auf fetten Grasplätzen der Ebene. — April.

#### CALTHA.

*palustris* L. In allen Bächen bis in die Alpen (Gotthard-Hospitz). — April — August.

#### TROLLIUS.

*europaeus* L. Hauptsächlich in der montanen und subalpinen Region. — Mai — Juli.

#### HELLEBORUS.

*viridis* L. Am Fusse von Felsen, auf dem Sand bei Chur. — März und April.

#### AQUILEGIA.

*vulgaris* L. In Gebüsch und Wiesen der Ebene (Chur, Rodels etc.) und in der Bergregion. — Mai und Juni.

*alpina* L. Bei Nufenen und Hinterrhein (Pfr. Felix), auf dem Piz Beverin (Haller), beim Auslauf des Rosetschgletschers (Hegetschweiler), in der Jochalp bei Chur, jedoch selten (d. Verf.). Schon der alte Bauhin sammelte diese Pflanze auf den Bergen bei Pfäfers, wie aus einer Angabe seines Herbariums hervorgeht, das von Prof. De Candolle consultirt wurde. — Sommer.

#### DELPHINIUM.

*Consolida* L. Im Getreide bei Chur, Unter-Engadin etc. Auf thon- und kalkhaltigem Erdreich. — Sommer.

*intermedium* Ait. Nach H. Regierungsrath Hegetschweiler auf mehreren Alpen Graubündens. Auch im benachbarten Glarus nach ebendemselben.

#### ACONITUM.

*Lycoctonum* L. Auf Bergweiden und in Bergwäldern bis in die subalpine Region, ziemlich gemein. — Juni.

*Napellus* L. Auf unseren Bergen häufig, besonders um die Alphütten herum, auf jedem Boden. Bei Tschierschen kommt die folgende Art in Gesellschaft dieser vor. — Sommer.

*Cammarum* All. Auf dem Bizockel



beim Schwarzwald, bei Tschierschen etc.

— Sommer.

*Anmerk.* *A. Anthora* soll sich, nach einer älteren Angabe, in Graubünden finden, was weder von mir noch von anderen bestätigt werden kann.

#### ACTAEA.

*spicata* L. In Bergwäldern (bei Splügen, in Valzeina, Tarasp etc.) und bis in die Ebene von Chur herab. — Mai.

### BERBERIDEAE.

#### BERBERIS.

*vulgaris* L. (Sauerdorn). Ueberall in der Ebene und bis ziemlich hoch in die subalpine Region. — Mai.

### PAPAVERACEAE.

#### PAPAVER.

*Rhoeas* L. Im Getreide und an Wegen, nicht so häufig als die folgende, geht bis in die subalpine Gegenden; Prof. Heer fand sie bei Lavin, H. Roland bei Tarasp. — Sommer.

*dubium* L. Bei Alveneu, Thusis, Chur etc. auf Schutt und in Aeckern. — Juni.

*Argemone* L. Bei Bonaduz in Aeckern. — Mai und Juni.

*pyrenaicum* Willd. Auf den Engadiner Bergen: auf Casanna (Rösch), im Bernina Heuthal (Bövelin, Muret), auf dem Levirone (Prof. Heer und d. Verf.), am Weissensee auf dem Bernina (H. Muret und d. Verf.).

*Anm.* In Graubünden kommt *P. alpinum* L. nicht vor; seine Standorte für die Schweiz sind der Pilatus und die Savoyer-Alpen.

#### CHELIDONIUM.

*majus* L. An allen Mauern und Wegen der Ebene. — Mai — Juli.

### FUMARIACEAE.

#### FUMARIA.

*officinalis* L. (Erdrauch). In Feldern und auf unbebauten Stellen von der Ebene bis in die Bergthäler. — Sommer und Herbst.

#### CORYDALIS.

*tuberosa* DC. In Baumgärten an Zäunen und auf schattigen Wiesen der Ebene; häufig. — Frühling.

### CRUCIFERAE.

#### NASTURTIUM.

*officinale* R. Br. (Brunnenkresse). An Bächen und Brunnen bei Zizers, in Schams, Misox etc. — Vom Juni bis Herbst blühend.

*sylvestre* R. Br. Am Wege im Bodmer bei Chur. — Sommer.

*palustre* DC. Bei Bellenz in Gräben und auf der Lenzerheide an den Seen (d. Verf.), am See auf dem Bernhardin (6000') (Pfr. Felix). — Sommer.

*pyrenaicum* R. Br. In Calanca häufig, sodann bei Roveredo in Misox und im Bergell. — Sommer.

#### BARBAREA.

*vulgaris* R. Br. In Gräben hin und wieder, bei Chur etc. — Mai und Juli.

#### TURRITIS.

*glabra* L. Auf steinigten Stellen bei Ems, Thusis, Marschlins etc. — Juni.

## ARABIS.

*alpina* L. Von der alpinen Region bis in die Ebene herab, überall. — Frühling und Sommer.

*auriculata* Lam. Unterhalb Rodels an Felsen. — Mai.

*hirsuta* Scop. Bei Pfäfers und zwischen Rothenbrunnen und Ortenstein. Scheint bei uns sehr selten zu sein. — Mai und Juni.

*ciliata* R. Br. Von der alpinen Region bis in die Ebene von Chur herab (Jochberg, Ausfluss der Plessur) auf Wiesen. — Frühling und Sommer.

β. *hirsuta*. Häufig bei Chur. Unterscheidet sich von der eigentlichen *ciliata* durch die vor der Blüthe nicht überhängenden Blumen- trauben.

*Halleri* L. Ich bewahre einige Exemplare auf, die ich bei Cellarina im Ober-Engadin fand. — Juni.

*Turrita* L. Zwischen Thusis und dem Verlorenen Loch. — Juni.

*pumila* Jacq. fl. aust. 5. t. 281. An der Stilsferstrasse und in der Urdenalp. — Juni.

*bellidifolia* Jacq. Auf dem Angstberg von Mag. Rösch und mir bemerkt. — Sommer.

*coerulea* Wulf. Auf dem Scesa plana und Levirone (beides Kalkgebirg), in der Alp Segnes, auf dem Augstberg (bei Parpan) (Schiefer) in den Rheinwalder

Bergen (Pfr. Felix), auf den Scopi, Scaradra und Valzerberg (H. Nägeli). — Sommer.

## CARDAMINE.

*alpina* Willd. Im Calfeusser-Thal (Ul. v. Salis), an der Sulzfluh auf dem Fluelen (Tausend), in der Sagenser-Alp (auf Kalkgebirg) und vom Augstenberg (d. Verf.). — August.

*resedifolia* L. Auf dem Panixer-Joch (Pfr. Knecht), von mir auf der ganzen Kette vom Bernhardin bis ins Engadin bemerkt (also auf Urgebirg). — Juni — August.

*imputiens* L. Am Malstrilser Berge und in Wäldern auf dem Bizockel bei Chur (der Verf.), nach H. Roland bei Schulz. — Juni.

*hirsuta* L. Die Waldform (*C. sylvatica* Link), am Wege nach der Fürstenalp im Walde der subalpinen Region; die Wiesenform bei Felsberg und am Malstrilser Berg, im ersten Frühling blühend.

*pratensis* L. Auf Wiesen bei Chur, überhaupt in der Ebene. — Frühling.

*amara* L. In Gräben und an Bächen durch alle Regionen (die oberste ausgenommen) hindurch und in allen Thälern Graubündens. Von Sargans an bis auf den Gotthard neben dem Hospitz (6540'). — Mai — August.

Anmerk. Nach H. Hegetschweiler hätte ich im Engadin die *Card. asarifolia* gefunden. Diess ist eine irrtige Angabe, zu der ich keine Veranlassung gegeben habe.

## DENTARIA.

*polyphylla* W. et K. Oberhalb der Schlossbrücke, wo nur noch wenige Exemplare stehen, sodann weiter hinein in der Valzeina (Ul. v. Salis), neben dem Verlorenen Loch (Dr. Lenz, Ad. v. Planta und d. Verf.), und ausser Graubünden bei Matt im Kant. Glarus auf dem Schnabelhorn (3600'), und im Tös-Thal K. Zürich (Prof. Heer). Oberhalb der Schlossbrücke steht sie in einem Buchenwald, im Verlorenen Loch in einem Tannenwalde, immer auf einer hohen und lockern Humusschicht. — Mai und Juni.

*pinnata* L. Auf dem Calanda oberhalb Untervatz, ungefähr 3500' s. m. — Juni.

## HESPERIS.

*matronalis* L. Bei Chur im Steinbruch, wo neben ganz kahlen Exemplaren solche stehen deren Blätter und Stengel rauhhaarig sind und zottige Kelche haben. Wenn es richtig ist, dass eine Pflanze da zu Hause ist, wo am meisten Varietäten zu bemerken sind, und wo sie in grosser Anzahl steht, so ist Chur die Heimath dieser Pflanze, obwohl sie auf Steinschutt neben Gärten ihren Sitz aufgeschlagen hat. — Juni.

## SISYMBRIUM.

*officinale* Scop. Ueberall an Wegen, bis in die höhern Bergthäler. — Sommer.

*Sophia* L. Gemein auf Schutt, an Wegen und in Aeckern. — Sommer.

*strictissimum* L. Im Unter-Engadin (Prof. Heer und H. Roland), im Puschlav häufig (der Verf.). — Juni.

*Alliaria* Scop. Unter Hecken und an andern Stellen der Ebene, gemein. — Frühling.

*Thalianum* Gaud. In Aeckern im Oberland, bei Bonaduz, Chur, im Misox und sogar bei Hinterrhein (4800'); scheint jedoch in manchen Jahrgängen wie ausgestorben zu sein. — Mai und Juni.

## ERYSIMUM.

*helveticum* DC. Syst. Durch das untere Misox hinab, in Calanca, Münsterthal, zwischen Sils und Silvaplana die Alpenform (*E. pumilum* Gd. und *E. ochroleucum* DC.). *E. rheticum* Schl., das, nach des Sammlers eigenen Mittheilungen, auf Mauern bei Morbegno wächst, muss, wie ich mich aus dem De Candolleschen Herb. selbst überzeugt habe, hierher gezogen werden. — Sommer.

*strictum* Flora d. Wetterau. Zwischen Samaden und Cellerina am Bergvorsprunge (d. Verf.), im Unter-Engadin U. v. Salis), zwischen Zernetz und Süs (Hr. Muret), bei Guarda (H. Roland). Auch Hr. Pfarrer Knecht brachte es mir aus dem östlichen Theile des Kantons. — Sommer.

## BRASSICA.

*campestris* DC. Kommt durch die ganze montane Region als Unkraut in

den Getreide-Aeckern vor (bei Klosters, Tschierschen, im Puschlav, Unter-Engadin etc.). Es ist diess höchst wahrscheinlich die gleiche Pflanze, die Schleicher zwischen St. Pierre und Liddes sammelte und von Gaud. zu *Br. camp.* DC. gestellt wurde. Die Beschreibung De Candolle's passt genau, dagegen will mir Kochs Meinung, der sie mit *Br. Rapa* L. verschmilzt, nicht einleuchten; ich zweifle dass dieser sonst richtig sehende Pflanzenkenner unsere Pflanze zu Gesicht bekommen hat. — Juni.

#### SINAPIS.

*arvensis* L. In Aeckern, auf Schutt, gemein. — Sommer.

#### ERUCASTRUM.

*obtusangulum* Reich. Auf Sand und Steinstellen, häufig durch die ganze Rheinebene. — Juni.

#### DIPLOTAXIS.

*tenuifolia* DC. Bei Chur herum sehr häufig. Am Rheine auf dem Sande kommen ein- oder zweijährige Exemplare vor, die sich in einigen Punkten der *D. muralis* DC. nähern. — Sommer und Herbst.

#### RAPHANUS.

*Raphanistrum* L. In Aeckern ein Unkraut; geht so hoch als die Cerealien gepflanzt werden (Tawetsch). — Juni — August.

#### DRABA.

*aizoides* L. Auf dem Calanda und andern Kalkbergen Graubündens, in der

alpinen und subnivalen Region, wie fast alle D. an Felsen oder felsigen Stellen. — Sommer.

*tomentosa* Wahlbg. In der Cellerner-Alp, auf dem Calanda und Albula (der Verf.).

*frigida* Saut. Soll auf dem Splügen und im Ursern-Thal wachsen (Gaud.); ich fand sie auf dem Stelvio; Prof. Heer im Val Livino. Ich muss jedoch bemerken, dass die Pflanze vom Stelvio bedeutend grössere Blumen hat, als die der übrigen genannten Orte. — Sommer.

*Johannis* Host. Auf dem Wormser-Joch, Bernhardin (unweit des Dorfs an Felsen), Albula, Augstberg (d. Verf.).

*fladnizensis* Wulf. Nach Hegetschweiler auf dem Tödi und andern Bündnerbergen so wie auch in der Glarner Sandalp; nach Heer in den Unter-Engadiner Alpen; nach Koch ist unsere Pflanze die *D. lapponica* Willd. — Sommer.

*confusa* Ehrh. Nach U. v. Salis kommt sie in Graubünden vor; ich fand sie an der Stilsfer-Strasse, wo sie auf thonhaltigem Felsenschutt wuchs. — Sommer.

*verna* L. In Aeckern u. a. Stellen der Rheinebene, häufig. — Frühling.

#### ALYSSUM.

*calycinum* L. Bei Chur, Ems etc. auf Schutt und andern Stellen gemein. — Mai.

*montanum* L. Nach Hegetschweiler bei Haldenstein. — Mai.

## LUNARIA.

*rediviva* L. Nach Fabricius auf dem Calanda.

*annua* Moench. Nach J. Bauhin bei Chur. Ich habe weder die eine noch die andere gesehen.

## ARMORACIA.

*rusticana* Fl. d. Wett. In grosser Menge um den Teich bei Alvaschein, wo sie über Mannshoch wird. — Juni.

## KERNERA.

*saxatilis* Reich. Auf Felsen in der alpinen Region, von wo sie oft weiter herunter steigt. Die Varietät mit leierförmigen Blättern beobachtete ich an der Stilsfer-Strasse; findet sich sonst im Domleschg und bei der Schlossbrücke (auf Thonschieferformation). — Mai — Juli.

## CAMELINA.

*sativa* Crantz. In Aeckern auf der Rheinebene, nicht selten. — Juni.

*dentata* Pers. Im Getreide im obern Misox und bei Klosters im Brättigau. — Juni.

## THLASPI.

*arvense* L. Auf Feldern und Schuttstellen, von der Rheinebene an bis in's Ober-Engadin (über 5000' s. m.). — Sommer.

*perfoliatum* L. An Halden und in Weinbergen, auf kalk- und thonhaltigem Boden bei Chur und in der ganzen Umgegend, häufig. — Frühling.

*alpestre* L. In den subalpinen und alpinen Thälern, so auf Davos, im Ober-Engadin etc. — Juni und Juli.

*rotundifolium* Gaud. Auf Kalksteingerölle der subnivalen Region, so auf der Spitze des Calanda (8250'), in der Alp Segnes etc. — Juli und August.

## BISCUTELLA.

*laevigata* L. Auf allen alpinen und subalpinen Weiden und Wiesen durch das ganze Gebiet ohne Unterschied der Formation. — Mai — Juli.

## LEPIDIUM.

*sativum* L. Ich fand diese Pflanze einmal in beträchtlicher Menge auf einem Acker bei Chur; wahrscheinlich verwildert. — Im Herbst, sonst im Mai und Juni.

*campestre* R. Br. Hinter St. Luzi bei Chur, sonst nirgendwo bemerkt. — Juli.

## HUTSCHINSIA.

*alpina* R. Br. Durch die ganze Alpenkette häufig, an mancherlei Stellen der obersten Regionen. — Sommer.

## CAPSELLA.

*bursa pastoris* Moench. Ueberall und zu jeder Zeit blühend; nach Heer im Camogasker-Thal in einer interessanten Form.

## AETHIONEMA.

*saxatile* R. Br. Nach Bauhin und Pol in den rhätischen Alpen, nach Heer im Liviner-Thal; nach Muret auf der Spitze

des Berges, der von Livino nach St. Giacomo di Fraele führt, in Felsschutt. — Sommer.

#### NESLIA.

*paniculata* Desv. In Aeckern im Domleschg, bei Malix etc. — Juni.

### RESEDACEAE.

#### RESEDA.

*lutea* R. Ueberall an Wegen, auf Schutt und andern Stellen. — Sommer.

*Luteola* L. Ich fand sie im Domleschg bei Rothenbrunnen. — Sommer.

### CISTINEAE.

#### CISTUS.

*salvifolius* L. Nach Haller bei Clemen und Riva. — Mai und Juni.

#### HELIANTHEMUM.

*vulgare* DC. Ueberall auf Triften. Eine Varietät davon (*H. grandiflorum* DC.) erhebt sich in die Berge. Zwischen Sils und Silvaplana beobachtete ich ein Stöcklein mit dunkelorange-farbenen Blumen. — Sommer.

*œlandicum* Gaud. Auf dem Calanda in der alpinen Region, von wo es auch weiter herabsteigt. — Sommer.

Anmerk. *H. canum* Dun. kommt bei uns nicht vor.

*Fumana* DC. Zwischen Chur und Maladers auf Felsen und magern Weiden. — Juni.

### VIOLARICAE.

#### VIOLA.

*palustris* L. Auf Bergsümpfen in der alpinen und subalpinen Region; so am Oberalpsee, auf dem Splügen etc. — Sommer.

*odorata* L. (Veilchen). Ueberall in der Rheinebene. — Frühling.

Linné's *V. hirta*, die von der *V. odorata* nicht specifisch verschieden ist, kommt auf trockenem und härtem Boden vor, und ist fast eben so häufig als jene.

*arenaria* DC. Ich bewahre Exemplare aus Bünden auf die ich wahrscheinlich bei Chur sammelte.

*canina* L. Ueberall unter Gebüsch, in der Rheinebene und montanen Region. — Frühling.

*silvestris* Lam.? Hierher ziehe ich eine Viola, die ich auf Wiesen der subalpinen Region am Bizockel (auf Brambrüsch) fand. — Juni.

*mirabilis* L. Um die Ruine von Nieder-Juvalta (Dr. Lenz und A. v. Planta), im Calanca-Thal und bei Chur im sogenannten Todtengut (d. Verf.). — Mai.

*pinnata* L. Auf dem Valzer-Berg (Urgebirg?) (Land. Hössli), am Calanda etwas oberhalb Feldsberg, im Camogasker-Thal und Bernina Heuthal, immer auf Kalk (d. Verf.), am Bergüner Stein, nach ältern Angaben.

*tricolor* L. Auf Feldern und andern Stellen der Ebene. Eine Abart mit klei-

nern Blümchen auf Aeckern bei Chur etc. (V. t. arvensis). — Juni.

*grandiflora* Vill. In der montanen und alpinen Region. Auf dem Julier nach Prof. Heer.

*calcarata* L. Auf fast allen Weiden der alpinen Region. — Sommer.

*biflora* L. Auf schattigen, feuchten Stellen, von der alpinen Region bis in die Ebene herab. — Juni und Juli.

## DROSERACEAE.

### PARNASSIA.

*palustris* L. Auf fast allen feuchten Wiesen. Steigt in die alpine Region, wo sie merkwürdigerweise im Sommer schon blüht, während für die Ebene die Blüthezeit in den Herbst fällt.

### DROSERA.

*rotundifolia* L. Am Schwarzensee auf Davos und auf dem Torfgrunde unweit Pontresina, jenseits der Brücke die nach St. Moritz führt. — August.

*anglica* Huds. Zwischen Selva und St. Giacomo in Tawetsch (ungef. 4000' s. m.) auf gewöhnlichem Sumpfe. — Sommer. — An dieser Pflanze fangen sich die kleinen Mücken; erst bleiben sie am Saft, den die Gabeln der Blätter reichlich absondern, kleben und dann schliesst sich das Blatt (von oben nach unten) zu, ohne Zweifel durch den Reiz veranlasst, den das Thier durch seine Bewegungen macht. Alle meine

Exemplare aus Tawetsch haben gefangene Mücken. Wer erinnert sich hier nicht an die verwandte *Dionaea muscipula*?

## POLYGALEAE.

### POLYGALA.

*vulgaris* L. Kommt auf Wiesen und andern Localitäten der Ebene und montanen Region (z. B. um Casaccia) häufig vor. — Frühling.

*amara* L. An ähnlichen Stellen, oft mit obiger vermischt wachsend. Die *P. alpestris* Reich. findet sich auf Wiesen der montanen und subalpinen Region ebenfalls häufig. — Frühling.

*Chamaebuxus* L. In Laubholzwäldern und unter Heidegesträuch; an trocknen sonnigen Halden, von der Ebene bis in die subalpine und alpine Region (bei Nufenen und Bevers nach Heer) häufig. Auf Kalk und Thonschiefer-Formation. März bis Mai.

## CARYOPHYLLEAE.

### DIANTHUS.

*carthusianorum* L. Auf Bergwiesen hin und wieder, besonders häufig in Misox, Tawetsch und Lugnetz. — Sommer.

*atro-rubens* All. Nach ältern Angaben in Ursern, nach Heer in Graubünden. Ich kann nicht zwei Arten aus dieser Gruppe in unserer Gegend unterscheiden.

*collinus* W et K. Von Herrn Appellationsrichter Muret bei Brusio im Puschlav gefunden. — Sommer.

*sylvestris* Jacq. Auf dürren Halden (bei Chur) bis in die alpine Region (Ober- und Unter-Engadin, Septimer), dies- und jenseits der Alpenkette. — Juni — August.

*deltoides* L. durch die ganze montane Region Graubündens; wo sie sich ein wenig über der Grenze des Kirschbaums hält. So bei Andeer, Brigels, Klosters, Davos und Salsanna. Nach Heer bei Lavin, nach Tausend bei Guarda. Immer auf Wiesen und Weiden. — Juni — September.

*cæsius* Sm. Nach der Fl. Comense auf dem Umbrail.

*glacialis* Hænk. In einer Höhe von ungefähr 7000' s. m. auf Grasplätzen mit kalkiger Unterlage, so auf dem Levirone am Uebergange nach Livino und neben dem Piz della Padella, oberhalb Samaden. Nach der Fl. Comense auf dem Umbrail und nach Tausend auf dem Brüggerhorn. Ob die Hegetschweilersche Pflanze, die auf den Bergen zwischen Graubünden und Glarus vorkommen soll, die nämliche ist, weiss ich nicht. — August.

*superbus* L. Auf fast allen Bergwiesen. — Juni.

Anmerk. Den *D. barbatus* traf ich im Steinbruch bei Chur in einem Baumgarten; ich halte ihn jedoch nur für verwildert. Und so möchte es sich auch mit dem

*D. Caryophyllus* verhalten, den Rösch bei der obern Zollbrücke angibt, wenn anders nicht der *D. sylvestris* zu dieser Angabe Veranlassung gegeben hat.

#### TUNICA.

*saxifraga* Scop. Auf dem sattelartigen Bergvorsprung unter der Kirche in Castiel (beiläufig 3400' s. m.) (der Verf.), bei Zernetz (Prof. Heer und Chir. Tausend). — Juli.

#### GYPHOPHYLLA.

*muralis* L. Auf brachen Aeckern, zwischen Ilanz und Truns, häufig (in einer Höhe von ungefähr 2350' s. m.). — August.

*repens* L. Auf Abhängen und Felsenschutt in der alpinen Region und von hier an abwärts dem Laufe der Flüsse folgend. — Wenn es in einem pflanzengeographischen Werklein erlaubt ist, auf organische Merkwürdigkeiten aufmerksam zu machen, so bemerke ich, dass bei Chur an der Plessur ganz weibliche Pflanzen mitunter vorkommen, die eine kleinere und geschlossene Corolle haben. — Mai — August.

Anmerk. Die *G. fastigiata* L., die nach Rösch auf dem Scesaplana und nach Scheuchzer auf dem Septimer und Malöja wachsen soll, ist wohl schwerlich daselbst zu finden. Ich vermuthete, dass diesen Angaben eine Verwechslung mit *Silene rupestris* oder *Gypsophyla repens* zu Grunde liegt.

#### SILENE.

*quadrifida* L. Diese Pflanze habe ich selbst in Graubünden nicht finden kön-



nen. Ich erhielt jedoch ein Exemplar von H. Muret, der es im Scharlthal sammelte. Die Fl. Comense gibt sie auch auf dem Braulio und Camoghé an. — Sommer.

*rupestris* L. Im Bergell, Misox, Ober-Engadin (auf plutonischen Massen), auf Davos, der Lenzer-Heide und oberhalb Parpan (auf Schiefer). Findet sich sowohl in der Ebene bei Roveredo als auf den Engadiner Bergen, in einer Höhe von 6000' und darüber. — Sommer.

*saxifraga* L. Im obern Veltlin (der Verf.), im Puschlav (H. Appellationsrichter Muret). — Sommer.

*acaulis* L. Auf allen Bergen, hauptsächlich in der alpinen und subnivalem Region. — Sommer.

*nutans* L. In der Ebene an Halden und andern Stellen; steigt auch in die subalpine Region. — Sommer.

*noctiflora* L. In Aeckern bei Chur (U. v. Salis), am Wege nach Malix in wenigen Exemplaren (der Verf.). — August.

*inflata* Sm. Ueberall auf Wiesen bis in die alpine Region. — Sommer.

*pumilio* Wulf. Nach H. Heldreich aus Sachsen auf der Furka, Urner-Seite, nahe bei der Höhe. Entdeckt im J. 1824. Ich sah die Heldreichschen Exemplare selbst. Eine neue Pflanze für die Schweizerflora.

#### LYCHNIS.

*viscaria* L. Im untern Misox und bei

St. Maria in Calanca auf Abhängen und Mauern, nicht selten. — Juni.

*alpina* L. Nach Prof. Heer und dem Verfasser im westlichen Bünden (Julier, Bernina, Liviner-Thal, Levirone etc.), zwischen 5—7000' Höhe auf Wiesen und Weiden. — August.

*flos-cuculi* L. Auf sumpfigen Wiesen der Ebene (Zizers und Fläsch) und der montanen Region (Klosters); wenn ich nicht irre selbst auf Davos. — Sommer.

*vespertina* Sibth. An Wegen, in Feldern und andern Stellen gemein. — Juni.

*diurna* Sibth. In Baumgärten und andern schattigen Stellen der Ebene, von wo sie sich bis in die subalpinen Thäler erhebt. — Sommer.

*flos-jovis* L. Im Unter-Engadin, z. B. bei Lavin an Wegen (Heer), so wie auch an einer Stelle über Bevers (H. Roland). — Sommer.

#### SAPONARIA.

*officinalis* L. An steinigten Stellen der Ebene und bis in die Bergthäler. — Juli.

*ocymoides* L. An Halden bei Chur, Tarasp und bis in die alpine Region (Engadin). — Sommer.

#### ALSINEAE.

#### SAGINA.

*procumbens* L. In Aeckern im Tawetsch, bei Thusis und andern Orten an Wegen und auf Schutt, auf der Lenzer-

Heide am See (beiläufig 4800' s. m.). — Mai und Juni.

*apetala* L. Im untern Misox an Strassen, zwischen Roveredo und Bellenz. — Juni.

#### SPERGULA.

*saginoides* L. Auf Grasplätzen und feuchten Stellen in der alpinen Region, nicht selten. — Sommer.

*arvensis* L. In Aeckern im Tawetsch und der Gruob, ferner an gleichen Standorten in Savien (bis an 5000' s. m.). In tiefern Gegenden traf ich sie nirgends an. — Juli und August.

#### ALSINE.

*rubra* Wahl. Im untern Misox und bei Disentis im Oberland. — Sommer.

*lanceolata* M. et K. var. *condensata* (Arenaria cherlerioides Vill. delph. t. XLVII, schlecht jedoch erkennbar). Findet sich an Kalkfelsen unweit des Uebergangspunkts auf dem Levirone. Nach Dr. Massara nei prati di Livigno. — Juli.

*biflora* (Sabulina biflora Reich. Nach DC. Herbar. die *Stellaria biflora* L.). Ebenfalls auf dem Levirone, aber auf Rasen unweit des Uebergangs, so wie auch auf dem Stelvio, wo man nach Umbrail ablenkt (7850' s. m.). — Juni und Juli.

*laricifolia* Wahlbg. (Arenaria lar. L.) Bei Sils im Ober-Engadin (nach Haller und d. Verf.) unweit des Priorasee (Kant.

Tessin), und zwei Stunden unterhalb Worms (d. Verf.). — Juli.

*verna* Bartling. Auf fast allen unsern Bergen, hauptsächlich auf der Centralkette, in der alpinen Region. — Sommer.

*recurva* Wahl. Beim Wormser-Bad. — Juni.

*Jacquini* Koch. Ebenfalls beim Wormser-Bad. — Juni.

#### CHERLERIA.

*sedoides* L. Auf allen Bergen in der alpinen und nivalen Region (wie z. B. der Sandgrath 8600'), wo sie oft für sich allein grosse Rasen bildet. — Sommer.

#### MOEHRINGIA.

*muscosa* L. An nassen Felsen, gern im Schatten, in der montanen und subalpinen Region, häufig. — Sommer.

*polygonoides* M. et K. Auf Steingerölle in der alpinen Region, nicht selten (Calanda, Urdenalp etc.). — Sommer.

*trinervia* Clairv. In Wäldern und auf andern schattigen Stellen bei Chur. — Juni und Juli.

#### ARENARIA.

*serpyllifolia* L. Ueberall bei Chur herum, auf Weiden etc. — Frühling.

Die *A. s. viscida* DC. bei Samaden und im Rosetsch-Thale. — Juni.

*ciliata* L. Auf dem Calanda in der subalpinen Region, auf dem Augstberg am Uebergang nach Urden. — Juli — September.

*biflora* L. Nach der Alpina in Graubünden. In den Alpen von Nufenen (Pf. Felix), auf dem Scaletta, Bernina, Levirone (d. Verf.). Standort: Sand und Gruss. — Juli und August.

#### HOLOSTEUM.

*umbellatum* L. Auf Aeckern bei Chur, Reichenau und andern Orten der Ebene. April.

#### STELLARIA.

*cerastoides* L. (In Smiths Pl. icones t. 15 nach einem Exemplar des Linn. Herb.). Auf fast allen Weiden der alpinen Region, als Augstberg, Levirone etc. — Sommer.

*nemorum* L. In subalpinen Bergwäldern, auf dem Gotthard (Haller), im Rheinwald, Misox und andern Orten (d. Verf.). — Juni.

*media* Vill. (Alsine media L.). In Gärten, auf Schutt überall; auch in montanen Wäldern bei Chur. — Blüht durchs ganze Jahr.

*graminea* L. Auf feuchten Wiesen der Ebene und montanen Region. — Sommer.

*uliginosa* Murr. Bei Roveredo, Soazza und Samaden, an Quellen und in Bächlein. — Sommer.

#### MALACHIUM.

*manticum* Reich. Von der Burgruine von Misox an durch das ganze Thal abwärts in Wiesen. — Mai und Juni.

*aquaticum* Fries. (Stellaria pentagyna Gaud.). Sehr häufig in Gräben und an Wegen bei Chur, Zizers und andern Orten. — Sommer.

#### CERASTIUM.

*glomeratum* Thuil. In der Ebene bei Malans, Fläsch, Sargans, Grono und am kleinen See auf der Lenzer-Heide, also etwa 4800' hoch. — Frühling und Sommer.

*semidecandrum* L. Ohne Zweifel zu Millionen in der Rheinebene von Thusis an abwärts nach Fläsch; kommt immer auf mageren Weiden, Schutt etc. vor. — Frühling.

*triviale* Link. Häufig bei Chur, Zizers und andern Orten der Ebene, an mancherlei Standorten. — Frühling.

*latifolium* L. Durch den ganzen Kanton, in der alpinen, subnivalen und nivalen Region (Scesa-plana 9200' s.m.) an Felsen und auf Gerölle. — Sommer.

*pedunculatum* Gaud. Nach Tausend auf dem Julier, nach Prof. Heer in den Engadiner Alpen, nach H. Nägeli auf dem Levirone und nach Comolli auf dem Braulio. — Sommer.

*alpinum* L. Koch. Auf Alpenweiden, nicht selten, so in der Malixer-Alp, auf dem Albula und andern Orten, zwischen Stalla und Avers nach H. Muret. — Sommer.

*arvense* L. Ich sah es nur in subalpinen und alpinen Thälern, aber dort

häufig auf Mauern, Gerölle etc. — Sommer.

## ELATINEAE.

### ELATINE.

*Hydropiper* L. Nach Thomas in Graubünden.

## LINEAE.

### LINUM.

*catharticum* L. Auf Wiesen und andern ähnlichen Orten bis in die alpine Region. — Sommer.

## MALVACEAE.

### MALVA.

*Alcea* L. Hin und wieder in Gebüsch bei Chur, Bonaduz etc. — Juli und August.

*sylvestris* L. Ebenfalls an Wegen, neben Weinbergen bei Chur und besonders häufig bei Jenins und Maienfeld. — Sommer und Herbst.

*rotundifolia* L. An Wegen, überall in der Rheinebene. — Sommer.

## TILIACEAE.

### TILIA.

*platyphylla* Vent. Ich traf diesen Baum in Schyn und in Lugnetz wild wachsend an, sonst häufig angepflanzt. Ein merkwürdiges Vorkommen desselben ist das auf der Dole (5168' s. m.), der höchsten Spitze des Jura bei Genf. Er bleibt jedoch daselbst nur strauchartig. — Sommer.

*microphylla* Vent. Wird hin und

wieder angetroffen, jedoch immer gepflanzt. — Sommer.

Zu Chur trifft man an einigen Orten diese beiden Lindenarten neben einander an und hier ist es wo die Verschiedenheit ihrer Lebenserscheinungen auch von Nicht-Botanikern leicht bemerkt wird, so z. B. im Hofe der Kantonschule und auf dem Sande neben der Schmid'schen Wirthschaft.

## HYPERICINEAE.

### HYPERICUM.

*perforatum* L. (Johanniskraut) Ueberall an Gräben, Wegen und andern Orten; steigt auch in die subalpine Region. — Sommer.

*quadrangulare* L. (*H. dubium* Gaud.) Bei Chur in den Maiensässen (reg. subalp.), in der Malixer-Alp, bei Klosters etc. — Sommer.

*tetrapterum* Fries. (*H. quadrangulare* Gaud.) Auf wässerigen Stellen bei Ilanz und Schnaus. — August.

*hirsutum* L. Bei Thusis unweit des Verlorenen-Lochs im Walde. — Juni und Juli.

*montanum* L. In Wäldern und Gebüsch, hauptsächlich in der montanen Region (so im Ober-Bergell), jedoch auch häufig in der Ebene. — Sommer.

## ACERINEAE.

### ACER. (Ahorn.)

*Pseudo-Platanus* L. In der montanen

Region bis auf 4600' Höhe (Tawetsch und Valzeina). Wie alt dieser Baum bei uns werden kann, zeigt das ehrwürdige Denkmal zu Truns, das schon vor 400 Jahren ein ausgewachsener grosser Baum war. — Blüht im Mai.

*platanoides* L. Bei Pfäfers schon vom grossen Haller bemerkt, woselbst man noch jetzt beim Ruheplatz «mes adieux» diese und die vorige Art finden kann. Auch bei Haldenstein gewahrte ich einen Stamm dieses Baums, der übrigens bei uns sehr selten ist und nicht so hoch in die Berge steigt als der vorige. — Mai.

*campestre* L. (Massholder). Ziemlich überall in Gebüsch bis in die montane Region. — Mai.

## GERANIACEAE.

### GERANIUM.

*phaeum* L. Ich habe es von Parpan (4546' s. m.), wo es nur wenige Schritte vom Dorf entfernt in Wiesen wächst. — Juli.

*sylvaticum* L. Auf allen fetten Bergwiesen und in Wäldern bis 6000' s. m., so oberhalb St. Moritz, wo es mit dem folgenden vermischt wächst. — Sommer.

β. In Aeckern im Medelser-Thal eine kleinblumige Varietät.

*aconitifolium* L'Her. Oberhalb St. Moritz, am Wege nach der Celleriner-Alp (wenigstens 6000' s. m.) im Walde (der

Verf.), im Rosetscher-Thal (H. Roland). — Juli und August.

*palustre* L. Bei Sargans und Wallenstadt. — Juni und Juli.

*sanguineum* L. Auf steinigten Stellen hin und wieder, bei Maienfeld und Haldenstein, zwischen Bonaduz und Versam und andern Orten. — Sommer.

*pyrenaicum* L. Ueberall an Wegen und in Wiesen bis an das Ende der Kornregion (Chiamut). — Sommer.

*pusillum* L. Ziemlich häufig bei Chur, Maienfeld, Truns, Disentis und noch weiter oben im Tawetsch. — Frühling und Sommer.

*columbinum* L. Auf steinigten Stellen bei Chur, Haldenstein, Maienfeld und auch sehr häufig im Misox. — Sommer.

*dissectum* L. In Aeckern bei Brigels, also an der Grenze des Kirschbaums (3500' s. m.). Ich konnte es sonst nirgends finden. — August.

*molle* L. Bei Feldsberg, Tamins, Sargans, Maienfeld. — Mai — August.

*divaricatum* Ehrh. Bei Latsch im Tyrol unweit der Bündnergrenze. — Sommer.

*robertianum* L. An alten Mauern und Wegen, überall in der Ebene. — Sommer.

### ERODIUM.

*cicutarium* DC. In Aeckern und an Wegen. Blüht durchs ganze Jahr hindurch.

## BALSAMINEAE.

## IMPATIENS.

*noli-tangere* L. Zwischen Ilanz und Truns, in Calanca, Lugnetz, im Brättigau, bei der Molinära, am Bizockel bei Chur, überhaupt in der mont. Region in Wäldern und Gebüsch; gerne am Wasser. — Sommer.

## OXALIDEAE.

## OXALIS.

*Acetosella* L. In Wäldern und auf schattigen Stellen bis nahe an die Tannengrenze durchs ganze Land. — Frühling und Sommer.

*corniculata* L. Auf Schutt bei Bellenz. — Juni.

## CALYCIFLORES.

## CELASTRINEAE.

## EUONYMUS.

*europæus* L. In Hecken der Ebene, überall. — Mai.

*latifolius* L. Nach Scheuchzer und Gaudin bei Pfäfers. Ich konnte ihn hier nicht finden. — Mai und Juni.

## RHAMNEAE.

## RHAMMUS.

*cathartica* L. In Hecken der Ebene, überall. — Mai.

*saxatilis* L. Wurde bereits von Gesner bei Chur bemerkt, in dessen Umgegend (bis nach Reichenau) dieser Strauch nicht selten ist. Standort: dürre Halden, die mit Gebüsch bewachsen sind. — Mai.

*pumila* L. An Felsen, gewöhnlich in der alpinen Region; er steigt jedoch oft weiter herab, so am Bergüner-Stein, Lenzer-Heide und sogar bis nach Reichenau. — Mai und Juni.

*Frangula* L. In Hecken ziemlich gemein, bei Chur u. a. O. der Ebene. — Mai und Juni.

## LEGUMINOSAE.

## SAROTHAMNUS.

*scoparius* Wim. u. Grab. In den transalpinen Thälern von der Ebene an bis in die subalpinen Höhen in grosser Menge, diessseits keine Spur. Hält sich, fragt man hier natürlich, der Besenginster an die Gebirgsformation die granitischer Natur ist, oder an die süd-

liche Abdachung? Wie denn auch sei, so ist er nicht allein in diesem Falle; der Färbe- und der deutsche Ginster der *Cytisus nigricans*, *Erysinum helveticum*, so wie auch deren Parasiten, die Orobanchen, theilen dasselbe Loos. — Mai — Juli.

## GENISTA.

*tinctoria* L. Im Bergell und Misox. — Sommer.

*germanica* L. Im Misox, sowohl oberhalb als unter dem Dorf Misocco; bei der Ruine traf ich häufig eine Pflanze an, die buschig, niedrig und ohne Dornen war, die aber im übrigen dem deutschen Ginster ganz glich. Nachdem ich meine Exemplare genau und mit Beziehung auf den Standort betrachtet hatte, überzeugte ich mich, dass sie ihr eigenthümliches Aussehen dem Umstand verdanken, in Wiesen gewachsen zu sein, die jährlich gemäht werden. Koch erhielt die nämliche Pflanze von Biasoletto, weiss aber nicht, was er aus ihr machen soll. — Sommer.

## CYTISUS.

*nigricans* L. Bei Soglio, Brusio und Grono. — Juni.

## ONONIS.

*spinosa* L. Auf dürrer und auf nassen (neben dem Zizerser-Ried) Triften nicht selten. — Sommer und Herbst.

*repens* L. An Halden und andern dürrer Stellen, so wie auch auf Wiesen,

bei Chur, Maladers, Alvenen u. a. O. gemein. — Juni.

*rotundifolia* L. Im Schalfigger-Thal und durch die Plessur auf dem Rheinsand geführt. — Juni.

## ANTHYLLIS.

*Vulneraria* L. Von den Wiesen der Rheinebene an bis in die Alpenweiden; ich traf sogar kleine Exemplare in der subnivälen Region unter dem Piz della Padella an. Die ochergelbe Var. fand ich bisher in den subalpinen Weiden und Wiesen der transalpinen Thäler und bei Sils im Ober-Engadin. — Frühling und Sommer.

## MEDICAGO.

*sativa* L. Auf Wiesen der Rheinebene, wo sie so gut als einheimisch zu betrachten ist. Zwischen dieser und der folgenden Art gibt es oft Uebergänge (vielleicht hybride Pflanzen), deren Blumen eine sonderbare schmutzige Farbe haben, die sowohl an das Blau der Luzerne als an das Gelb der *M. falcata* mahnen. — Juni.

*falcata* L. Auf dürrer Stellen fast überall, so bei Chur, im Oberland, Unter-Engadin, Hochgericht Belfort. — Juni.

*lupulina* L. Auf Wiesen und an Wegen häufig. — Mai.

*minima* L. Bei Chur, Thusis, im Domleschg, Haldenstein, auf sehr mageren dürrer Weiden und Halden. — Mai und Juni.

## MELILOTUS.

*officinalis* Willd. In Wiesen, an Gräben und andern nassen Stellen der Ebene, nicht selten. — Sommer und Herbst.

*vulgaris* Willd. An Wegen und unbebauten Stellen bei Chur u. a. O., gemein. — Sommer.

## TRIFOLIUM.

*pratense* L. Ueberall auf Wiesen. — Mai und Juni.

*medium* L. In der montanen und alpinen Region, so in Valzeina, Samaden, in der Parpaner-Alp u. a. O., auf Weiden und unter Gebüsch. — Sommer und Herbst.

*alpestre* L. Bei Castaneto, zwischen Grono und St. Maria, an beschatteten Bergabhängen. Bei Fettan (Prof. Heer). — Juni und Juli.

*rubens* L. Bei Chur, Trimmis und Waltensburg, meist in Gebüsch an Halden. — Juni — August.

*arvense* L. Im Bergell und bei Waltensburg im Oberland. Standort: Aecker. — August.

*fragiferum* L. Auf nassen Stellen bei Ilanz, Schnaus, Maiefeld. — Sommer.

*alpinum* L. Auf Alpenweiden im Rheinwald, Engadin, Davos, Lenzer-Heide, Maloja, Flüela und andern Orten, nicht selten. — Sommer.

*montanum* L. Auf Weiden und Wiesen der montanen Region. — Sommer.

*repens* L. Häufig auf Wiesen, beson-

ders gerne in neuen Aufbrüchen. Erscheint so schnell, dass man ihm eine spontane Entstehung bei uns zuschreibt. — Mai — Herbst.

*caespitosum* Reyn. Auf fast allen besseren Weiden in der alpinen Region. — Sommer.

*badium* L. Sehr häufig auf allen Weiden der alpinen Region, steigt selten aus ihr herunter. — Sommer.

*agrarium* L. Im Bergell, bei St. Maria (in Calanca) und bei Truns im Oberlande. — Sommer.

*procumbens* L. An Wegen und auf Weiden, häufig in der Ebene und der montanen Region. — Juni — Herbst.

*filiforme* L. Nicht sehr häufig bei uns; ich fand blos bei Bonaduz auf nassen Plätzen der Reichenauer Ebene und bei Grono in Misox Exemplare. — Juni und Juli.

*chrysanthum* Gaud. Bei Bellenz, Grono und Clefen (Prof. Heer).

## DORYCNium.

*suffruticosum* Vill. Bei Fläsch, Malans, Chur und andern Orten dieses Reviers, auf magern Weiden und an Halden. — Juni.

## LOTUS.

*corniculatus* L. Auf allen Wiesen der Ebene und Berge. Steigt in die alpine Region; so findet er sich in der Parpaner-Alp, Samaden etc. — Frühling und Sommer.



*sepium* L. In Wiesen und an Hecken, häufig. Steigt auch in die subalpinen Thäler. — Sommer.

*sativa* L. Findet sich, vermuthlich verwildert, hin und wieder. — Sommer.

## LATHYRUS.

*tuberosus* L. In Aekern der Ebene, bei Chur u. a. O. — Sommer.

*pratensis* L. In Hecken und Wiesen, von der Ebene bis in die subalpine Region. — Sommer.

*sylvestris* L. An Halden, Rainen und in Gebüsch, gern auf Gestein, bei Chur und in der Herrschaft. — Juni und Juli.

## OROBUS.

*vernus* L. Erscheint im Frühling an Waldrändern und in Wäldern und Gebüsch, sowohl in der Ebene als in montanen Gegenden.

*tuberosus* L. Bei uns in Bergwäldern und subalpinen Wiesen, im Lürlibad im Rauber'schen Maiensäss bei Chur. — Mai.

*luteus* L. In Gestein bei Bategna (auf dem Calanda in der subalpinen Region) und weiter unten am Fusse des Mastrilser-Bergs. — Mai — Juli.

*niger* L. Im Gebüsch auf steinigten Stellen der Ebene; bei Reichenau, Malans etc. — Frühling.

Anmerk. Die *Galega officinalis*, die bei Luzein wachsen soll, möchte wohl der *Orobus luteus* sein. Sie kommt jedoch in der italienischen Schweiz vor.

## AMYGDALAEAE.

## CERASUS.

*caproniana* DC. Hin und wieder bei Chur, vielleicht verwildert. — April.

*Mahaleb* DC. Am Ausgang des Münstertals gegen das Tyrol, wenn mein Gedächtniss nicht irrt. Ich besitze kein Exemplar aus Graubünden. — Mai.

*Padus* DC. (*Lasi*, auf romanisch Lausas oder Lasas). Im ganzen Lande in der montanen und subalpinen Region. Standorte sind Malix, Chürwalden, Ilanz, Nufenen, Hinterrhein etc. — Mai.

## PRUNUS.

*spinosa* L. Ueberall in Hecken. — April.

## SPIREACEAE.

## SPIRAEA.

*Aruncus* L. In montanen Wäldern bei Chur u. a. O. nicht selten. — Juni.

*Ulmaria* L. An Bächen und auf nassen Wiesen bis an das Ende der Kirschbaum-Grenze (Valzeina, Praden etc.). — Sommer.

*Filipendula* L. Auf der Ebene bei Worms (Bormio) (5860'), und nach H. Roland im Ober-Engadin. — Juni.

## DRYAS.

*octopetala* L. Auf allen magern Weiden der alpinen Region, von wo sie bisweilen bis in die montane heruntersteigt, so bei Chur auf dem Städeli. — Frühling und Sommer.

## GEUM.

*rivale* L. Auf sumpfigen und nassen Wiesen der montanen, subalpinen und alpinen Region. — Juni und Juli.

*inclinatum* Schleich. (Meine Varietät vom *G. rivale*). In der Fürstenalp oberhalb Trimmis. — Juli. (Ist wohl eine hybride Pflanze von der vorigen und der folgenden abstammend.)

*montanum* L. Auf Weiden der alpinen und der subalpinen Region. — Juni.

*reptans* L. An Felsen der nivalen Region nicht selten; so oberhalb Jenatz (nach Rösch) auf dem Parpaner-Horn, Augstberg, in den Savier-Alpen (nach d. Verf.), auf dem Sandgrath in einer Höhe von 8600' (H. Nägeli aus Zürich). — August.

## RUBUS.

*ideus* L. (Himbeere). In abgegangenen Wäldern der montanen und subalpinen Region häufig. — Juni und Juli.

*cæsius* L. An Bächen und in Gebüsch, häufig in der Ebene. — Juni.

*fruticosus* L. Diesseits der Wasserscheide nie in der Ebene, sondern immer in abgegangenen Wäldern der montanen Region; jenseits häufig an Wegen bei Brüs. — Juni.

Der *Rubus tomentosus* (nach dem DeCandolle'schen Herbarium) am Wege von Feldsberg nach der Feldsberger-Alp in Gesellschaft des *Galii rubri*.

*saxatilis* L. In Bergwäldern der sub-

alpinen Region, nicht selten bei Chur herum. — Mai und Juni.

## FRAGARIA.

*vesca* L. In Wäldern überall. — Mai und Juni.

*elatio* Ehrh. Bei Rothenbrunnen und Ortenstein an Abhängen. — Mai.

## POTENTILLA.

*rupestris* L. Nach Rösch bei Disentis, nach dem Verf. ebendasselbst und bei Truns. — Juni.

*Anserina* L. Ueberall an Wegen bis in die alpine Region (Samaden). — Sommer.

*recta* L. Bei Roveredo im Misox, in der Nähe von Weinbergen. — Juni.

*argentea* L. An Wegen, auf Mauern, von der Ebene bis zur Grenze des Kirschbaums: bei Chur, im Puschlav bei Brusio, im Misox, bei Klosters und Disentis. Bei Süs und Lavin (Tausend), bei Schulz (Roland). — Sommer.

*reptans* L. Ueberall an Wegen bei Chur, im untern Misox u. a. O. — Sommer.

*aurea* L. (P. Halleri Ser.) Auf allen alpinen und subalpinen Weiden. — Sommer.

*salisburgensis* Hänk. Auf dem Calanda in der subalpinen Region, bei der Schlossbrücke auf dem Flussgeschiebe der Lanquart, auf dem Splügen nach dem Haller'schen Herbarium, und wahrscheinlich noch mehrfach anderwärts,

## TETRAGONOLOBUS.

*siliquosus* Roth. Auf feuchten Stellen, häufig in der Rheinebene und deren Bergabhängen. — Frühling und Sommer.

## COLUTEA.

*arborescens* L. Zwischen Feldsberg und Tamins, oberhalb Trimmis am Wege nach Talein, an Halden. — Mai und Juni.

## PHACA.

*frigida* L. Auf dem Lukmanier und bei St. Moritz (nach ältern Angaben), bei Nufenen (Pfr. Felix), auf dem Maloja (H. Roland), im Ober-Engadin auf dem Bernina und in der Cellerner-Alp, sowie auf dem Montellin bei Chur und in der Carmenna (d. Verf.); hält sich stets auf abhängigen grasreichen Weiden der alpinen Region. Sommer.

*alpina* L. Durch das ganze Ober-Engadin bis 6420' s. m. (so beim Weissenstein), sodann, nach Pfr. Felix, auch im Rheinwald; hält sich ebenfalls auf abhängigen Weiden auf. — Juli und August.

*australis* L. (Jacq. misc. v. 2. t. 2.) Bei Nufenen, auf der Lenzer-Heide, auf dem Albula unweit des Weissensteins und bei den Wormser-Bädern, immer auf Schiefer oder Kalk, gerne in grobem Steingerölle. — Mai — August.

*astragalina* DC. Auf alpinen Weiden bei Chur herum, auf der Lenzer-Heide, nicht selten. — Sommer.

## OXYTROPIS.

*campestris* DC. Ursprünglich auf abhängigen magern Weiden der alpinen Region, von wo sie sich auf Steingerölle der subalpinen Region herablässt. Ist durchs ganze Engadin, Rheinwald, Oberland, Hochgericht Belfort sehr gemein und steigt nicht selten bis 7000' s. m. — Sommer.

*sordida* DC. Am Pass nach Scharl nach Prof. Heer.

*pilosa* DC. Bei Chur auf dem Bizockel (Thonschiefer) an Felsen in der subalpinen Region; von hier und andern dergleichen Orten steigt sie in das Flussgeschiebe der Plessur und Lanquart herab, wo sie schon im Mai blüht. — Sonst im Juni und Juli.

*lapponica* Gaud. Wurde mir aus dem Rheinwald von Landammann Hösli mitgetheilt. Auch auf dem Albula nach E. Thomas und meiner eigenen Erfahrung.

*montana* DC. Auf alpinen Weiden des Ober-Engadins (über 6000' s. m.), in der Carmenna, auf dem Joch u. a. St. — Sommer.

*uralensis* DC. Nach Pol zwischen dem Münsterthal und Worms auf dem Umbrail nach Dr. Lenz und A. v. Planta am südlichen Abhange des Gotthards. In der Alp Urschein und Remus nach Prof. Heer. — Juni und Juli.

## ASTRAGALUS.

*Onobrychis* L. Im Unter-Engadin

häufig (Ul. v. Salis, Prof. Heer und H. Roland) am Ausgange des Münsterthals nach Tyrol (d. Verf.). Auf Weiden und an Felsen. — Sommer.

*Cicer* L. Zwischen Katzis und Thusis (Gaudin), unweit Lenz und zwei Stunden unter Worms (der Verf.). — Juni und Juli.

*glyciphyllus* L. In Gebüsch hin und wieder von der Ebene bis in die mont. Region (Sais und Schulz). — Juni.

*excapus* L. Nach Sieber bei Glurns im Tyrol, unweit der Bündner-Grenze.

*monspessulanus* L. Findet sich nicht selten an sonnigen Halden der montanen Region, so bei Rothenbrunnen, Ems, Alveneu, Worms. — Mai und Juni.

#### CORORILLA.

*Emerus* L. In Hecken der Ebene, häufig. — Mai.

*vaginalis* Gaud. In den rhätischen Alpen (Dek. Pol), auf dem Montellin und bei Alveneu (d. Verf.). Findet sich auf Weiden der alpinen Region und tiefer unten gerne unter Gebüsch. — Mai — Juli.

*montana* L. Zwischen Feldsberg und Reichenau bei der sogenannten Rüfi, auf Kalksteingeröll. — Juni.

*varia* L. Nach Heer im Unter-Engadin bei Lavin und Fettan. — Ich fand sie im obern Veltlin. — Juni.

#### HIPPOCREPIS.

*comosa* L. Auf Wiesen und Weiden von der Ebene an bis in die alpine Re-

gion. Blüht vom Frühling an bis in den Sommer.

#### HEDYSARUM.

*obscurum* L. Auf fast allen alpinen Weiden. — Juni und Juli. Diese Pflanze möchte sehr zu berücksichtigen sein, wenn es sich darum handelt künstliche Wiesen in den höhern Gegenden unserer Berge anzulegen. In der Jochalp bei Chur findet sich eine Wiese (eine eingezäunte, gedüngte Stelle zum Abmähen bestimmt), die wegen der Güte des Heu's das sie liefert in der Umgegend berühmt ist. Auf ihr wächst hauptsächlich Meum Mutellina und Hedysarum obscurum.

#### ONOBRYCHIS.

*sativa* Lam. Auf vielen Wiesen und andern Stellen bis in die subalpine und alpine Region, so bei Samaden, auf dem Montellin etc. — Mai — Juli.

#### VICIA.

*hirsuta* Koch (Ervum hir. L.). Im untern Misox, von Dorf Misocco an und bei Clefen. — Juni.

*tetrasperma* Koch (Ervum t. L.). Bei Chur auf Gartenauswurf, selten. — Juni und Juli.

*sylvatica* L. In montanen Wäldern bei Chur, Bonaduz, Tarasp etc. Oberhalb Parpan in der alpinen Region, auf offenen grasreichen Weiden (über 6000' s. m.). — Sommer.

*Cracca* L. Ueberall in Wiesen und Gebüsch bis in die subalpinen Thäler. — Sommer.

jedoch seltener als vorstehende. — Mai und Juni.

*verna* L. Ueberall in der Ebene, an Halden, Felsen und auf magern Weiden, steigt auch in die Berge. — Frühling.

*grandiflora* L. In der subalpinen und alpinen Region auf Grasplätzen und in Wäldern; bei Chur auf dem Joch, am Hinterrhein, bei Samaden. — Juli.

*minima* L. In der alpinen Region auf Grasplätzen u. a. St.; auf den Bergen bei Chur (Hegetschweiler), auf dem Gurgeletsch (Tausend), in der Thäli-Alp bei Nufenen (Pfr. Felix), in der Sagenser-Alp neben Segnes und auf dem Sträla, an beiden Orten auf Kalkgebirg (d. Verf.). — Sommer.

*frigida* Vill. Nach Heer und Muret auf dem Stelvio; ich fand sie auf der Granitspitze neben dem Piz della Padella bei Samaden in einer Höhe von wenigstens 8000' s. m. und H. Nägeli auf dem Sandgrath in einer Höhe von 8600'. — August.

*alba* L. Auf der Erhöhung von Canova, etwa 100 Schritt von der Burgruine entfernt. — Mai.

*caulescens* L. An Felsen bei Haldenstein, Alveneu, in Avers und bei der Schlossbrücke. — Juli und August.

*Fragaria* Sm. Zu Malans hinter dem Bodmer. — Mai.

*Tormentilla* Sibth. Auf feuchten Wiesen der Ebene und subalpinen Region.

#### SIBBALDIA.

*procumbens* L. In der alpinen Region auf Weiden nicht selten; im Engadin, auf dem Augstberg bei Malans u. a. O. — Sommer.

#### COMARUM.

*palustre* L. An sumpfigen Stellen zwischen Ponte und der Au im Engadin, am Schwarzensee auf Davos, im Bernina-Thal und auf dem Torfgrunde unweit Pontresina neben *Vaccinium Oxycoccus*. — Juli und August.

#### AGRIMONIA.

*Eupatorium* L. An Wegen, Halden u. a. O. der Ebene, nicht selten. — Sommer.

### SANGUISORBEAE.

#### ALCHEMILLA.

*vulgaris* L. Auf Wiesen in der Ebene, bis auf die Alpenweiden. — Sommer.

Eine Abänderung (?) davon, die *Alch. montana* Schleich. am Hügel, an welchen das Dorf Bernhardin angelehnt ist.

*fissa* Schummel. In der Alp Segnes (in der Höhe von beiläufig 7000') und noch anderwärts. — August.

*alpina* L. Auf allen Alpenweiden, von wo sie zuweilen bis gegen die montane Region herabsteigt. — Sommer.

*pentaphyllea* L. Auf dem Splügen und Gotthard (nach ältern Angaben), auf den Medelser-Bergen und dem Bernhardin (in der Höhe von ungefähr 6000').

(der Verf.). Scheint sich somit an die granitischen Formationen zu halten. — Juni — August.

#### SANGUISORBA.

*officinalis* L. In Wiesen der subalpinen und alpinen Thäler, oft so häufig, dass sie für die Physiognomie dieser Gegenden charakteristisch wird. — Sommer.

#### POTERIUM.

*Sanguisorba* L. An Halden, Wegen u. a. St. der Ebene häufig. Soll nach einer Angabe bis auf 7000' Höhe in die Berge steigen (siehe Catalogue des plantes vasculaires du cant. de Vaud). — Frühling und Sommer.

### ROSACEAE.

#### ROSA.

*alpina* L. In montanen, subalpinen und alpinen Bergwäldern, häufig; im Ober-Engadin, wo sie wie andere Waldpflanzen, über die gewöhnliche Grenze hinausgeht. — Sommer.

*R. alp. pyrenaica.* Bei Augio im Calanca-Thal. — Juni.

*rubrifolia* Vill. Am Ende der mont. Region. Bei Klosters, an den Wiesen, in Calanca. — Juni und Juli.

*canina* L. Ueberall in Hecken, die Abänderung mit tomentosen Blättern in montanen Thälern, wie Schams und Inner-Brättigau. — Juni.

*rubiginosa* L. Bei Chur, Maladers und vielfach anderwärts. — Juni.

*villosa* L. (excl. *R. tomentosa*). Beim Dorf Misocco. Ende Juni blühend. Ich führe hier die Synonymen dieser Pflanze nach dem De Candolle'schen Herbarium an. Exemplare dieser Species kommen unter folgenden Arten vor: *R. rubiginosa*, *cretica*; *R. tomentosa mollis* in herb. non in Prod.; *R. villosa*, *nuda*.

*tomentosa* Sm. Bei Chur und Haldenstein, wahrscheinlich noch mehrfach anderwärts. — Juni.

*arvensis* Huds. Auf dem Mastrilser-Berg (U. v. Salis), zwischen Schiers und Grösch und auf der Steig (d. Verf.). — Juni und Juli.

### POMACEAE.

#### CRATAEGUS.

*Oxyacantha* L. Ich bin nicht sicher, den wirklichen *C. Oxyacantha* in Graubünden gefunden zu haben. Die folgende Species ist dagegen sehr häufig.

*monogyna* Jacq. Bei Trimmis, Chur, Truns im Oberland und grosse Stämme bei Rothenbrunnen. — Mai.

#### COTONEASTER.

*vulgaris* Lindl. Oberhalb St. Moritz in Gebüsch an Felsen, in der Parpaner-Alp, an beiden Orten beiläufig 6000' s.m. — Juni.

*tomentosa* Lindl. Bei Chur in Bergwäldern, so im Lürlibad und Schwarzwald. — Mai.

#### PYRUS.

*Amelanchier* Willd. Fast überall an

Halden, bei Chur, Feldsberg, Trimmis u. a. O. — Mai und Juni.

*Aria* Ehrh. Geht etwas über die montane Region hinaus, so auf Runkelier bei Chur. Findet sich übrigens am Mastrilser-Berg u. a. O. — Mai und Juni.

*Aucuparia* Gärtn. In montanen und subalpinen Wäldern, überall in Bünden. — Mai und Juni.

*Chamae-mespilus* Lindl. In der alpinen Region auf dem Bizockel, Scesa-plana und andern Bergen. — Juni.

## GROSSULARIEAE.

### RISES.

*Uva-crispa* L. Ueberall in Hecken und Gebüsch, bei Chur und andern Orten. — April.

*alpinum* L. Auf dem Calanda bei Bategna (subalpine Region) und wahrscheinlich noch mehrfach anderwärts. — Juni.

*rubrum* L. Bei Lavin im Unter-Engadin (Heer), bei Chur selten an Bächen und in Gebüsch (vielleicht verwildert), auf Davos (d. Verf.). — März — Mai.

*petraeum* Wulf. In subalpinen Gegenden, so über Splügen und Hinterrhein. Nach Regierungsrath Hegetschweiler bei St. Moritz. Ist nicht constant von voriger Art verschieden, deren Stamm-pflanze sie wahrscheinlich ist. — Juni.

## CUCURBITACEAE.

### BRYONIA.

*alba* L. Zu Chur in einer Hecke unweit des Winterbergs, am Wege nach dem Voral, wo ungefähr 10 Stauden stehen mögen. — Juni und Juli.

*dioica* L. Diese Pflanze habe ich in Bünden nirgends angetroffen, wohl aber unweit unserer Grenzen bei Latsch im Tyrol, wo sie häufig ist. — Juni.

## PORTULACEAE.

### PORTULACA.

*oleracea* L. Bei Grono in Misox; diesselts selten; ich beobachtete sie blos in einem Acker bei Chur, in welchem ein Jahr ums andere Mais gepflanzt wird; in den Jahrgängen der Kartoffeln bleibt sie aus. — Sommer.

### MONTIA.

*fontana* L. Auf Davos (U. v. Salis), bei Soazza (1700') und Truns (ungefähr 2200') (d. Verf.). Kommt in Wassergräben und Bächlein vor. — Juni — August.

## PAROXYCHIEAE.

### HERNIARIA.

*glabra* L. Nach einer Angabe in der Alpina in Bünden. Ich fand sie auf der Ebene unter Samaden jenseits des Inns und bei Waltensburg. — Juli und August.

*alpina* Vill. Neben dem Rothenhorn am Uebergange von Parpan nach Urden (7000?) auf sandhaltigen kahlen Plätzen. — August und September.

## SCLERANTHEAE.

### SCLERANTHUS.

*annuus* L. Im Oberland, Engadin (unweit Cellerina 5200' ungefähr), im Misox und bei Klosters, in Aeckern, an verschütteten Stellen und andern Orten. — Sommer.

*perennis* L. Bei Soglio auf der Treppe. — Sommer.

## CALLITRICHINEAE.

### CALLITRICHE.

*verna* L. (?) In Gräben bei Sargans. — Mai.

*minima* Hoppe. Hierher ziehe ich die Pflanze, die sich in allen Pfützen der subalpinen und alpinen Region findet und im Sommer zum Vorschein kommt. Erinnerung ist sie mir noch von Samaden, Salsanna und aus der Gegend zwischen Stella und der Septimer-Höhe.

## HALORAGEAE.

### MYRIOPHYLLUM.

*spicatum* L. Im Canover-See im Domleschg. — Sommer.

*verticillatum* L. Auf dem Zizerser-Ried und bei Sargans in Gräben. — Mai.

## TAMARISCINEAE.

### MYRICARIA.

*germanica* Desv. (*Tamarix* germ. L.) Auf Flussbeeten überall; steigt in die untern Alpenthäler (Davos 4360'). — Juni und Juli.

## LYTHRARIEAE.

### LYTHRUM.

*Salicaria* L. An Bächen und stehendem Gewässer der Ebene. — Sommer und Herbst.

## ONAGRARIEAE.

### CIRCAEA.

*Lutetiana* L. In Wäldern und andern schattigen Stellen, bis in die montane Region (Valzeina). — Sommer und Herbst.

*intermedia* Ehrh. Zwischen Valz und Lugnetz, und zwischen Ilanz und Tavannasa an der Strasse. — August.

*alpina* L. In dunkeln Bergwäldern (3000') im Oberland und im Brättigau bei Serneus, oberhalb Seewis, bei Valzeina, Furnen und Jenaz. — August.

### EPILOBIUM.

*angustifolium* L. In abgetriebenen Bergwäldern und längs den Bächen, bei Chur u. a. O. — Sommer.

*Fleischeri* Hochst. Findet sich auf Flussgeschieben bei Bergün, Tarasp, Davos und im Ober-Engadin. Ob die



Exemplare, die ich bei Grono fand, hier oder zum E. Dedonaci gehören, kann ich nicht entscheiden, da ich sie jetzt nicht unter den Händen habe. — Sommer.

*hirsutum* L. An Bächen und in Hecken bei Chur und Zizers. — Sommer und Herbst.

*molle* Lam. Auf sumpfigen Stellen bei Ilanz, Alveneu, Zizers. — August.

*montanum* L. An Gräben und Bächen in der Ebene bis in die subalpinen Thäler (Savien, Oberland etc.), häufig. — Sommer.

*trigonum* Schr. In der Carmenna, Langwies, etwas unter der Fürstenalp, immer in einer Höhe von ungefähr 5000' s. m. auf fetten Grasplätzen oder an Gräben und Bächen. — Sommer.

*roseum* Schreb. Bei Ilanz und Truns, im Dorfe Peist (3460'). Hier und wohl noch anderwärts an Brunnen und Bächen. — Juli und August.

*tetragonum* L. Zwischen Roveredo und St. Vittore an einem wasserreichen Abhange. — Juni.

*palustre* L. Im Ober-Engadin, bei Ilanz, Tschierschen u. a. O. an Wassergraben häufig. — Sommer.

*organifolium* Lam. Nach Hegetschweiler in Bünden. Ich fand es (zwischen 5—6000') im Medelser-, Rosetscher- und Liviner-Thal, immer an Bächen. — Juli und August.

*alpinum* L. An Alpenbächen und versumpften Stellen der alpinen Region, durch ganz Bünden. — Sommer.

#### OENOTHERA.

*biennis* L. Auf Dämmen bei Chur, Zizers und jenseits der Berge bei Grono. Juni — Herbst.

### CRASSULACEAE.

#### RHODIOLA.

*rosea* L. Im östlichen Theile des Kantons (Prof. Heer), bei Hinterrhein (Land. Hössli und Pfr. Felix), auf der Scaradra (7000') (H. Nägeli aus Zürich). — Sommer.

#### SEDUM.

*Telephium* L. Bei Chur auf Mauern und in Weinbergen, wo ich es aber nie blühen sah; viel häufiger und mit Blüthen kommt es auf Gestein und Mauern von Ilanz an bis nach Disentis vor. — August.

*maximum* L. Bei Lavin nach Prof. Heer.

*villosum* L. Ich fand es im Rosetscher Thal, unweit der Alphütten (beiläufig 6000'), auf sumpfigem Boden. Auch Pfr. Knecht brachte es mir vor einigen Jahren aus dem östlichen Theil des Landes. — August.

*atratum* L. Auf allen unsern Bergen in der alpinen Region, wohl auch höher und tiefer. Ich besitze sie vom Augstberg (bei Parpan), Augstenberg (bei Malans), Calanda, Stelvio, Malixer-Alp

und aus dem Engadin. Diese Pflanze ist meist einjährig; ich fand jedoch auch Exemplare mit sterilen Schossen, so dass ich auf die Vermuthung geführt wurde, es möchte sich hier ein Verhältniss wiederholen, das zwischen dem *S. annuum* und *S. repens* besteht.

*annuum* L. (Reich. ic. n. 1133). In den montanen Thälern bis auf die Höhe von 6000'. Unter den vielen Standorten nenne ich blos Bergell, Schams, Misox, Augstenberg. — Juni — August.

*album* L. Ueberall auf Mauern bis in die subalpinen Thäler. — Sommer.

*dasyphyllum* L. Bei Sils im Domleschg, bei Andeer und bei Chur am Wege nach Maladers. — Sommer.

*acre* L. Auf Mauern und an Wegen bis an die Grenze des Kirschbaums (3500'), häufig. — Sommer.

*sexangulare* L. Häufig in der Rheinebene und jenseits der Berge auf Mauern und dürrn Weiden; geht ebenfalls bis an die Grenze des Kirschbaums (z. B. an den Wiesen mit dem vorigen vermischt wachsend). — Sommer.

*repens* Schleich. (Reich. ic. n. 1134). Gaudin hat es irgendwo in Bünden gefunden. Ich sammelte es auf dem Bernhardin und Augstenberg. Nach Comolli auf dem Umbrail und im St. Jakobsthal: — Juni.

*reflexum* L. Im obern Veltlin und durch ganz Misox, vom Dorfe Misocco an abwärts. — Sommer.

## SEMPERVIVUM.

*tectorum* L. Wild wachsend wird die Hauswurz in den subalpinen und alpinen Thälern Graubündens nicht selten gefunden, so auf Davos, im Rosetscher-Thal, in Ursern, Leventiner-Thal etc.; häufig auch auf Dächer und Mauern gepflanzt. — Sommer.

Ob wohl eine gelbblühende Pflanze, die ich im Rosetscher-Thal neben der gewöhnlichen fand, zu *S. Wulfenii* Hoppe gehört, kann ich in diesem Augenblicke nicht entscheiden.

*montanum* L. Häufig in der alpinen Region, im Ober-Engadin, auf den Bergen bei Chur etc. — Sommer.

*arachnoideum* L. In unzähliger Menge an Halden und Mauern des Ober-Engadins, im Misox, Bergell, auf dem Calanda, bei Andeer u. a. O. — Sommer.

Noch besitze ich ein Exemplar eines *Sempervivum*, das ich von Pfr. Knecht vor mehreren Jahren erhielt. Es wurde von ihm auf dem Stelvio gesammelt und scheint gelbe Blumenblätter gehabt zu haben. (Vielleicht *S. Braunii* Funk?)

*Wulfenii* Hoppe. Auf der Rosetschinsel (Prof. Heer).

## SAXIFRAGEAE.

### SAXIFRAGA.

*Cotyledon* L. In der Via-mala, sowie jenseits des Splügens, im Misox, im Ursern- und Leventiner-Thal häufig bei

den Hütten der Zaportalp ungef. 6800' (Heer). — Sommer.

*elator* M. et K. Nach Koch am Fusse des Berges Umbrail bei Bormio (wahrscheinlich aus Gaudin).

*Aizoon* L. Von der alpinen Region bis in die montane herunter, an Felsen durch das ganze Land, am liebsten auf Kalkgestein. — Sommer.

*mutata* L. Am Calanda in der mont. Region zwischen Vettis und Pfäfers; höher oben auf der Seite von Feldsberg. — Sommer.

*Vandelli* Sternb. Nach Ulys. v. Salis an Felsen bei Bormio, nach Prof. Heer zwischen Livino und St. Giacomo di Fræle, auf dem Fräla nach dem Herb. von Haller, Sohn. — Sommer.

*cæsia* L. Häufig auf allen unsern Kalkbergen, hauptsächlich in der alpinen Region; wenn ich nicht sehr irre, habe ich sie auch zwischen Thusis und Splügen bemerkt, wo Thonschieferformation ist. — Sommer.

*oppositifolia* L. Von der Spitze des Scesa-plana (9200' s. m.) an, wo sie noch an geschützten Stellen in Felsenritzen gedeiht, bis in die Felsen der Schlossbrücke; auf granitischem Gestein auf dem Bernhardin, Valzer-Berg und Rosetsch. — Juni und Juli.

*biflora* All. Auf Mergel oder Thonschiefergerölle, in der Alp Segnes (d. V.), auf den Bergen zwischen Glarus u. Grau-

bünden (Hegetschweiler), im Rheinwald (Pf. Felix). — Sommer.

*aspera* L. Bei Splügen und Hinterrhein nach ältern Angaben; zwischen Zernetz und Süs (H. Roland); im Ober-Engadin nicht selten (d. Verf.), auf dem Rothenhorn (Tausend). — Sommer.

*bryoides* L. Auf dem Sandgrath in einer Höhe von 8600' (H. Nägeli), auf dem Septimer, Splügen, Augstenberg, Albula, Bernina-Heuthal und andern Bergen in der alpinen Region (d. Verf.). — Sommer.

*aizoides* L. An Alpenbächen bis in die Ebene, häufig. Churwalden, Viamaala, Engadin etc. — Sommer und Herbst.

*stellaris* L. An Bächen der alpinen und montanen Region, im Ober-Engadin, auf dem Bernhardin, im vördern Calanca. — Juni und August.

*cuneifolia* L. Durch die ganze Viamaala und Rofflen, zwischen Ilanz und Truns, im Misox etc. — Juni.

*Anmerk.* An ersterer der genannten Stellen trifft man Exemplare, deren Wurzelblätter einen schwach gewimperten Stiel haben, was wahrscheinlich Dekan Pol die Veranlassung gegeben hat, daselbst die *S. umbrosa* anzugeben.

*muscoides* Wulf. Auf allen Bergspitzen; Calanda (8200'), Alp Segnes. — Sommer.

*exarata* Vill. Auf dem Wörmser-Joch, in der Celleriner-Alp, dem Gott-hard und andern Bergen in einer Höhe

von 7000'. Wenn die *S. caespitosa* von Reg. Hegetschweiler hierher gehört, so geht sie bis 8600' hoch. — Sommer.

*stenopetala* Gaud. Auf den Glarner-Alpen (Hegetschweiler), auf dem Panixer-Joch (Em. Thomas), an Felsen des Piz della Padella (Kalk) auf der Schattenseite gegen Norden (Bovelin und d. Verf.). — August.

*planifolia* Lapeyr. An der nämlichen Stelle auf dem Piz della Padella, wo die vorige, sodann in der Flimser-Alp Segnes und in Savien. — August.

*Seguieri* Spreng. An Kalkfelsen in der Churer-Alp, auf dem Bernina, auf dem Bernhardin auf Gneissand, ferner auf dem Stelvio etc. Hält sich gewöhnlich zwischen 6000—7000' s.m. — Sommer.

*androsacea* L. Auf Rasen oder humushaltigen Erdschichten der alpinen Region, auf dem Joch, in der Churer-Alp etc. — Sommer.

*controversa* Sternb. Im hintern östlichen Valzer-Thale, an der Stelle wo der Felsen treppenartige Absätze bildet, über die der Weg nach der Alp und nach Savien führt. Ist die einzige einjährige Saxifraga aus der alpinen Region und findet sich auf Humus, der sich auf Felsenschutt gebildet; auch besitze ich sie von der Stilfser-Strasse und von Apotheker Bovelin aus dem Engadin mitgetheilt. — Sommer.

*tridactylites* L. Auf Mauern und dürren Stellen der Ebene bei Chur etc. — Mai und Juni.

#### CHRYOSPLENIUM.

*alternifolium* L. An Bächen und andern feuchten Stellen der montanen Gegenden, so auf dem Mittenberg bei Chur, bei Praden, in der Via-mala etc. — Mai und Juni.

### ARALIACEAE.

#### ADOXA.

*Moschatellina* L. Unter Gebüsch in der Ebene von Chur etc. häufig. — März und April.

#### HEDERA.

*Helix* L. An Felsen, Baumstämmen und Mauern bei Chur, Feldsberg, Rothensbrunnen, Maienfeld etc. — October.

### UMBELLIFERAE.

#### SAXICULA.

*europaea* L. In Laubholzwäldern der montanen Region häufig. — Mai.

#### ASTRANTIA.

*minor* L. Im Bergell und Medelser-Thal, also in subalpinen Gegenden, häufig. — August.

*major* L. Auf fast allen Wiesen der montanen Region. — Juli und August.

#### ERYNGIUM?

*alpinum* L? Nach einer handschriftlichen Note eines ältern Botanikers in den Fidiriser-Heubergen.

#### TRINIA.

*vulgaris* DC. Bei Worms im Veltlin. — Juni.

## AEGOPODIUM.

*Podagraria* L. An Zäunen und Hecken, überall in der Rheinebene. — Sommer.

## CARUM.

*Carvi* L. Auf allen Wiesen, hauptsächlich in der montanen und subalpinen sowie auch in der alpinen Region. — Sommer.

## PIMPINELLA.

*magna* L. Ueberall in Wiesen und Baumgärten, in der Ebene und in der montanen Region. — Sommer.

*Saxifraga* L. Auf magern Tristen der Ebene, häufig. — Sommer.

## BUPLEURUM.

*ranunculoides* L. Nach alten Angaben in Rhätien; von mir wurde es zwischen der Maienfelder Bad-Alp und Stürvis gefunden. — Sommer.

*stellatum* L. Auf dem Bernhardin, auf der Prassignola oberhalb Soglio, im Bernina-Thal, in Calanca, zwischen Andermatt und der Teufelsbrücke an den Felsen. Eine Felsenpflanze, die sich ziemlich beständig in einer Höhe von 5000' hält, und an das granitische Gestein gebunden zu sein scheint. — Sommer.

*rotundifolium* L. In Aeckern bei Ems (Ul. v. Salis); ich fand es in der Nähe von Lenz (4200') und bei Rhäzüns, ebenfalls in Aeckern. — Sommer.

## AETHUSA.

*Cynapium* L. Auf Schutt und in Aeckern und Gärten ein Unkraut, steigt

in die montane Region bei Krida und Malix. — Sommer.

## SESELI.

*coloratum* Ehrh. (*S. annuum* L.) Bei Bonaduz auf Hügeln; auch Ul. v. Salis fand es in Bünden. — August und Herbst.

*Anmerk.* Das *Ses. montanum* einer ältern Angabe, das bei Bonaduz gefunden wurde, kann nichts anders als diese Pflanze sein.

## LIBANOTIS.

*montana* All. Im Thalkessel von Tiefenkasten häufig; ebenso im untern Münsterthal. — Sommer.

## ATHAMANTA.

*cretensis* L. Ich bewahre ein Exemplar vom Calanda auf. — Sommer.

## SILANS.

*pratensis* Bess. Auf dem Sarganser-Ried und zwischen Schiërs und Grösch. — Juli.

## MEUM.

*Mutellina* Gärtn. Auf allen alpinen Weiden häufig. — Sommer.

## GAYA.

*simplex* Gaud. (Vill. delph. t. IV.) Auf der Höhe der Urdenalp, des Albula (7270' s. m.) und vieler anderer Berge. — Sommer.

## ANGELICA.

*sylvestris* L. An Bächen und auf feuchten Stellen, häufig in der Ebene. — Sommer.

*montana* Schleich. Ich erinnere mich im Schwarzwald bei Chur eine Angelica

gesehen zu haben, die wohl die Schleicher'sche Species sein mag. Bei Nufenen nach Prof. Heer.

## PEUCEDANUM.

*Cervaria* Lapeyr. Zwischen Feldsberg und Reichenau und bei Trimmis. — Juli.

*Oreoselinum* Moench. Auf Halden bei Chur, Maienfeld etc. — August.

*verticillare* Koch. An Halden bei Alveneu, bei Filisur, im Verlorren Loch bei Thusis, zu Chur an der Plessur. — Juni.

*rablense* Koch. Nach Schleicher in den Alpen bei Worms. — Sommer.

## IMPERATORIA.

*Ostruthium* L. Auf Wiesen und in Wäldern, gerne auf steinigten Stellen der subalpinen Thäler, so auf dem Bizockel in den Maiensässen, in Erosen etc. — Juli.

## PASTINACA.

*sativa* L. Auf Wiesen und an Wegen, häufig bei Chur und der ganzen Rheinebene. Findet sich auch höher, wie ich in Wallis beobachtete. — Sommer.

## HERACLEUM.

*Sphondylium* L. Ueberall auf Wiesen bis in die subalpine Region. — Juni — August.

*longifolium* Jacq. Nach Bauhin in Graubünden.

*montanum* Schleich. Nach Hegetschweiler in Graubünden unweit dem Rosetschglletscher.

## LASERPITUM.

*latifolium* L. Ziemlich häufig in der ganzen montanen und subalpinen Region Graubündens. — Juli.

*luteolum* Gaud. Bei Hinterrhein von Gay entdeckt; ich fand es bei St. Maria in Medels, Scans, oberhalb Soglio, unweit Filisur, auf der Lenzer-Heide, in der Urdenalp, oberhalb Samaden (in einer Höhe von wenigstens 5500'). — Juli.

*Siler* L. An Halden und auf Gestein in der montanen Region, so bei Trimmis, im Lugnetz, Domleschg und vielen andern dergleichen Orten.

*Halleri* All. Auf Davos, im Ober- und Unter-Engadin, in Tawetsch, auf Wiesen häufig. — Sommer.

## DAUCUS.

*Carota* L. Ueberall auf Wiesen. — Frühling und Sommer.

## TORILIS.

*Anthriscus* Gärtner. Häufig in der Rheinebene, an Wegen, in Gebüsch und andern dergleichen Orten. — Sommer.

## ANTHRISCUS.

*sylvestris* Hoffm. In grossen Massen auf allen Wiesen und in Baumgärten der Ebene und montanen Region (so bei Versam). — Mai.

## CHEROPHYLLUM.

*temulum* L. An Wegen, auf Schutt u. a. d. St. bei Chur und in der ganzen Umgegend häufig. — Juni.

*aureum* L. An Zäunen und in Wiesen

bei Chur (jedoch selten); sodann beim Dorf Samaden (5200'). — Sommer.

*hirsutum* L. In den subalpinen Thälern häufig, auf Wiesen. — Juni.

#### MOLOPOSPERMUM.

*cicutarium* DC. Im Puschlav und Veltlin nach ältern Angaben, im Bergell häufig nach U. v. Salis. H. Muret fand es bei der Kirchruine von Casaccia (4400' s. m.). — Sommer.

#### CONIUM.

*maculatum* L. Bisher nur bei Tiefenkasten von mir bemerkt. — Sommer.

### CORNEAE.

#### CORNUS.

*sanguinea* L. In der Ebene überall in Hecken. — Mai und Juni.

### SAMBUCINEAE.

#### SAMBUCUS.

*nigra* L. In Wäldern der montanen Region traf ich die grössten Stämme an, so bei Versam, Valandas und Praden; sonst vielfach in der Ebene an Zäunen und Mauern. — Mai bis August.

*racemosa* L. In Gebüsch der subalpinen und montanen Region, durch alle Thäler Graubündens. — Mai bis Juli.

*Ebulus* L. In Wäldern und auf steinigen Stellen der montanen Region, so unter Maladers u. a. O. nicht selten und immer gesellschaftlich. — Juli.

#### VIBURNUM.

*Lantana* L. In montanen Laubholzwaldungen und Gebüsch. — Frühling.

*Opulus* L. An Bächen und in feuchten Wäldern, nicht selten. — Mai und Juni.

### CAPRIFOLIACEAE.

#### LONICERA.

*Xylosteum* L. In Hecken und Gebüsch, überall, sogar bis in die subalpinen Thäler Davos, Rheinwald etc. — April bis Juni.

*nigra* L. In abgegangenen Bergwäldern, bei Chur (im Schwarzwald), auf Valzeina, an der Langwies, am Calanda, immer in der montanen Region. — Mai und Juni.

*alpigena* L. Ganz wie die vorige, nur noch häufiger.

*cærulea* L. In subalpinen Thälern in Gebüsch und an andern Stellen, so im Rheinwald, in Savien etc. häufig. — Blüht im Juni.

#### LINNAEA.

*borealis* L. Eine nordische Pflanze, die sich bei uns in subalpinen und alpinen Bergwäldern wiederfindet, jedoch nur unweit der Centralkette. So fanden sie andere Botaniker sowohl als ich im Görjer-Wald unterhalb Splügen an der Heerstrasse, in Cannicül und Avers, zwischen Tinzen und Stalla, im Ober-Engadin überall, und sogar jenseits der Wasserscheide auf dem Stelvio (Wormser-Seits). Bauhin hatte seine

*Campanula serpyllifolia* auch aus Rhätien. — Juni und Juli.

Man erlaube mir zu bemerken, dass ich die Normalzahl fünf der Staubgefäße oft fand.

## LORANTHACEAE.

### VISCUM.

*album* L. Ein Parasit auf fast allen Sorten von Bäumen. — April.

## RUBIACEAE.

### SHERANDIA.

*arvensis* L. In Aeckern, soweit solche gehen. — Sommer und Herbst.

### ASPERULA.

*odorata* L. In montanen Wäldern, überall. — Mai und Juni.

*taurina* L. Unter Gebüsch auf steinigten Stellen bei Chur, Trimmis, Malans, auf der Steig u. a. d. O. häufig. — Mai und Juni.

*cynanchica* L. Auf magern Wiesen und Weiden bis an's Ende der montanen Region. — Juni bis September.

*Anmerk.* Die nach einer alten Angabe bei Chur vorkommen sollende *A. arvensis* ist wahrscheinlich die *Sherardia*.

### GALIUM.

*Cruciata* Scop. An Zäunen und unter Gebüsch, in der Ebene sowohl als in der montanen Region. — April und Mai.

*vernum* Scop. Im obern und untern Misox, auf Gestein. — Mai und Juni.

*Aparine* L. In Hecken, Gärten und andern Stellen, soweit aufgelockerter Boden vorkommt. — Mai und Juni.

*spurium* L. In einer Pfütze bei St. Maria (Calanca) traf ich zwei Varietäten an, die kahlfrüchtige und rauhfrüchtige von Vaillant. — Juni.

*uliginosum* L., *grandiflorum* Gaud. Auf der sumpfigen Ebene unterhalb Sils im Ober-Engadin (5400'). — Juli.

*palustre* L. Auf schlammigen und sumpfigen Stellen bei Bonaduz, Ilanz und andern Orten nicht selten. — Juni.

*rotundifolium* L. In dunkeln Nadelholzwäldern der montanen Region, zu Chur auf dem Bizockel. — Juni.

*boreale* L. Bei Fläsch auf sumpfigen Wiesen; auf Gestein und trockenen Halden durch das ganze Engadin. — Mai bis Juli.

*verum* L. In fast allen Wiesen, auf der Rheinebene. — Mai und Juni.

*sylvaticum* L. In Wäldern der montanen Region, bei Chur, auf Valzeina u. a. O. nicht selten. — Juni.

*Mollugo* L. In Hecken und Wiesen, sowohl in der Ebene als in der montanen Region, häufig. — Mai und Juni und oft im Herbst wieder.

*rubrum* L. Regierungsrath Hegetschweiler zeigt es auf dem Calanda an; ich fand es auf diesem Berge am Wege von Feldsberg nach der Feldsberger-Alp. Obwohl das *G. purpureum* das Villars in der Viamala angibt hieher ge-



zogen werden möchte oder eine rothblühende Varietät des *G. sylvestris* ist, weiss ich nicht anzugeben. — Juli.

*sylvestre* Poll. An Wegen, auf Wiesen, an Halden von der alpinen Region an abwärts überall. Die rothblühende Var. traf ich in Misox an. Hierher gehört auch *Gal. pusillum* Vill. Delph. t. VIII, das an der Halde zwischen Silvaplana und Sils vorkommt.

*helveticum* Weigel. In der Alp Segnes (Flims) auf Gerölle (7000' ungefähr). — August.

Anmerk. Nach der Alpina sollen in Bünden vorkommen *G. aristatum* und *G. hercyrum* Weig.

## VALERIANEAE.

### VALERIANA.

*officinalis* L. An Waldsäumen und Bächen hin und wieder. Steigt bis in die subalpine Region, wie z. B. hinter Tschierschen. — Juni bis August.

*dioica* L. Auf nassen Wiesen, an Bächlein der montanen und subalpinen Region, nicht selten bei Chur etc. — Juni.

*tripteris* L. An Felsen und auf Gestein der montanen Region, häufig in der Umgegend von Chur, so wie auch im Ober- und Unter-Engadin. — Mai und Juni.

*montana* L. In Wäldern und Gebüsch der montanen und subalpinen Region, so im Schwarzwald bei Chur,

bei Serneus, oberhalb Parpan und an andern Orten mehr. — Mai und Juni.

*supina* L. Nach einer frühern Angabe in Bünden; zwischen Livino und St. Giacomo di Fræle (H. Muret und Prof. Heer), nach letzterm auch auf dem Wormser-Joch. — Sommer.

*saxatilis* L. Im Schallfigg und auf dem Wormser-Joch nach älteren Angaben, ich fand sie auf dem Scesa-plana, Bovellin im Liviner-Thal, H. Muret bei den Wormser-Bädern. — Sommer.

### VALERIANELLA.

*olitoria* Moench. In und um Weinberge und Aecker bei Chur und der ganzen Ebene. — März.

*dentata* DC. Im Getreide der höhern Gegenden, so im Tavetsch, bei Flims etc. Juli.

## DIPSACEAE.

### SCABIOSA.

*Columbaria* L. Ueberall auf Wiesen und Weiden; in der alpinen Region die *S. Lucida* Vill., wo sie im August und September blüht.

### SUCCISA.

*pratensis* Moench. Auf sumpfigen und feuchten Wiesen und in Wäldern in der Ebene und montanen Region, häufig. — Herbst.

### KNAUTIA.

*sylvatica* Duby. In Wäldern und andern Stellen der montanen und sub-

alpinen Region, bei Chur, Parpan etc.  
— Sommer.

*arvensis* Coult. Ueberall auf Wiesen  
und Aeckern. — Juni.

#### CEPHALARIA.

*alpina* Schrad. Ich fand sie unter-  
halb Obervatz an Wegen. — Juli.

#### DIPSACUS.

*sylvestris* Mill. An Wegen und Flüs-  
sen, ziemlich gemein in der Ebene. —  
Juli.

*pilosus* L. Bei Chur im Lürlibad,  
Feldsberg und wohl bei allen Dörfern  
der Rhein-Ebene. — Juli.

### COMPOSITAE.

#### EUPATORIUM.

*cannabinum* L. An Wassergräben  
und andern Stellen, häufig durch die  
ganze Rhein-Ebene bis in die montanen  
Thäler (bei Alveneu). Sommer.

#### ADENOSTYLES (ehemals Cacalia).

*Petasites* Bl. et F. In Gebüsch der  
*Alnus viridis*, an Gewässern, in der  
alpinen Region bis auf den Thalgrund  
von Maiefeld und Chur. — Sommer.

*glabra* DC. Nach Prof. Heer bei  
Ferara, Splügen, Beverser-Thal.

*leucophylla* Reich. Auf dem Bernina  
(Prof. Heer). — Sommer.

#### HOMOZYNE.

*alpina* Cass. (*Tussilago alpina* L.)  
In Wäldern und auf schattigen und

feuchten Weiden der alpinen und sub-  
alpinen Region, häufig. — Juni und Juli.

#### TUSSILAGO.

*Farfara* L. Ueberall auf Lehmboden  
bis in die alpinen Höhen. — März bis  
Juni.

#### PETASITES (ehemals Tussilago).

*vulgaris* Desf. An Bächen und auf  
fetten Stellen in der montanen (Filisur  
an der Albula) und subalpinen Region  
(Parpan und Vatz). — Blüht im Frühling.

*albus* Gärtn. In subalpinen und mon-  
tanen Wäldern bei Chur herum, wo  
beide, die mehr weiblichen und die  
ganz hermaphroditen Pflanzen vorkom-  
men. — März bis Mai.

*niveus* Cass. Oberhalb Parpan in der  
Alp, auf Kunkels, Davos, und an der  
Langwies in Sapün, also in subalpinis  
und alpinis. — Juni.

#### LINOSYRIS (Chrysocoma nach Linné).

*vulgaris* Cass. Auf Hügeln und an  
Halden bei Bonaduz und Ems; an letz-  
term Orte, wo sie unter Eichen wächst,  
wurde sie schon von ältern Botanikern  
bemerkt. — Blüht im Herbst.

#### ASTER.

*alpinus* L. An Felsen und auf Wei-  
den der alpinen Höhen, aus welchen sie  
zuweilen bis fast in die Ebene hinunter-  
steigt, wie bei Fläsch. Kommt vor auf  
dem Joch, dem Augstenberg im ganzen  
Engadin etc. — Sommer.

*Amellus* L. In der Ebene auf magern

Halden, so bei Chur, Reichenau u. a. O.  
— Sommer.

BELLIDIASTRUM (Arnica nach Linné).

*Micheli* Cass. Von der montanen Region an aufwärts bis 7500' Höhe, ziemlich überall. — Frühling u. Sommer.

BELLIS.

*perennis* L. Ueberall und durch das ganze Jahr.

ERIGERON.

*canadense* L. Ueberall auf Schutt, Dächern u. a. St. in grösster Menge. — Sommer.

*acris* L. Auf Weiden, Gestein, Sand, häufig; geht bis über 5000' hoch in die Berge, so oberhalb Samaden gegen St. Peter, wo es mit der folgenden Art vermischt wächst. — Sommer.

*alpinus* L. Findet sich in den alpinen Höhen überall, in mehrfacher Gestalt:

*fingerslang und einblumig* in schönen Exemplaren auf der Höhe des Augstenbergs bei Malans,

*bis fusshoch, vielblumig und zottig* (*hirsutus*) zwischen Samaden und St. Peter, auch in der Jochalp (ist das *E. hirsutum* Hop. et Horn.),

*über fusshoch, vielblumig und fast ganz kahl* (einige Röhre am Stengel ausgenommen), am Inn im Schatten, zwischen Samaden und Cellerina. Stimmt vollkommen mit *E. rupestre* Hop. et Horn. überein. — Wo *E. acris* neben dieser Art steht deu-

tet ein ganz verschiedener Habitus auf die Verschiedenheit der Species. Ausserdem und die andern bekannten Merkmale bei Seite gesetzt, zeigen die vielköpfigen Abarten des *E. montani* immer laterale Blumenstiele, die über dem centralen hinausgehen.

*uniflorus* L. Auf vielen unserer Berge, in alpinen und subnivalen Höhen, so auf der Greina, Joch, im Engadin etc.

SOLIDAGO.

*Virgaurea* L. Häufig auf Gestein, unter Gebüsch und andern Stellen. Steigt von der Ebene bis in die alpinen Höhen. — Sommer.

β) Die alpine Form auf dem Joch und dem Calanda (Tausend).

INULA.

*Conyza* DC. prod. (*Conyza squarrosa* L.). In Gebüsch an Halden bei Chur, Maladers etc. — Sommer.

*salicina* L. Bei der Soliser-Brücke. — Juli.

PULICARIA (ehemals Inula).

*dysenterica* Gaud. An Bächen und Wassergräben bei Feldsberg, Maienfeld, Zizers. — Sommer und Herbst.

BIDENS.

*tripartita* L. Im Hochgericht Gruob nicht selten mit folgender vermischt, bei Alvaschein am Teich, bei Zizers. Immer in oder am Wasser. — Sommer.

*cernua* L. Nach Prof. Heer bei Saas im Prättigau; bei Ilanz und Schnaus, wo

sie immer gestrahlt ist (der Verf.). — August.

#### ANTHEMIS.

*tinctoria* L. Ich fand einmal einige Exemplare an einem Abhange am Rhein bei Chur. — Sommer.

*arvensis* L. Hin und wieder in Aeckern und an Wegen, so bei Chur, unterhalb Malix, bei Klosters im Prättigau etc. — Sommer.

#### ACHILLEA.

*atrata* L. Auf dem Scesa-plana, Montellin, Urdenalp nicht selten; scheint das Centralgebirg zu fliehen, wo ich immer nur die folgende Art sah. Hält sich in der alpinen Region. — Sommer.

*moschata* Jacq. Auf dem Splügen, Wormser-Joch, Oberalp, im Bergell, im Ober-Engadin u. a. O. mehr. Gewöhnlich zwischen 6—7000' s. m. — Sommer.

*nana* L. Im Bergell und Avers nach Scheuchzer, oberhalb Parpan neben dem Rothhorn (ungefähr 7000') im Bernina-Heuthal, im Rosetscher-Thal (Engadin) u. a. O. (d. Verf.). — Sommer.

*macrophylla* L. In subalpinen und alpinen Höhen unter Gebüsch der *Alnus viridis* und der Alpenrosen. Auf dem Calanda, Joch, Splügen, Gotthard, im Ober-Engadin u. a. O. — Sommer.

*Clavenae* L. Ich besitze ein Exemplar das auf einem Bergpass zwischen dem

untern Misox und dem Comersee gesammelt wurde. — Sommer.

*alpina* L. Bei Airolo nach Thomas. — Sommer.

*Ptarmica* L. Unweit Brusio im Puschlav. — Juni.

*Millefolium* L. Ueberall, auch in den alpinen Höhen wie z. B. zuoberst am Uebergange von der Fürstenalp nach Maladers. — Sommer.

*tanacetifolia* All. Nach Bauhin und Gaudin bei Chur. Ist mir nie vorgekommen. — Sommer.

#### CHRYSANTHEMUM.

*Leucanthemum* L. Auf Wiesen bis in die alpine Region häufig. — Sommer.

*montanum* L., *heterophyllum* Koch. An Felsen bei Roveredo und St. Vittore und im Rheinsand bei Chur. — Juni und Juli.

Anmerk. Das *Ch. coronarium* L. soll nach Haller auf dem Fræla vorkommen. Diess ist sicher irrig, da genannte Pflanze die heissen Gegenden des nördlichen Afrikas, die Canarischen Inseln etc. zur Heimath hat. Dieser von Haller angeregte Irrthum hat sich seither durch alle Bücher, die die Schweizerfloren kopirten, verbreitet.

#### PYRETHRUM (ehemals Chrysanthemum).

*alpinum* Willd. Häufig auf allen unsern Bergen bis in die Höhe von 8000' s. m., so auf der Granitspitze neben dem Piz della Padella (Ober-Engadin). — Sommer.

*Halleri* Willd. \*) In der Churer-Alp,

\*) Ist das *Chrys. atratum* meiner «Pflanzen der Schweiz.»

in Urden und Segnes; immer in alpinen Höhen und gern auf Schutt und Steingeschiebe. — Sommer.

*Parthenium* Sm. Auf Schutt bei Chur, vielleicht aus Gärten. — Sommer.

*inodorum* Sm. In Aeckern, häufig bei Chur. — Sommer.

#### MATRICARIA.

*Chamomilla* L. Auf Gartenauswurf und Schuttstellen, wahrscheinlich aus Gärten. — Sommer.

#### ARTEMISIA.

*campestris* L. Auf dünnen Triften, an Halden bei Chur und anderwärts. — Sommer.

*vulgaris* L. In der Ebene bei Feldsberg, Kästris, in der montanen Region bei Malix, Ilanz und Truns, hoch in der subalpinen bei Zuz (5000' s. m.). An diesen und andern Orten findet sie sich häufig auf Mauern und Gestein. — Sommer.

*spicata* Jacq. In Graubünden (Hegetschweiler), in der Churer-Alp beim Mürli und auf der Höhe des Uebergangs von Parpan nach Urden (d. Verf.). — Sommer.

*Mutellina* Vill. Bei Fermutt (Pol), in den Rheinwalderalpen (Pfr. Felix, der sie mir mittheilte), in den Schamser-Alpen (Tausend), auf der Höhe des Uebergangs auf dem Albula (7270'), im Bernina-Heuthal, auf dem Montellin (?) bei Chur (d. Verf.). Eine Pflanze, die

nach meinen Erfahrungen auf Kalkfelsen vorkommt. — Sommer.

*glacialis* L. In Samnaun (zuunterst im Unter-Engadin) (Mag. Rösch), auf dem Bernina (Bovelin), und nach dem Herbar. von Haller Sohn von Krönig auf Flüelen gefunden. — Sommer.

*Absinthium* L. Auf Gestein und Mauern von der Ebene an bis an's Ende der Kirschbaumgrenze (sehr häufig noch in Disentis (3500') und im Unter-Engadin. — Sommer.

*Anmerk.* Auf dem Piz Beverin soll nach Chorherr Schinz die *Artemisia pontica* zu finden sein, was aber sehr in Zweifel gezogen werden muss. Es möchte wohl die *Artemisia Mutellina* gewesen sein, die auch Tausend von dort her hat.

#### TANACETUM.

*vulgare* L. Wird hin und wieder angetroffen, zum Beispiel im Lürlibad und Steinbruch bei Chur, am Mastrilser-Berg. Auf dem Simplon soll diese Pflanze noch über der Baumgrenze zu finden sein. — August — Herbst.

#### GNAPHALIUM.

*luteo-album* L. Bei Clefen nach Scheuchzer; von mir bei Grono gefunden. — Juni.

*uliginosum* L. Nach Thomas bei Disentis. Ich beobachtete es ebendasselbst und verfolgte es bis nach Ilanz. Kommt an Wegen und trocknen Stellen vor. — Juli und August.

*sylvaticum* L. Bei Ilanz, Truns und

noch weiter hinauf gegen Medels und Tawetsch. — Sommer.

*Norvegicum* Hoppe. In der Churwalder-Alp, auf dem Joch, in der Malixer-Alp und in Savien am Platz. — Sommer.

OMALOTHECA (ehedem Gnaphalium).

*supina* DC. Beim Oberalpsee, in der Haldensteiner-Alp, im Rosetscher-Thal, auf dem Augstberg bei Parpan (d. Verf.), auf dem Splügen nach Haller. Kommt auf Weiden vor und steigt nicht aus der alpinen Region herab. — Sommer.

*pusilla* (G. pusillum Hænke). Ich habe diese Pflanze auf dem Augstenberg bei Malans gesammelt. — Sommer.

FILAGO (ehedem zu Gnaphalium gerechnet).

*arvensis* L. Im Puschlav und unweit Truns von mir bemerkt. — Sommer.

ANTENNARIA.

*Carpathica* Bluff et Fing. (Gnaph. alpinum auct. helv.). Am Hinterrhein, auf dem Splügen (nach ältern Angaben), im Rosetscher-, Bernina- und Beverser-Thal (Prof. Heer), auf dem Joch bei Chur (d. Verf.), wo es auf Weiden vorkommt. — Sommer.

*alpina* Gärtn. Am Fusse des Berges Greina, im Beverser- und Camogasker-Thal hat Prof. Heer diese Pflanze, die er für das ächte Gnaphalium alpinum L. hält, gefunden. — Sommer.

*dioica* Gärtn. Ueberall auf dünnen Triften, besonders häufig in der subalpinen und montanen Region. — Juni.

LEONTOPODIUM (ehedem Gnaphalium).

*alpinum* Cass. Auf dem Fräla, Albula, Splügen, Bernina nach ältern Angaben, in den Rheinwalder-Alpen (Pfr. Felix), auf dem Joch, in Urden, beim Weissenstein und vielen andern Orten (d. Verf.). Eine Felsenpflanze, die zuweilen in die subalpinen Thäler (z. B. gegen Bergün) herabsteigt. — Sommer.

ARNICA.

*montana* L. Am häufigsten in subalpinen Gegenden (Davos, Parpan etc.), von wo sie sich in die montanen herunter (beim Städeli bei Chur) und in die alpinen hinauf zieht, wie z. B. ziemlich hoch über Samaden. — Sommer.

ARONICUM (ehedem Arnica).

*Doronicum* Reich. Auf granitischem Gestein. In den Averser-Alpen, beim Uebergangspunkt des Albula (7270' s. m.) auf der Granitspitze oberhalb Samaden neben dem Piz della Padella (der Kalk ist). Nach Scheuchzer ebenfalls auf dem Albula. — Juli und August.

*scorpioides* DC. Auf Kalksteingerölle (Calanda in einer Höhe von wenigstens 7000' s. m.), auf Humus und an Schatten auf dem Rothenhorn, wo die Pflanze bis 11/2' hoch wird. Ausserdem auf noch vielen Bergen. — Sommer.

Anmerk. *Doronicum Pardalianches* Will. soll nach Dekan Pol und Dr. Amstein in Bünden (von Letzterm in der Maienfelder-Alp Yas angegeben) vorkommen. Ich vermute jedoch, dass diese Angabe auf einer Verwechslung mit *Aron. scorpioides* oder *Senecio Doronicum* beruht.

## SENECIO.

*vulgaris* L. Ueberall in Aeckern, an Wegen, durch das ganze Jahr.

*viscosus* L. Bisher habe ich diese Pflanze bloß im Oberhalbstein beobachtet. Bei Soazza, Ferrera und Maloja (Heer). — Sommer.

*rupestris* W. et K. Bei Worms im Veltlin, zwischen Gestein, häufig, nach H. Muret zwischen Zernetz und dem Ofen bei Schäferhütten und im Scharlthal. — Sommer.

*Jacobaea* L. Ueberall an Wasser und andern Stellen der Ebene. — August und Herbst.

*abrotanifolius* L. Auf den Weiden der Engadiner Berge bis 7000' s. m.; so oberhalb Samaden, auf dem Julier, im Bernina-Heuthal, im Camogasker-Thal, in Livino; nach Prof. Heer in der Ramüser-Alp — Juli und August.

*carniolicus* Willd. Auf dem Fluela (Charpentier und Tausend), auf dem Albula (Thomas), auf den Engadiner-Bergen (nach Bovelin und Heer), auf dem Scaletta, Wormser-Joch, Albula, oberhalb Samaden auf der Granitspitze, Bernina-Heuthal, Livino, Camogasker-Thal, zuoberst in der Churer-Alp (der Verf.). Steigt bis 7500' s. m. und findet sich auf Granit und Kalk. — Sommer.

Anmerk. *S. incanus* L. Nach Scheuchzer in Averser und Bergeller Bergen. Ich habe den ächten noch nie in Bünden gesehen, noch von daher erhalten.

*saracenicus* L. Auf den Alpenweiden von Urschein (Prof. Heer). — Sommer.

*Fuchsii* Gmel. Im Schalfigg, bei Tschierschen, in der Ebene am Rhein bei Masans, in der Parpaner-Alp, Tarasp, Silvaplana. Hält sich gewöhnlich in der Höhe von 3400' bis 6000' durch ganz Bünden. — Sommer und Herbst.

*Doronicum* L. Auf dem Albula und Wormser-Joch nach ältern Angaben, auf den Engadiner Bergen häufig, auf dem Maloja, dem Montellin bei Chur, in Carmenna (d. Verf.). Hält sich in der alpinen Region auf Weiden. — Sommer.

*cordifolius* Clairv. (*Cineraria cord. Haum.*). Bei den Alphütten und Bächen der Alpen, fast durch ganz Bünden (in Valz, auf dem Splügen, Gotthard, Churer-Alp, Urden, Sapün etc.). — Sommer.

*campestris* DC. (*Cineraria campestris* Retz). Bei den Alphütten der Zuser-Alp auf dem Levirone, häufig. Man kann daselbst zwei Formen unterscheiden, wovon die erste mehr am Schatten und unter Aconiten und die andere an offenen Stellen wächst.

1. *sublanuginosa*, foliis radicalibus ovatis subcordatis, pedicellis bractea brevioribus
2. *glabriuscula*, foliis rad. ellipticis in petiolum sensim attenuatis, pedicellis bractea longioribus.

*tenuifolius* (*Cineraria tenuifolia* Gaud). Auf dem Wormser-Joch nach Gaudin,

Schleicher und Appel. Muret. — Sommer.  
Wäre diese Pflanze vielleicht eine weitere Ausbildung der zweiten Form der vorigen Art? Nach dem von H. Muret mir mitgetheilten Exemplar zu urtheilen, bin ich sehr geneigt diess anzunehmen.

## CARLINA.

*acaulis* L. Auf Bergweiden bis in die alpine Region; so in der Carmenna etc. und von dort bis in die Ebene, wo sie oft fusshohe Stengel treibt. — Sommer.

*vulgaris* L. Auf dürrn Stellen, an Halden und dergleichen, bei Chur, im Bergell u. a. O. — Sommer.

## LAPPA (ehedem Arctium L.).

*glabra* Lam. An Wegen bei Thusis gegen das verlorne Joch hin. — Sommer.

*minor* DC. Ueberall an Wegen, bei Chur, Emis, Unter-Engadin etc. — Juli und August.

*tomentosa* Lam. Kommt in montanen Thälern vor, so bei Andeer in Schams und Unter-Engadin. — August und Herbst.

## ONOPORDUM.

Bei Chur, Maladers, Ilanz an Wegen und sonnigen Halden, auf Schutt u. a. d. St. — Sommer.

## CARDUUS.

*nutans* L. An Wegen und auf Schutt allenthalben, auch in der montanen Region, bei Alvaschein. — Sommer.

*crispus* L. Ebenfalls an Wegen, öfters an Bächen u. a. St., durch die Rhein-

ebene gemein. Nach Haller im Hochgericht Belfort. — Sommer.

*defloratus* L. In Wäldern der montanen (Versam, Chur etc.) und subalpinen Region (oberhalb Davos am Platz etc.). — Sommer.

*defloratus, rheticus* nach DC. prod. V. vi). Zwischen Bellenz und Grono; steigt von Clefen bis nach Sils im Ober-Engadin (5500') hinauf (d. Verf.), im Beverser-Thal (Heer). — Sommer.

*Personata* Jacq. Um Bergdörfer herum, im innern Brättigau, in Valzeina, bei Bategna auf dem Calanda, Malix, Tarasp, Ursern etc. — Juni.

*leptophyllus* Gaud. Im Beverser-Thal nach Prof. Heer, in Puschlav nach einem Exemplar, das H. Muret von Lausanne mir gütigst mittheilte. — Sommer.

## SERRATULA.

*tinctoria* L. Auf dem Sarganser-Ried in ziemlicher Anzahl, seltener bei St. Victor in Misox. — Sommer.

## SAUSSUREA.

*alpina* DC. Auf dem Tödi nach Hegetschweiler, bei St. Maria in Medels, Samaden, im Bernina-Heuthal (d. Verf.). Kommt gerne auf grossem Gestein vor und hält sich an die untern alpinen Höhen. — Juli und August.

*discolor* DC. In den Bergeller-, Averser-, Staller- und Rheinwalder-Alpen, auf dem Splügen, Bernina und Bernhardin nach ältern Angaben; zum Theil auf diesen und zum Theil an andern



Orten, wie in der Carmenna von neuern Botanikern und mir bemerkt. Hält sich auf Felsen, ebenfalls in der alpinen Region. — August.

#### CIRSIUM.

*palustre* Scop. Auf sumpfigen und wasserreichen Stellen, überall, in der montanen und selbst, wenn ich nicht irre, in der alpinen Region. — Sommer.

*lanceolatum* Scop. Sehr gemein an Wegen. Ob es weit auf die Berge hinauf geht, ist mir nicht mehr erinnerlich. — Sommer.

*oleraceum* All. Auf Wiesen und Bächen, in der Ebene und der montanen Region häufig. — Sommer und Herbst.

*rigens* Gaud. Auf wasserhaltigen Stellen beim Dorf Praden und an Bächlein auf den Churerwiesen gegen Masans, hier jedoch selten. — Sommer.

*Erisithales* L. (Jacq. fl. aust. 4. 310). In Wiesen zwei Stunden unterhalb Worms und unweit Arvigo im Calanca-Thal. — Juni.

*erucagineum* DC. *C. Hallerianum* Gaud. Von dieser Pflanze wurde in Valz unter dichtem Ellern-Gebüsch vom Verf. ein Exemplar gefunden. Diess ist die nämliche Pflanze die Haller, Sohn, von Schleicher empfing, der auch nur ein Exemplar im Veltlin fand, das sich vom meinigen durch mehrere Köpfchen auszeichnet. Es ist diess eine unpublicirte Species, die einer Abbildung werth ist. Bonjean hat ein vollkommen gleiches

Exemplar, das aus den Alpen der Dauphine kommt, Hr. DeCandolle geschickt, worauf dieser sodann (zum Theil) seine Species gegründet hat.

*spinosissimum* Scop. Auf fast allen Alpenweiden bis in eine Höhe von 6700' s. m. — Sommer.

*purpureum* All. Im Ursern-Thal bei Hospital (Em. Thomas), unweit des Wirthshauses auf dem Bernina (Prof. Heer), auf dem Scopi Tessinerseits (H. Nägeli) und im Rheinwald (Dr. Schultess). — Sommer.

*heterophyllum* DC. In Medels und Rheinwald nach frühern Angaben; von mir bemerkt auf Runkelier bei Chur, bei Stalla, im Ober-Engadin, bei Klosters, die Varietät mit geschlitzten Blättern auf Davos. Findet sich gewöhnlich in Wiesen. — Sommer.

*acaule* Lam. In montanen und subalpinen Wiesen und von dort bis in die Ebene herab, fast überall. — Sommer und Herbst.

*Anmerk.* Die Zahl der hybriden Disteln muss noch um eine vermehrt werden. Beim Städeli (Churergebiet) wächst eine Pflanze die von *C. acaule* und *C. oleraceum* abstammt, welche beide an der gleichen Stelle vorkommen. Seither finde ich diese Bastardform auch von Koch angeführt, der sie *Cirsium decoloratum* nennt.

*eriophorum* Scop. Dieser schöne Distel findet sich in Menge im Ober-Engadin (zwischen Samaden und Cellerina), noch häufiger nach Prof. Heer im Unter-

Engadin; auch um das verlassene Dorf Stürvis (jetzt Maienfelder-Alp) fand ich ihn. — Sommer.

*arvense* Lam. In Feldern; an Wegen u. a. O. gemein. — Sommer.

RHAPONTICUM (ehedem zu *Centaurea* geh.).

*scariosum* DC. In Avers, Bergell, auf dem Splügen nach ältern Angaben, auf dem Bernina und Fräla nach dem Herb. von Haller, Sohn, im Rheinwald nach Pfr. Felix, in den Pleisen und in Carmenna (beides Wege nach den Churer-alpen) so wie auch oberhalb Parpan gegen das Rothhorn hin nach des Verf. Erfahrungen. Wächst auf Halden und grasreichen Weiden in einer Höhe von 5—6000' s. m. — Sommer.

CENTAUREA.

*Jacea* L. Ueberall auf Wiesen, sowohl trocknen als feuchten, in der montanen Region wie in der Ebene. — Sommer.

*nigrescens* Willd. Bei Clevn nach einer ältern Angabe. Ich fand sie zwischen Roveredo und St. Vittore an einem wasserreichen Abhänge. — Juni.

*montana* L. Auf Wiesen und in Wäldern der subalpinen Region, nicht selten, so auf Sais, unterhalb der Fürstenalp, Runkelier und vielen andern Stellen. — Sommer.

*Cyanus* L. Im Getreide fast überall. — Sommer.

*splendens* L. Bei Clevn (U. v. Salis, der sie mir gütigst mittheilte, und nach ältern Angaben). — Sommer.

*Scabiosa* L. Ueberall in Wiesen bis an die Tannengrenze. — Sommer.

*paniculata* L. Zu Chur bei der Halbmühl (d. Verf.), im Unter-Engadin? (Prof. Heer und Hauptm. U. v. Salis). — Sommer.

*maculosa* Lam. fl. fr. (verglichen mit dem DC. Herb.). Diese Pflanze wächst bei Schulz, wo sie H. Muret von Lausanne sammelte, und höchst wahrscheinlich ist diess auch die *Cent. cineraria* (non Lin.) die Dekan Pol als im Unter-Engadin wachsend angibt. Weniger sicher, doch möglich, ist es dass Hauptm. v. Salis und Prof. Heer die nämliche Pflanze im Unter-Engadin sahen, so wie ich vermuthete, dass auch die Exemplare die ich seiner Zeit im Münsterthal ohne Blüthen beobachtete hieher zu ziehen sind. Schon Linné scheint die Pflanze gekannt zu haben, indem er sie als eine Varietät der *C. paniculata* folgendermassen bezeichnet: *Varietatem etiam habemus floribus majoribus magnitudine C. Jaceæ foliis canescentibus nonnihil diversam* (L. sp. pl. ed. 3. Vind.). Zum Troste der deutschen Botaniker füge ich bei, dass sie auch zwischen Triest und Montfalcone wächst, wie aus einem Exemplar hervorgeht, das Prof. Alph. De Candolle daselbst sammelte. — Sommer.

*austriaca* Willd. sp. pl. 3. 2283, pilis elongato-conicis aspera, radice multipiti, caules plurimos copiamque foliorum gerente, caulibus a medio ramosis,

ramis simplicibus, foliis in gemmis radicalibus sterilibusque ovatis petiolatis parce dentatis, caulinis sessilibus ovatis parce servatis, involucri squamis ciliis longis pectinatis, pappo achænio duplo brevior.—Planta  $1\frac{1}{2}$ –2 pedalis, maxima inter Centaureas phrygiæ sectionis. Capitulum diametro unciali floribus neutris radiantibus munitum (Jacq. vind. t. 167). Diese Art fand ich im Jahr 1832 zwischen Zernetz und Brail in einer Höhe von 4—5000' auf Wiesen und zwischen Gestein. Später beobachtete sie Hauptm. Ul. v. Salis bei Nauders im Tyrol, wenn ich nicht irre, und H. Muret von Lausanne ebenfalls zwischen Zernetz und Brail.

Diess ist ohne Zweifel die Clusische *Jacea austriaca capite villosa, sive quatuor elatior*, von der er eine Abbildung gibt (Cl. lib. IV. p. 7. Fig. links). Da nun Bauhin in seinem Pinax diese und die nebenstehende *Jacea angustifolia* (siehe unten bei der *Cent. phrygia montana*) unter seiner *Jacea latifolia et angustifolia capite hirsuto* vereinigt und Linné das Bauhin'sche Citat so wie die Clusische Pagina (Clus. hist. 2. p. 7) auf seine *C. phrygia* bezieht, so geht daraus deutlich hervor, dass Linné auch diese Pflanze unter seiner *phrygia* verstand. Ja es ist sogar wahrscheinlich, dass er diese Art mehr berücksichtigte als die übrigen Synonymen, da er aus der Clusischen Beschreibung dieser Art (nämlich der *Jacea austriaca capite villosa, sive quatuor*

*elatior*) seine Bewunderung über das *magisterium naturæ*, die wir am Schlusse seiner Beschreibung finden, entlehnt. Man könnte daher den Namen *phrygia* mit mehr Recht auf die *C. austriaca* Willd. übertragen und für die *C. phrygia* einen neuen aufstellen (oder gar zwei, so wie man zwei Arten daraus macht), wenn man der Uebung aller Botaniker, die seit einem halben Jahrhundert gewohnt sind, die einblumige auf unsern Alpen häufig vorkommende Pflanze *Centaurea phrygia* zu nennen und die bald eben so lange Willdenows *Centaurea austriaca* (wenigstens in Oestreich) unter diesem Namen aufbewahren, nicht Rechnung tragen will.

*phrygia* Auct. Pilis conicis villisque cylindricis mixtè vestita, caule simplici ramosoque, foliis radicalibus lanceolatis ovatis, caulinis linearibus sessilibus dentatisque vel oblongis grosse sinuato-dentatis pinnatisectis auriculato-sessilibus, involucri squamis ciliis longis pectinatis, pappo achænio subæquante.

a. *alpina*, caule mono- et oligocephalo, capitulis uncialibus.

α) *minor* (*C. phr. adscendens*) (Vid. ic. nostr. 4.) caule 2–4 pollicari adscendente pilis elongato-conicis incano.

Auf alpinen Weiden. Ich habe sie von der Halde am Priora-See und wahrscheinlich ist es diese Pflanze die Scheuchzer in Rhätien fand und von welcher er sagt: *Jacea uncialis*

foliosa calyce squamis pinnatis composito (Sch. ic. VI. p. 459). Haller zieht die Scheuchzer'sche Pflanze mit Unrecht zur *Cent. uniflora* L. die wir in der Schweiz nicht haben.

*Erklärung der Abbildung :*

1. Die Pflanze in ihrer natürlichen Grösse.
2. Die conischen Haare sehr vergrössert.
- 2a. *idem ramosa*. Diess ist vollkommen die *C. phr. adscendens* nur mit dem Unterschiede dass sie zuweilen einen Ast bildet und somit zweiblumig wird. Die Verästung ist durchaus die der *Cent. rhætica* unserer Abbildung. Es ist diess auch die Pflanze die der jüngere Thomas, vermischt mit der nicht ästigen, unter dem Namen *C. ambigua* (non Guss.) verkauft.
- β. *media* (Reich. t. 554) caule erecto pedale unifloro. Diess ist die häufig vorkommende Form der sogenannten Heuberge, d. i. ungedüngten Bergwiesen, der subalpinen Region (*C. nervosa* Willd. et Koch).
- ββ. foliis inferioribus pinnatisectis. Hieher gehört die in der Flore française angeführte Var. *incisa*, die im Nikolai-Thale (*C. Wallis*) vorkommt.
- γ. *major*, caule bipedale simplice ramosove.

γγ. caule simplice. Findet sich auf gedüngten Wiesen der alpinen Region. Ich habe sie aus dem Ober-Engadin u. a. O.

γγγ. caule ramoso (Reich. t. 555). Da die Natur des Standorts (hohes Gras in gedüngten Wiesen der alpinen Region) der Verästung hinderlich ist, so erklärt sich die Seltenheit dieser Pflanze hinlänglich. Ich fand sie oberhalb Parpan (etwa 5600' s. m.) und sah ein Exemplar vom Simplon, das der ältere Thomas unter dem Namen *C. ambigua* verkaufte.

b. *montana* (*C. phrygia* Koch.) caule oligocephalo, capitulis semuncialibus. Die Pflanze von welcher meine Beschreibung genommen ist, fand Herr Boissier im Piemont in der Val Seana auf granitischen Felsen der montanen Region (wo man Mais baut). Hieher ziehe ich die Clusische Figur rechts nebst deren Bezeichnung: *Jacea montana villosa capite humilior* (Cl. pan.) vel quinta (id. hist.) so wie das darauf bezügliche Citat Bauhins (im Pinax 271) die *Jacea angustifolia capite hirsuto*, welche beide in Linné's Synonymen inbegriffen sind. Bei dieser Pflanze fand ich den Pappus bald nur halb so lang als Achän (und dann schmutzig roth) und bald eben so

lang als dasselbe (und in diesem Falle weisslich). Diesen Unterschied zeigten zwei Exemplare vom nämlichen Standort.

CENTAUREA.

*rhætica* (Vid. ic. 3.) lanugine rara e villis cylindricis contractis composita in caule et dorso foliorum juxta nervos vestita, caule adscendente vel suberecto subramoso, foliis facie glabris radicalibus petiolatis subrotundis ovalibusve caulinis inferioribus petiolatis ovato-lanceolatis, summis sessilibus lanceolatis subulatisve, involucri squamis ciliis longis pectinatis. In rupibus et pascuis aridis Rhætiae et Italiae superioris. — Fl. Mense Julio.

*Car. naturalis.*

Radix (seu caulis pars subterranea) transversalis vel erecta, indivisa fibris longis stipata. Caulis angulatus solitarius (rarius plures e una eademque radice) adscendens 4—6 pollicaris simplex vel a medio ramum unum alterumve moncephalum gerens (rarius diffusus ramosissimus) angulosus sublanuginosus subcontortus. Folia rigida dentata margine subtusque juxta nervos parce lanuginosa, supra glabra (in *C. phrygiae* formis semper plus minus pilis conicis aspera sunt) radicalia petiolata subrotunda (in planta italica subcordata) ovaliave, caulinea inferiora ovato-lanceolata petiolata, superiora sessilia lanceolata subulatave capitulum fere cingentia. Capitulum grossae nucis Avellanæ magnitudine sed ovatum, solitarium. Involucrum e squamis imbricatis appendicibus longe ciliatis re-

curvisque. Squamæ exteriores fuscae a basi ad apicem ciliis longis stipatae, interiores subulatae integræ appendice ciliato. Cilia denticulata basi atra apice rufa cum nervo medio recurva. Receptaculum pilosum pilis copiosis simplicibus albis. Achænium immaturum pubescens pappo multiplici serie coronatum. Pappus rufus, pili simplices minutissime denticulati. Corolla florum fertilium longe tubulosa; tubus superne dilatatus quinquefidus; corollæ laciniae lineares purpureo-lilacinæ æquales. Flores marginales radiati, neutri, steriles, corolla tubulosa superne inæqualiter 5. fida. Antherarum tubus longus quinquedentatus albus. Stylus glaber annulo e villis composito coronatus in stigmate bifido purpureo-lilacino desinens.

β. Variat caule diffuso foliis caulinis subcordato-sessilibus (ut in *Cent. phrygia*) grosse dentatis. Occurrit in solo pinguiori.

*Erklärung der Abbildung:*

1. Die Pflanze in ihrer natürlichen Grösse.
2. Die Schuppen des Involucrums etwas grösser als natürlich.
3. Ein Theil des Stengels sehr vergrössert; um die Natur der Haare darzustellen.

Diese neue *Centaurea* findet sich in den sogenannten Zügen (so wird der Weg von den Wiesen nach Davos genannt) an Felsen die spärlich mit Kiefern bewachsen sind, und unweit des Dorfs

Schmitten am Wege nach den Wiesen, wo sie auf einer steinigen, mit Rasen überzogenen und mit Gebüsch bewachsenen Halde wächst. Den erstern der genannten Standorte muss man in die subalpine Region setzen, während der letztere noch der montanen angehört; ersterer hat eine Lage nach Osten und letzterer nach Süden oder Südosten; ersterer beherbergt nur wenige Exemplare, auf letzterem sah ich wohl über Hundert. An beiden Orten ist Kalkformation. — Ganz mit den Bündner-Exemplaren übereinstimmend findet sich diese *Centaurea* auf den Corni di Canzo in Obër-Italien, woselbst sie H. Hauptmann Ul. v. Salis und H. Bentham der Verf. einer Monographie der Labiaten, sammelten.

### *Kritik der Species.*

Nachdem ich das DeCandoll'sche Herbarium in seinen *Centaureen* durchgesehen und alle mir bekannten Abbildungen mit meiner Pflanze verglichen hatte, musste ich mich überzeugen, dass ich eine neue *Species* vor mir habe. Bis auf die *Cent. pectinata* habe ich alle verwandten Arten und Abarten in der Natur selbst beobachtet und die *Cent. austriaca* in Chur in einem Garten cultivirt und später auch aus Grätzer-Samen gezogen im botanischen Garten zu Genf beobachtet. Auf diese Erfahrungen gestützt, will ich hier die Unterschiede folgen lassen, die die *Cent. rhætica* von den verwandten Pflanzen trennen.

### *Vergleichung der Species.*

#### *Centaurea rhætica.*

Schwach weichhaarig.

Ästig in wenigstens  $\frac{3}{4}$  der von mir beobachteten Exemplare. Bei der diffusen Varietät von unten an verästet und zwar dass die Äeste noch mehrblumig sind.

Die Äeste reichen nicht bis zum Niveau der Centralblume und sind abstehend.

Grösse von 4—9 Zoll.

Grösse der Blumenköpfchen  $\frac{1}{2}$  Zoll.

Ansteigend oder Diffus.

#### *Centaurea phrygia* Auct.

Rauhe und weiche Haare.

In seltenen Fällen ästig.

Die Äeste reichen in den genäherten Formen über das Niveau der Central-Blume hinaus.

Grösse von 2 Zoll bis  $1\frac{1}{2}$  Fuss.

Grösse der Blumenköpfchen  $\frac{1}{2}$ —1 Zoll.

Meist aufrecht.

Stengelblätter sitzend oder halb umfassend.

*Centaurea rhætica.*

Schwach weichhaarig.

Die Wurzel treibt nur einen Stengel und wenige Wurzel-Gemmenblätter.

Die Pflanze verästet sich in der Var.  $\beta$  von der Basis an.

Grösse 4—9 Zoll.

Grösse der Blumenköpfchen  $\frac{1}{2}$  Zoll Diameter.

Stengelblätter meist lanzett- oder pfriemenförmig in der Var.  $\beta$  nur eirund.

*Centaurea rhætica.*

Schwach weichhaarig, wodurch das helle Grün der Pflanzen kaum verändert wird.

Schwach ästig, selten diffus.

Grösse von 4—9 Zoll.

Hüllen (involucra) an der Basis ziemlich gewimpert.

Stengelblätter sitzend oder halb umfassend.

In den Fällen wo diese Art ansteigend wird ist sie immer kleiner als die *Cent. rhætica*.

Stengelblätter sitzend und meist geöhrt.

*Centaurea austriaca* Willd.

Rauhhaarig.

Die Wurzel treibt (wie es die Clusische Figur gut angibt) viele Wurzelblätter und mehrere Stengel.

Die Pflanze verästet sich beständig nur an ihrem obern Theile.

Grösse  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss.

Grösse der Blumenköpfchen 1 Zoll Diameter.

Stengelblätter beständig eirund.

*Centaurea pectinata* L.

Grösstentheils weiche Haare (villi cylindrici) mit wenig rauhen (pili elongato-conici) untermischt machen die ganze Pflanze grau.

Meist diffus, selten aufrecht und wenig ästig.

Grösse ungefähr und im Durchschnitt 1 Fuss.

Hüllen an der Basis ziemlich nackt, d. h. die Wimpern sind so spärlich, dass die Schuppe grösstentheils unbedeckt bleibt.

Stengelblätter halbumfassend, geöhrt, immer an der Basis am breitesten.

*Centaurea rhætica.*

Schwach weichhaarig, hellgrün.

Meist ästig, bisweilen sogar diffus.

Grösse der Köpfchen  $\frac{1}{2}$  Zoll Diam.

Hüllen an der Basis ziemlich gewimpert, jedoch so dass man die Schuppen noch durchscheinen sieht.

Ausser den in obiger Zusammenstellung angegebenen Unterscheidungsmerkmale besitzt die *C. rhætica* noch eines, welches sie von allen verwandten Species auf den ersten Anblick unterscheidet, nämlich der gänzliche Mangel an Haaren auf der Oberseite der Blätter. Es ist zwar auf dieses Merkmal, wenn es sich vom Unterscheiden der Arten handelt, kein Gewicht zu legen; aber für eine gewisse Klasse von Botanikern ist es nicht unwichtig ein sicheres und beständiges Abzeichen zu haben. — Die relative Grösse des Pappus zum Achäus kann ich bei meiner Species nicht angeben, da ich keine reifen Samen habe. Constant habe ich jedoch denselben nur bei der *C. austriaca* gefunden, wo der

*Centaurea uniflora* L.

Dicht weichhaarig, filzig, weissgrau.

Bisher immer nur mit einfachem Stengel und einblumig gefunden.


Grösse der Köpfchen meist 1 Zoll Diameter.

Hüllen an der Basis ganz mit Wimperhaaren überzogen.

Pappus nur die Hälfte der Länge des Achäus erreicht. Die meisten Formen der *C. phrygia* haben einen Pappus der ziemlich so lang als das Achäus ist; allein bei der letzteren (*C. phrygia*, *montana*) (der *C. phrygia* Koch) habe ich an zwei verschiedenen Exemplaren einen langen und einen kurzen bemerkt; ich kann mithin in diesem Punkte der Koch'schen Diagnose meine Zustimmung nicht ertheilen.

Um den Zusammenhang der Pflanzen aus dieser Gruppe, wie ich mir ihn ihrer innern Verwandtschaft nach und aus den äussern Ursachen der horizontalen und vertikalen Verbreitung abgeleitet denke, anschaulich darzustellen, entwerfe ich folgendes Schema :





Zum Schlusse will ich noch einige Abbildungen und Synonymen mit unsern Pflanzen in Uebereinstimmung zu bringen suchen. — *C. pectinata* Reich. ic. 556 ist falsch bestimmt oder falsch gezeichnet; dagegen ist N° 865 im siebennten Bande richtig. *C. austriaca* in Reich. ic. 555 ist die *C. phrygia* major; sie nähert sich jedoch der wahren *C. austriaca* W. und wäre somit eine Mitelform. *C. cirrata* Reich. ic. 10. f. 1295 ist nach Koch zur *C. austriaca* W. zu

ziehen, was nicht übel geht; allein der Standort (piedmontesische Thäler) deuten eher auf eine wohlgenährte *C. phrygia* montana. Prof. DeCandolle hat meine *C. rhætica* zur *C. austriaca* gezogen, was mir aber keine geglückte Vereinigung zu sein scheint. Wer sich die Mühe geben will, meine nach meinem Bewusstsein naturgetreue Auseinandersetzung aufmerksam zu durchgehen, der mag entscheiden wer Recht hat.

## CICHORACEAE.

## LAMPSANA.

*communis* L. In Aeckern, auf Schutt und andern dergleichen Stellen. Geht bis nach Tawetsch. — Sommer.

## APOSERIS.

*foetida* Less. Ich glaube sie in Bergwäldern in Bünden gesehen zu haben, bewahre aber von daher kein Exemplar auf. — Sommer.

## CICHORIUM.

*Intybus* L. An Wegen überall. — Sommer.

## HYPOCHERIS.

*radicata* L. Bei Untervatz, auf Valzeina, zwischen Chur und Ems, im Ober-Engadin, auf Wiesen und Weiden. Sommer.

## ACHYROPHORUS (ehemals auch Hypochaëris).

*helveticus* Scop. Auf fast allen alpinen und subalpinen Weiden und Wiesen. — Sommer.

?Den *A. maculatus* Scop. habe ich in Graubünden nicht gefunden und die ältern Botaniker die ihn angeben, mögen wohl obigen dafür genommen haben.

## LEONTODON (auch Apargia).

*squamosum* Lam. Auf dem Augstberg oberhalb Parpan und anderwärts. Oberhalb Samaden auf der Granißpitze neben dem Piz della Padella in einer Höhe von ungefähr 7800' fand ich neben der behaarten Form (die der eigentliche *L. squamosum* ist) an einer und der-

selben Stelle eine kahle Varietät, die ein vollkommener *L. hastile* ist. — Sommer.

*hastile* L. Ueberall auf Wiesen bis in die alpine Region (Alphütten vom Albula). — Mai bis Juli.

*hispidum* L. Bei Chur, Ilanz und andern Orten sehr gemein. Wächst auf Wiesen, Weiden und an Wegen. Ist von voriger Art kaum zu trennen, wie denn das ganze Geschlecht nur eine Reihe bildet, aus der wir einzelne Punkte hervorheben. — Sommer.

*crispum* Vill. Im Liviner- und Camogasker-Thal nach Prof. Heer; auf der Scaradra (H. Nägeli), auf dem Joch (d. Verf.). — Sommer.

*dubium* Reich. Auf dem Uebergang von der Fürstenalp nach den Calfreiser-Heubergen. — Sommer.

*incanum* DC. Im Engadin (Bovelin) auf dem Albula (Muret), auf dem Joch Churwalderseits und bei Reichenau (der Verf.). — Mai bis Juli.

## APARGIA.

*Taraxaci* Willd. Auf Kalksteingeirölle auf dem Calanda und Levirone bis in die nivale Region; sodann in Segnes (d. Verf.). Nach Exemplaren die mir H. Pfarrer Felix gütigst mittheilte, im Rheinwald und vermuthlich noch vielfach anderwärts. — Sommer.

## OPORINIA.

*autumnalis* Don. An Wegen und in Wiesen fast überall. Geht in die mont. Thäler. — Sommer und Herbst.

## TRAGOPOGON.

*pratense* L. Auf allen Wiesen bis in die subalpinen Höhen (Rheinwald). — Sommer.

## SCORZONERA.

*humilis* L. et Koch. Auf dem Sarganser-Ried zu beiden Seiten der Heerstrasse in ziemlicher Anzahl. — Mai.

## PICRIS.

*hieracioides* L. Bei Chur auf St. Antonien fand ich einmal ein Exemplar dieser Pflanzen die hierseits der Berge äusserst selten zu sein scheint. Häufiger ist sie im obern Veltlin. — Sommer.

## LACTUCA.

*perennis* L. An dürren Halden am Fusse des Calanda zwischen Feldsberg und Haldenstein, zwischen Scheid und Rothenbrunnen, bei Alveneu, Filisur und Unter-Engadin. — Juni und Juli.

*Scariola* L. Nach Dick in Graubünden. Ich fand eine Lactuta bei Tiran, erinnere mich aber nicht welche.

*muralis* DC. prod. (*Prenanthes muralis* L.). In dunkeln Wäldern und auf Mauern fast überall. — Sommer.

## CHONDRILLA.

*junceae* L. Im obern Veltlin. — Juni.

*prenanthoides* Vill. An den Ufern der Albula bei Alveneu, der Landquart im Brättigau und der Plessur unter Maladers und von diesen Flüssen an den Rhein geführt. — Juni bis August.

## TARAXACUM.

*Dens-leonis* Desf. Auf allen Wiesen.

und Weiden von der Ebene an bis über die alpine Region hinaus (so auf dem Calanda). — März bis August.

*alpestre*. Nach Custor auf dem Calanda; von mir in der Celleriner-Alp gefunden. — Sommer.

*palustre* DC. Auf dem Sarganser-Ried. — Mai.

WILLEMETIA (*Chondrilla Poldidium*).

*apargioides* Less. (Jacq. fl. austr. 5. t. 293) (*Zollikoferia* Gaud.). Auf sumpfigen Wiesen der alpinen und subalpinen Region; so oberhalb Churwalden, Parpan, auf Davos, in Erosen (5774' s. m.) (d. Verf.), im Rheinwald (Pfr. Felix), auf dem Malöja (5634' s. m.) (Pr. Heer). — Juni und Juli.

## CREPIS.

*alpestris* Tausch. Durch den ganzen Canton verbreitet. Auf Wiesen und Weiden der alpinen, subalpinen und montanen Region; so in der Haldensteiner-Alp auf dem Calanda, im Ober-Engadin, auf der Oberalp, Davos; Erosen, Bizockel bis nahe an Chur herabsteigend. — Juni und Juli.

Hier muss ich einer Pflanze erwähnen, die Prof. Heer zuoberst auf dem Levirone fand. Sie ist unstreitig mit *Crepis alpestris* nahe verwandt, könnte jedoch eine eigene Species bilden und in dem Falle schlug ich vor sie *Crepis Heeri* zu heissen.

*hyoseridifolia* Reich. Auf den Glarneralpen häufig nach Hegetschweiler

und Heer, nach Tausend auf dem Calanda, von mir auf dem Augstberg oberhalb Parpan am Uebergange nach Urden und auf dem Levirone (wenn ich nicht irre) im Engadin bemerkt. Scheint sich auf der Schieferformation zu gefallen. — Sommer.

*chondriloides* Fröehl. Auf dem Albulathal, Ofen, im Liviner- und Camogaskerthal nach Thomas, Bovelin, Heer und Muret. Nach H. Nägeli auf dem Fräla. — Sommer.

*prunellaeifolia*. Oberhalb Worms (Bormio) nach Prof. Heer. — Sommer.

*aurea* Cass. (*Hieracium aureum* L.). Auf Wiesen und Weiden der montanen subalpinen und alpinen Region, durch ganz Bünden. — Sommer.

*blattarioides* Vill. Auf alpinen Wiesen häufig. Auf Davos, Runkeliet etc. — Sommer.

*grandiflora* Fröehl. In subalpinen Wiesen und Weiden, auf dem Bizockel, bei Runkeliet, in den Thälern Davos, Medels, Ober-Engadin (zwischen Brail und Zernetz) und vielen andern Orten. — Sommer.

*montana* Reich. Auf dem Scesaplana, oberhalb Parpan, auf Davos, im Rheinwald auf alpinen und subalpinen Wiesen. — Sommer.

*praemorsa* Fröehl. Auf Wiesen und Weiden der montanen Höhen, so beim Städeli bei Chur, oberhalb Maienfeld. — Juni.

*paludosa* Moench. Auf sumpfigen Stellen der montanen Region, so bei Praden, Lax und Saas im Prätigau und im Unter-Engadin. — Sommer.

*setosa* L. Bei Chur auf dem Lendischnen Rheingut (obwohl zufällig mit fremdem Grassamen eingeführt?) bei Tiran im Veltlin. — Sommer.

*virens* L. Auf Wiesen häufig, durchs ganze Oberland, bei Chur, im Bergell etc. — Sommer.

*stricta* DC. Bei Untervatz. Möchte wohl mit obiger zu verschmelzen sein.

*biennis* L. Auf allen Wiesen. Blüht vom Juni an.

*tectorum* L. Bei Tiran im Veltlin. — Juni.

#### SONCHUS.

*asper* Vill. An Wegen und auf Schutt. — Sommer.

*laevis* Vill. In Gärten, auf Aeckern, als Unkraut fast überall. — Sommer.

*arvensis* L. In Aeckern bei Chur, Malix u. a. O. — Sommer.

#### PRENANTHES.

*purpurea* L. In montanen Laubholzwäldern, häufig bei Chur u. a. O. — August — Herbst.

#### MULGEDIUM (Sonchus).

*alpinum* Less. (Nach Smith der *Sonchus canadensis* L.) Nicht selten auf unsern Bergen, gewöhnlich in Ellern-Gebüsch (*Alnus viridis*) so bei Chur auf dem Bizockel, hinterhalb Tschierschen und oberhalb Parpan. — Sommer.

## HIERACIUM.

*Pilosella* L. Auf magern Triften, an Wegen und Halden. Nach einer mässigen Berechnung finden sich allein auf der Emser-Ebene gegen Reichenau hin wenigstens 500,000 Exemplare. Eben so erinnere ich mich in einem Reisebericht von Prof. Tenore eine Bemerkung gelesen zu haben, aus welcher das einförmige und eben so häufige Vorkommen dieser Pflanzen in den Neapolitanischen Gebirgen hervorgeht. — Sommer.

*pilosellaeformis* Fröhl. (*H. Pillosella*, Hoppeanum Schult.) Unter andern Stellen auf dem Joch bei Chur und auf dem Mittenberg. — Sommer.

*dubium* Willd. (*H. Auricula* L. ex Fröhl.) Auf Wiesen fast überall, selbst in den alpinen Höhen (Albula, Calanda), wo es aber meist einblumig erscheint. — Sommer.

*angustifolium* Hoppe. Ich habe es aus den Averser-Alpen, vom Albula, wo es nicht weit unter dem Uebergangspunkt vorkommt, und aus der Alp Segnes. — Sommer.

β) *H. angustifolium*, *fuscum* (Vid. ic. nost. 5). Ich gebe eine Abbildung dieser Pflanze weil sie mir wieder etwas Licht auf die Verwandlung der Hieracien zu werfen scheint. Sie wurde von H. Prof. Heer auf dem Bernina gefunden und von seinen Exemplaren ist die Abbildung genommen. Die Verwandtschaft mit dem gewöhnlichen *H. angustifolium* ist deutlich und die

Abweichung von demselben weist eben so klar auf die luxurianten Formen des *H. dubii* hin, so dass man hier im Grunde die gleiche Erscheinung nur auf einer andern Stufe findet. Hieher ziehe ich das *H. fuscum* Vill. L. et N. Voy. en Suisse. Die Abbildung, die diese Botaniker gaben, ist jedoch nicht gut, stellt wenigstens unsere Pflanze nicht getreu dar. Ihre Exemplare fanden sie auf dem Splügen.

*sphaerocephalum* Moesl. et Reich. In Avers und dem Beverser-Thal (Prof. Heer), im Bernina-Heuthal (ebender-selbe und der Verf.). — Sommer.

*piloselloides* Vill. Delph. t. XXVI. Bei Chur, Cleyen, Brienz und Alveneu. — Sommer.

*praetium* Gochn. Auf Bergen (beim Städeli unweit Chur), besonders häufig aber auf Sand und Steingerölle der Flüsse. — Sommer.

*cymosum* Vill. et Wallr. *H. collinum* Gochn. ! *H. fallax*, *exstolonosum* Gaud. Zu Davos auf Flussgeschiebe, im Ober-Engadin (an beiden Orten eine dem vorigen sich annähernde Form), aber besonders deutlich ausgesprochen in Araschgen und unterhalb dem Eber unweit Chur im Gebüsch. — Sommer.

*aurantiacum* L. Nach Pol in Rhätien, nach Scheuchzer in Avers, nach Custor auf dem Sarganser-Bergen, nach meinen Beobachtungen auf Wiesen bei Klosters, auf Davos, in der Malixer-Alp und im

Ober-Engadin bis in die Höhe von 6000'.  
— Sommer.

*glaucum* All. (*H. porrifolium* Jacq. austr. t. 286 non auct. post.) Bei Battegna auf dem Calanda und im Sand und Steingerölle am Rhein und der Plessur bei Chur. — Sommer.

*staticefolium* All. In Puschlav, Calanca, Nufenen, Ober-Engadin auf dem Ofen, in Livino (Prof. Heer und d. Verf.). — Sommer.

? *rupestre* All. Im Camogasker-Thal, auf dem Ofen und in Livin (Prof. Heer). Ich habe die Heerischen Pflanzen nicht gesehen und kann also nicht bürgen dass sie nicht mit andern hier angeführten Species zusammen fallen.

*saxatile* Jacq. Ein H. Brunner aus Bern sammelte diese Art in Rhätien. Sein Exemplar kann fast ebensogut zu *H. glaucum* als zu *H. flexuosum* gezogen werden.

*flexuosum* W. et K. Kommt nicht selten vor. Mit Gewissheit kann ich nur einen Standpunkt nennen, den nämlich wo H. Muret es fand, bei der Kirche in Avers. — Sommer.

*villosum* L. Auf allen Bergen (im Rheinwald, in der Langwies, im Engadin etc.).

β) *valde-pilosum*. In der Cellerner-Alp (d. Verf.), auf dem Vögeliberg, Bernhardin und in der Vruin-Alp (Prof. Heer). — Beide Varietäten blühen im

Sommer und finden sich in der alpinen Region.

γ) *elongatum* (*H. elongatum* Willd. und *H. dentatum* Hoppe). Diese Pflanze und zwar in ausgezeichneter Uebereinstimmung mit getrockneten Exemplaren von Hoppe und andern Autoren findet sich oberhalb Parpan an einem Bache auf gutem Wiesenboden, wohin höchst wahrscheinlich Samen es gebracht haben, die von einem daneben stehenden dürrn Abhang wo die gewöhnliche Form des *H. villosum* wächst, gefallen sind.

δ) *glabratum*. Im Rheinwald bei Nufenen.

*alpinum* L. Auf subalpinen und alpinen Wiesen und Weiden. So im Unter-Engadin, auf Davos, bei Salsanna und Stalla, im Dischma-Thal, in der Cellerner-Alp, und in einer Alp die nach Sagens gehört. — Sommer.

*Schraderi* DC. ! Auf alpinen Weiden. Im Bernina-Heuthal, Rosetsch, auf dem Calanda, Joch, Augstberg, oberhalb Samaden (d. Verf.), auf dem Bernhardin (Heer). — Sommer.

*glanduliferum* Hoppe. Auf Alpenweiden ziemlich gemein. Ich habe es vom Augstberg, Bernhardin u. a. O. — Sommer.

*sylvaticum* Lam. Gemein an etwas besser genährten Stellen als wo das folgende vorkommt.

*murorum* L. Sehr gemein auf Gestein

und Sand, auch auf Bergen und unter Gebüsch.

*bifidum* Kit. Auf dem Albula am Wege im Herabsteigen nach Ponte auf Abhängen (der Verf.). — Sommer. — Das oben angeführte *H. rupestre* könnte vielleicht mit seinen Angaben hierher zu ziehen sein.

*umbellatum* L. In Gebüsch bei Truns und Seewis, auf offenen Stellen bei Chur am Rheine, in einem Eichenwald unterhalb Maladers (d. Verf.). — Sommer.

*sylvestre* Tausch. (*H. sabaudum* auct. helv.). Zwischen Feldsberg und Tamins an einem mageren Bergabhange. — Herbst.

*prenanthoides* Vill. In Laubholzwäldern der montanen und subalpinen Region; so auf dem Bizockel bei Chur, auf den Bergen bei Maienfeld, nach Heer in Avers, nach Suter auf dem Splügen. — Sommer.

*Jacquinii* Vill. Auf dem Fräla nach Dick, an Felsen bei Haldenstein, Unter- vatz und im Puschlav (der Verf.). — Sommer.

*amplexicaule* L. An Felsen und auf Felsenschutt bei Angelo custode im Puschlav, im Misox, bei Schmitten und bei Thusis. — Sommer.

*picroides* Vill. voy. suiss. t. I. Nach Villars selbst auf dem Valser-Joch, nach Seringe auf dem Gotthard. Ich habe es noch nicht finden können. — Sommer.

*intybaceum* Jacq. (*H. albidum*). Hält

sich zwischen 5—6000'. In der Zaportalp (Gaudin) im Averser-Thal (Muret), bei Nufenen (Pfr. Felix), in der Celleriner-Alp, in Tawetsch und Medels häufig (d. Verf.). — August.

*nivale* Froehl. mss. DC. prod. Wird von Fröhlich als auf dem Ortler wachsend angegeben. Ich kenne diese Pflanze nicht.

## CAMPANULACEAE.

### JASIONE.

*montana* L. Bei Soglio und in Misox; diesseits der Wasserscheide sah ich sie nirgends. — Juni und Juli.

### PHYTEUMA.

*orbiculare* L. Erscheint häufig durch das ganze Land in folgenden Formen:

*orb. cordatum* Gaud. (Ph. Bovelini Hegetsch.) Einige Zoll hoch mit herzförmigen Wurzelblättern; im Camogasker-Thal (Prof. Heer), in der Celleriner-Alp (d. Verf.), auf trocknen Weiden an Halden in der alpinen Region. — Sommer.

*orb. ellipticum* Gaud. Eine fuss-hohe Mittelform mit elliptischen Wurzelblättern; überall auf subalpinen Wiesen. — Sommer.

*orb. elongatum*. An zwei Fuss hoch mit ovalen verlängerten Blütenköpfchen: eine Form die in hohem Gras oberhalb Parpan mir vorgekommen ist. — Sommer.

*Columnæ* Thom. An der sonnigen Halde auf Felsen unter Scheid (d. Verf.), bei Clefen (Gaud.). — Juni.

*Scheuchzeri* All. Bei Rhäzüns, in Misox, in der Via-mala, zwischen Samaden und Cellerina u. a. O. Nach H. Muret bei Brusio. Eine Felsenpflanze die bis in die alpinen Höhen steigt. — Sommer.

*humile* Schleich. Im Bernina-Heuthal nach Heer, Muret, Nägeli und Bovelin. H. Wirth und ich fanden diese seltene Species auf Felsen an der Bernina, zwischen Pontresina und dem Bernina-Wirthshaus. Nach einem Exemplar des Hallerschen (des Sohns) Herbariums findet es sich auch auf dem Splügen. — Juli.

*hemisphaericum* L. Kommt in folgenden Formen häufig auf unsern Alpenweiden vor :

1. foliis radic. caule brevioribus subaequantibusve, caulinis bracteis similibus serratis, ciliatis, bracteis ovato-acuminatis ciliatis. In den Engadiner Alpen auf offenen Stellen.

2. foliis rad. caule brevioribus, caulinis super. bracteis simillimis, bracteis ovato-lanceolatis serratis ciliatis, caule unipedale. Unter Gebüsch in tiefen Schatten und auf gutem Boden im Salsanna-Thal am Fusse des Scaletta. — August.

3. foliis rad. caule brevioribus, caulinis linearibus subulatisve serratis, bracteis ovato-acuminatis ciliatis. —

Die gewöhnlichste Form, die allenthalben vorkommt.

4. foliis rad. flaccidis caule longe superantibus, caulinis linearibus remotissime serrulatis, bracteis ovato-acuminatis. Eine interessante Form mit halbfusshohem Stengel und fusslangen Blättern. Sie kommt in Felsenritzen zwischen Andermatt und der Teufelsbrücke vor. — Sommer.

*globulariaefolium* Sternb. Dieses Pflänzchen fand ich nie unter 8000' Höhe; so auf der Granitspitze oberhalb Samaden, zuhinterst in Medels, auf dem Levirone, in der Alp Segnes. Nach Muret im Umbrail und auf dem Albula. Gesner, Schleicher, Pfr. Felix, Nägeli und Tausend fanden es auf dem Bernina, Scopi, Scaradra und an andern Stellen in Bünden. Wenn auch dieses Ph. glob. nur eine Varietät des Ph. pauciflori L. sein mag, so hielt ich es angemessener unsere Pflanze unter Sternbergs Namen aufzuführen, dessen Diagnosis ganz auf sie passt. Alle Pflanzen, die ich in Bünden fand oder von andern gefunden mir zu Gesicht kamen, gleichen sich vollkommen, keine ist ein ächtes Ph. pauciflorum. — August.

*betonicaefolium* Vill. Sehr gemein auf Wiesen und Weiden in Graubünden (Davos, Misox, Ober-Engadin etc.). Steigt aus der montanen Region bis auf 6000' Höhe im Engadin. — Juni.

Variirt mit kahlen und behaarten Blättern.



*spicatum* L. Auf feuchten Wiesen der Ebene, an Waldsäumen und andern Orten der Ebene. Bei Fläsch und Marschlins erscheint es mit blauen Blüten. — Juni.

*Halleri* All. In fast allen subalpinen Thälern Graubündens (bei Klosters auf Davos, Rheinwald, Bergell, bei Parpan und Churwalden etc.) in Wiesen. — Sommer.

*Michellii* All. Nach E. Thomas bei Splügen, nach Ph. Thomas auf dem Bernhardin und nach Hegetschweiler in den Glarner-Alpen. — Sommer.

SPECULARIA (*Campanula Speculum* L.).

*segetum* Alph. DC. In Aeckern des untern Misox. — Juni.

#### CAMPANULA.

*rotundifolia* L. Auf verschiedenen Stellen von der Ebene an (1700') bis in die Höhe von 7000' (so auf dem Uebergang des Augstbergs). — Sommer.

*Scheuchzeri* Vill. Bei Runkelier, auf dem Bizockel und in den Churer-Alpen. — Sommer.

*pusilla* Hænke. Auf Steingerölle an der Plessur bei Chur, am Gypsbruch bei Samaden, im Unter-Engadin und vielen andern Orten. — Sommer.

*rapunculus* L. Von der Burgruine von Misox an abwärts durchs ganze Thal. — Juni.

*patula* L. Bei Chur, Bonaduz, Zizers (im Ried), bei Lavin, im Bergell an Wegen und in Wiesen. — Mai und Juni.

*rhomboidalis* L. Geht vom Westen her von den Savoyer-Alpen bis zum Ursern-Thal, verschwindet ganz in Graubünden und kommt erst wieder in Krain zum Vorschein. — Sommer.

*cenisia* L. Ich erhielt dieses Pflänzchen von Pfr. Felix aus dem Rheinwald und fand es später selbst auf Flussgeschiebe im Thal Segnes (Flimser-Alp). Auf dem Mischum im Unter-Engadin (Prof. Heer). — Sommer.

*Trachelium* L. In Hecken bei Feldsberg. — Sommer.

*urticifolia* Schm. Bei Chur, Praden, im Lugnetz und andern montanen Gegenden in Gebüsch. — Sommer.

*rapunculoides* L. Häufig auf schattigen und sonnigen Stellen bei Chur. — Sommer.

*aggregata* Willd. Durch die ganze Ebene häufig. — Juni.

*glomerata* L. Bei Alveneu, Samaden und Lenz, im Unter-Engadin in Wiesen. Ist bei weitem seltener als die vorige und nur durch Verwechslung mit jener hielt man sie für gemein. — Juli.

*thyrsoidea* L. Auf Alpenweiden bis 6000' hoch nicht selten (Rheinwald, Augstberg etc.). — Sommer.

*barbata* L. In der montanen und alpinen Region, auf Weiden nicht selten. — Sommer.

*alpina* L. Schleicher soll sie aus Rhätien haben. Prof. Heer fand im Beverser-Thal *Campanula*-Formen, die er hieher zieht. — Sommer.

*spicata* L. Im untern Misox nicht selten. — Juni.

Anmerk. Zweifelhaft scheinen mir Camp.

*Cervicaria* L., die Magister Rösch auf dem Falkniss und in der Casanna bei Conters angibt, so wie Camp. *excisa* Schleich. die Chirurg Tausend in der Flimser-Alp gefunden zu haben vorgegab. Seither finde ich diese letztere auch in der Flora Comense von Camolli als auf der Spitze des M. Brailio wachsend angegeben.

## VACCINEAE.

### VACCINIUM.

*uliginosum* L. Bei uns nur in der alpinen und subalpinen Region, gewöhnlich in Gesellschaft der Heidelbeere. — Sommer.

*Myrtillus* L. In montanen und subalpinen Wäldern und in der alpinen Region theils an freien Stellen, theils im Schutze von Alpenrosen und Tross (*Alnus viridis*). — Juni.

*Vitis-idaea* L. Auf dünnen Halden der montanen und subalpinen Region, bei Chur auf dem Bizockel, im Giorjer-Wald unter Splügen u. a. O. häufig. — Mai und Juni.

### OXYCOCCOS.

*palustris* Pers. Auf zwei Torfgründen: der eine auf der Lenzer-Heide an der Westseite des grossen See's (4940'), der andere unweit der Brücke die von Pontresina ab nach St. Moritz und

Cellerina führt (ungefähr 5200'). — Juni.

## ERICACEAE.

### CALLUNA.

*vulgaris* DC. Fast überall in der alpinen, subalpinen und montanen Region. — Sommer.

### ERICA.

*carnea* L. Gewöhnlich in der montanen Region in Wäldern und unter Gebüsch im ganzen Rheingebiet. — Die Blümchen bilden sich im Herbst um in dem darauf folgenden ersten Frühling (März) aufzubrechen.

*arborea* L. Nach der Flora Comense bei Clefen und Morbegno.

### ARCTOSTAPHYLOS.

*alpina* Spreng. In der Malixer-Alp, Carmenna und an andern Orten, an Halden und Felsen. Eine alpine Pflanze die schon im Mai und Juni blüht.

*Uva-ursi* Spreng. Bei Chur auf dem Rheinsand, zwischen Lax und den Flimser-Waldhäusern auf Gestein. — Sommer.

### RHODODENDRUM.

*ferrugineum* L. In der alpinen Region, für die es bezeichnend ist. Aus dieser steigt es zuweilen in die tiefer gelegenen Gegenden, wie z. B. (nach Prof. Heer) auf die Ruinen von Plurs. — Juni und Juli.

*hirsutum* L. Weniger häufig als ersteres und oft mit ihm vermischt

wachsend, so auf dem Calanda, Bizockel, in der Carmenna und bei Tarasp. — Juni.

*Chamaecistus* L. Nach Dr. Massara auf dem Monte Braulio (Umbrail). Diess wäre, wenn die Angabe richtig ist, die westlichste Grenze dieses Strauches. — Ende Juli.

#### LOISELEURIA.

*procumbens* Desv. (*Azalea procumbens* L.). Bildet heideartige Stellen in der alpinen Region. Ich fand es auf den Bergen bei Chur herum, im Unter-Engadin etc. — Sommer.

### PYROLACEAE.

#### PYROLA.

*rotundifolia* L. Unter Gebüsch und in Wäldern der Ebene. Bei Chur etc. — Juni.

*rosea* Sm. (Rad. mon. f. 2). In den Wäldern des Ober-Engadins. — Juli.

*chlorantha* Sw. Nach U. v. Salis in Graubünden.

*secunda* L. In Tannenwäldern der montanen und subalpinen Region. — Juni und Juli.

*uniflora* L. In Tannenwäldern der Ebene und der montanen und subalpinen Region. So im Fürstenwald bei Chur, in den Maiensässen am Bizockel, bei Klosters (Forstinspector Bohl), bei Tarasp, im Rheinwald in 5000' Höhe. — Sommer.

#### MONOTROPA.

*Hypopytis* L. In Tannenwäldern bei Chur (unweit des Städeli) u. a. St. —

### JASMINEAE.

#### LIGUSTRUM.

*vulgare* L. In Hecken der Ebene, überall. — April und Mai.

#### FRAXINUS.

*excelsior* L. In Laubholzwäldern bis ans Ende der montanen Region. Bildet im hintern Lugnetz noch hohe Stämme. — Frühling.

### APOCYNACEAE.

#### VINCA.

*minor* L. In Gebüsch und Wäldchen durch die ganze Ebene hin und wieder. — April und Mai.

### ASCLEPIADEAE.

#### CYRANCHUM.

*Vincetonicum* Pers. In Gebüsch an Halden, wie bei Chur am Wege nach Maladers und an andern Orten, häufig. — Juni.

### GENTIANAEAE.

#### GENTIANA.

*lutea* L. Auf alpinen und subalpinen Weiden, gerne in grobem Gestein. Ist bei uns bei weitem seltener als in der westlichen Schweiz, was vom häufigen

Ausgraben herrühren mag \*). Ich fand sie bei Bategna auf dem Calanda, auf dem Scesa-plana, im Rosetsch-Thale, Celleriner-Alp u. a. O. — Sommer.

Diese Pflanze erzeugt durch Vermischung des Blumenstaubes mit mehreren verwandten Arten hybride Gewächse, deren ich hier Erwähnung thun muss.

1. Aus der Vermischung der *Gentiana lutea* mit der *G. purpurea* entsteht die *Gentiana Thomasii* Hall. f. Sie wurde von Abr. Thomas auf dem Bovonnaz gefunden und, wenn mein Gedächtniss nicht irrt, so behandelt ein Mémoire von Guillemain die gleiche Pflanze, aber vom Mole in Savojen.
2. Aus der Vermischung der nämlichen *G. lutea* mit *G. punctata* entstehen sowohl im Beverser-Thal (nach Heer) als im Rosetscher-Thal (nach des Verfassers Erfahrungen) eine Menge Mittelformen, die bald mehr auf die eine Seite bald mehr auf die andere Seite sich neigen. Da Hr. Prof. Heer die hybriden Gentianen in einer besondern Schrift zu behandeln gedenkt, so kann ich mich hier des fernern füglich enthalten, zumal wenn er seine Abhandlung mit Ab-

bildungen begleiten sollte. Diess ist die *Gentiana Burseri* 7 Fl. fr.

*purpurea* L. Auf Alpenweiden hin und wieder, so auf dem Bizockel, bei St. Maria in Medels, in Ursern, in der Urden-Alp u. a. O. — Sommer.

Zwischen dieser Art und der *Gent. punctata* fand Em. Thomas auf dem Bovonnaz ebenfalls eine hybride Pflanze, die sich jedoch mehr der *purpurea* zuneigt (*Gentiana Gaudiniana* Thom.). Schleicher soll die nämliche Pflanze in Bünden gefunden haben. Die *Gent. pannonica* Scop. könnte wohl aus gleicher Zeugung abzuleiten sein, wenn an der Stelle wo sie vorkommt (ich sah sie in Menge auf dem Untersberge in Salzburg), die beiden Stamm-pflanzen sich vorfänden, was ich aber nicht bemerkte. Wie es sich auf den Sieben Kuhfirsten verhält, wo Herr Dr. Zollikofer von St. Gallen die wirkliche *G. pannonica* Scop. (nach meinem Dafürhalten, das sich jedoch nur auf das Sehen eines Exemplars gründet) fand, weiss ich nicht anzugeben.

*punctata* L. Häufiger als die beiden vorhergehenden. Findet sich in der Churer-Alp, auf dem Montellin, im Camogasker-Thal, Rosetsch-Thal, Beverser-Thal, Celleriner-Alp etc. — Sommer.

\*) Aus der Wurzel dieser Pflanze (und in Ermanglung derselben auch aus denen der *G. purpurea* und *punctata*) wird der Enzner Brantwein gebrennt. Diess wurde und wird noch jetzt so stark geübt, dass mehrere Gemeinden (so Seewis im Brättigau) sich veranlasst sahen, das Wurzelgraben unter schwerer Strafe zu verbieten.

Im Rosetscher-Thal kommt diese *G. punctata* mit ganz gelben ungetupften Blumen vor.

*cruciata* L. Nicht häufig; ich fand sie bei Maladers und bei Samaden (5200'). — Sommer.

*asclepiadea* L. In Bergwäldern und auf grasreichen Halden bis in die alpine Region (in der Parpaner-Alp wenigstens 6000' hoch). Häufig um Chur herum, in Urden, am Heinzenberg. — Herbst.

*Pneumonanthe* L. Auf dem Sarganser- und Maiefelder-Ried. — August — Herbst.

*ciliata* L. Unter Gebüsch am Rhein bei Chur und ebendasselbst in Bergwäldern beim Wilhelmsbad; sodann oberhalb Parpan in der alpinen Region (über 6000' hoch). — Herbst.

*acaulis* L. Auf fast allen alpinen Weiden bis in die montane Region hinab. — Frühling und Sommer.

*alpina* Vill. Auf dem Levirone, im Bernina-Heuthal und auf andern Bergen des Engadins in einer Höhe von 6—7000' fand ich Pflanzen, die ich hieher ziehe. H. Nägeli gibt sie auf dem Tödi an. — August.

*verna* L. In der alpinen, subalpinen und montanen Region, ja in der Ebene von Chur häufig. — Blüht im Frühling.

*brachyphylla* Vill. Auf dem Augstberg am Passe von Parpan nach Urden, in den Engadiner-Bergen; in der subnivalen Region. Nach H. Nägeli auf dem

Scopi, nach Tausend auf dem Calanda und Brüggerhorn. — August.

*bavarica* L. Von den subalpinen Thälern an aufwärts bis auf die Höhe des Scaletta (8060') und des Sandgraths (8600'). Findet sich durch ganz Bünden. — Sommer.

*utriculosa* L. Hin und wieder in der alpinen Region auf dem Bernhardin und Splügen, in der montanen bei Saas, Riedberg und Filisur. — Sommer.

Die Pflanzen die auf wirklichem Sumpfe (nicht an fliessendem Wasser) wachsen, wie die von Saas und noch mehr die von Riedberg, zeichnen sich durch einen schlanken straffen Wuchs von den andern aus; auch ist ihre Blumenröhre um zwei Linien länger als der Kelch, während sonst der Kelch bis ans Ende der Röhre oder fast so weit geht.

*nivalis* L. Meist auf Bergspitzen durch ganz Bünden in einer Höhe von 7-8000' wie auf dem Calanda, Parpanerhorn, Weisshorn und andern Bergen; findet sich aber auch auf der Ebene bei Sils im Ober-Engadin. — Sommer.

*germanica* Willd. Bei Alveneu in Wiesen. Dort blüht sie schon im Juli, während die *G. Amarella* Willd. bei Zürich herum im Oktober in Blüthe steht. Unsere Pflanze ist ausser den breitem Corallenlappen und der geringern Grösse auch dadurch von der Zürcherschen verschieden dass sie schon

in den Achseln des ersten und zweiten Blattpaares Aeste treibt, was bei letzterer in den vierten Blattachseln statt findet und hauptsächlich durch die Blumenstiele, die nicht länger wohl aber kürzer als die sie von unten umgebenden Blattpaare sind. Bloss die endständige Blume hat einen längern Stiel. Hieher muss auch das Hegetschweiler'sche Citat der G. Amarella gezogen werden, die er bei St. Moritz fand.

*campestris* L. Von der Ebene bei Chur, wo sie in grosser Menge steht, bis fast auf die Calendaspitze (8000'), wo sie in einblümigen zollhohen Exemplaren vorkommt.— Sommer und Herbst.

*obtusifolia* Willd. Nach Prof. Heer auf dem Ofen; auch Reg. Hegetschweiler hat sie aus Bünden.

*glacialis* Ab. Thom. In den Rheinwalder-Alpen (Pfr. Felix), auf dem grössern Sattel des Calanda in einer Höhe von ungef. 8000', auf der Ebene von St. Maria in Medels (5600') und im Rosetsch-Thal auf Rasen an Bächen (d. Verf.). — Sommer.

#### SWERTIA?

*perennis* L. Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Hauptm. Ul. v. Salis auf dem Torfgrunde am grossen See auf der Lenzerheide. Da er die Pflanzen ohne Blüthen fand, so fürchte ich dass er das Kraut der *Gentiana asclepiadea*, das ich dort bemerkte, für die *Swertia* nahm. Ich bedaure hiedurch

die Zahl der zweifelhaften Species, die ich zu vermindern trachte, vermehren zu müssen.

#### ERYTHRAEA.

*Centaurium* Pers. Auf magern Triften und sumpfigen Stellen, bei Chur, Zizers u. a. O. — Sommer und Herbst.

*pulchella* Fries. Ich habe dieses Pflänzchen von Untervatz und der Bonaduzer Ebene. — August.

Auf dem Rossboden bei Chur findet sich häufig eine Mittelform der beiden *Erythraen*.

#### MENYANTHES.

*trifoliata* L. Auf sumpfigen Stellen der Ebene (bei Mels) und subalpinen Höhen (in Erosen am See, am Schwarzensee zu Davos und andern Orten). Ist überhaupt nicht selten. — Frühling und Sommer.

### POLEMONIACEAE.

#### POLEMONIUM.

*caeruleum* L. In subalpinen und alpinen Thälern, oft in der Nähe von Alphütten unter Aconiten und Nessel: im Münsterthal bei St. Maria, in Avers, im Rosetschthal, Camogasker-Thal, Liviner-Thal (d. Verf.), in Valtasna, auf dem Ofen, bei Zernetz, auf dem Albula (nach ältern Autoren).—Sommer.

## CONVOLVULACEAE.

## CONVOLVULUS.

*arvensis* L. Auf Aeckern u. a. St. häufig. — Sommer.

*sepium* L. In Hecken fast überall. — Sommer.

## CUSCUTA.

*europæa* L. Auf Nesseln und andern Pflanzen, an vielen Stellen bei Chur, Valendas an der Langwies etc. — Sommer.

*Epithyrum* DC. Bei Tiefenkasten und noch mehrfach anderwärts in Graubünden. — Juli.

## SOLANEAE.

## SOLANUM.

*Dulcamara* L. In Hecken und Gebüsch hin und wieder in der Ebene. — Juli.

*nigrum* L. Auf Schutt, als Unkraut in Gärten, in der Rhein-Ebene und in den montanen Thälern (wie bei Truns). — Sommer.

## PHYSALIS.

*Alkekengi* L. Hält sich blos an die Gegenden des Weinstocks, also bei Chur, den fünf Dörfern und Herrschaft. — Juni und Juli.

## ATROPA.

*Belladonna* L. In Bergwäldern bei Chur am Bizockel und Mittenberg, am Calanda, bei Churwalden u. a. St. — Juni und Juli.

## DATURA.

*Stramonium* L. Nach der Alpina in Graubünden. Findet sich in manchen Jahrgängen hin und wieder, auf jeden Fall aber selten. — Sommer.

## HYOSCIAMUS.

*niger* L. Hin und wieder stellenweise, nicht in allen Jahrgängen gleich häufig; ich sah ihn bei Chur, Truns, Andeer, Rothenbrunnen, Alveneu, Disentis u. a. O. — Juni und Juli.

## SCROPHULARINEAE.

## VERBASCUM.

*thapsiforme* Schrad. Bei Ilanz, Sagens, Chur und anderwärts in der Ebene; steigt bei Chur auf dem Mittenberg in abgetriebenen Wäldern bis fast an die Tannengrenze (5000<sup>l</sup>). — Sommer.

*crassifolium* DC. (Verb. montanum Schrad. in Hort. Goett. 1811). Bei Samaden (5350<sup>l</sup>) oberhalb des Dorfs und in den sogenannten Zügen, dem Wege nach Davos. — Juli.

*nigrum* L. An Wegen bei Ilanz, Chur etc. — Sommer.

*Lychnitis* L. Fast überall in der Ebene. — Sommer.

*Blattaria* L. Ich fand es in Misox. — Sommer.

## DIGITALIS.

*ambigua* Willd. In montanen Wäldern hin und wieder, im Brättigau, Lugnetz, bei Malix etc. — Sommer.

*lutea* L. Auf Halden und andern Stellen bei Chur, Pfäferserbad u. a. O. nicht selten. — Juni.

Anmerk. Die *D. purpurea* konnte ich nirgends bei Chur finden als in Gärten.

#### GRATIOLA.

*officinalis* L. Nach der Alpina in Graubünden, nach einer neuern Angabe am Clevner-See. Der Verf. fand sie zwischen Roveredo und St. Vittore an einem wasserreichen Abhange und unweit St. Vittore in sumpfigen Wiesen. — Juni.

#### ANTIRRHINUM.

*majus* L. Hin und wieder an Mauern, verwildert. — Sommer.

#### LINARIA.

*minor* Desf. In Aeckern, auf Schutt, hin und wieder bei Chur. — Sommer.

*alpina* DC. Auf alpinen (Chureralp) und nivalen (so auf der Furka und dem Sandgrath 8600') Halden und von dort aus dem Laufe der Flüsse folgend bis in die Ebene von Chur etc. — Sommer.

*vulgaris* L. Auf steinigen Stellen an Wegen, um Aecker herum, allenthalben auf der Ebene. — Sommer.

#### SCROPHULARIA.

*nodosa* L. An Bächen und Hecken, in der Ebene bei Chur, sowie bei Guarda und Casaccia. — Juni und Juli.

*canina* L. Auf Gestein im untern Misox. — Juni.

Anmerk. Den *Erinus alpinus* konnte ich in Bünden nirgends finden; auch kenne ich keine zuverlässigen Angaben für unsern Kanton.

## RHINANTHACEAE.

#### TOZZIA.

*alpina* L. In der subalpinen Region von mir beobachtet; auf dem Calanda, Savien im Thal, in der Carmenna. — August.

#### MELAMPYRUM.

*arvense* L. Bei Chur in Aeckern und auf steinigen dürrn Stellen. — Juni und Juli.

*pratense* L. In Gebüsch und Wäldern der Ebene, bei Chur etc. — Sommer.

*sylvaticum* L. Ueberzieht gesellschaftlich grosse Strecken von Tannenwäldern von der Ebene an bis an die subalpine Region, so bei Chur. — Sommer.

#### PEDICULARIS.

*palustris* L. Auf Sümpfen fast überall bis in die alpine Region. — Juni und Juli.

*tuberosa* L. Nach Haller und Wahlenberg auf dem Gebirgsstock des Gotthards.

*adscendens* Schleich. Häufig auf subalpinen und alpinen Weiden, durch alle Thäler Graubündens; ich sammelte sie in Davos, Ober-Engadin, in den Churwaldner-Alpen, auf dem Ofen. Steigt auf 5400' s. m. — Sommer.

*rostrata* L. Auf allen Bergen des Ober-Engadins, Bergells, Medelser-Thals. Hält sich an die Centralkette der Alpen in einer Höhe von 6—7000' und darüber auf granitischen Massen. — Sommer.



*verticillata* L. Auf alpinen Wiesen und Weiden, wo sie in grosser Menge auftritt. Ich beobachtete sie in der Thalsohle des Ober-Engadins, in Davos, auf dem Joch und Augstberg u. a. St. — Sommer.

*recutita* L. Auf dem Splügen nach Haller., auf dem Cera in Schams nach Scheuchzer und nach H. Roland auf der Oberalp. Ich fand sie auf subalpinen Höhen im ganzen Rheinwald, auf Sais, in den Churwalder Heubergen und in Erosen. H. Nägeli fand sie neben der folgenden auf dem Valzerberg und im Engadin. — Sommer.

*atro-rubens* Schleich. (Ic. nostr. 6). Diese nach meinem Wissen noch unpublicirte Pflanze wurde sowohl von den Herren Muret und Leresche, als auch von H. Nägeli, Stud. med., aus Zürich, in Graubünden in Gesellschaft der *P. recutita* und *P. incarnata* gefunden. Nach letzterm gab es an drei verschiedenen Standorten unter einer Menge jener beiden nur wenige Exemplare dieser Art, die nach ihrem innern Charakter sowohl als nach ihrem äussern Vorkommen als hybrid gelten muss. Denn diese wenigen Exemplare fanden sich, wenn die *P. incarnata* an einem Abhang und die *P. recutita* unten daran auf einer etwas fetten Stelle standen, zwischen beiden in der Mitte.

Hr. Nägeli fand diese Pflanze auf dem Valzerberg, beim Wirthshaus auf dem Bernina und im Beverser-Thal, an

welchen beiden letztern Orten sie auch die Herren Muret und Leresche beobachteten.

Unsere Abbildung zeigt 1) die Pflanze in ihrer natürlichen Grösse und 2) ein vergrössertes Blümchen, an dem durch die Beharrung des Kelchs und die Form der Corolle die Verwandtschaft nach beiden Seiten angedeutet wird.

*incarnata* Jacq. Auf den Engadiner-Bergen bei 6000' Höhe. Ich besitze sie vom Beverser-, Camogasker- und Bernina-Heuthal. H. Heer fand sie auf dem Ofen und H. Nägeli auf dem Valserberg. — Sommer.

*versicolor* Wahlenb. Nach Rösch und Hauptm. Ul. v. Salis auf dem Augstenberg bei Malans, von woher ich durch die Güte des letzteren Exemplare besitze. — Sommer.

*foliosa* L. In der subalpinen und alpinen Region in Graubünden nicht selten; so bei Runkelier, oberhalb Parpan, im Ober-Engadin etc. — Juni.

#### RHINANTHUS.

*Crista-galli* L. Auf Wiesen, Weiden und Aeckern. — Mai bis August.

*minor* Ehrh. Ebenfalls häufig und mit voriger oft vermischt wachsend durch die ganze Rheinebene. — Mai und Juni.

*angustifolius* Gmel. H. Roland fand ihn auf dem Baduz und ich auf dem Calanda in der alpinen Region. — Juni und Juli.

## BARTSIA.

*alpina* L. In der alpinen und subalpinen Region durch alle Thäler Graubündens. — Sommer.

## EUPHRASIA.

*officinalis* L. Auf Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die subalpine Region, überall. — Sommer u. Herbst.

*salisburgensis* Furk. Bei Maladers (um 5000'), auf dem Mittenberg und Joch bei Chur, im Camogasker-Thal (6000'). — Sommer.

*minima* Jacq. Auf allen Bergen in der alpinen Region, auf Weiden. — Sommer.

*lutea* L. In Menge zwischen Feldsberg und Tammins, bei Talein oberhalb Trimmis und bei Waltenspurg im Oberland. — Sommer und Herbst.

*Odontites* L. Im Getreide und an Wegen durch die ganze Rheinebene. — Sommer.

## VERONICA.

*hederæfolia* L. In Aeckern und Weinbergen, an Mauern etc. häufig in der Rheinebene. — März und April.

*agrestis* L. Ueberall in Aeckern, an Wegen und Mauern in der Rheinebene. — März und April.

*pulchella* DC. Bei Chur an ähnlichen Stellen, aber seltener. — Blüht im April.

*Buxbaumii* Ten. Im Lürlibad bei Chur. — Frühling.

*arvensis* L. An Ackerrändern und in Aeckern, auf magern Triften etc. in

grosser Zahl durch die ganze Rheinebene. — Frühling.

*triphyllos* L. In Aeckern bei Chur und Haldenstein, oft in grosser Zahl. — Frühling.

*verna* L. Auf Mauern im Oberland bei Brigels und Disentis, bei Pontresina und Cellerina (5200'). — Juli.

*serpyllifolia* L. In Baumgärten und auf nassen Wiesen bei Chur etc. Steigt bis in die alpine Region (Bernina-Wirthshaus). — Mai bis August.

*alpina* L. Nicht selten auf Alpenweiden; ich habe sie vom Weisshorn, Bernina und der Fürstenalp (ungefähr 5300' s. m.). — Sommer.

*bellidioides* L. Ich fand sie auf dem Augstberg, Lenzerheide, Emseralpen, im Ober-Engadin, auf dem Maloja, Flüelen und andern Orten auf magern Weiden in der alpinen und subalpinen Region. — Sommer.

*fruticulosa* L. Auf dem Calanda bei Bategna und andern Bergen in der subalpinen Region. Scheint die Centralkette der Alpen zu fliehen? — Sommer.

*saxatilis* L. Fast überall in alpinen und subalpinen Höhen, auf dem Calanda, bei Bergün und hauptsächlich auf den Bergen des Ober- und Unter-Engadins. — Sommer.

*spicata* L. Auf magern Triften der Ebene von Maïenfeld an bis Ilanz. — Sommer und Herbst.

*prostrata* L. Oberhalb Latsch im

Tyrol am Wege nach dem Münsterthal.  
Juni.

*latifolia* L. (V. *Teucrium* Gaud.)  
Auf Gestein und in Gebüsch hin und  
wieder bei Chur und andern Orten der  
Ebene. — Mai und Juni.

*Chamædrys* L. An Zäunen und We-  
gen, überall bei Chur und andern Orten  
der Ebene. — Mai.

*urticaefolia* Jacq. In Bergwäldern der  
montanen Region wie z. B. im Schwarz-  
wald bei Chur, in Valzeina. Nicht selten  
in Graubünden. — Sommer.

*officinalis* L. In montanen und sub-  
alpinen Wäldern auf den Bergen bei  
Chur. — Sommer.

*aphylla* L. Auf fast allen Alpenwei-  
den, ohne Unterschied der Formation.  
— Sommer.

*Anagallis* L. In Wassergräben hin  
und wieder, z. B. häufig bei Rothen-  
brunnen. — Juni.

*Beccabunga* L. An Bächen fast über-  
all bis in die Höhe von Schams (3000'  
ungefähr). — Juni.

## OROBANCHEAE.

### OROBANCHE.

*caryophyllacea* Sm. Hin und wieder  
auf den Wurzeln des *Galii Moluginis*. —  
Mai und Juni.

*cruenta* Bert. Auf dem Färbeginster  
in Misox; ferner auf dem *Lotus corni-*

*culatus* in der Parpaner-Alp (über 6000'  
hoch). — Sommer.

*minor* L. Ich sammelte irgendwo in  
Graubünden Exemplare. Wächst auf  
den Wurzeln des Wiesenklee's.

*elatio*r Sutt? Auf *Ononis arvensis* bei  
Alvener. — Juni.

*Epithymum* DC. Auf Wurzeln des  
Quendels bei Tiefenkasten und an der  
Langwies. In der Parpaner-Alp (wenig-  
stens in 6000' Höhe) fand ich auf dem  
*Lotus corniculatus* eine Orobanche, die  
ich auch hierher ziehe. — Sommer.

*Rapum* Thuil. nach Koch. Auf den  
Wurzeln des Besen-Ginsters (*Sarotham-*  
*nus*) zwischen Grono und St. Maria (d.  
Verf.). Nach Prof. Heer am Fusse des  
Camoghé. — Juni.

*ramosa* L. Auf den Wurzeln des  
Hanf's. Ich fand diesen schädlichen  
Parasit bei Zizers, Chur, Ems. —  
Sommer.

## BORAGINEAE.

### CERINTHE.

*alpina* Kit. Ich nehme nach Koch  
diesen Namen für unsere Pflanze an,  
die sich auf vielen unserer Berge findet  
und sich gewöhnlich in der subalpinen  
und alpinen Region hält. Mir kam sie  
vor in Ferrera, St. Antonien im Brätti-  
gau, auf Davos, am Wege nach der  
Chureralp zuoberst an den Pleissen und  
auch im Ober-Engadin. — Sommer.

## ECHIUM.

*vulgare* L. Häufig an Wegen und in Wiesen; steigt bis in die subalpinen Thäler (Rheinwald, Unter-Engadin). — Sommer.

## • LITHOSPERMUM.

*officinale* L. Auf steinigten unfruchtbaren Stellen bei Chur etc. — Juni.

*arvense* L. In Aeckern und an andern Stellen bei Chur nicht selten. — Juni.

## PULMONARIA.

*angustifolia* L. Kommt bei uns nur in der alpinen Region vor (6000' und darüber), so oberhalb der Zuser-Alp auf dem Levirone, im Bernina-Heuthal (nach dem Verf.) und in der Valzer-Alp in Gesellschaft des *Hormini pyrenaici* (nach Land. Hössli, der die Güte hatte ein Exemplar von dorthier mir mitzutheilen). — Juni und Juli.

*azurea* Bess. Ich fand ein einziges Exemplar auf dem Albula, etwas über dem Wirthshause zum Weissenstein in Arlengebüsch (*Pinus sylvestris*). Die Pflanze ist schlanker und hat schmalere Blätter als die vorige. Ist sie vielleicht eine Schattenform derselben? Uebrigens stimmt sie vollkommen mit österreichischen Exemplaren überein. Die Reichenbach'sche Abbildung (ic. f. 694) stellt unsere Pflanze sehr gut dar, doch erinnere ich mich nicht die Haarbüschel zwischen den Staubgefässen gesehen zu haben. — Juli.

## SYMPHYTUM.

*officinale* L. An Wassergräben und andern Stellen der Ebene und, wenn ich nicht irre, auch der subalpinen Thäler. — Sommer.

## ANCHUSA.

*officinalis* L. Ueberall in der Rheinebene von Chur und Maienfeld, im Oberland in der Gruob, etwas unter Lenz und bei Alvener häufig, sowie auch im Unter-Engadin. — Sommer.

*angustifolia* L. Nach der *Enumeratio stirpium Floræ Helveticæ* von Wegelin (Turici 1837) bei Bellenz. Bei Chur konnte ich nicht zwei Species unterscheiden. Bei Zernetz nach Prof. Heer.

## ASPERUGO.

*procumbens* L. Hauptsächlich um Ställe und Hütten herum in der mont. und subalpinen Region. — Juni u. Juli.

## ECHINOSPERMUM.

*Lappula* Gaud. An Wegen und Mauern der Rheinebene häufig; geht auch in die Bergthäler, wie z. B. Unter-Engadin. — Sommer.

*deflexum* Sw. Zwischen Katzis und Rhäzuns am Wege, im verlornen Loch, auf dem Mittenberg und Bizockel bei Chur (in der subalpinen Region), im Lugnetz; nach H. Muret zwischen Zernetz und dem Ofen bei Schäferhütten und bei den Wormser Bädern. — Sommer.

## ERITRICHIMUM.

*nanum* Schrad. Nach Prof. Heer, H. Roland und Apoth. Bovelin auf den höchsten Granitbergen des Ober-Engadins. Ich fand es auf der Granitspitze neben dem Piz della Padella in einer Höhe von beiläufig 8000' und im Heuthal auf dem Bernina. H. Nägeli theilte es mir vom Scopi im Medelser-Thal mit. — Sommer.

## MYOSOTIS.

*palustris* With. Bei Sargans im Mai.

*caespitosa* Schulz. Hierher ziehe ich die Myosotis die auf nassen Plätzen, an Pfützen und in Sümpfen in Bünden vorkommt und im Sommer blüht. Unter andern Standorten nenne ich Ems, Feldsberg, Rongella (hier auf trocknen Wiesen). — Sind diese beiden Arten wohl constant verschieden?

*sylvatica* Ehrh. Ueberall in Wiesen und Baumgärten an Bächen und andern Stellen durch die ganze Rheinebene. Auch zwischen Andeer und Splügen an der Strasse. — Mai und Juni.

*intermedia* Link. Häufig in Aeckern und Wiesen, bis in die subalpinen Thäler (Erosen). — Mai und Juni.

*alpestris* Schm. Auf fast allen Alpenweiden. — Sommer.

*Anmerk.* Hier und anderwärts mehr könnte ich mich besonders veranlasst finden, mich in eine Kritik der Species einzulassen. Da diess aber ausser dem Zweck dieser Arbeit liegt, so begnüge ich mich zu bemerken, dass, wenn ich in der Regel die aufgestellten Formen und

Species auseinanderhalte, ich diess für ein pflanzen-geographisches Werklein nothwendig erachte, damit aber keineswegs eine Billigung der Trennung aussprechen will.

## CYNOGLOSSUM.

*officinale* L. An Wegen, auf Schutt und Feldern, in der Rhein-Ebene und der montanen Thäler (Andeer in Schams und im Oberland.) — Juni.

*montanum* L. In Ferrera unweit der Eisenschmelze (Prof. Heer). Nach Reg. Hegetschweiler in Graubünden.

## LABIATAE.

## LYCOPUS.

*europæus* L. An Gräben und auf sumpfigen Stellen hin und wieder, z. B. an der untern Zollbrücke, bei Feldsberg, Ilanz. — August und September.

## SALVIA.

*pratensis* L. Ueberall auf Wiesen bis in die montane Region (Heinzenberg). — Mai und Juni.

*glutinosa* L. In Gebüsch und Wäldern in der montanen Region, bei Chur herum, in Valzeina etc. häufig. — Sommer und Herbst.

*verticillata* L. Nach Pol bei Schulz, nach H. Roland bei Tarasp; von mir zwischen Obervatz und Alvaschein so wie auch im Risch'schen Maiensäss bei Chur gefunden. Scheint sich somit an die montane Region zu halten. — Sommer.

## AJUGA.

*reptans* L. Ueberall auf Wiesen und in Baumgärten, häufig. — Mai.

*genevensis* L. In aufgelockertem Boden: so auf brachen Feldern, Schutt etc. in der Ebene und der montanen Region nicht selten. — Juni.

*pyramidalis* L. Auf Alpenweiden: so in der Malixer-Alp, auf dem Augstberg, in der Cellerner-Alp (ungefähr 6000') etc. — Juli und August.

## TEUCRIUM.

*Scorodonia* L. In Wäldern im Misox. — Juni.

*Chamaedrys* L. Ueberall auf Halden, an Mauern, bei Chur herum und in der ganzen Rheinebene. — Sommer.

*montanum* L. Auf dem Kalkgebirg nicht selten, sowie auch auf dürrn verschütteten Stellen, meist in der montanen Region (bei Schulz, Tarasp, Alveneu, Chur etc.). — Sommer.

## LEONURUS.

*Cardiaca* L. In Hecken und auf steinigen Stellen bei Chur und andern Orten nicht selten. — Sommer.

## MARRUBIUM.

*vulgare* L. Bei Ems, Chur, Haldenstein; auch bei Waltensburg im Oberland. — Sommer.

## BALLOTA.

*nigra* L. Ueberall in Hecken, in Menge. — Sommer.

## GALEOPSIS.

*Tetrahit* L. Um und in Bergwäldern

und in Aeckern bis in die alpine Region, durchs ganze Land. — Sommer.

*versicolor* Curt. Diese für die Schweiz neue Species fand H. Muret von Lausanne bei Guarda im Unter-Engadin. — Juli.

*intermedia* Vill. et Reich. Auch diese Species verdanke ich H. Muret, der sie bei Malix fand. — August.

*Ladanum* L. Auf entblösten Halden, an Wegen und in Aeckern etc. bei Chur, Haldenstein und andern Orten der Ebene: Findet sich auch bei Sils im Ober-Engadin (5300'). — Sommer.

*pubescens* Bess. Nach Scheuchzer und Wahlenberg bei Pfäfers, nach Thomas bei Bellenz. — Sommer.

## GALEOBDOLO.

*luteum* Huds. An Zäunen und unter Gebüsch an Schatten, überall durch die Ebene. — Mai und Juni.

## LAMIUM.

*album* L. An Wegen, in Hecken und andern Stellen, sehr häufig in unserer Thalebene. — Mai bis Herbst.

*maculatum* L. An ähnlichen Stellen, ebenfalls in Menge. — Mai bis Herbst.

*purpureum* L. Auf brachen Aeckern, oft in zahlloser Menge. — Frühling.

*plexicaule* L. Gleichfalls auf Aeckern und in Weinbergen, in nicht unbeträchtlicher Zahl. — Frühling.

## GLECHOMA.

*hederaceum* L. Unter Hecken und vielen andern Stellen, sehr gemein. — Frühling.

## BETONICA (Stachys Benth).

*officinalis* L. In Gebüsch und Wiesen hin und wieder in der montanen Region auf dem Mastrilser-Berg, im Oberland, so wie auch bei Grono, bei Chur u. a. O. — Sommer.

## STACHYS.

*sylvatica* L. An Zäunen und Gräben der Ebene, nicht selten. — Sommer.

*alpina* L. In der montanen und sub-alpinen Region in Hecken und andern Stellen; oberhalb Chur beim Städeli, bei Parpan. — Juni und Juli.

*palustris* L. An Gräben und sumpfigen Stellen der Ebene, in Aeckern der montanen Region bei Alvaschein, Malix. — Sommer.

*germanica* L. An entblösten Halden, an Wegen und um Wälder bei Chur, Trimmis, Maladers, Ilanz. Nach Koch auf Kalk, nach meinen Beobachtungen auf Thon (bei Genf), auf Kiesel (bei Ilanz). — Sommer.

*recta* L. Auf Halden, nm Aecker herum, nicht selten bei Chur, Haldenstein und andern Orten der Ebene. — Sommer.

*annua* L. In Aeckern bei Maladers, in Plankis bei Chur, eher selten. — Sommer.

## NEPETA.

*Cataria* L. An Halden und Ruinen, oft in Hecken und unter Gebüsch bei Chur, Ilanz u. a. O. — Sommer und Herbst.

## MENTHA.

*sylvestris* L. Sehr häufig an Wassergräben durch die ganze Ebene und montane Region. — Juli und August.

*hirsuta* L. An Wassergräben und andern schlammigen Stellen bei Feldsberg. — Sommer.

*arvensis* L. In Aeckern der Ebene und montanen Region (Feldsberg, Churwalden), nicht selten. — Herbst.

*rotundifolia* L. Bei Clefen und bei Bellenz. — Juli und August.

*hybrida* Schl. Ich habe Exemplare ohne Blüthen bei Bellenz und Lugano gesammelt die ich hieher ziehe.

## THYMUS.

*Serpyllum* L. Auf mageren Triften, überall. Nach ältern Angaben und von mir gemachten Beobachtungen kommt zwischen Truns und Tamins und bei Ems die zottige Varietät (Th. Serp. var. *hirsuta*) vor. — Sommer.

*pannonicus* All. Im Kanton Tessin und bis nach Grono (Prof. Heer).

*Acinos* L. In der Ebene auf Halden, Schutt und in Aeckern, so bei Chur etc. — Sommer.

*alpinus* L. Auf Weiden und Wiesen von der alpinen Region an abwärts bis in die montane. — Juni und Juli.

## CALAMINTHA.

*officinalis* Moench. An Hecken und unter Gebüsch, überall in der Ebene. — Sommer.

*Nepeta* Clairv. Bei Ragatz und Pfäfers nach Wahlenberg. Ich fand sie im Veltlin oberhalb Tiran. — Juni.

## CLINOPODIUM.

*vulgare* L. Unter Hecken und an andern Stellen fast überall. — Sommer und Herbst.

## ORIGANUM.

*vulgare* L. Ueberall auf steinigten Stellen, in Gebüsch, durch die ganze Ebene. — Sommer.

## PRUNELLA.

*vulgaris* L. Hauptsächlich auf nassen Wiesen. Steigt bis in die alpine Region. — Sommer.

*grandiflora* L. An Wassergräben, in Wäldern so wie auch auf trocknen Stellen der Ebene und montanen Region, nicht selten. — Sommer und Herbst.

*laciniata* Lam. Bei Roveredo. — Sommer.

## MELITIS.

*melissophyllum* L. Nach einem Exemplar das Dr. Lenz und Ad. v. Planta bei Grono gesammelt haben im untern Misox. — Juni.

## HORMINUM.

*pyrenaicum* L. Besonders häufig auf dem Wormser-Joch, wo sie, so wie auch auf den Alvenener-Bergen, von den ältern Botanikern schon angegeben wird. In

der Valzer-Alp zuerst von mir, dann von Prof. Heer, Pfr. Felix, Land. Hössli und H. Nägeli gefunden. — Juni.

## SCUTELLARIA.

*galericulata* L. Ich fand sie am Laxer-See. — Sommer.

## DRACOCEPHALUM.

*Ruyschiana* L. Bei Bevers, Samaden, Camogaschg, Cellerina an Halden (nach Bovelin, Heer, Wirth und d. Verf.). — Juli.

## VERBENACEAE.

## VERBENA.

*officinalis* L. Ueberall an Wegen der Ebene. — Sommer.

## LENTIBULARIAE.

## PINGUICULA.

*vulgaris* L. Auf sumpfigen Stellen der Ebene, bei Chur, Zizers etc. — Sommer.

*orthoceras* Reich. \*) Häufig durch die alpinen und subalpinen Thäler, an nassen Stellen, im Oberland, Ober-Engadin (im Bernina- und Beverserthal), auf dem Bernhardin etc. H. Roland fand sie bei Tarasp und der Martinsbrücke. — Sommer.

*alpina* L. (Gaud.) Auf sumpfigen oder auch nur nassen Stellen der alpinen

\*) Der Name *grandiflora* sollte aufgegeben werden, da er bald dieser bald der *P. longifolia* gegeben wird. Auf jeden Fall würde die letztere Pflanze, die auf dem Jura wächst, ihn mit mehr Recht tragen als die unsrige, da jene eine doppelt grössere Blume hat.



Region und von dort häufig bis in die Thalebene von Chur. — Frühling und Sommer.

#### UTRICULARIA.

*vulgaris* L. Im Zizerser-Ried, Laxer-See etc. — Juni.

*intermedia* Hayne. Nach U. v. Salis in Graubünden.

### PRIMULACEAE.

#### TRIENTALIS.

*europæa* L. Im benachbarten Ursern-Thal. Irrigerweise wurde sie als bei Chur wachsend von Schleicher angegeben. — Sommer.

#### LYSIMACHIA.

*vulgaris* L. An Gräben und Zäunen bei Chur, Ilanz, in Misox etc. — Sommer.

*Nummularia* L. An Wegen, Gräben und andern Stellen bei Chur etc. — Sommer.

*memorum* L. In schattigen Wäldern bei Chur, Sais, im Brättigau und andern Gegenden. — Sommer.

#### ANAGALLIS.

*phaenicea* Lam. Ueberall im Getreide und auf unbebauten Stellen. — Sommer.

*cærulea* Schreb. Im Getreide bei Briegels. Merkwürdig dass sie nicht in die niedern Gegenden von Chur und der Herrschaft heruntersteigt. — August.

#### SOLDANELLA.

*alpina* L. Auf allen Bergen, in der subalpinen und alpinen Region, häufig.

Kommt beständig auf Stellen vor die beständig etwas nass haben und blüht unmittelbar nach dem Zerschmelzen des Schnee's. — Mai und Juni.

*pusilla* Baumg. In den rhätischen Alpen (Muret), im Thal des Levirone (7000') und auf dem Scopi (7—8000') zuhinderst im Medelser-Thal (H. Nägeli aus Zürich), auf dem Tödi (Hegetschweiler), auf dem Bernina (Bovelin). — Sommer.

#### CYCLAMEN.

*europæum* L. In Wäldern, nicht überall aber wo sie vorkommt häufig, so im Fürstenwald bei Chur und bei Maienfeld gegen die Steig zu. — Herbst.

#### PRIMULA.

*sylvestris* Scop. carn. In Baumgärten, Hecken und Gebüsch vom Januar bis in den April durch die ganze bündnersche Rheinebene. — Alle Synonyme dieser Pflanze sind neuern Datums als der Scopoli'sche Name, der ihn im J. 1772 aufstellte. *Prim. acaulis* Jacq. ist von 1778 und *P. vulgaris* Huds. vom nämlichen Jahr. *P. grandiflora* Lam. ist noch neuerer. — Von dieser Pflanze zur folgenden besitze ich eine Reihenfolge, die für jeden unbefangenen Forscher als einen unterbrochenen Uebergang von dieser Species in die folgenden gelten muss.

*elatior* Jacq.

α) foliis sensim in petiolum attenuatis, calycibus tubulosis. Jacq. et Oed. fl. Dan. t. 434. Findet sich gewöhn-

lich in der Ebene in Hecken und Baumgärten, durchs ganze Land. — April und Mai.

β) *foliis abrupte in petiolum attenuatis, calycibus ampliatis campanulatis*. Prim. *elator* Koch. in Synops. Diese Form findet sich auch in den Churer Baumgärten, wird auch zuweilen cultivirt angetroffen mit rothen oder gesprengelten Blumen. Besonders beständig und häufig ist aber ihr Vorkommen in subalpinen Wiesen und Weiden, wie auf Runkelier und in der Urdenalp. Der Kelch kann jedoch ändern. — Mai und Juni.

*officinalis* Jacq. Auf Wiesen durch die ganze Ebene häufig. — April und Mai.

α) *suaveolens* Bertol. *calycibus ampliatis*. Zuweilen in den Baumgärten bei Chur.

*Auricula* L. Auf alpinen Weiden in der Höhe von 6000'; so auf dem Calanda, in der Sagenser-Alp u. a. St. Oft steigt sie in die montane Region herab; so in Valzeina; und bis in die Ebene auf Felsen; so bei der Schlossbrücke und bei Fläsch. Blüht in unsern Gärten im April und Mai, in der alpinen Region im Juni.

*Rhætica* Gaudin. *foliis obovatis oblongis crenatis carnosius laevibus albo marginatis, calyce brevissimo*.

So lautet die Gaudin'sche Beschreibung. Eine genaue Untersuchung eines Exemplars, das Gaudin von Rösch er-

hielt und dem Oberamtman von Haller; mittheilte, und das ich in dessen Herb. fand, muss folgendermassen charakterisirt werden:

*P. Rhætica* Gaud. *foliis obovatis crenatis utrinque pulvine rara conspersis margine pilis glandulosis ciliata, calycis sinibus albo-pulverulentis, floribus purpureis*.

Diese Pflanze kommt nach dem Hallerschen Herb. oberhalb Marschlins vor und möchte wohl eine hybride Pflanze zwischen der *P. Auricula* und der *villosa* sein. Einen ähnlichen Ursprung scheint auch die *P. ciliata* Moretti zu haben, bei welcher jedoch die Behaarung dichter ist und sich auf die beiden Flächen des Blattes erstreckt und deren Blumen gelb sind.

Gleichermassen ist hierher zu ziehen die *P. venusta* Host., und vielleicht auf die gleiche Weise ihr Ursprung zu erklären. Wenn man jedoch bedenkt, dass die *P. Auricula* bald ganzrandig und bald gekerbt und in Gärten häufig mit rothen und blauen Blumen erscheint, so lässt sich der Behauptung, dass die *P. Rhætica* eine wilde Varietät der *Auricula* sei, nicht viel entgegenhalten. Der pergamentartige Rand entsteht in dieser Gruppe durch Verwachsung der Haare und der Mehrrand durch Verkümmern derselben von denen dann nur das Produkt, nämlich der Staub zurück bleibt. Dieser Staub ist das Analogon des von den glandulösen Haaren ausge-

schwitzten Safts, der die *P. latifolia*, *villosa* etc. auszeichnet, ist jedoch von verschiedener Natur. Es geht hieraus hervor, dass um die Frage zu entscheiden, ob die *P. rhætica* eine blosse Varietät der *auricula* oder eine hybride zwischen dieser Art und der *villosa* oder gar der *latifolia* sei, zu untersuchen bleibt, ob die Haare am Rande der Blätter einen klebrigen Saft oder eine trockene Substanz aussondern.

Was Thomas in Bex unter dem Namen *P. rhætica* verkauft, ist eine *P. latifolia* mit weisslichen Corollenröhren.

*latifolia* Lapeyr. (Aus der Beschreibung und nach Exemplaren vom Lapeyr. Standorte. Reichenbach's Abbildung (ic. vol. 7. f. 858) ist gut in Bezug auf den Habitus, doch die Frucht ist im unreifen Zustande abgebildet, desswegen füge ich hier, so wie auch für die verwandten Species eine kurze Diagnose bei.)

*P. latifolia* Lap. glanduloso-pilosa, foliis obovato-cuneatis crenatis, floribus pedicellatis pedicellis involucrum longe superantibus, calycibus turbinatis corollæ tubo triplo brevioribus laciniis triangularibus acutis, capsula calycem æquante vel superante.

Diese Pflanze findet sich auf dem ganzen Centralgebirgszug (Prof. Heer). Ich besitze Exemplare von der Prassignola Averserseite, vom Septimer, aus dem Rosetscher-Thal, Bernina-Thal, Maloja,

vom Levirone und durch H. Muret vom Albula. Sie hält sich immer in einer Höhe von 6000–7000' s. m. und wächst an Felsen. — Sommer. Wenn obige Beschreibung nicht hinreichte sie von der *P. villosa* Jacq. zu unterscheiden, so würde man sie auf jeden Fall durch das dunkle Blau der Blumen das sich auch auf die Corollenröhre erstreckt leicht unterscheiden. Auch wird sie in der Regel grösser als jene. Hicher ziehe ich (nach der Abbildung) die *P. alpina* Schleich. in Reich. icon. f. 1121, nach der Bezeichnung der Blumenfarbe (lila mit blassem weisslichem Schlund und Röhre) aber wäre es eine *P. villosa* Jacq., wenn nicht gesagt wäre, dass sie im trockenen Zustande violet würde.

*Muretiana* (Vid. ic. nost. 2) foliis longe cuneatis crenatis, floribus pedicellatis pedicellis involucro brevioribus, calycibus cyathiformibus corollæ tubo dimidio brevioribus laciniis obtusis, capsulis.....(abortivis?). In rupibus graniticis regionis alpinæ nivalisque Alpium Rhætorum, rara.

Diese Pflanze besitze ich schon seit 1832 in meinem Herbar. H. Muret ist es jedoch der im Jahr 1837 mich besonders darauf aufmerksam machte. Er fand sie auf dem Albula in Gesellschaft der *P. latifolia* und *P. Candolleana*. Auch ein H. Brunner aus Bern hat sie ebenfalls in Bünden gefunden, wie aus einem Exemplar das auf dem Conservatoire botanique von Genf sich findet,

hervorgeht. Mein Exemplar kommt von der Prassignola Averserseits, wo ich auch die *P. latifolia* fand; ich erinnere mich aber nicht recht, ob die *P. Candolleana* daneben war. Auf jeden Fall hat sie Verwandtschaft mit diesen beiden Arten. Die Kürze der Blumenstiele und die Form und Grösse des Kelchs ist ganz wie bei *P. Candolleana*, während die Kerbung der Blätter und das dunkle Blau der Blumen ganz deutlich auf die *P. latifolia* hinweisen. Ich sehe sie daher für hybrid an. Ich muss in Bezug auf die Abbildung bemerken, dass die Blätter eine zu zahlreiche Kerbung haben, dass aber dagegen die Kerbe nicht gross genug sind.

*Candolleana* Reich. ic. f. 803. Auf fast allen unsern Bergen in der alpinen Region, so in der Malixer-Alp, auf dem Bernhardin, Splügen, Albula, Baduz, Rosetsch etc. Man findet sie auf Weiden, seltener an Felsen wie die vorige. Die Blumen sind blassblau und erscheinen im Juli und August.

Die *P. integrifolia* L. kann wohl diese Art in sich gefasst haben. Allein ausser dem Bedenken, dass er die Clusische Figur citirt, welche jetzt die *P. Clusii* ist, kommt noch die Schwierigkeit hinzu, dass ein Citat Bauhin's (*Sanicula alpina purpurea*), welches unsere Pflanze ist, von Linné zur *P. Auricula* gezogen wird.

*glutinosa* L. Auf dem Braulio (Stilfser-Joch) nach Bertoloni in der Flora italica.

Einige Schritte nach Osten vom Grenzpunkt des Veltlins und Tyrols auf dem Stilfser-Joch (H. Appellationsrichter Muret von Lausanne). — Blüht im höchsten Sommer.

*villosa* Jacq. glanduloso-pilosa viscosa, foliis crenatis obovato-cuneiformibus rotundatisve in petiolum attenuatis, florum pedicellis involucrum superantibus, calycibus cyathiformibus capsulis duplo fere longioribus.

Diese Pflanze kommt häufiger als die *P. latifolia* in unsern Alpen vor, steigt eben so hoch oder noch höher (in diesem Fall wird sie kaum zollhoch und einblumig) hinauf und lässt sich bis in die Thalebene vom untern Misox herab. Unter den vielen Stellen nenne ich den Scaletta, Bernina, Tödi, Flüela, Rheinwald. Sie wächst immer an Felsen und blüht in den höhern Regionen im Sommer.

Hier ziehe ich *P. helvetica* Don in Reich. icon. f. 1158. Villars *P. viscosa* scheint mir ganz identisch mit der *P. villosa* Jacq. Die beste Abbildung jedoch die genau die Bündner'sche Pflanze darstellt, sowohl in Bezug auf den Habitus als auf die Blumenfarbe (roth mit weisslicher Corollenröhre) ist in Curtis bot. mag. t. 14.

*farinosa* L. Häufig auf Wiesen und Weiden durchs ganze Land, von der Rheinebene an bis in die alpine Region, fast immer an wasserreichen Stellen. — Frühling und Sommer.

*Zweifelhafte bündnersche Primeln.*

? *minima* L. Diese Pflanze wird angegeben: von Mag. Rösch bei der Bärenburg und bei Klosters, von Pol im Umbrail und von Apoth. Bovelin auf dem Bernina. Ich glaube jedoch dass allen diesen Angaben eine Verwechslung mit der einblumigen Form der *P. villosa* zu Grunde liegt.

? *Flærkeana* Schrad. (Nach Lehmanns Abbild. monogr. prim. t. 8200 kaum von der *P. villosa* zu unterscheiden). Nach Bovelin auf dem Albula. Ich sah die bündner'sche Pflanze nicht, die Prof. Heer bestimmt hat.

? *longiflora* All. Ein französischer Botaniker gibt sie als auf dem Bernhardin wachsend an und nach H. Reg. Hegetschweiler soll sie beim Sauerbrunnen von Bernhardin sein. Ich habe einen ganzen Tag darauf verwendet um sie zu finden, konnte sie aber nicht zu Gesichte bekommen. Man vergleiche eine Anmerkung bei der *Androsace obtusifolia*.

Mehr als zweifelhaft ist die

?? *marginata* Curt. die H. Reg. Hegetschweiler für Graubünden angibt. Diese Angabe beruht auf einer Verwechslung der *P. Rhætica* mit der *P. marginata*. Diese gleicht zwar jener, kommt aber auf den Seealpen und gewiss nicht in unsern Gebirgen vor.

## ANDROSACE.

*helvetica* Gaud. Auf Kalkgebirg bis

in die Höhe von 8000', immer an Felsen, so auf dem Calanda, Joch, Weissenhorn, Piz della Padella bei Samaden. — Sommer.

*alpina* Lam. (non Gaudin). Immer in einer Höhe von 6—8000' auf zersetztem oder zerbröckeltem Gerölle und zwar auf granitischem auf der Prassignola im Bergell und im Rheinwald und andern Orten und auf Thonschiefer auf dem Levirone, in der Alp Segnes, auf dem Scopi (H. Nägeli), im Medelser-Thal. Ich habe auch Exemplare vom Panixer-Pass. — Juli und August.

Anmerk. Das Exemplar von H. Nägeli hat Blumenstiele, die dreimal länger als die Blätter sind.

*imbricata* Lam. (*A. tomentosa* Schleich.) Auf dem Trone in Rhätien nach Haller.

*obtusifolia* All. Auf fast allen alpinen Weiden unseres Landes, so auf dem Joch, Augstberg, Majola, Calanda, im Engadin, bei Bernhardin, wo die *P. longiflora* vorkommen soll, in schönen grossen Exemplaren etc. — Sommer.

β) *aretioides* Gaud. Diese einblumige Varietät fand der nun leider verstorbene Regierungsrath Hegetschweiler auf dem Calanda. Prof. Heer schickte die nämliche Pflanze an Prof. DeCandolle unter dem Namen *Androsace Charpentieri* mit dem Bemerkung, dass sie vom Camoghé (einem Berge in Tessin unweit der Bündnergrenze) komme. Da ich jedoch, so wenig als

andere Botaniker, die die Heer'sche Pflanze in Genf untersuchten, sie für eine neue Species halten kann, so stellt sich die Synonymie dieser Varietät so heraus :

*Andr. obtusifolia* All. *aretioides* Gaud.

*Aretia ciliata* Murrith.

*Andr. Charpentieri* Heer.

*Andr. aretioides* Hegetsch. in Fl. der Schw. p. 187.

*Aretia brevis* Hegetsch. in Fl. de Schw. p. 190.

*Chamaejasme* Jacq. Ebenfalls auf alpinen Weiden und auf Felsen, noch häufiger als vorige. Steigt auch weiter herab als jene. — Sommer.

*Anmerk.* Die *A. villosa* Wulf. wurde nach der Flora Comense vom Dr. Mazzara nei Boschi di Fræle gefunden. Die angeführten Synonymen und die Beschreibung scheinen für die Species zu bürgen, doch der Standort (boschi) lassen auf eine Verwechslung mit der *A. Chamaejasme* schliessen.

*septentrionalis* L. Nach H. U. v. Salis im Ober-Engadin. — Sommer.

Eine zweifelhafte Species ist die *Aretia Vitaliana*, die nach der Alpina in Bünden vorkommen soll.

## GLOBULARIEAE.

### GLOBULARIA.

*vulgaris* L. An Halden bei Chur, Haldenstein etc. — Mai.

*cordifolia* L. An Felsen vom Fusse der Berge an bis in die alpine Region. — Sommer.

*nudicaulis* L. Auf Bergwiesen und Halden bei Chur, so auf dem Sand, beim Städeli. — Mai und Juni.

## PLUMBAGINEAE.

### STATICE.

*alpina* (*Armeria alpina* Schleich.). Nach Haller in Rhätien, nach Heer in den Engadiner-Gebirgen (Scaradra) und nach Nägeli in der Zaportalp. — August.

## PLANTAGINEAE.

### PLANTAGO.

*major* L. Ueberall an Wegen in der Ebene und den alpinen Thälern (bei Samaden im Ober-Engadin). — Sommer.

*media* L. Ueberall in Wiesen. — Sommer.

*montana* Lam. Auf montanen und alpinen Weiden (bei Kriden, Samaden, auf dem Maloja, im Unter-Engadin, in der Maienfelder-Alp etc.), nicht selten. — Juni.

*lanceolata* L. Ueberall und häufig in der Ebene. — Juni und Juli.

*alpina* L. Auf fast allen Alpenweiden in mannigfaltiger Gestalt. — Sommer.

*graminea* Schleich. Nach Hegetschweiler in Graubünden. Nach Heer in Fettau, in den Strassen von Bevers, im Camogasker-Thal und wenn ich die gleiche Pflanze im Auge habe, am Gypsbruch bei Samaden. — Sommer. Die Wurzel meiner Pflanze hat einen starken nicht unangenehmen Geruch, der etwas an den *Melilotus caeruleus* mahnt.

## MONOCHLAMYDEAE.

## AMARANTHACEAE.

## AMARANTHUS.

*Blitum* L. Ein Unkraut in Gärten, an Wegen, bei Chur, Ilanz, Truns. — Sommer.

*retroflexus* Willd. Bei Ilanz, wo er sich an Wegen und in Aeckern als ein lästiges Unkraut findet. Bisher ist diese Pflanze bei uns noch nie diesseits der Alpen gefunden worden und merkwürdig wäre es wenn sie sich von Ilanz aus hierwärts verbreiten würde. Bereits habe ich ein Exemplar bei Bonaduz gefunden. Die Gebirgsformation ist bei Ilanz am linken Ufer des Rheines granitischer Natur. Hauptm. U. v. Salis gibt ihn auch im Bergell an. — August.

## CHENOPODEAE.

## CHENOPODIUM.

*Bonus-Henricus* L. Um Ställe und Wohnungen bis in die alpine Region gemein. — Sommer.

*murale* L. Auf Schutt und andern Stellen bei Chur und der ganzen Ebene, — Sommer.

*hybridum* L. Auf Schutt und andern Stellen bei Chur und der ganzen Ebene. häufig. — August und Herbst.

*album* L. Auf Schutt, in Aeckern und an Gräben, überall. — Sommer.

*rubrum* L. In der montanen Region um Düngerstellen häufig: bei Ragatz (Ul. v. Salis), Malix, Runkelier, Parpan, Maladers, Peiden im Lugnetz etc. (der Verf.) — August und September.

*Vulvaria* L. An Mauern und andern Stellen bei Chur, häufig. — Sommer.

*polyspermum* L. Auf bebauten Stellen als Unkraut. Bei Chur, Truns im Oberland etc. — Sommer.

## ATRIPLEX.

*angustifolia* L. An Wegen, in Aeckern und andern Stellen bei Chur und anderwärts, häufig. — Sommer.

## BLITUM.

*capitatum* L. Nach Gesner am Wege der nach dem Albula führt, nach Hegetschweiler häufig in Graubünden. Hat Herr Hegetschweiler nicht vielleicht das *Chenopodium rubrum* dafür genommen? ich wenigstens fand bisher nur zwei Exemplare im Fidrizer-Bad. — Juli.

*virgatum* L. H. Appellationsrichter Muret fand diese Pflanze zwischen Süs und Lavin (nach brieflicher Mittheilung) und nach der Etiquette, die die Pflanze begleitete auf dem Ofen (bei Schäfershütten). Ich traf das Bl. virg. hin und wieder an Wegen bei Chur an, hielt jedoch dafür, dass es bloss verwildert sei.

## PHYTOLACCA.

*decandra* L. Wenn diese Pflanze auch nicht ursprünglich bei uns zu Hause war, so ist sie jetzt dermassen zwischen Grono und St. Maria (Calanca) verbreitet, dass sie an Häufigkeit viele Altbürger übertrifft. An der Spontanität lässt sich nicht zweifeln. — Juli.

## POLYGONEAE.

## RUMEX.

*crispus* L. An Wassergräben und andern ähnlichen Stellen, nicht selten in der ganzen Rheinebene. — Sommer.

*pulcher* L. Bei Bellenz. — Sommer.

*obtusifolius* L. Um Ställe und Wohnungen herum, von der Ebene bis in die Maiensässe (subalpinen Region) nicht selten. — Sommer.

*alpinus* L. Um Bergdörfer und Alpküthen herum, gemein. — Sommer.

*Acetosella* L. Hält sich bei uns hauptsächlich in den subalpinen Thälern, steigt bis 5450' im Bernina-Thal und lässt sich in die Ebene bei Thusis und Tiran im Veltlin herab. Ist häufig in den Thälern von Davos, Rheinwald und Ober-Engadin. — Sommer.

*scutatus* L. Auf steinigten Stellen der subalpinen und montanen Region häufig. So bei Lenz, Castasegna, Chur, im Puschlav. — Sommer.

*Acetosa* L. In Baumgärten und Wiesen der Ebene, fast überall. — Mai.

*montanus* Desf. (*R. arifolius* All.) Auf dem Calanda bei Bategna in der Jochalp und andern Stellen dieser Höhe ungefähr 4500'. — Sommer.

*nivalis* (Hegetschweiler in der Flora der Schweiz p. 345) dioicus, caespitosus, acetosus, caule unifolio, foliis radicalibus ovato-hastatis petiolo brevioribus. Von dieser Pflanze hatte ich bereits im Jahr 1830 ein Exemplar in der Urdenalp gesammelt aber erst im Jahr 1837 erkannte ich eine neue Species in ihr, die ich *R. nivalis* nannte, ohne im mindesten zu ahnen, dass bereits ein anderer Botaniker sie mit dem nämlichen Namen getauft hat. Ich habe seither einen Stock cultivirt und wieder aus Samen neue Pflanzen gezogen, so dass ich über ihren Charakter und Beständigkeit einigen Aufschluss zu geben im Stande bin.

Sobald die Primordialblätter der jungen Pflanzen entwickelt sind bilden sich bereits kleine Wurzelschosse, die sich durch ganz kleine gestielte Blättchen (wie sie unsere Figur zeigt) zu erkennen geben und aus denen sich fast gleichzeitig wie das Centralschoss Stengel erheben, und zwar nicht nur 2—3 sondern 10—15. Der Stengel bleibt bei der cultivirten Pflanze meist einblättrig und die Blumenrispe einfach, nur an besonders üppigen Schossen bilden sich im untersten Blumenquirl ein oder zwei Aeste. Die Blätter zeigen auch dem blossen Auge zahlreiche Punkte (Sto-



mata?) was bei *R. Acetosa* und *montanus* viel schwächer hervortritt. Die Blumen sind grösser als bei den vorgehenden verwandten Species, so wie auch die Früchte; bei beiden wohl um das doppelte. Der Geschmack der Blätter ist nicht so sauer als bei jenen. Es muss hier bemerkt werden, dass in unserer Abbildung die nämlichen Blümchen um die Hälfte zu klein gezeichnet sind. Die Grösse der cultivirten Pflanze ist das doppelte der wilden, die in unserer Abbildung getreu angegeben ist. Der Stengel ist bei der cultivirten schwach und etwas schlaff und hat somit eine Neigung zum Aufliegen.

Diese Pflanze kommt vor: am Urden-see und in der Alp Segnes (auf Flimsergebiet), wo ich sie 1837 im August und am erstern Orte im September gefunden habe; sie steigt daselbst bis an die Schneeregion und hält sich an den beiden Orten an der Grenze der Studer'schen Bündnerschiefers (Fucoidenschiefer) auf. Herr Reg. Hegetschweiler besitzt sie von einer Alp bei Chur, die ihm unter dem Namen Ramuz bekannt ist. Endlich hat mir auch H. Nägeli aus Zürich Exemplare vom Valzerberg mitgetheilt.

*Erklärung der Abbildung Nr. 4.*

1. Ein weibliches Exemplar in natürlicher Grösse.
2. Ein männliches Exemplar in natürlicher Grösse.

3. Die weibliche Blume sehr vergrössert.
4. Ein petalum der weiblichen Blume vergrössert.
5. Die Frucht, vergrössert, etwa um das doppelte.
6. Ein Querdurchschnitt der nämlichen.
7. Die männliche Blume sehr vergrössert.

OXYRIA.

*digyna* Camb. Auf alpinen Weiden in den Rheinwalder-Alpen, auf dem *Scesaplana*, Gotthard und andern mehr. — Sommer.

POLYGONUM.

*dumetorum* L. In Hecken bei Chur etc. — Sommer.

*Convolutus* L. In Aeckern bei Chur, Lavin etc. — Sommer.

*alpinum* L. Durchs ganze Calanca-Thal bis fast nach Rossa hinauf, in grosser Menge in Wiesen: an einer Stelle im Rheinwald. Eine neue Localität für die Schweizerflora hat H. Heldreich im J. 1834 und 1838 entdeckt; nämlich das Val-Bedretto im K. Tessin zwischen Airolo und Villa. — Juni.

*aviculare* L. Ueberzieht grosse Strecken an Wegen und in Wiesen. Unter allen phänogamischen Pflanzen möchte wohl keine Art soviel Individuen in der Schweiz zählen. Sie geht über die montane Region hinaus, so bei Tschierschen. — Sommer.

*minus* Willd. Um die Pfützen herum

die rechts an der Landstrasse von Chur nach Ems liegen. — August und Herbst.

*mite* Schrank. Bei Chur.

*Hydropiper* L. An Gräben und um stehende Wasser, besonders häufig durchs Oberland hinauf; weniger in der Umgegend von Chur. — Sommer.

*Persicaria* L. An Wegen und in Aeckern in der Umgegend von Chur und durchs Oberland hinauf. — Sommer.

*lapathifolium* Ait. Bei Chur auf Schutt und am Wasser. — Sommer.

*Anmerk.* Bei Sagens im Oberland fand ich in Menge ein *P. incanum*. Es war an der Unterseite der Blätter grau filzig und wuchs in Aeckern. Die gleiche Pflanze, jedoch ohne den grauen Filz, wächst in grosser Menge am Laxer-See.

*amphibium* L. In einem kleinen See der Lenzer-Heide (4900'). — Sommer.

*viviparum* L. Auf allen Alpenweiden (auf der Albulahöhe 7200'), von wo es in die montane Region heruntersteigt (Kriden bei Chur). — Sommer.

*Bistorta* L. In subalpinen Thälern; wo es oft den Hauptbestandtheil der Wiesen ausmacht (Rheinwald, Valz, Stalla etc.). — Sommer.

## THYMELEAE.

### DAPHNE.

*Mezereum* L. In Gebüsch und Wäldern von der Ebene bis in die alpine Region; in letzterer oft häufiger als in ersterer. — April bis Juni.

*alpina* L. Nach Dick auf dem Brühl zwischen Ems und Reichenau; ich fand sie bei Worms im Veltlin. — Juni.

*striata* Koel. Auf allen unsern Bergen, in der alpinen und subalpinen Region. Ich nenne bloss den Calanda, Emser-Alpen, Bernhardin beim Dorf, Scesaplana, Augstberg, Greina, Segnes, Orte wo sie mir vorgekommen. — Juni.

*Anmerk.* Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist die *Daphne Cneorum*, die ältere Botaniker in Bünden gefunden haben, hierher zu ziehen.

## SANTALACEAE.

### THESIUM.

*alpinum* L. Auf Alpenweiden und bis in die Ebene. — Sommer.

*rostratum* M. et K. Nach Ul. v. Salis bei Marschlins. Ich fand es auch irgendwo in Bünden, erinnere mich aber nicht mehr der Stelle.

*pratense* Ehrh. Auf Bergwiesen bei Chur (St. Hilarien). — Sommer.

*montanum* Ehrh. Ohne für die Identität der Erhard'schen Pflanze mit der unsrigen gutzustehen, bemerke ich bloss, dass in der Umgegend von Chur ein ausgezeichnetes Thesium mit aufrechtem über fusshohem Stengel nicht selten vorkommt, welches von ältern Botanikern als das *Th. linophyllum* L. bezeichnet wurde und das ich auch aus der italien. Schweiz erhielt. — Juni und Juli.

## ELEAGNEAE.

## HIPPOPHAE.

*ramnoides* L. Auf Flussufern bis in die Berghäler, sowohl diesseits als jenseits der Berge. Bei Lavin (Prof. Heer). — Mai.

## ARISTOLOCHIEAE.

## ASARUM.

*europæum* L. Ich fand einmal bei Chur eine Stelle, die mit dieser Pflanze bewachsen war, die aber seither verschwunden zu sein scheint. Vielleicht findet sie sich anderwärts im Kanton häufiger. — Frühling.

## EUPHORBIACEAE.

## MERCURIALIS.

*annua* L. Als Unkraut in Gärten und sonst häufig auf bebauten und unbebauten Stellen. — Sommer.

*perennis* L. An Rainen und unter Gebüsch, nicht selten. — Frühling.

## BUXUS.

*sempervirens* L. Nach Prof. Röder in Misox. Ich beobachtete ihn in Hecken bei Bellenz.

## EUPHORBIA.

*Lathyris* L. Nach Haller zwischen Bellenz und Osogna am Wege. — Juni und Juli.

*Peplus* L. An Wegen und auf bebauten Stellen häufig (Chur, Misocco etc.) — Sommer.

*helioscopia* L. An Wegen, in Weinbergen und andern Stellen häufig um Chur. — Frühling.

*sylvatica* L. Zwischen Marschlins und der Schlossbrücke, bei Rhazuns. — Juni.

*dulcis* L. Bei St. Maria in Calanca. — Mai und Juni.

*Cyparissias* L. Ueberall auf magern Triften; steigt auch bis in die subalpine Region. — Frühling und Sommer.

## EMPETREAE.

## EMPETRUM.

*nigrum* L. Bei uns auf fast allen Bergen, in der alpinen Region. — Blüht im Juni.

## URTICEAE.

## PARIETARIA.

*officinalis* L. Hin und wieder zerstreut bei Chur, Trimmis, Scheid etc. — Sommer.

*diffusa* M. et K. Nach Haller bei Clefen. Der Verf. fand sie bei Bellenz. — Juni.

## URTICA.

*dioica* L. An Wegen, um Wohnungen, auf Schutt in der Ebene; in der alpinen Region trifft man sie noch bei Alpenhütten unter Aconiten an. — Sommer.

*urens* L. Ein Unkraut in Gärten und Aeckern, das den Menschen in allen Himmelsgegenden und Höhen begleitet. — Sommer.

## HUMULUS.

*Lupulus* L. In Hecken durch die ganze Rheinebene. — August.

## FICUS.

*Carica* L. Ich fand verwilderte Feigenbäume am Ausgang des Misoxer-Thals. — Sommer.

## ULMACEAE.

## CELTIS.

*australis* L. Soll nach Haller und andern bei Clefen vorkommen.

## ULMUS.

*campestris* L. Hin und wieder bei Chur, und in der montanen Region bei Serneus und Klosters, so wie auch zwischen Valz und Lugnetz. — Frühling.

## CUPULIFERAE.

## QUERCUS.

*pedunculata* Ehrh. Bei Chur etc. meist vereinzelt. Eichenwälder sind in Graubünden selten und wo sie vorkommen habe ich sie auf einem Boden mit felsiger Grundlage bemerkt, so dass alle Stämme verdorrte Kronen haben. Ich vermute, dass die Eichen von Misox zu dieser Species gehören, kann aber nichts bestimmtes angeben. — Frühling.

*sessiliflora* Salisb. Bei Chur. — Mai.

## CASTANEA.

*vesca* Gärtner. In den italienischen Thälern überall; diesseits der Wasser-

scheide selten und in geringer Zahl: bei Rothenbrunnen und Sils im Domleschg, auf dem Mastrilser-Berg. Soll nie auf Kalk vorkommen, was jedoch der Bestätigung bedarf. Die letzten Kastanien wachsen bei Soglio im Bergell, bei Misocco in Misox. — Juni.

## FAGUS.

*sylvatica* L. Bildet am Fusse unserer Berge Wälder, besonders häufig im vordern Brättigau. Die Buche vertritt hierseits der Berge den Kastanienbaum der transalpinen Thäler, was das Vorkommen betrifft; jenseits der Berge gibt es keine Buchen, ausgenommen einige Stämme, die ich im Calanca-Thal wahrnahm. Das letzte Vorkommen hochstämmiger Buchen möchte wohl zuoberst in den Maiensässen von Kunkels (in ungel. 4000' Höhe) sein. Sie haben daselbst sowohl wegen der Dicke der Stämme als wegen dem Flechtenüberzug ein gewissermassen ehrwürdiges Aussehen. — Mai.

Auf der Höhe des Saleve bei Genf finden sich in einer Höhe von ungefähr 4400' s. m. hochstämmige aber schon halb abgestorbenen Buchen, die der Stelle auf der sie wachsen den Namen «aux treize arbres» zugezogen haben.

## CORYLUS.

*Avellana* L. In Gebüsch und Wäldern der Ebene und montanen Region häufig. — Februar und März.

## BETULINEAE.

## BETULA.

*alba* L. Durchs ganze Land bis in die alpinen Thäler. Für sich allein bildet die Birke nur selten Wälder, und wenn diess geschieht, so sind sie sehr lichte, wie z. B. bei Truns und unterhalb Briegels. In der Alp Albigna finden sich, nach Landammann Bapt. von Salis, in in einer Höhe von 5—6000' noch hochstämmige Birken. — Frühling.

## ALNUS.

*viridis* DC. In der alpinen Region durchs ganze Land; steigt auch in die subalpine herab. Dieses Gesträuch ist für die Menschen, indem es ihnen Brennmaterial liefert, für die Alpenthiere, denen es Nahrung liefert und eine Zufluchtstätte ist und für die Vegetation in diesen Höhen von äusserster Wichtigkeit. Der letztern gewährt es Schatten und Feuchtigkeit, daher auch eine Menge Pflanzen vorzugsweise dasselbe bewohnen. Nehmen wir zum Tross (wie der Bündner diesen Strauch heisst) noch die Alpenrosen und Legföhren, so haben wir die drei Pflanzen, die den alpinen Regionen einen eigenthümlichen Charakter aufdrücken; es sind die letzten ungefähr mannshohen holzartigen Gewächse, die sich immer in ansteigender Richtung von Boden erheben, weite Strecken dicht überziehen und eine eigene Vegetation von niedern Kräutern beherbergen. — Mai und Juni.

*glutinosa* Gärt. Ich fand diesen Baum nur zwischen Grono und St. Maria (Calanca) in geringer Zahl; in den diesseitigen Thälern des Kantons nirgends. — März.

*incana* Willd. Sehr häufig dies- und jenseits der Berge, gewöhnlich an Flüssen. — März.

## SALICINEAE.

## POPULUS.

*alba* L. In der Au bei Chur und am Wege von Fläsch nach Mels dem Rhein nach hinunter. — März und April.

*Tremula* L. In der Ebene und montanen Region, vereinzelt und gesellschaftlich. Nach Heer bei Bevers (5200'). — Blüht im März.

*nigra* L. In der Ebene an Flüssen und andern Stellen, bei Chur nicht selten, auch bei Lavin (Heer). — März.

## SALIX.

*alba* L. Vereinzelt an Bächen und andern Stellen der Rheinebene. — Die *S. vitellina* L., die eine Abart dieses Baums ist und die man hierseits der Berge um ihrer Zweige willen cultivirt, kommt nach Landam. Bapt. v. Salis bei Soglio wild vor, von wo aus jährlich eine beträchtliche Menge Ruthen (Band, zum Binden der Weinrebe) nach Clefen ausgeführt werden. — Frühling.

*triandra* L. Bei Chur am Rhein. — April und Mai.

*pentandra* L. Nach Hegetschweiler im Rosetsch-Thal. Ich fand diesen kleinen Baum bei Salsanna im Ober-Engadin am Thalwasser. Im Ursern-Thal, wo es längst schon beobachtet worden ist, hatten sich diess Jahr (1857) an den Blättern sämmtlicher männlicher Individuen durch Insekten kirschen-ähnliche Auswüchse gebildet, so dass das ganze Gewächs wie mit Kirschen beladen erschien. Auf den weiblichen Stämmen war keine Spur davon zu sehen. — Mai und Juni.

*daphnoides* Vill. An Flüssen bei Chur, Trimmis, nicht selten, aber vereinzelt; kommt aus den alpinen Thälern herunter, wo sie, wie z. B. bei Sils im Ober-Engadin, in grösserer Menge vorhanden sind. — Blüht in der Ebene schon im März.

*fissa* Hoffm. fruct. glabris. Ich fand nur einen weiblichen Strauch auf dem Salis'schen Gute bei Chur an der Plessur und einen andern am Rheine. — April.

*incana* Schrank. Ueberall an Flüssen der Ebene und in Menge. — April.

*monandra* Hoffm. Ueberall und häufig in der Ebene. Auch bei Bevers, Nufenen (über 5000') (Prof. Heer). — April.

*hastata* L. Im Camogasker-Thal, bei Samaden, St. Maria in Medels, in den Churwalder-Bergen, Urdenalp, auf dem Julier etc. — Juni.

*Hegetschweileri* Heer. Im Ursern-Thal nach dem Entdecker, H. Reg. He-

getschweiler. Steht der *S. hastata* sehr nahe.

*nigricans* Wahl. Bei Chur und andern Orten häufig. — Mai.

*stylaris* Ser. Bei Chur hin und wieder. — Mai.

*retusa* L. Auf allen unsern Bergen in den alpinen Höhen und sehr häufig. — Juni.

*serpyllifolia* Scop. Ich fand diese Art im Rosetsch-Thal und Bernina-Heuthal, an erstem Orte neben voriger Species wachsend, wo sich die Selbständigkeit der Art sehr deutlich herausstellte. — Juli und August.

*herbacea* L. In der alpinen und sub-nivalen Region durch das ganze Land. Die Pflanze wächst gern auf Weiden, welche sie oft dicht überzieht. Unter den vielen Standorten nenne ich bloss den Splügen, Septimer, Albula, Augstberg, Segnes. — Juni und Juli.

*caesia* Vill. Bei St. Moritz nach Reg. Hegetschweiler und dem Verf. Nach H. Heer bei Bevers, und nach H. Roland ebenda am Inn.

*repens* L. Nach Prof. Heer bei Bevers in Gräben. — Sommer.

*buxifolia* Schleich. Im Camogasker-Thal und Julier (Prof. Heer).

*foetida* DC. Am Hinterrhein nach Seringe, von woher ich sie auch habe; anderwärts fand ich sie in den Churwalder-Alpen, auf dem Augstberg und den Engadiner-Bergen. — Juni.

*glauca* L. (Auch *L. lapponum*). Auf den Engadiner-Bergen, so in der Celleriner-Alp, im Camogasker-Thal und andern Orten, in der alpinen Region. — Sommer.

*helvetica* Vill. Nicht selten in der

alpinen Region und noch höher: so auf dem Bernhardin, Albula und andern Engadiner-Bergen, nach meinen Erfahrungen auf granitischen Formationen. — Sommer.

## MONOCOTYLEDONES.

### MONOCOTYLEDONES PHÆNOGAMI.

#### ALISMACEAE.

##### ALISMA.

*Plantago* L. An und im stehendem Wasser von Fläsch bis Ilanz, überall. — Juni bis August.

#### JUNCAGINEAE.

##### TRIGLOCHIN.

*palustre* L. Auf Sümpfen und nassen Stellen der Ebene (Zizers, Feldsberg) und der subalpinen Thäler (Davos etc.), ziemlich häufig. — Sommer.

#### NAJADEAE.

##### POTAMOGETON.

*densus* L. In allen stehenden oder langsam fließenden Gewässern durch die ganze Rheinebene bis Thusis. — Juni.

*obtusus* Ducros. In Gräben bei Sargans. — Juli.

*natans* L. Im Davoser? - und Laxer-See. Nach Prof. Heer im Engadin bei Bevers. — Sommer.

*fluitans* Koch. Bei Maienfeld auf den Riedern.

? *praelongus* Wulff. Nach Prof. Heer im Davoser-See beim Platz.

*crispus* L. Im Laxer-See, wo ich ihn im August ohne Blüthen fand.

*pusillus* L. In Pfützen bei Chur am Rhein. — Sommer.

*pectinatus* L. In dem See unterhalb der Flimser-Waldhäuser in grosser Anzahl, auch bei Fläsch in Wassergräben. Juni und Juli.

? *perfoliatus* var. Im Davoser-See. (Heer).

*obtusifolius* M. et K. Unweit Sargans sammelte ich im Juli 1836 in Wassergräben an der Heerstrasse ein Potamogeton ohne Blüthen, das ich für die angeführte Species halten muss.

#### ZANNICHELLIA.

*palustris* L. var.? Nach einer Angabe von C. Bauhin bei Sax (vielleicht eher Lax?) in Sümpfen. Ich fand sie in einer Pfütze in Schams zwischen Zillis und Andeer an der Heerstrasse. — Juni.

### LEMNACEAE.

#### LEMNA.

*minor* L. In allen stehenden Gewässern, über welche sie eine Decke bildet.

### TYPHACEAE.

#### TYPHA.

*latifolia* L. Auf dem Zizerser-Ried und bei Alvaschein im Teich. — Sommer.

*minima* Hoppe. Auf sandigen den Ueberschwemmungen ausgesetzten Stellen, wie bei Chur am Rheine und bei Zizers. — Sommer.

#### SPARGANIUM.

*ramosum* Huds. Unweit Lostallo in Misox in langsam fliessendem Wasser, auf dem Ried bei Maienfeld und andern Stellen. — Sommer.

*simplex* Huds. Bei Clefen und vielleicht auch anderswo. — Sommer.

*natans* L. Diese Pflanze fand ich in einem Sumpfe des Münsterthals, wo sie sehr häufig wuchs. Blühen sah ich sie weder dort noch in dem noch höhern Chamounix-Thale. Nach Heer auf dem Bernina (7500') und Maloja.

### CALLACEAE.

#### ARUM.

*maculatum* L. Tritt unweit der Bündnergrenze zuerst auf bei Mels im Fürstenthum Lichtenstein und beim Dorfe Pfäfers. — Mai.

### ORCHIDEAE.

#### GOODYERA.

*repens* R.Br. In Tannenwäldern auf dem Bizockel bei Chur. — Sommer.

#### LISTERA.

*ovata* R.Br. Ueberall unter Gebüsch in der Ebene und montanen Region. — Mai.



*cordata* R. Br. Nach Ul. v. Salis in Wäldern des Brättigaus. Ich fand sie in einem finstern Walde der subalpinen Region oberhalb Lax. — August.

## NEOTTIA.

*Nidus-avis* Rich. Nicht selten in dunkeln Wäldern bei Chur, Haldenstein, im Brättigau und andern Orten. — Juni.

## EPIPACTIS.

*latifolia* All. In Laubholzwäldern bei Chur und andern Orten, nicht selten. — Juni.

*palustris* Crtz. Auf sumpfigen Stellen bei Zizers, Chur und in der montanen Region des Brättigaus etc. — Juni.

## CEPHALANTHERA.

*pallens* Rich. (*Epipactis grandiflora* Gaud.) In Buchenwäldern, unterhalb Krida bei Chur, bei Maienfeld und Fläsch. — Juni.

*ensifolia* Rich. Hin und wieder in Laubholzwäldern der montanen Region, z. B. in der Umgegend von Chur. — Juni.

*rubra* Rich. In Wäldern der montanen Region, bei Ems, Chur, Alveneu. — Juni.

## LIMODORUM.

*abortivum* L. Ich fand diese Pflanze einmal am Wege von Chur nach Maladers, wo ich sie aber seither nicht wieder erblicken konnte. — Juni.

## HERMINIUM.

*Monorchis* R. Br. (*Ophrys Monorchis*

L.) Auf Weiden der Ebene und der montanen Region nicht selten. — Juni und Juli.

## GYMNADENIA.

*viridis* Rich. (*Orch. viridis* Cr.) Auf dem Tschiera (Cera) nach Scheuchzer. Auf Weiden der alpinen Region (Fürstenalp, Augstberg etc.) von wo sie bis in die Ebene herabsteigt, ziemlich überall. — Juni und Juli.

*albida* Rich. Auf unsern Bergen nicht selten, von der montanen bis in die alpine Region. Besondere Standorte: Chureralpen, Städeli bei Chur etc. — Juni und Juli.

## ORCHIS.

*globosa* L. Auf alpinen und subalpinen Weiden. Ich fand sie auf Davos und auf dem Gebiete von Churwalden. — Juni.

*nigra* Scop. Auf alpinen und subalpinen Weiden, häufig durchs ganze Land. Die rosenrothe Abart nach Scheuchzer auf den Alpen von Surser in Schams. — Juni und Juli.

*suaveolens* Vill. delp. t. 1. Ein Exemplar von dieser Pflanze kam mir auf einem Abhange des Jochbergs bei Chur vor. Es stimmt mit der Villars'schen Figur und Beschreibung überein und seine hellrothe Farbe und die anderen Charaktere lassen mich auf einen hybriden Ursprung von der *O. nigra* und *odoratissima* schliessen.

*nigro-conopsea*. Diess ist eine zweite

Pflanze auf die die Beschreibung Villars gleichfalls passt. Allem Anscheine nach verdankt sie aber ihren Ursprung der Vermischung der *O. nigra* mit *O. conopsea*, zwischen welchen sie auf einer ebenen Stelle auf dem nämlichen Jochberg in der alpinen Region wuchs. Der Sporn hält wie bei obiger genau die Mitte zwischen denen der beiden genannten Arten und die Blumenfarbe ist ein dunkles Violett, was nothwendig aus dem Braun des *O. nigra* und dem blassen Violett der *O. conopsea* entstehen musste.

Die hybriden Orchideen gehören zu den seltenen Erscheinungen, scheinen mir nun aber ganz erwiesen seitdem ich die *O. nigro-conopsea* beobachtet habe, denn es findet hier das statt, was das Vorkommen der Hybriden im Allgemeinen bezeichnet: Zusammen treffen der beiden Stammspecies auf einer Stelle, Seltenheit der hybriden Exemplare an diesen Stellen selbst und hauptsächlich das Zwischeninnestehen in Bezug auf die Charaktere. Diess zugegeben, so kann man nicht umhin die Verwandtschaft der beiden Mutterspecies unter sich näher zu stellen als man sonst geneigt war und dürfte mithin es schwerlich billigen sie in zwei verschiedene Gattungen zu trennen.

*odoratissima* L. Auf alpinen Weiden von Davos, Maladers, Churwalden und andern Orten nicht selten. In diesen Höhen kommen die Blüthen immer

weiss und rosenroth gefärbt vor, wogegen sie auf tiefer gelegenen Standorten, wie auf dem Sarganser-Ried, immer violett sind. — Juni und Juli.

*conopsea* L. Ungemein häufig in allen Regionen von der alpinen an abwärts. Kommt auf Weiden und Wiesen vor. — Mai bis Juli.

*coriophora* L. Auf der Ebene zwischen Reichenau und Bonaduz. — Juni.

*Morio* L. Auf magern Triften und sumpfigen Weiden, häufig in der Ebene. In Misox zwischen Misocco und Soazza (also in der montanen Region) fand ich die weissblühende Abart mit grünen Streifen auf den obern Blumenblättern; dieselbe, so wie auch eine fleischfarbene kommen gleichfalls im Sarganser-Ried vor. — Mai.

*mascula* L. In Gebüsch und auf offenen Stellen der montanen Region, bei Trimmis, Maienfeld, Pfäfers etc. — Mai.

*ustulata* L. Auf haldigen Weiden bis in die subalpine Region, nicht selten. — Mai und Juni.

*militaris* L. (nicht Gaudin, welcher noch eine andere sehr verschiedene Art, die *O. Simia* Lam. damit verschmilzt). Auf fetten Wiesen bei Chur und andern Orten der Ebene häufig. — Die Orch. *Simia* Lam. haben wir nicht.

*pallens* L. Man hat sie mir von Trimmis her frisch zugetragen. — Mai.

*latifolia* L. Bei Chur, auf dem Sar-

ganser-Ried und andern Orten häufig.  
— Mai.

*maculata* L. Hin und wieder in der montanen Region, so in Misox, im verlorren Loch, bei Sils im Domleschg etc.  
— Juni.

#### PLATANThERA.

*bifolia* Rich. (*Orchis bifolia* L.) In Wäldern und auf Waldwiesen sehr gemein und zahlreich. — Mai und Juni.

#### CHAMORCHIS.

*alpina* Rich. Auf alpinen Weiden hin und wieder, und wo sie auftritt gewöhnlich sehr zahlreich. Ich fand sie auf dem Augstberg, in der Jochalp beim Zeichen, auf dem Albula. — Juli und August. — Geht unter allen Orchideen am höchsten (auf dem Albula wohl in die Höhe von 7000') und steigt nicht in die tiefern Regionen wie *O. nigra* und *Gymnadenia viridis* Rich.

#### OPHRYS.

*myodes* Jacq. Auf dürrn unfruchtbaren Halden, um Chur herum, jedoch nicht häufig. — Mai.

*aranifera* Huds. Wächst zwischen Feldsberg und Tamins in geringer Anzahl. — Mai.

#### EPIPOGIUM.

*Gmelini* Rich. In einem Buchenwald bei Marschlins, der seither abgetrieben worden (Hauptm. U. v. Salis).

#### MALAXIS.

*monophylla* Sw. In Bergwäldern, selten. Der verstorbene Prof. Schulthess

fand sie bei St. Moritz, Ul. v. Salis (wenn ich nicht irre) auf dem Gebirgsstock der Scheibe, Prof. Heer und Kunstgärtner Wirth bei Matt im K. Glarus.

#### CYPRIPEDIUM.

*Calceolus* L. In Bergwäldern bei Chur, Fideris und andern Orten, nicht selten. — Mai.

### DIOSCOREAE.

#### TAMUS.

*communis* L. Findet sich in Hecken bei Chur, Maienfeld, Trimmis und andern Orten der Ebene. — Mai und Juni.

### SMILACEAE.

#### PARIS.

*quadrifolia* L. Hin und wieder gesellschaftlich, am liebsten auf schattigen Stellen bis in die subalpine Region (Fettan). — April und Mai.

#### ASPARAGUS.

*officinalis* L. In Gebüsch und an andern Stellen bei Chur, nicht selten. — Juni und Juli.

#### STREPTOPUS.

*amplexifolius* DC. Immer auf der obersten Grenze des Kirschbaums, um 3500' s. m. Ich fand diese Pflanze gewöhnlich auf schattigen Stellen, auf Wiesen um Gebüsch herum, bei Praden, in der Valzeina und in Calanca. Nach Scheuchzer auch auf den Tschiera. — Juni.

## MAIANTHEMUM.

*bifolium* DC. In Gebüsch hin und wieder in der montanen Region; nicht selten in der Umgegend von Chur, so wie auch in Misox. — Mai und Juni.

## CONVALLARIA.

*multiflora* L. In Hecken und andern Stellen; nicht selten in der Umgegend von Chur. — Mai und Juni.

*Polygonatum* L. Auf Gemäuer und andern Stellen der Rheinebene, gemein. — Mai und Juni.

*verticillata* L. In der montanen Region; nicht selten auf steinigen Stellen wo Gebüsch ist. — Juni und Juli.

*majalis* L. In Laubholzwäldern und Gebüsch; sowohl in der Ebene als in der montanen Region, gemein. — Mai.

## COLCHICACEAE.

## VERATRUM.

*album* L. Häufig auf alpinen und subalpinen Wiesen durch das ganze Land. — Sommer.

Häufig kommt auch die grünblühende Varietät (*V. Lobelianum* Bernh.) vor, so z. B. in der Malixer-Alp im Herabsteigen nach Jux mit der weissblühenden vermischt.

## TOFIELDIA.

*calyculata* Wahl. Auf sumpfigen und nassen Stellen vom Fuss der Berge an bis in die alpine Region. — Sommer.

*glacialis* Gaud. Nach Gaudin bei Airolo, nach Heer in der Alp Aret bei Fettan und auf dem Bernina; nach Muret auf dem Albula. — Sommer.

*borealis* Wahl. Im Bernina-Thal (5350') auf einer sumpfigen Stelle (der Verf.), auf dem Col Joata zwischen Tschierfs und Scharl (Appellationsrichter Muret). — Sommer.

## COLCHICUM.

*autumnale* L. In allen Wiesen in Menge, bis in die subalpinen Höhen. — Herbst.

*alpinum* DC. (Nach Comolli synonym mit *Colch. arenarium* W. et K.) Findet sich nach der Flora Comense auf den Alpenweiden des Splügens und bei Madesimo oberhalb dem Campo dolcino. — Blüht im August.

## LILIACEAE.

## Allium.

*oleraceum* Don. In Gebüsch und auf Mauern bei Chur und Feldsberg. — Juni.

*carinatum* Don. Häufig an Aecker-rändern, um Weinberge herum. — Juni und Juli.

*paniculatum* L.

α) *capsuliformum* (Hall. all. n° 25! Reich. ic. 604. An etiam Red. lil?) Nach Haller selbst bei Pfäfers und nach Prof. DeCandolle auf der Südseite des Splügens, von woher er ein Exemplar aufbewahrt.

ß) *bulbiferum* (All. flexum W. et K. n° 278! All. violaceum Willd.) Sehr häufig durch ganz Bünden; von der Steig und Chur an bis Versam, Trüns und den Heinzenberg; selbst in der Parpaner-Alp, also in einer Höhe von 6000' und mehr, fand ich ein Exemplar. — Sommer.

*sphaerocephalum* L. (excl. syn. Hall. et Bauh.) Im obern Veltlin und unweit Airolo. — Juli und August.

*suaveolens* (Jacq. Gaud.) Bei Samaden nach Prof. Heer.

*Schœnoprasum* L. Auf sumpfigen Stellen der Alpenweiden, gemein. — Sommer.

*Scorodoprasum* L. Wiederholt versicherte mich H. Emanuel Thomas, dass das Allium, das er mir unter dem Namen *arenarium* schickte, von St. Jakob im Tavetsch komme. Ich glaube aber mit Koch dass das Al. *arenarium* und Al. *Scorodoprasum* eine und dieselbe Species ist.

*fallax* Don. (A. angulosum Gaud. non L.) Auf Felsen und Halden bei Haldenstein, Reichenau, im Bergell, oberhalb des Dorfs Cellerina (um 5300' s. m.), auf dem Camoghé (Prof. Heer). — August und Herbst.

*Victorialis* L. In der alpinen Region, am Rothenhorn oberhalb Brienz, in den Brättigauer-Alpen, im Bernina-Heuthal etc. — Sommer.

*ursinum* L. In der Ebene von Fläsch

nach Chur hin und wieder auf fetten Stellen. — Mai.

#### SCILLA.

*bifolia* L. In Wiesen bei Marschlins, Malans, Maienfeld, wo sie im April blüht. Ich habe sie bei uns nie sich über die Ebene erheben sehen, wie diess im Jura bei Genf der Fall ist, wo sie in den alpinen Höhen sich neben *Narcissus Pseudo-Narcissus* findet.

#### MUSCARI.

*racemosum* Mill. In Baumgärten, auf Wiesen und in Weinbergen, bei uns selten. — April.

*botryoides* Mill. In Menge hinter dem Schlosse Marschlins an den Gräben, weniger häufig bei Chur auf den Wiesen nächst der Au. — April.

*comosum* Mill. Ich fand in den Weinbergen oberhalb Grono Exemplare. — Frühling.

#### ORNITHOGALUM.

*umbellatum* L. Gesellschaftlich auf Wiesen, bei Chur an mehrern Stellen. — Juni.

#### GAGEA (ehedem Ornithogalum).

*lutea* Duby. An Zäunen, in Baumgärten und andern Stellen, nicht selten. Steigt in die Maiensässe (etwas in die subalpine Region hinein). — März bis Mai.

*minima* Schulth. Oberhalb Untervatz auf dem Calanda in einer Wiese, in einer Höhe von ungefähr 5500', wo sie

mit der *G. lutea* vermischt wächst; so-  
dann im Dorf Vettis in einem Acker  
in zahlloser Menge. — Mai.

*fistulosa* Duby. Um die Alphütten  
herum unter *Rumex alpinus* und den  
*Aconiten*; blüht aber schon im Juni ehe  
diese Wohnungen bezogen werden.  
Auf dem Calanda, Bizockel und andern  
Bergen.

*villosa* Duby (*Ornithogalum arvense*  
Pers.) In den Aeckern beim Rothen-  
thurm, Churer-Gebiet. — April und Mai.

#### ANTHERICUM.

*ramosum* L. Auf dürrer, sowohl als  
auf sumpfigem Boden, von der Ebene  
bis auf die alpinen Weiden. — Sommer.

*Liliago* L. In der subalpinen Region.  
Ich fand es oberhalb Soglio und im  
Herabsteigen vom Montellin nach Ma-  
laders. — Sommer.

#### CZACKIA (auch Anthericum).

*liliastrum* Andr. Auf Wiesen in der  
montanen und subalpinen Region, fast  
überall. Auf dem Bernhardin, bei Chur  
herum und andern Orten. — Juni und  
Juli.

#### HEMEROCALLIS.

*fulva* L. Bei Chur an vielen Stellen,  
blüht aber nicht immer. — Juni und Juli.

#### LLOYDIA.

*serotina* Salisb. (*Antherium ser.* L.)  
Durch das ganze Land in den alpinen  
Höhen (auf dem Albula am Uebergang  
7270'). Blüht gleich nach dem Schmelzen  
des Schnee's.

#### LILIUM.

*bulbiferum* L. An Felsen bei Pfäfers,  
Trimmis, der Molinära, bei Fläsch und  
Chur, an letztem Orte auf dem Mitten-  
berg in der subalpinen Region; jenseits  
der Wasserscheide noch häufiger, bei  
Misocco, St. Maria in Calanca und im  
Bergell; auch im Unter-Engadin. —  
Juni.

*Martagon* L. In Bergwäldern bis in  
die alpinen Weiden hinauf (in der  
Zuzer-Alp auf dem Levirone auf den  
Felsköpfen über den Alphütten wohl in  
einer Höhe von 6400' s. m. — Juni bis  
August.

#### TULIPA.

*sylvestris* L. Gesellschaftlich, an  
manchen Stellen bei Chur in unzähliger  
Menge; blüht aber selten. — Mai.

### AMARYLLIDAE.

#### NARCISSUS.

*poeticus* L. In montanen und sub-  
alpinen Wiesen, gesellschaftlich, oft in  
ungeheurer Menge. In den Heubergen  
von Seewis, im Rheinwald, Dom-  
leschg etc. — Mai und Juni.

#### GALANTHUS?

*nivalis* L. Nach einer Angabe in der  
Alpina in Graubünden.

### IRIDEAE.

#### CROCUS.

*vernus* Vill. Von der alpinen Region

herab bis an den Fuss der Berge, sehr häufig auf Wiesen und Weiden. An manchen Stellen überwiegt diese Pflanze an Individuen-Zahl alle andern zusammen genommen. — Frühling und Juni.

#### IRIS.

*sibirica* L. Nach Hauptm. Ul. v. Salis im Sarganser-Ried, der von daher mir ein Exemplar mitzuthellen die Güte hatte. — Juni.

*germanica* L. Auf Halden und Gestein bei Chur, nicht selten. — Mai und Juni.

*Pseud'acorus* L. Im untern Misox bei St. Vittore. — Juni.

#### GLADIOLUS.

*communis* L. Auf dem Sarganser-Ried traf ich um 200 Stücke einer Siegwurz an, die ohne Zweifel der *Gl. palustris* Gaudin ist und die wohl der Urtypus der in Gärten kultivirten Pflanze sein mag. — Juli.

### JUNCINEAE.

#### LUZULA.

*pilosa* Willd. In Laubholzwäldern und andern Stellen. Steigt bis in die Alpenweiden hinauf. Bei Chur, Canova im Domleschg neben *L. flavescens* und *erecta* u. a. O. — Mai.

*flavescens* Gaud. In Laubholzwäldern beim Städeli auf Churergebiet, bei

Canova und auch in der Malixer-Alp. — Mai und Juni.

*nivea* DC. In Wäldern von Pfäfers an bis Chur nicht selten. Auch im Misox. — Sommer.

*sylvatica* Bich. In Wäldern und Waldwiesen, gemein. — Mai und Juni.

*spadicea* Desv. In Schams und auf dem Bernhardin nach ältern Angaben. Der Verf. fand sie fast durch ganz Bünden in der subalpinen Region. — Sommer.

*spicata* DC. Auf dem Gotthard, von mir in der Churwalder-Alp, auf dem Levirone und andern Orten gefunden. — Sommer.

*lutea* DC. Auf alpinen Weiden bis in die Höhe von 7000' nicht selten. Auf dem Septimer, Augstberg, Albula, Rosetsch etc. — Sommer.

*campestris* DC. Auf montanen Weiden, wie am Mastrilser-Berg, beim Städeli oberhalb Chur, nicht selten. — Mai.

*erecta* Desv. Findet sich wahrscheinlich vielfach bei uns. Meine Exemplare sammelte ich im Wäldchen bei der Burgruine Canova im Domleschg. — Mai.

*sudetica* DC. Auf fast allen alpinen Weiden: Calanda, Montellin, Malixer-Alp etc. — Sommer.

#### JUNCUS.

*Jacquini* L. In den alpinen Höhen (bis 7000' s. m.) der ganzen Länge

der Centralkette nach : Septimer, Maloja, bei St. Maria in Medels, über Campo gegen den Scopi, im Heuthal von Bernina und andern Orten. — Sommer.

*castaneus* Sm. In den Lugnetzer-Bergen von Em. Thomas im Jahr 1854 entdeckt. — Sommer.

*triglumis* L. Nicht selten auf wasserreichen Stellen der alpinen Region. Nach Gesner auf dem Bernhardin, von mir auf dem Parpaner Horn, in der Fürstenalp und an vielen andern Stellen gefunden. — Sommer.

*bufonius* L. Auf Sandstellen, die den Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, in Schlammgräben und andern Orten, gemein. Steigt von den Ufern der Moesa und des Rheins bis in die Höhe von 5000', so bei Samaden. — Sommer.

*bulbosus* L. Auf feuchten Grasplätzen bei Chur, Klosters, Waltensburg, Samaden, Soglio u.a.O. — Sommer.

*ustulatus* Hoppe (J. alpinus Vill.) Häufig in der Umgegend von Chur; die Alpenform bemerkte ich in Erosen. — Sommer.

*obtusiflorus* Ehrh. Zwischen St. Vitore und Roveredo und auf dem Maienfelder-Ried. — Juni und Juli.

*sylvaticus* Reich. (J. acutiflorus Ehr.) Wurde mir durch H. Roland mitgetheilt, der ihn bei Samaden sammelte.

*trifidus* L. An Felsen der alpinen Höhen nicht selten. Auf dem Lukmanier, Gotthard, Septimer, im Calanca

u.a.O. Scheint sich an die Centralkette zu halten. — Sommer.

*arcticus* Willd. Auf der sumpfigen Ebene unterhalb Sils im Ober-Engadin (5600').

*filiformis* L. Auf alpinen Weiden nicht selten. So in der Maienfelder Badalp, in Medels in subalpinen Gegenden. — Sommer.

*conglomeratus* L. Bei Lostallo in Misox. — Juni.

*effusus* L. Auf schlammigen und sumpfigen Stellen sehr gemein. — Sommer.

*glaucus* Sibth. In Misox bei Lostallo und bei Ilanz und Schnaus. — Sommer.

## CYPERACEAE.

### SCHOENUS.

*nigricans* L. Auf sumpfigen Stellen bei Chur, Sargans und anderwärts. — Sommer.

*ferrugineus* L. Auf montanen und subalpinen Sumpfstellen im Domleschg, bei Chur, in den Churvalder-Heubergen etc. — Sommer.

### ELEOCHARIS (Scirpus L.).

*palustris* R. B. Auf sumpfigen flachen Stellen, gemein. — Sommer.

*Baeothryon* Ehrh. Nach Scheuchzer in den rhätischen Alpen. Der Verf. fand dieses Pflänzchen bei Sils und im Bernina-Thal (5600') in Menge. — Sommer.



*caespitosa* Ehrh. Auf fast allen versumpften Stellen der alpinen und subalpinen Region. Auf Runkelier, in Erosen etc. — Juni.

*alpina*. Herr Nägeli aus Zürich hat diese seltene Species bei Pontresina gefunden.

SCIRPUS.

*sylvaticus* L. An schattigen und feuchten Stellen, an Wassergräben und andern Orten bei Zizers, Lostallo im Misox etc. — Mai und Juni.

*lacustris* L. Um Seen herum, in Bünden am Canover- und Laxer-See. — Sommer.

BLYSMUS.

*compressus* Panz (Schoenus compressus L.). Auf versumpften Grasplätzen der Ebene (Feldsberg, Untervatz etc.) und der subalpinen Region (Churer-Maiensässe etc.) gemein. — Juni.

Bei Ilanz fand ich im August blühend einen Blysmus, der vom gewöhnlichen *compressus* etwas verschieden war. Ich überlasse es den nach mir kommenden Botanikern ihn genauer zu beobachten.

ERIPHORUM.

*alpinum* L. Auf dem Torfgrunde zwischen Pontresina und St. Moritz, so wie auch im Bernina-Thal. — Sommer.

*capitatum* Hoffm. Auf alpinen Sümpfen nicht selten. Auf dem Bernhardin, Joch, Stallerberg, Flüelen etc. — Juni.

*latifolium* Hoppe. Häufig auf Sümpfen und versumpften Halden durch ganz Bünden bis in die subalpinen Thäler (Erosen). — Mai und Juni.

*angustifolium* Roth. Hin und wieder. Auf dem Sarganser-Ried und im Rosetsch-Thale, im Ober-Engadin (6000' ungef.). — Mai und Juni.

CYPERUS.

*fuscus* L. Im Hochgericht Gruob bei Ilanz und Schnaus. — August.

*longus* L. Nach Schleicher bei Clefen. — Sommer.

*Monti* L. Nach Gaudin zwischen Clefen und alla Riva. — August und September.

*flavescens* L. Auf dem Zizerser- und Maienfelder-Ried. — September.

CAREX.

*dioica* L. Auf der sumpfigen Ebene bei Sils im Ober-Engadin (5500') und nach H. Nägeli bei Pontresina. — Juli.

*Davalliana* Sm. Häufig auf sumpfigen oder auch nur nassen Stellen durch das ganze Land. — Mai.

*foetida* All. Am Oberalp-See und auf dem Gotthard (d. Verf.), auf dem Bernhardin (Scheuchzer), auf dem Splügen (Gaudin). Immer in der alpinen Region, an Wasser. — Sommer.

*juncifolia* All. Nach Gay zwischen Splügen und Hinterrhein (auf der rechten Seite des Rheins, Medels gegenüber, der Verf.); ferner bei Samaden, Bevers,

im Bernina-Thal (Prof. Heer, Apoth. Bovelin und der Verf.) Findet sich in diesen Höhen, genau auf denselben Standorten, wie der *Schoenus compressus* L. auf tiefer gelegenen. — Sommer.

*paniculata* L. Ueberall an Bächen und andern Stellen. Steigt bei Parpan bis 6000' hoch. — Mai und Juni.

*teretiuscula* Good. Am Schwarzen-see auf Davos auf Torfgrund. — Juni und Juli.

*paradoxa* Willd. Bei Chur auf St. Hilarien. — Mai.

*vulpina* L. An Gräben. Fundorte: Untervatz, Misox etc. — Mai und Juni.

*muricata* L. Ueberall an Wegen und andern Stellen gemein. — Mai.

*stellulata* Good. In der alpinen und subalpinen Region. Ich habe sie vom Augstenberg, der Lenzer-Heide und St. Maria in Medels. — Sommer.

*ovalis* Good. Ich fand sie in der Malixer-Alp, zwischen Lostallo und Grono u. a. St. — Sommer.

*approximata* Hoppe. Auf der Greina (Prof. Heer). — Sommer.

*curta* Good. Nach Gaudin auf dem Splügen. Ich sammelte sie an den Seen auf der Lenzer-Heide und am Schwarzen-see auf Davos.

Die *C. curta brunescens* Gd. Auf trocknen Alpenweiden in Medels oberhalb St. Maria und bei Airolo. — Sommer.

*remota* L. Bei Untervatz, zwischen Soazza und Grono. — Mai und Juni.

*bicolor* All. Auf dem Thalgrund der Alp Segnes, auf etwas sumpfigen Stellen. — Juli und August.

*curvula* All. Nach Gaudin auf dem Splügen. Ich fand sie auf der Central-kette fast überall vom Bernhardin an, wo sie in allerlei Gestalt erscheint, bis zum Bernina und Albula, an Felsen in einer Höhe von 6500—7300'. — Juni.

*atrata* L. Auf dem Septimer, Augstberg und andern Bergen bis in die Höhe von 7300'. — Sommer.

*aterrima* Hoppe. Bei Bevers nach Prof. Heer.

*VahlII* Schkuhr. Wurde nach H. Gays Mittheilung von Thomas auf dem Albula und zwar auf der Uebergangshöhe des Passes gefunden. — Sommer.

*mucronata* All. Auf dem Calanda (Dr. Custor), auf dem Ofen (Prof. Heer). — Sommer.

*caespitosa* L. Ist häufig auf versumpften Weiden der subalpinen und alpinen Region. Kommt auch auf den Churer-Wiesen am Mühlbach vor, wo sie im Mai blüht.

*stricta* Good. Auf den Sümpfen (Riedern) von Sargans, Zizers, Untervatz in Menge. — Mai.

*pauciflora* Lightf. Auf Torfgründen in alpinen Gegenden, selten in Graubünden. Ich fand sie am grossen See auf der Lenzer-Heide und zwischen

Pontresina und St. Moritz (5140—5280').  
— Juni und Juli.

Die *Carex pulicaris* L. die Hauptm.  
v. Salis am grossen See der Lenzer-  
Heide gefunden haben will, möchte  
wohl diese Art sein.

*microglochin* Wahl. Nach Thomas  
auf dem Albula und nach H. Nägeli im  
Beverser-Thal. Der Verf. fand sie in  
Menge im Bernina-Thal und auf der  
Ebene unter Sils im Ober-Engadin  
(5500') an Flüssen. — Juli.

*rupestris* All. (C. *petraea* Wahl.) Auf  
der Albulahöhe (7270'), auf dem Le-  
virone gegen das Liviner-Thal und im  
Heuthal auf dem Bernina, immer auf  
Kalkfelsen. — Juli.

*tomentosa* L. Fast überall auf nassen  
Stellen, bei Chur auf St. Hilarien. —  
Mai.

*montana* L. Ueberall auf Wiesen u.  
a. St. — April.

*praecox* Jacq. Gemein, auf Wiesen  
und Weiden. — April.

*membranacea* Hopp. Nach Prof. Heer  
in Livino. Nach Scheuchzer in den rhä-  
tischen Alpen. — Sommer.

*ericetorum* Pollich. Nach Prof. Heer  
bei Nufenen.

*humilis* Leys. An Halden um Chur  
herum gemein. Steigt bei Genf auf die  
Höhe des Salève (4400'). — März—Juni.

*digitata* L. In Wäldern bei Chur  
herum, gemein; im Bernina-Heuthal  
u. a. O. — April—Juni.

*ornithopoda* Willd. Bei Pfäfers,  
Malans, im Domleschg etc. — Mai.

*sempervirens* Vill. Auf Alpenweiden  
und in Wiesen bis in die montane  
Region herab (St. Hilarien bei Chur,  
bei Pfäfers). — Sommer.

*pallescent* L. Auf alpinen, subalpinen  
und montanen Weiden und Wiesen.  
Fundorte: Malixer-Alp, Runkelier,  
bei Rungella etc. — Juni.

*limosa* L. Am Schwarzensee auf  
Davos, auf der Lenzer-Heide am grossen  
See auf Torfboden (5140'), auf Malöja  
(Heer). — Blüht im Juni.

*Oederi* Ehrh. Ziemlich gemein bei  
Chur herum. — Mai.

*flava* L. An Bächen und andern  
nassen Stellen, bei Trüms, Parpan u. a.  
St. — Mai und Juni.

*distans* L. Zwischen Roveredo und  
St. Vittore im Misox. — Blüht im Mai.

*Hornschuchiana* Hop. Gemein auf  
sumpfigen oder nur nassen Stellen, um  
Chur herum. — Mai und Juni.

*sylvatica* Huds. In Laubholzwäldern  
in der Umgegend von Marschlins, ober-  
halb Maiefeld an der Quelle, welche  
die Brunnen dieses Städtchens nährt  
u. a. St. — Mai und Juni.

*alba* L. Um und in Wäldern und an  
andern Stellen bei Chur herum, häufig.  
— Frühling.

*firma* Host. An Felsen in der alpinen  
und subalpinen Region; z. B. oberhalb

Bergün, bei der Brücke, auf dem Augstberg, am Uebergange auf dem Albula (7270'). — Sommer.

*panicea* L. An Bächen auf den Churer-Wiesen, häufig, bei Sils in einer Höhe von 5600' u. a. O. — Frühling — Juni.

*Scopolii* Gaud. Oberhalb Parpan und auf dem Joch, also in subalpinen und alpinen Höhen. Auf dem Bernina nach Heer. — Juni und Juli.

*brachystachys* Schrank. Nach Dr. Custor auf dem Calanda. — Sommer.

*frigida* All. Im Ursern- und Calfeiser-Thal nach ältern Angaben; ich fand sie in Erosen, Lugnetz, Ober-Engadin u. a. O. — Juni.

*capillaris* L. Auf Weiden der subalpinen und alpinen Region. Auf Davos, bei Sils und Pontresina, im Ober-Engadin, in der Malixer-Alp, Jochalp beim Zeichen. — Juni und Juli.

*glauca* L. Ueberall an Bächen. — Mai.

*hirta* L. Auf schlammigen Stellen, überall. — Frühling.

*paludosa* Good. Auf Sümpfen und in Wassergräben bei Sargans und Untervatz. — Mai.

*vesicaria* L. In Sümpfen; ich habe sie von der Lenzer-Heide und von Sargans. — Mai und Juni.

*ampullacea* Good. Um den Laxer- und Schwarzen-See herum, bei Klosters, häufig (d. Verf.), auf dem Valserberg (H. Nägeli). — Juni. Steigt bis 4500' hoch in die Berge.

#### KOBRESIA.

*scirpina* Willd. Auf den alpinen Weiden unserer Berge nicht selten, ich habe sie vom Augstenberg bei Malans, Weisshorn, Albula (am Uebergang, 7270'). — Sommer.

#### ELYNA.

*caricina* M. et K. Auf dem Albula (Thomas), im Beverser-Thal (Prof. Heer), zwischen Sils und Silvaplana (d. Verf.). — Juni und Juli.

### GRAMINEAE.

#### ANTHOXANTHUM.

*odoratum* L. In Wiesen, häufig, von der Ebene bis in die alpine Region. — Frühling und Vorsommer.

#### PHLEUM.

*pratense* L. Ueberall auf Wiesen u. a. St. — Juni und Juni.

*alpinum* L. Auf allen Alpenwiesen und Weiden. — Sommer.

*commutatum* Gaud. Nach Hegetschweiler in Graubünden. — Sommer.

*phalarioides* Koel. (Ph. Boehmeri Wib.) Auf trockenen Stellen im bündnerischen Oberland und nach H. Roland im untern Misox. — Sommer.

*Michelii* All. Nach Scheuchzer in Rhätien, von mir auf dem Calanda bei Bategna gefunden, nach Heer im Engadin. — Juni und Juli.

ALOPECURUS.

*fulvus* Sm. Findet sich in den kleinen Seen der Lenzer-Heide, bei Samaden in Wassergräben (5200' s. m.). — Juli und August.

ANDROPOGON.

*Ischaemum* L. Zwischen Chur und Maladers, bei Ilanz, im vordern Lugnetz, in Calanca, immer an Halden oder andern der Sonnenhitze ausgesetzten Stellen. — Sommer.

*Gryllus* L. Man findet dieses hohe Gras von Bellenz an bis nach Lostallo hinauf. Schon Scheuchzer hat es bemerkt. Nach Comolli auch bei Clefen, Morben und Sonders. — Juni.

MILIUM.

*effusum* L. Nach Scheuchzer auf dem Berg Cera (Tschera) in Schams; ich fand es beim Städeli auf Churer-Gebiet an einem Waldsäume. Hauptm. Ul. v. Salis hat es hin und wieder bemerkt, gibt aber die Lokalitäten nicht an. — Mai und Juni.

ORTHOPOGON.

*undulatifolius* R. B. Nach Hauptm. Ul. v. Salis bei Clefen.

ECHINOCHLOA.

*Crus-galli* R. et Sch. Ueberall an Wegen und in Aeckern, durch die ganze Rheinebene. — Sommer.

DIGITARIA.

*filiformis* Koel. (Reich. agr. 1406.) Bei Chur in der Au und auf dem Ge-

biete von Maienfeld. — Sommer und Herbst.

SETARIA (Panicum L.).

*verticillata* R. et Schult. An Wegen und als Unkraut in Gärten bei Chur, Trimmis u. a. O. — Sommer.

*glauca* R. et Schult. Von Chur und Ems an bis nach Truns im Oberland, in Aeckern. — Sommer.

*viridis* L. R. et Schult. Gemein in Aeckern und auf andern Stellen. — Sommer.

NARDUS.

*stricta* L. Auf allen dürrn Alpenweiden. — Sommer.

LOLIUM.

*perenne* L. Auf Wiesen, an Wegen, in Baumgärten gemein. — Sommer.

ELYMUS.

*europæus* L. In montanen Wäldern, bei Chur im Schwarzwald. — Sommer.

HORDEUM.

*murinum* L. An Wegen und andern Orten sehr gemein. — Sommer.

TRITICUM.

*caninum* Schreb. An schattigen Stellen, seltener als die folgende Art. Ich habe sie von Parpan. — Sommer.

*repens* L. Ueberall an Zäunen und Hecken. Bei Tiran findet sich eine graugrüne Abart davon. — Sommer.

*pinnatum* DC. Ueberall in Hecken, in Zäunen, in Wäldern. — Sommer.

*sylvaticum* DC. In Wäldern und Ge-

büsch, bei Trimmis unter Hecken, ist seltener als voriges. — Sommer.

## BROMUS.

*erectus* Huds. Auf allen Wiesen in grosser Menge. — Juni.

*asper* L. In Wäldern und Waldwiesen, zu Chur im Rauber'schen Maiensäss. — Juni.

*sterilis* L. Ueberall an Wegen und Ackerrändern, häufig. — Mai und Juni.

*tectorum* L. An und auf Mauern, bei Chur hin und wieder und auch bei Ilanz. — Juni.

*racemosus* L. Zwischen dem Dorf Alveneu und dem Bade in Aeckern. — Juni.

*mollis* L. Ueberall an Wegen und in Wiesen. — Juni.

*arvensis* L. Auf Aeckern, Schutt und andern Stellen sehr häufig in der ganzen Rheinebene und dem Gebiete von Tiefenkasten. — Juni.

*velutinus* Schrad. (Reich. agr. 1594—1596!). Bei Chur hin und wieder. — Blüht im August und Herbst.

*secalinus* L. In Aeckern bei Ems, bei Roveredo im Roggen. — Juni.

*giganteus* L. Gemein an schattigen und nassen Stellen. — Sommer.

## FESTUCA.

*rhætica* DC. Nach Schleicher in Rhätien. Ich fand sie auf Davos bei Glaris und bei Samaden und Sils in grosser Anzahl, an letztem Orte in einer

Höhe von beiläufig 5500—5600' s. m. — Sommer.

*pumila* Vill. Auf alpinen Weiden gemein: auf dem Calanda, Urdenalp etc. — Sommer.

*spadicea* L. Nach Dick und Schleicher in Rhätien. — Sommer.

*Scheuchzeri* Gaud. Nicht selten auf fetten Grasplätzen der subalpinen und alpinen Region, so auf dem Mittenberg bei Chur, am Wege der Carmenna, bei Sils im Ober-Engadin (5580'). — Sommer.

*sylvatica* Vill. Auf dem Bizockel bei Chur auf offenen Grasstellen im Walde. — Juli.

*arundinacea*. Nach Prof. Heer bei Ponte.

*elatio*r L. In allen Wiesen, häufig um Chur herum. — Juni.

*nigrescens* Lam. Nach der Alpina in Graubünden. Ich fand sie bei Samaden (5200'), und Prof. Heer in der Alp Laret (Aret) bei Fettan. — Sommer.

*heterophylla* Juss. Zu St. Maria in Calanca. — Juni.

*rubra* L. Bei Chur in der Ebene und auf dem Mittenberg. Es kommen mehrere Varietäten hier vor. — Sommer.

*valesiaca* Gaud.? In der Jochalp und auf dem Mittenberg bei Chur. — Sommer.

*duriuscula* L. Auf trockenen Grasplätzen, auf Mauern, gemein. Bei Chur, Trimmis und andern Orten der Ebene,

bei Cellerina und Samaden (5200' s. m.).  
— Sommer.

*violacea* Gaud. In der Jochalp bei Chur, wo *Fest. valesiaca* vorkommt. —

*alpina* Sut. Auf dem Calanda in der alpinen Region, bei Glaris auf Davos (d. Verf.), im Heuthal (H. Nägeli). — Sommer.

*Halleri* Vill. Auf dem Calanda (8250') wo Kalkgebirg ist und auf granitischen Formationen in den Engadiner-Bergen. — Sommer.

*ovina* L. Häufig auf dünnen Weiden bei Chur, Maienfeld u. a. O. — Juni.

*varia* Hænke var. *flavescens* (Reich. agr. 1553). Oberhalb Andermatt im Ursern-Thal (d. Verf.) und auf dem Bernina (6500') (Heer). — Sommer.

#### VULPIA.

*Myurus* Gmel. Häufig auf dünnen Grasplätzen bei Bellenz. — Mai.

#### SESLERIA.

*caerulea* And. Ueberall an Felsen und auf Weiden, vom Fusse der Berge an bis in die Höhe von 7500' s. m. (so auf dem Tödi nach Nägeli), häufig. — Frühling und Sommer.

*disticha* Pers. Nach Suter und Gaudin auf dem Splügen, nach Thomas auf dem Bernina, nach H. Nägeli auf dem Scaletta und Bernina, nach mir auf dem Augstberg (Seite von Urden), auf der Albula-Höhe (7200') neben des *Sesl. caerulea* und auf mehreren andern Bergen

des Engadins. Steigt nicht aus der alpinen Region herab. — Sommer.

#### DACTYLIS.

*glomerata* L. Ueberall auf Wiesen bis in die subalpine Region. — Sommer.

#### KOELERIA.

*cristata* Pers. Auf trockenen dünnen Stellen bei Chur herum gemein. — Sommer.

*hirsuta* Gaud. (Reich. agr. 1673.) Nach Pfr. Felix bei Nufenen, nach Prof. Heer bei Bevers und anderwärts im Ober-Engadin. Ich fand sie in grosser Menge auf der Ebene Samaden gegenüber auf mageren Weiden; sodann weit über demselben Dorfe gegen die Alp zu und in der Zuzeralp auf dem Levirone, wohl in einer Höhe von 6400' s. m. — Sommer.

β) Bei Samaden eine Varietät mit kahlen Aehrchen.

#### CYNOSURUS.

*cristatus* L. Auf Wiesen. Zu Chur in der Praserin, bei Klosters im Brättigau. — Sommer.

#### GLYCERIA.

*fluitans* R. et Schult. Ueberall auf schlammigen Stellen an Bächen, durch die ganze Ebene; auch bei Samaden in Schlammgräben. — Sommer.

#### CATABROSA.

*aquatica* Reich. Auf Schlamm an Bächen und Seen. So am Teich bei Alvaschein, bei Lenz gegen Brienz; zwischen

Bergün und den Bergünner-Alpen, auf der Lenzer-Heide und bei Samaden (5500'). — Sommer.

#### POA.

*pratensis* Sm. Ueberall auf Wiesen bei Chur und der ganzen Ebene; auch bei Samaden (5200'). — Sommer.

*trivialis* L. In Aeckern bei Chur, an Wassergräben bei Rothenbrunnen. — Mai.

*P. t. spiculis 5-floris aleis majoribus* nach dem Herb. von Haller, Sohn, im Bernina-Thal.

*laxa* Hænke. In der alpinen und subalpinen Region. Bei Chur auf Brambrüsch, in der Churwalder-Alp, bei Cellarina etc. Nach Prof. Heer an den Quellen des Hinterrheins, und bis in die Höhe von 9000'. — Sommer.

*distichophylla* Gaud. Zwischen der Maienfelder-Badalp und Stürvis. Nach Nägeli im Heuthal auf dem Bernina; wahrscheinlich mehrfach anderwärts. — Sommer.

*bulbosa* L. Ueberall an Wegen und in Wiesen, bei Chur und durch die ganze Ebene. — Sommer.

*alpina* L. Auf allen Alpenweiden. Calanda etc. — Sommer.

*annua* L. Ueberall an Wegen gemein. — Frühling und Sommer. Die Varietät mit gefärbten Aehrchen (*P. supina* Schrad.) unter andern Lokalitäten auch bei Belvedere (Malixer-Gebiet).

*nemoralis* L. Ueberall auf Grasplätzen und in Gebüsch. — Sommer.

α) *nemoralis courc tata* Gaud. Auf Gestein der Jochalp und im obern Misox.

β) *nemoralis caesia* Gaud. Im Tawetsch in ungef. 5000' Höhe.

γ) *nemoralis glauca* Gaud. Beim Dorf Bernhardin (5080').

*sudetica*. Nach Heer auf den sandigen Ufern des Inns bei Zernetz.

*pilosa* L. Bei Ilanz an Felsen. — August.

#### BRIZA.

*media* L. Ueberall auf Wiesen. — Juni.

#### MOLINIA.

*caerulea* Koel. Auf nassen Stellen, in Wäldern, überall. — August und September.

#### MELICA.

*nutans* L. In Laubholzwäldern und an andern Stellen, ziemlich überall. — Mai und Juni.

*ciliata* L. Auf Gestein und Felsen hin und wieder: bei Rothenbrunnen, Alveneu, Chur etc. — Sommer.

#### DANTHONIA.

*decumbens* DC. Auf dem Mittenberg bei Chur in abgetriebenen Wäldern fast an der Grenze der Tannenregion. Nach Heer bei Splügen. — Sommer.

#### AIRA.

*caryophyllea* L. Auf Mauern zwischen



Roveredo und St. Vittore. — Mai und Juni.

*flexuosa* L. Auf alpinen Weiden (Calanda, Augstberg etc.) und in tiefer gelegenen Wäldern (verlornes Loch bei Thusis). — Sommer.

*cæspitosa* L. An Bächen und auf sumpfigen Stellen, gemein. Ich verfolgte sie bis in die Churwalder-Alp hinauf. — Sommer.

#### AVENA.

*pratensis* L. Auf magern Wiesen der montanen, subalpinen und alpinen Region: hinter St. Luzi bei Chur, zu Glaris auf Davos, bei Samaden etc. — Sommer.

*versicolor* Vill. Auf fast allen Alpenweiden durchs ganze Land. — Sommer.

*pubescens* L. Auf Wiesen nicht selten; bei Chur herum und an andern Orten der Ebene. — Mai und Juni.

*flavescens* L. Bei Chur und an andern Orten häufig; in subalpinen Gegenden kommt besonders häufig die Form mit geschäckten Aehrchen vor (Runkelier, Parpan etc.). — Sommer.

*distichophylla* Vill. delph. t. IV. Oberhalb der Churwalder-Heuberge auf dünnen Halden. Nach Prof. Heer am Bach im Camogasker-Thal, auf dem Ofen im Liviner-Thal und andern Orten der alpinen und subnivalen Region. Nach H. Nägeli auf dem Fräla bei 6000' Höhe. — Sommer. Kalk.

*subspicata* Clairv. Ich erhielt diese

Pflanzen durch Pfr. Felix aus dem Rheinwald. Selbst gefunden habe ich sie an Felsen im Bernina-Thal, an der Bernina, und in der Alp Segnes (ungefähr 7000') auf Elmsergebiet. — Sommer.

#### ARRHENATHERUM.

*elatus* P. B. (*Avena elatior* L.) Ueberall auf guten Wiesen, bis in die subalpine Region (zu Glaris auf Davos ungefähr 4300'). — Juni.

#### HOLCUS.

*lanatus* L. In Wiesen, hauptsächlich in fetten, auch häufig auf von der Natur bewässerten Stellen, durch die ganze Ebene und montane Region. — Sommer.

*mollis* L. Auf Aeckern und an Zäunen in Tawetsch, zwischen 4—5000' s. m. — August.

#### AGROSTIS.

*rupestris* All. (non Willd.) Auf Alpenweiden nicht selten; ich habe sie aus der Maienfelder-Badalp und von Sils im Ober-Engadin. — Sommer.

*alpina* Scop. (non Willd.). Auf Felsen, häufig in der alpinen Region unseres Landes: Jochalp, Calanda, Urden, Albula (auf der Höhe 7270') etc. — Sommer.

*alba* Schrad. Gemein auf verschiedenartigen Stellen bei Chur und andern Orten. Die *Agr. alba*, *patula* Gaud. fand ich am Wege durch die Carmenna

nach der Churer-Alp (ungef. 5000').  
— Sommer.

*vulgaris* With. Häufig, auf dünnen Weiden der Ebene (bei Ems), in fetten Bergwiesen, wie bei Klosters, wo sie den Hauptbestandtheil mancher Wiesen bildet, und in der Jochalp, also von der Ebene bis in die alpine Region. — Sommer.

*Spica-venti* L. Im Getreide bei Chur und andern Orten diesseits der Berge; sehr häufig in Misox in der montanen Region. — Die Art, die ich bei St. Maria in Calanca fand, könnte vielleicht die *Agr. purpurea* Adans sein. — Juni.

#### PHRAGMITES.

*communis* Trin. Gemein auf Ried und an Bächen. — Sommer.

#### CALAMAGROSTIS.

*Epigeios* Roth. An Flussufern bei Chur und andern Orten gemein. — Sommer.

*Halleriana* DC. Nach Scheuchzer

auf dem Cera in Schams; ich fand sie in Menge auf dem Mittenberg bei Chur am Ende der Waldgrenze bei Parpan und noch an andern Orten. — Sommer.

*montana* DC. In Bergwäldern häufig; bei Chur im Schwarzwald. — Sommer.

*argentea* DC. Auf Felsen und dünnen Weiden; am Fusse des Calanda, bei Trimmis, in einem Föhrenwäldchen am Ausflusse der Plessur in grosser Zahl. — Sommer.

#### STIPA.

*pennata* L. Nach Gesner auf dem Scaletta. Ich fand dieses schöne Gras am Fusse des Calanda und zwischen Samaden und Cellerina über dem Wege (5300' ungefähr) an beiden Orten auf Felsen. — Juni.

*capillata* L. Nach einer ältern Angabe bei Rothenbrunnen, woselbst auch ich es auf dem vorspringenden Felsenkopf, wenn man nach der Scheiderhalde umlenkt, antraf. — Juni.

## MONOCOTYLEDONES CRYPTOGRAMI.

### EQUISETACEAE.

#### EQUISETUM.

*arvense* L. Auf Aeckern, an Bächen und andern Stellen häufig. Bei der Brücke, die bei Hinterrhein (4800's.m.)

über den Rhein führt, kommt es im granitischem Sande vor. — Fructificirt im Frühling und schießt die Wedel im Sommer.

*sylvaticum* L. Ich fand diese Art bisher bloss einmal, und diess im Walde

gegenüber von Samaden auf der Pontresiner-Seite (5200' s. m.).

*limosum* L. In stehenden Wassern bei Sargans, Zizers, am Davoser-See und bei Sils ebenfalls im See zunächst der Brücke. Bei Hinterrhein neben *E. arvense* im Sande, wo es natürlich klein bleibt und die Aeste am untern Theile des Schafts zuerst hervorbrechen und zwar noch ehe die Aehre sich ganz entwickelt hat.

*palustre* L. Häufig auf sumpfigen Weiden von der Ebene (Chur) bis in die subalpine (Kunkels) und alpine Region (Samaden neben *E. sylvaticum*.)

*multiforme* Vauch. Im untern Misox zwischen Roveredo und der tessinischen Moesa-Brücke auf der linken Seite des Flusses. — Juni.

*ramosissimum* Desf. Neben dem *E. multiforme* im untern Misox. — Ende Juni.

Unsere Pflanze ist etwas magerer als die Desfontaines'schen Exemplare, die ich mit ihr verglich. An die Abbildung die Prof. Vaucher in seiner Abhandlung über die Equisetaceen gibt, ist nicht zu halten, da sie die drei Linien langen *aristæ* an den Zähnen der Scheiden nicht darstellt, die allerdings sehr häufig und nur an jungen Exemplaren vollständig vorhanden sind.

## FILICES.

### CETERACH.

*officinarium* C. Bauh. Nach Haller bei

Cleven. Kommt auch im Veltlin vor. — Sommer.

*Marantæ* DC. fl. fr. Nach Haller, Sohn, auf der Sonnenseite im Veltlin, bei Arden und andern Orten häufig. Wahrscheinlich auch bei Clefen.

### POLYPODIUM.

*vulgare* L. In Wäldern bei Chur, im Engadin bis gegen 6000' s. m. und an andern Orten nicht selten. Fructificirt im Sommer.

*Phægopteris* L. In Inner-Calanca, im Tawetsch, auf Davos, in Savien und andern Orten der subalpinen Region. — Sommer.

*rhæticum* L. Nach Bauhin in Rhätien. Ich sammelte es in der Umgegend von Chur; es findet sich jedoch in Rhätien gar nicht häufig. — Sommer.

*Dryopteris* L. In subalpinen Gegenden: auf Davos, Savien am Platz und andern Orten nicht selten. — Sommer.

*calcareum* Sm. Häufig von der montanen bis in die alpine Region: Malix, Savien am Platz, Ober-Engadin etc. — Sommer.

*Oreopteris* Engl. bot. Ich bewahre ein Exemplar aus der Umgegend von Chur auf, so wie auch andere, aus dem innern Calanca. — Sommer.

### PTERIS.

*crispa* L. Nach Haller auf dem Splügen. Von mir auf dem Scaletta, im Tawetsch, in Calanca und andern Orten gefunden. — Sommer.

*aquilina* L. In allen Wäldern an etwas offenen Stellen. — September.

#### SCOLOPENDRIUM.

*officinale* Sm. In montanen Wäldern: bei Sils, Thusis, in Valzeina. — Fructificirt im Sommer und Herbst.

#### ASPLENIUM.

*Adiantum-nigrum* L. Nach Haller bei Chur. Hier habe ich es nie bemerkt, wohl aber zwischen Grono und St. Maria im Misox. — Juni.

*Ruta-muraria* L. Ueberall an alten Mauern und Felsen bis in die alpine Region. — Sommer.

*germanicum* Weiss. (*Asp. alternifolium* in Jacq. misc. v. 2. t. 2). Unweit Pioda (bei der Brücke über den Tessin) im Leventiner-Thal an Felsen. — August.

*septentrionale* Hoffm. Meist auf granitischem Gestein in Felsenritzen: bei Coltura im Bergell, im Tawetsch, bei Klosters, Zernetz, oberhalb Parpan u. a. O. — Sommer.

*Trichomanes* L. An Mauern und Felsen bei Chur, Trimmis, Grono und vielen andern Orten. — September.

*viride* Huds. An Felsen in Alpen, z. B. in der Fürstenalp, Urdenalp etc. Auch unter Maladers. — Sommer.

#### ASPIDIUM.

*Filix-foemina* Roth. Ueberall in Wäldern. Bei Chur auf dem Mittenberg in der subalpinen Region. — Sommer.

*fragile* Sw. Gemein. Findet sich von Füssen der Berge an bis in die alpine Region durchs ganze Land. — Sommer.

*alpinum* Sw. Auf dem Augstberg oberhalb Parpan, im Ober-Engadin an mehreren Orten. — Sommer und Herbst.

#### POLYSTICHUM.

*dilatatum* DC. Häufig in der subalpinen und alpinen Region: bei Andeer, oberhalb Parpan, in Inner-Calanca, im Ober-Engadin etc. — Sommer u. Herbst.

*Filix-mas* DC. Ueberall in Wäldern, bei Chur, Maladers und andern Orten häufig. — Sommer.

*aculeatum* Roth. Bei Chur auf dem Mittenberg und im Winterberg. — Herbst.

*rigidum* DC. In der Urdenalp auf Kalksteingerölle, ungef. 5000' s. m. — September.

*Lonchitis* Roth. Bei Chur auf dem Mittenberg, oberhalb Parpan auf dem Augstberg, in Savien und an andern Orten der subalpinen und alpinen Region. — Sommer.

#### WOODSIA.

*hyperborea* R. Br. in Trans. Lin. soc. vol. XI. t. 2. An Felsen der alpinen Region. Auf dem Julier, im Dürrenboden, unter dem Wasserfall des Inns, wo er aus dem St. Moritzer-See fließt. — Fructificirt im August.

#### BOTRYCHIUM.

*Lunaria* Sw. In Wäldern und auf subalpinen und alpinen Weiden: Malix,

Rheinwald, bei Samaden, wo es auf einer sehr dünnen Stelle neben der *Koeleria hirsuta* steht, u. a. O. — Sommer.

## LYCOPODIACEAE.

### LYCOPODIUM.

*alpinum* L. Auf magern Alpenweiden. Ich habe es vom Augstberg, aus der Malixer-Alp u. a. dgl. O.

*annotinum* L. In dunkeln Bergwäldern, so unter andern oberhalb Lax in der subalpinen Region. Haller fand es zwischen Splügen und Schams. — Fructificirt im August.

*clavatum* L. Bei uns nicht so häufig als anderwärts; es findet sich in sub-

alpinen und alpinen Höhen in Schams, bei St. Maria in Medels auf Heidelbeertreffen. — Fructificirt im August.

*Selago* L. Nach Haller auf dem Gotthard, Splügen und Albula. Ich fand es häufig auf den Bergen bei Chur herum. — Sommer.

*Selaginoides* L. Auf alpinen und subalpinen Weiden häufig: bei Chur, Klosters, im Tawetsch u. a. O. — Sommer.

*helveticum* L. Gemein an schattigen, feuchten Stellen durch ganz Bünden. Haller gibt Thusis, Splügen, Vettis, die Zollbrücke als Standorte für diese Pflanze an.

*complanatum* L. Nach Haller bei Morbegno im Veltlin.

## AUSLÄNDISCHE PFLANZEN,

*die man mehr oder weniger häufig verwildert findet.*

*Erodium moschatum.* Bei Chur.

*Aster chinensis.* ibid.

*Aster Noræ-Belgii.* ibid.

*Borago officinalis* L. ibid.

*Cheiranthus Cheiri* L. ibid.

*Malva Mauritiana.* ibid.

*Amaranthus caudatus.* Bei Chur.

*Lycium europæum* L. ibid.

*Staphylea pinnata* L. Bei Ragatz.

*Philadelphus coronarius* L. Bei Chur.

*Silybum marianum* L. ibid.

*Syringa vulgaris* L. ibid.

## AUSLÄNDISCHE CULTURPFLANZEN.

### I. ZU ÖCONOMISCHEM GEBRAUCHE.

#### α) *Cerealien.*

*Triticum vulgare* L. (Sommer- und Winterweizen).

*Secale cereale* L.

*Hordeum vulgare* L.

*Panicum miliaceum* L.

» *italicum* L.

*Avena sativa* L.

*Zea Mays* L.

*Polygonum Fagopyrum* L.

#### β) *Gemüspflanzen.*

*Solanum tuberosum* L.

*Pisum sativum* L.

*Phaseolus vulgaris* L.

» *nanus* L.

*Cucumis sativa*.

» *melo*.

*Scorzonera hispanica* L.

*Cynara Scolymus* L.

*Lactuca sativa* L.

*Brassica oleracea* L.

*Raphanus sativus* L.

*Cichorium Endivia* L.

*Atriplex hortensis* L.

*Beta vulgaris* L.

*Spinacia oleracea* L.

*Faba vulgaris*.

*Ervum Lens* L.

#### γ) *Fruchtbäume und Sträucher.*

*Cerasus duracina* DC.

*Cerasus juliana* DC.

» *caproniana*.

*Prunus domestica* L.

» *insititia* L.

*Armeniaca vulgaris* Lam.

*Persica vulgaris* DC.

*Amygdalus communis* L.

*Cydonia vulgaris* Pers.

*Pyrus communis* L.

» *Malus* L.

*Ribes nigrum* L.

*Juglans regia* L.

*Vitis vinifera* L.

*Cornus mascula* L.

*Morus nigra*.

#### δ) *Gewürzpflanzen.*

(In Bündeln Geschmetter.)

*Apium graveolens* L.

*Petroselinum sativum*.

*Salvia officinalis*.

*Allium Cepa* L.

» *sativum* L.

» *Porrum* L.

*Origanum Majorana*.

*Foeniculum officinale*.

*Coriandrum sativum* L.

#### ε) *Futterkräuter.*

*Cucurbita maxima* Duh.

*Medicago sativa* L.

*Brassica Rapa* L.

(Die übrigen sind inländischen Ursprungs.)

## 2. ZU TECHNISCHEM GEBRAUCHE.

Cannabis sativa L.  
 Linum usitatissimum L.  
 Morus alba L.  
 Melilotus caeruleus L.  
 Brassica Napus L.

## 3. ZU MEDECINISCHEM GEBRAUCHE.

Ligusticum Levisticum L.  
 Anthriscus Cerefolium Hoffm.  
 Myrrhis odorata.  
 Matricaria Chamomilla.

## DIE GEWÖHNlichsten AUSLÄNDISCHEN ZIERPFLANZEN.

*In Tæpfen.*

Opuntia vulgaris.  
 Cheiranthus Cheiri L.  
 Dianthus caryophyllus L. (in jedem  
 Bauernhaus, oft mit ausgezeichnet  
 gefüllten Blumen).  
 Rosmarinus officinalis L.  
 Pelargonium odoratissimum L.  
 Rosa sempervirens L.  
 Mathiola incana R. Br.  
 Primula chinensis.  
 Nerium Oleander L.  
 Cactus Phyllanthus.

*In Gärten im freiem Felde.*

Aster chinensis L.  
 Rosa centifolia L.  
 Lilium candidum L.  
 Pæonia officinalis L.  
 Papaver somniferum L.  
 » orientale L.  
 Hepatica triloba DC.  
 Calendula officinalis L.

Lavendula Spica L.  
 Thymus vulgaris L.  
 Satureja hortensis L.  
 Primula Auricula L.  
 » acaulis, var.  
 Bellis perennis, fl. tubul.  
 Reseda odorata L.  
 Lathyrus latifolius.  
 Dahlea.  
 Solidago.  
 Lychnis chalconica L.  
 Agrostemma Coronaria L.  
 Malva rosea.  
 Tulipa gesneriana L.  
 Narcissus Pseudo-Narcissus L.  
 Hyacinthus etc.

*An Alleen, Ruheplätzen, in Kirch-  
höfen etc.*

Aesculus Hippocastanum L.  
 Platanus orientalis L.  
 Robinia Pseudacacia L.  
 Robinia viscosa.

Cytisus Laburnum L.  
 Salix babylonica L.  
 Populus fastigiata Poiv.  
 Buxus sempervirens L.  
 Lonicera Caprifolium L.  
 Clematis Viticella.

NB. In der nachstehenden Uebersicht der Pflanzen dieses Verzeichnisses sind von diesen Zierpflanzen nur diese letztern, welche als Bäume und Sträucher im Freien aushalten, aufgenommen worden.

## ÜBERSICHT

*der in diesem Verzeichniss enthaltenen Pflanzen.*

DICOTYLEDONEN.		Celastrineæ	2	Corneæ	1
Ranunculaceæ	46	Rhamnææ	4	Sambucineæ	5
Berberideæ	1	Leguminosæ	68	Caprifoliaceæ	5
Papaveraceæ	5	Amygdaleæ	4	Loranthaceæ	1
Fumariaceæ	2	Spireaceæ	52	Rubiaceæ	18
Cruciferæ	63	Sanguisorbeæ	6	Valerianeæ	8
Resedaceæ	2	Rosaceæ	7	Dipsaceæ	7
Cistineæ	4	Pomaceæ	8	Compositæ	186
Violariææ	11	Grossulariææ	4	Campanulaceæ	28
Droseraceæ	3	Cucurbitaceæ	2	Vaccinieæ	4
Polygaleæ	3	Portulaceæ	2	Ericaceæ	9
Caryophylleæ	27	Paronychieæ	2	Pyrolaceæ	6
Alsineæ	33	Scleranthææ	2	Jasmineæ	2
Elatineæ	1	Callitrichineæ	2	Apocyneæ	1
Lineæ	1	Halorageæ	2	Asclepiadeæ	1
Malvaceæ	5	Tamariscineæ	1	Gentianeæ	22
Tiliaceæ	2	Lytharieæ	1	Polemoniaceæ	1
Hypericineæ	5	Onagrarieæ	15	Convolvulaceæ	4
Acerineæ	3	Crassulaceæ	16	Solaneæ	6
Geraniaceæ	13	Saxifrageæ	22	Scrophularineæ	14
Balsamineæ	1	Araliaceæ	2	Rhinanthaceæ	44
Oxalideæ	2	Umbelliferæ	42	Orobancheæ	7



Boraginæ	20
Labiataë	55
Verbenacæ	1
Lentibulariæ	5
Primulacæ	26
Globulariæ	3
Plumbaginæ	1
Plantaginæ	6
Amaranthacæ	2
Chenopodæ	11
Polygonæ	21
Thymeleæ	3
Santalacæ	4
Eleagnæ	1
Aristolochiæ	1
Euphorbiacæ	9
Empetrea	1
Urticacæ	6
Ulmacæ	2
Cupuliferæ	5
Betulineæ	4
Salicineæ	26
Cupressineæ	3
Coniferæ	5
<hr/>	
	1078

PHAN. MONOCOTYLEDONEN.

Alismacæ	1
Juncagineæ	1
Najadæ	11
Lemnacæ	1
Thyphacæ	5
Callacæ	1
Orchideæ	34
Dioscoreæ	1
Smilacæ	8
Colchicacæ	6
Liliacæ	26
Amaryllideæ	2
Irideæ	5
Juncineæ	23
Cyperacæ	71
Gramineæ	99
<hr/>	
	295

CRYPT. MONOCOTYLEDONEN.

Equisetacæ	6
Filices	27
Lycopodiaceæ	7
<hr/>	
	40

*Recapitulation :*

Dicotyledonen	1078
Ph. Monocotyledonen	295
Cr. Monocotyledonen	40
<hr/>	
Im Ganzen wildwachsende Pflanzen	1415
Rechnet man hiezu noch :	
verwilderte,	12
baumartige Zierpflanzen im Freien	10
und die Culturpflanzen (die Zierpflanzen ausgeschlossen)	62
<hr/>	
so erhält man im Ganzen	1497



# VERZEICHNISS

DER MIR BEKANNT GEWORDENEN PFLANZENNAMEN AUS GRAUBÜNDEN ,  
*in deutscher, romanischer und italienischer Sprache.*

Mit diesem Verzeichnisse glaube ich nichts weniger als eine vollständige Aufzählung aller bündnerischen Pflanzennamen zu geben ; es soll diess bloss ein Anfang und Anknüpfungspunkt zu fernern Forschungen sein. Wahrscheinlich gibt es in jeder der drei Sprachen so viel Volksnamen als hier im Ganzen aufgezählt sind oder noch mehr.

Die von mir bemerkten Namen bilden hier den geringern Theil , wenn man die allgemein bekannten nicht auch dazu rechnet ; mehr verdanke ich den Mittheilungen einiger Freunde. Herrn Pfarrer Felix sind die Namen aus dem Rheinwald , Pfarrer Leonhardi die aus Saas , Statthalter Ch. Valentin die aus Maienfeld zuzuschreiben. Am meisten unterstützte mich Herr Landammann Bapt. v. Salis, dessen Gefälligkeit ich fast alle romanischen und italienischen Namen, die hier angeführt sind , verdanke ; mehrerer deutschen von Davos nicht zu gedenken.

Die Abkürzung *d. G.* bedeutet *deutsch Graubünden*, *rom.* = *romanisch*.

Acacia (d. G.) Robinia Pseudacacia L.	Badalese (Stalla) Polygonum Bistorta.
Acèr (Bergell) Acer Pseudo-Platanus.	Badogn } (rom.) Betula alba.
Adelgras (d. G.) Plantago alpina (s. Nadelgras und Ritz).	Badoing }
Aglai (d. G.) Aquilegia.	Bärenplumpen (Rheinwald) Anemone alpina.
Agna (Ober-Engadin) Alnus incana.	Bibernell (d. G.) Pimpinella magna.
Alber (Puschlav) Populus nigra.	Birche (d. G.) Betula alba.
Albere (Chur) idem.	Birnbaum (d. G.) Pyrus communis.
Allermannsharnisch (d. G.) Allium Victorialis.	Blutruthen (d. G.) Cornus sanguinea.
Ambiz (rom.) Abies pectinata.	Blutzen (d. G.) Senecio cordifolius.
Amblé (rom.) idem.	Bocklaub (Rheinwald) Laserpitium latifolium.
Ampas *) (Brättigau) Rubus idæus (s. Omchias).	Bocksbart (Davos) Anemone alpina.
Ann (Bergell) Alnus viridis.	Böllen (d. G.) Allium Cepa.
Apfelbaum (d. G.) Pyrus Malus.	Böni (d. G.) Senecio cordifolius.
Arbe (d. G.) Pinus Cembra.	Brischnaklas (Heizenberg) Onobrychis sativa.
Arle (Haldenstein) Pinus sylvestris montana.	Bruuch (d. G.) Erica carnea.
Arve siehe Arbe.	Brui**) (Oberhalbst.) Erica carnea u. Calluna vulg.
Aron (d. G.) Arum maculatum.	Buchs (d. G.) Buxus sempervirens.
Astränze (d. G.) Imperatoria Ostruthium.	Burket (Chur) Chenopodium album.
Augstenblümli (Rheinwald) Euphrasia officinalis.	Butteln (Davos und Klosters) Vaccinium uliginosum (Pludern).

\*) Vom italienischen Ampolle.

\*\*) Bruyère der Franzosen.

Caglia (Bergell) *Juniperus communis*, alpina.  
 Camutsches (Oberhalbstein) *Colchium autumnale*.  
 Castoigna (rom.) *Castanea vesca*, Fr.  
 Chamille (d. G.) *Matricaria Chamomilla*.  
 Choccoladenblümchen (d. G.) *Orchis nigra*.  
 Cichorien (d. G.) *Leontodon Taraxacum*.  
 Colla (Oberhalbstein) *Corylus Avellana*.  
 Coriander (d. G.) *Coriandrum sativum*.  
 Cultheischen (rom.) *Pyrus Aucuparia*.

Dammiez (Bergell) *Abies pectinata*.  
 Denk-an-mich (d. G.) *Viola tricolor*.  
 Distel (d. G.) *Cirsia et Cardui*.  
 Donder (Bergell und Engadin) *Pinus sylvestris montana*.  
 Drasa (Bergell) *Alnus viridis*.  
 Drausa (Oberhalbstein) *Alnus viridis* (s. Tross).  
 Drosseln (d. G.) idem.

Ehrenpreis (d. G.) *Veronica officinalis*.  
 Eiche (d. G.) *Quercus*.  
 Eisenhut (d. G.) *Aconita*.  
 Enzian (Enznerwurz) (d. G.) *Gentiana lutea* und  
*punctata*.

Epheu (d. G.) *Hedera Helix*.  
 Erle (d. G.) *Alnus incana*.  
 Erbsen (d. G.) *Pisum sativum* L.  
 Espe (d. G.) *Populus Tremula*.  
 Esper } (d. G.) *Onobrychis sativa*.  
 Esparsette }

Fahrn (d. G.) *Filices variæ*.  
 Fau (rom.) *Fagus sylvatica*.  
 Faschölen (d. G.) *Phaseolus*.  
 Feigenbaum (d. G.) *Ficus Carica*.  
 Fenchel (d. G.) *Foeniculum*.  
 Fieberklee (d. G.) *Menyanthes trifoliata*.  
 Fimmeln (d. G.) *Cannabis sativa*, mas.  
 Flachs (d. G.) *Linum usitatissimum*.  
 Fluor balla (Bergell) *Rhododendrum*.  
 Fo siehe Fau.  
 Fohre (d. G.) *Pinus sylvestris*.  
 Fräsen siehe Fresen.  
 Fraschin (Bergell) *Fraxinus excelsior*.

Frauenschlüssel (Saas) *Primula officinalis*.  
 Frauenschuh (d. G.) *Cypripedium Calceolus*.  
 Fresen (rom.) *Fraxinus excelsior*.

Galeieli (Chur) *Convallaria majalis*.  
 Gänseblümchen (d. G.) *Bellis perennis*.  
 Geisbeeren (d. G.) *Ligustrum vulgare*.  
 Geisblatt (Chur) *Lonicera Caprifolium*.  
 Gelhagel (Chur) *Berberis vulgaris*.  
 Gember (rom.) *Pinus Cembra*.  
 Gerbern (d. G.) *Veratrum album*.  
 Gerste (d. G.) *Hordeum vulgare*.  
 Giftbeeren (Rheinwald) *Daphne Mezereum* Fr.  
 Giftblumen } (Rheinwald) *Aconita*.  
 Giftkräuter }  
 Ginestra (Misox) *Sarothamnus scoparius*.  
 Girlitz (d. G.) *Pyrus Aucuparia*.  
 Girsch (d. G.) idem.

Giüp } (Bergell) *Juniperus communis*.  
 Giüppe }  
 Glocken (Chur) *Anemone Pulsatilla*.  
 Glocken (Rheinwald) *Gentiana acaulis*.  
 Glysli (Rheinwald) *Ranunculus acris*.  
 Goldkraut (d. G.) *Cineraria cordifolia*.  
 Goldwurz (d. G.) *Lilium Martagon*, bulbus.  
 Gryfeln (Davos und Klosters) *Vaccinium Vitis-idaea*.  
 Gürgütsch (Chur) *Pyrus Aucuparia*.  
 Gürmsch (d. G.) idem.

Haber (d. G.) *Avena sativa*.  
 Hahnenfuss (d. G.) *Lotus cornicatus*.  
 » (d. G.) *Ranunculus repens*.  
 Hanf (d. G.) *Cannabis sativa*.  
 Haselnuss (d. G.) *Corylus Avellana* Fr.  
 Hasenöhrlin (Saas) *Silene inflata*.  
 Hauswurz (d. G.) *Sempervivum tectorum*.  
 Heidelbeere (d. G.) *Vaccinium Myrtillus*.  
 Heiden (d. G.) *Polygonum Fagopyrum*.  
 Heimeln (d. G.) *Chenopodium Bonus-Henricus*.  
 Hirtenbeeren (Rheinwald) *Empetrum nigrum* (?)  
 Hocker (d. G.) *Phaseolus nanus*.  
 Holder (d. G.) *Sambucus nigra*.

- Holländer (Rheinwald, Heinzenberg, Brättigau) *Salvia pratensis*.  
Hopfen (d. G.) *Humulus Lupulus*.  
Ibe (d. G.) *Taxus baccata*.  
Ibisch (rom.) idem.  
Ischier (rom.) *Acer Pseudo-platanus*.  
Iva (d. G.) *Achillea moschata*.  
Johannisbeere (d. G.) *Ribes rubrum*.  
Johannisblume (Rheinwald) *Chrysanthemum Leucanthemum*.  
Johannisblümli (Saas) *Bellis perennis*.  
Judenkirsche (d. G.) *Physalis Alkekengi*.  
Kabis (d. G.) *Brassica oleracea, capitata* (Weisskohl).  
Kalbermilch (Rheinwald) *Tragopogon pratense*.  
Kästenen (d. G.) *Castanea vesca* Fr.  
Käslkraut (Chur) *Malva rotundifolia*.  
Katzenäuglein, blaue (Rheinwald) *Myosotis*.  
" rothe (Rheinwald, Saas) *Primula farinosa*.  
Kessler (Davos) *Gentiana acaulis*.  
Klaffen (d. G.) *Rhinanthus*.  
Klee (d. G.) *Trifolium*.  
Klupfa (Saas) *Silene inflata*.  
Knoblauch (d. G.) *Allium sativum*.  
Körbelkraut (d. G.) *Chærophylum sativum* und *Myrrhis odorata*.  
Kornblume (d. G.) *Centaurea Cyanus*.  
Krausbeere (d. G.) *Ribes Uva-crispa*.  
Krausmünze (d. G.) *Mentha crispa*.  
Kresse (d. G.) *Lepidium sativum*.  
Kuhshelle (d. G.) *Anemone alpina*.  
Kümmel (d. G.) *Cavum Carvi*.  
Kukumer (d. G.) *Cucumis sativa*.  
Kürbse (d. G.) *Cucurbita*.  
Kürlibeere (d. G.) *Cornus mascula*.  
Lak (d. G.) *Cheiranthus Cheiri*.  
Lämmliungen (Maienfeld) *Achillea Millefolium*.  
Lärche (d. G.) *Larix europæa*.  
Larisch (rom.) idem.  
Lausas (rom.) *Cerasus Padus*, fr.  
Lausèr (rom.) " " arb.  
Lavander (d. G.) *Lavendula spica*.  
Lavazzi (Puschlav) *Rumex alpinus*.  
Leberblume (d. G.) *Hepatica triloba*.  
Linde (auf deutsch und romanisch) *Tilia*.  
Linse (d. G.) *Ervum Lens*.  
Losas siehe Lausas.  
Losi (d. G.) *Cerasus Padus*.  
Lungas da bof (Heinzenberg) *Polygonum Bistorta*.  
Luzerne (d. G.) *Medicago sativa*.  
Malam (Stalla und Schams) *Veratrum album*.  
Manzögnas (im Unter-Engadin nach Prof. Saluz) *Lilium bulbiferum*.  
Marillen (d. G.) *Armeniaca vulgaris* Lam.  
Marren (d. G.) *Castanea vesca*, fr.  
Märzblume (d. G.) *Primula acaulis*.  
Masaran (d. G.) *Origanum Majorana*.  
Masaran, wilder (Saas) *Teucrium Chamædrys*.  
Maulbeerbaum (d. G.) *Morus*.  
Meerrettig (d. G.) *Armoracia rusticana*.  
Meil } (rom.) *Pyrus Malus*, fr.  
Meila }  
Meiler (rom.) *Pyrus Malus*, arb.  
Melisse (d. G.) *Melissa officinalis*.  
Milchen (d. G.) *Tragopogon pratense*.  
Mistel (d. G.) *Viscum album*.  
Münze (d. G.) *Mentha*.  
Muttern (d. G.) *Meum Mutellina*.  
Mutton (rom.) idem.  
Nachtschatten (d. G.) *Solanum nigrum* und *Chenopodium hybridum*.  
Nadelgras (d. G.) *Plantago alpina*.  
Nägeli = Nelkeu = *Dianthus*.  
Nägeli, blaue (Rheinwald) *Gentiana verna*.  
Nägeliblust (d. G.) *Syringa vulgaris*.  
Niele (Chur) *Clematis Vitalba*.  
Nespeln (Chur) *Mespilus germanica*.  
Nesseln (d. G.) *Urtica*.  
Nitscholas (rom.) *Coryllus Avellana* fr. und *Pinus Cembra* fr.

Nucèr (rom.) *Juglans regia*.  
 Nuèr (rom.) idem.  
 Nussbaum (d. G.) idem.  
 Nüsslialat (Chur) *Valerianella olitorna*.  
  
 Ochsenzunge (Rheinwald) *Polygonum Bistorta*.  
 Ogn. s. Onn.  
 Olm (rom.) *Ulmus campestris*.  
 Olzuga (Bergell) *Vaccinium Myrtillus*.  
 Omchias (rom.) *Rubus idæus*.  
 Onn oder Ogn oder Ognà (Oberl. rom.) *Alnus incana*.  
 Onn (Bergell) *Alnus incana et viridis*.  
  
 Peccia (Puschlav) *Abies excelsior*.  
 Peira (rom.) *Pyrus communis fr.*  
 Peirèr (rom.) » » arbor.  
 Peterli (d. G.) *Petroselinum sativum*.  
 Pfaffenköpfchen (d. G.) *Euonymus europæa*.  
 Pfeffermünze (d. G.) *Mentha piperita*.  
 Pflaumen (d. G.) *Prunus insititia*.  
 Pign (rom.) *Abies excelsior*.  
 Pin (rom.) idem.  
 Plakten (d. G.) *Rumex alpinus*.  
 Pludern (d. G.) *Vaccinium uliginosum* \*).  
 Pluditschi \*\*) (d. G.) idem.  
 Pom genevra (rom.) *Juniperus communis*.  
 Poppenrolle \*\*\*) (Puppenrolle) (d. G.) *Trollius europæus*.  
 Preiselbeer (d. G.) *Vaccinium Vitis-idæa*.  
 Pumèr da Chovra (Geisenbaum) (Oberhalbstein)  
     *Pyrus Aucuparia*.  
 Pumèr da rascha (rom.) *Pinus silvestris*.  
 Pyra s. Peira.

Räbe (d. G.) *Brassica Rapa*.  
 Rauslen (d. G.) *Rhododendrum*.  
 Rainfohre (d. G.) *Tanacetum vulgare*.  
 Rebe (d. G.) *Vitis vinifera*.  
 Reckholder (d. G.) *Juniperus communis*.  
 Riedrolle (Saas) *Caltha palustris*.  
 Rittersporn (d. G.) *Delphinium*.  
 Ritz (d. G.) *Plantago alpina*.  
 Roggen (d.) *Secale cereale*.  
 Rose (d.) *Rosa*.  
 Rosmarin (d. G.) *Rosmarinus officinalis*.  
 Rothtanne (d. G.) *Abies excelsior*.  
 Rovèr (Bergell) *Quercus*.  
 Rübli (d. G.) *Daucus Carota*.  
 Ruvèr (rom.) *Quercus*.  
  
 Sale (d. G.) *Salix*.  
 Salisch (rom.) idem.  
 Sammtplakten (d. G.) *Tussilago alba* und *Farfara*.  
 Sandkraut (Rheinwald) *Achillea moschata*.  
 Sanikel (d.) *Sanicula*.  
 Sauerampfer (d. G.) *Rumex Acetosa*.  
 Sauerklee (d. G.) *Oxalis Acetosella*.  
 Schabziegerkraut (d. G.) *Melilotus cœruleus*.  
 Schärtling (Chur) *Heracleum Sphondylium*.  
 Schellkraut (d. G.) *Chelidonium majus*.  
 Schember (rom. u. Puschlav) *Pinus Cembra*.  
 Schlajas (rom.) *Prunus spinosa*, fr. (Schlehe).  
 Schläjèr (rom.) *Prunus spinosa*, frutex.  
 Schlehe (d. G.) idem.  
 Schlüsselblume (d. G.) *Primula officinalis* (vergl.  
     Frauenschlüssel).  
 Schmalzblume (d. G.) *Ranunculum flores lutei*.  
     « (Rheinwald) *Narcissus poeticus*.

\*) Hängt wohl mit Blurie, Bleurie der Ober-Italiener, dem Bleuè einig franz. Dialekte zusammen.

\*\*) Durch eine Menge von Nüancen hindurch ist vom Ober-italienischen Blué (was am besten mit Bläueli übersetzt wird) das Wort Pluditschi und Pluderen entstanden.

\*\*\*) Rolle heisst ein kugeliges Glöckchen, in welchem ein freiliegender Stein die Töne hervorbringt, wenn das Glöckchen gerüttelt wird. Von Rolle hat sich wahrscheinlich der deutsche Schriftnamen Trollblume gebildet und aus diesem, meint Haller, habe Linné Trollius gemacht. Diess ist nicht unwahrscheinlich. Aber Haller scheint die Ableitung des Worts Trollblume nicht gekannt zu haben.

- Schmeerkraut (Rheinwald) *Hieracium albidum*.  
 Schneeberger (Brättigau u. a. O.) *Arnica montana*.  
 Schneeglöcklein (d. G.) *Crocus*.  
 Schneiderin (Rheinwald) *Lychnis diurna*.  
 Schnittlauch (d. G.) *Allium foliosum*.  
 Schwelch (d. G.) *Viburnum Lantana*.  
 Schweinbohne (d. G.) *Faba vulgaris*.  
 Scuserla (Bergell) *Rhododendrum*.  
 Seifenkraut (d. G.) *Saponaria officinalis*.  
 Seve (d. G.) *Juniperus Sabina*.  
 Spadonis (d. G.) *Amelanchier*.  
 Spanische Feige (d. G.) *Opuntia*.  
 Sparsen (d. G.) *Asparagus officinalis*.  
 Spiess (Herrschaft) *Scilla bifolia*.  
 Spitzbeere (d. G.) *Berberis vulgaris*.  
 Stechapfel (d. G.) *Datura Stramonium* und  
*Dipsacus sylvestris*.  
 Steineiche (d. G.) *Quercus sessiliflora*.  
 Strescha (Bergell?) *Juniperus communis alpina*.  
 Suvig (rom.) *Sambucus nigra*.  
 Tammarken (d. G.) *Valeriana officinalis*.  
 Taubenspeck (Chur) *Silene inflata*.  
 Tausendguldenkraut (d. G.) *Erythræa Centaurium*  
 und noch öfter *Hypericum perforatum*.  
 Teghione (Bergell) *Pinus sylvestris*.  
 Teja (Bergell) *Tilia*.  
 Tei s. Teghione.  
 Tejone s. Teghione.  
 Teignespeln (d. G.) *Mespilus germanica*.  
 Thaublatt (Rheinwald) *Alchemilla vulgaris*.  
 Thymian (d. G.) *Thymus vulgaris*.  
 Tija (Puschlav) *Pinus sylvestris*.  
 Tockimilch (Rheinwald) *Euphorbia Cyparissias*.  
 Träubchen (Trübli) (d. G.) *Muscari racemosum*.  
 Tregel (d. G.) *Cannabis sativa*, *foem.*  
 Triembel (rom.) *Populus Tremula*.  
 Tross s. Drosseln.  
 Trunkelbeere (Davos und Klosters) *Vaccinium*  
*uliginosum* \*).  
 Tschereischa (rom.) *Cerasus*, fr.  
 Tscherschè (rom.) » arb.  
 Tschöcklein (kleine Artischoke) (Chur) *Carlina*  
*acaulis*.  
 Tulipane (d. G.) *Tulipa*.  
 Türken (d. G.) *Zea Mays*.  
 Türkenbund (d. G.) *Lilium Martagon*.  
 Ulm (rom.) *Ulmus campestris*.  
 Ulme (d. G.) *idem*.  
 Vanillenblümchen (d. G.) *Orchis nigra*.  
 Veilchen (Veieli) (d. G.) *Mathiola incana* R. B.  
 Viez (Domleschg u. Puschlav) *Abies pectinata*.  
 Weizen (d. G.) *Triticum vulgare*.  
 Wasserschwelch (d. G.) *Viburnum Opulus*.  
 Wegerich, breiter (d. G.) *Plantago media*.  
 » schmaler (d. G.) *Plantago lanceolata*.  
 Weissdorn (d. G.) *Cratægus Oxyacantha*.  
 Weisstanne (d. G.) *Abies pectinata*.  
 Wermuth (d. G.) *Artemisia Absinthium*.  
 Wicke (d. G.) *Vicia sativa* und *Lathyrus latifolius*.  
 Wildfräuleinkraut (d. G.) *Achillea moschata*.  
 Wohlverleih (d. G.) *Arnica montana*.  
 Wollkraut (d. G.) *Verbascum thapsiforme*.  
 Zeitlose (d. G.) *Colchium autumnale* und *Crocus*.  
 Ziegerkraut (Maienfeld) *Euphrasia officinalis*.  
 Ziernüsslibaum (d. G.) *Pinus Cembra*.  
 Zuondra (Bergell und Engadin) *Pinus sylvestris*  
*montana*.  
 Zuvig s. Suvig.  
 Zwetschgen (d. G.) *Prunus domestica*.

\*) Ist hier nicht eine Verwechslung mit der Rauschbeere (*Empetrum nigrum*) vorgegangen?

## REGISTER.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Achillea	72	Anthericum	130	Atropa	99	Campanula	93
Acer	48	Anthoxanthum	136	Avena	141	Campanulaceæ	91
Acerineæ	48	Anthriscus	66	Azalea	95	Caprifoliaceæ	67
Achyrophorus	86	Anthyllis	51	Ballota	106	Capsella	41
Aconitum	36	Antirrhinum	100	Balsamineæ	50	Cardamine	38
Actaea	37	Apargia	86	Barbarea	37	Carduus	76
Adenostyles	70	Apocyneæ	95	Bartsia	102	Carex	133
Adonis	35	Aposeris	86	Bellis	71	Carlina	76
Aegopodium	65	Aquilegia	36	Bellidiastrum	71	Carum	65
Aethionema	41	Arabis	38	Berberideæ	37	Caryophylleæ	43
Aethusa	65	Araliaceæ	64	Berberis	37	Castanea	120
Agrimonia	57	Arctium	76	Betonica	107	Catabrosa	139
Agrostis	141	Arctostaphylos	94	Betula	121	Celastrineæ	50
Aira	140	Arenaria	46	Betulineæ	121	Celtis	120
Ajuga	106	Aristolochieæ	119	Bidens	71	Centaurea	78
Alchemilla	57	Armoracia	41	Biscutella	41	Cephalanthera	125
Alisma	123	Arnica	71. 74	Blitum	115	Cephalaria	70
Alismaceæ	123	Aronicum	74	Blysmus	133	Cerastium	47
Allium	128	Arrhenatherum	141	Boragineæ	103	Cerasus	55
Alopecurus	137	Artemisia	73	Botrychium	144	Cerinthe	103
Alnus	121	Arum	124	Brassica	39	Ceterach	143
Alsine	46	Asarum	119	Briza	140	Chærophyllum	66
Alsineæ	45	Asclepiadeæ	95	Bromus	133	Chamorchis	127
Alyssum	40	Asparagus	127	Bryonia	59	Chelidonium	37
Amaranthaceæ	115	Asperugo	104	Bupleurum	65	Chenopodeæ	115
Amaranthus	115	Asperula	68	Buxus	119	Chenopodium	115
Anagallis	109	Aspidium	144	Cacalia	70	Cherleria	46
Anchusa	104	Asplenium	144	Calamagrostis	142	Chondrilla	87
Androsace	113	Aster	70	Calamintha	107	Chrysanthemum	72
Andropogon	137	Astragalus	53	Callaceæ	124	Chrysocoma	70
Anemone	34	Astrantia	64	Callitriche	60	Chrysosplenium	64
Angelica	65	Athamantia	65	Calluna	94	Cichoraceæ	86
Antennaria	74	Atragene	33	Caltha	36	Cichorium	86
Anthemis	71	Atriplex	115	Camelina	41	Cineraria	75

	Seite		Seite		Seite		Seite
Circaea	60	Daucus	66	Euonymus	50	Helianthemum	42
Cirsium	77	Datura	99	Eupatorium	70	Helleborus	36
Cistineae	42	Delphinium	36	Euphorbia	119	Hemerocallis	130
Cistus	42	Dentaria	39	Euphorbiaceae	119	Hepatica	34
Clematis	33	Dianthus	43	Euphrasia	102	Hieracleum	66
Clinopodium	108	Digitalis	99	Fagus	120	Herminium	125
Colchicaceae	128	Digitaria	137	Festuca	138	Hesperis	39
Colchicum	128	Dicotyledones	33	Ficaria	36	Hieracium	89
Colutea	53	Dioscoreae	127	Ficus	120	Hippocrepis	54
Comarum	57	Diplotaxis	40	Filago	74	Hippophae	119
Compositae	70	Dipsaceae	69	Filices	143	Hoccus	141
Conium	67	Dipsacus	70	Fragaria	56	Holosteam	47
Convallaria	128	Dorycnium	52	Fraxinus	95	Homogyne	70
Convolvulaceae	99	Draba	40	Fumaria	37	Hordeum	137
Convolvulus	99	Dracocephalum	108	Fumariaceae	37	Horminum	108
Conyza	71	Drosera	43	Gagea	129	Humulus	120
Corneae	67	Droseraceae	43	Galanthus	130	Hutschinsia	41
Cornus	67	Dryas	55	Galeobdolon	106	Hyosciamus	99
Coronilla	54	Echinochloa	137	Galeopsis	106	Hypericum	48
Corydalis	37	Echinospermum	104	Galium	68	Hypericineae	48
Corylus	120	Echium	104	Gaya	65	Hypochaeris	86
Cotoneaster	58	Elatine	48	Genista	51	Impatiens	50
Crassulaceae	61	Eleagneae	119	Gentiana	95	Imperatoria	66
Crataegus	58	Elymus	137	Gentianeae	95	Inula	71
Crepis	87	Elyna	136	Geraniaceae	49	Iris	131
Crocus	130	Empetreae	119	Geranium	49	Jasione	91
Cruciferae	37	Empetrum	119	Geum	56	Jasmineae	95
Cucurbitaceae	59	Epilobium	60	Gladiolus	131	Juncagineae	123
Cupuliferae	120	Epipactis	125	Glechoma	106	Juncaceae	131
Cuscuta	99	Epipogium	127	Globularia	114	Juncus	131
Cyclamen	109	Equisetaceae	142	Glyceria	139	Kernera	111
Cynanchum	95	Equisetum	142	Gnaphalium	73. 74	Koeleria	139
Cynoglossum	105	Erica	94	Goodyera	124	Kobresia	136
Cynosurus	139	Ericaceae	94	Gramineae	136	Knautia	69
Cyperaceae	132	Erigeron	71	Gratiola	100	Labiatae	105
Cyperus	133	Eriophorum	133	Grossularieae	59	Lactuca	87
Cypripedium	127	Eritrichium	105	Gymnadenia	125	Lamium	106
Cytisus	51	Erodium	49	Gypsophila	44	Lampsana	86
Ccackia	130	Erucastrum	40	Halorageae	60	Lappa	76
Dactylis	139	Eryngium	64	Hedera	64	Laserpitium	66
Danthonia	140	Erysimum	39	Hedysarum	54	Lathyrus	55
Daphne	118	Erythraea	98	Heleocharis	132	Leguminosae	50



	Seite		Seite		Seite		Seite
Lemna	124	Melitis	108	Oxyria	117	Prunella	108
Lemnaceæ	124	Mentha	107	Papaver	37	Prunus	55
Lentibulariæ	108	Menyanthes	98	Papaveraceæ	37	Pteris	143
Leontodon	86	Mercurialis	119	Parietaria	119	Pulicaria	71
Leontopodium	86	Meum	65	Paris	127	Pyrethrum	72
Leonurus	106	Milium	137	Parnassia	43	Pyrola	95
Lepidium	141	Molinia	140	Paronychieæ	59	Pyrolaceæ	95
Libanotis	65	Mœhringia	46	Pastinaca	66	Pyrus	58
Ligustrum	95	Molopospermum	67	Pedicularis	100	Quercus	120
Lilium	130	Monochlamydeæ	115	Petasites	70	Ranunculaceæ	33
Limodorum	125	Monocotyledones	123	Peucedanum	66	Ranunculus	35
Linaria	100	Monotropa	95	Phaca	53	Raphanus	40
Lineæ	48	Montia	59	Phleum	136	Reseda	42
Linosyris	70	Mulgedium	88	Phragmites	142	Resedaceæ	42
Linum	48	Muscari	129	Physalis	99	Rhamneæ	50
Linnæa	67	Myosotis	105	Phyteuma	91	Rhamnus	50
Listera	124	Myricaria	60	Phytolacca	116	Rhinanthaceæ	100
Lithospermum	104	Myriophyllum	60	Pimpinella	65	Rhinanthus	101
Lloydia	130	Najadeæ	123	Pinguicula	108	Rhodiola	61
Lolium	137	Narcissus	130	Picris	87	Rhododendrum	94
Lonicera	67	Nardus	137	Plantago	114	Ribes	59
Loranthaceæ	68	Nasturtium	37	Plantagineæ	114	Rosa	58
Lotus	52	Neottia	125	Plathanthera	127	Rosaceæ	58
Lunaria	41	Nepeta	107	Plumbagineæ	114	Rubiaceæ	68
Luzula	131	Neslia	42	Poa	140	Rubus	56
Lychnis	45	Oenothera	61	Polemoniaceæ	98	Rumex	116
Lycopodiaceæ	145	Omalothea	74	Polemonium	98	Sagina	45
Lycopodium	145	Onagrariæ	60	Polygala	43	Salicineæ	121
Lycopus	105	Onobrychis	54	Polygaleæ	43	Salix	121
Lysimachia	109	Onopordum	76	Polygoneæ	116	Salvia	105
Lythrarieæ	60	Ophrys	127	Polygonum	117	Sambucus	67
Lythrum	60	Oporinia	86	Polypodium	143	Sanguisorba	58
Maianthemum	128	Orchideæ	125	Polystichum	144	Sanicula	64
Malachium	47	Orchis	125	Pomaceæ	58	Santalaceæ	118
Malaxis	127	Origanum	108	Populus	121	Saponaria	45
Malva	48	Ornithogalum	129	Potamogeton	123	Sarothamnus	50
Malvaceæ	48	Orobanche	103	Portulaca	59	Saussurea	76
Marrubium	106	Orobus	55	Potentilla	56	Saxifraga	62
Medicago	51	Orthopogon	137	Poterium	58	Scabiosa	69
Melampyrum	100	Oxalideæ	50	Prenanthes	88	Schœnus	132
Melica	140	Oxalis	51	Primula	109	Scilla	129
Melilotus	52	Oxycoccus	94	Primulaceæ	109	Scirpus	133

	Seite		Seite		Seite		Seite
Scleranthus	60	Sparganium	124	Thymeleæ	118	Urtica	119
Scolopendrium	144	Specularia	93	Thymus	107	Urticæ	119
Scorzonera	87	Spergula	46	Tilia	48	Utricularia	109
Scrophularia	100	Spiraea	55	Tiliacæ	48	Vaccinium	94
Scutellaria	108	Spiraeacæ	55	Tofieldia	128	Valeriana	69
Sedum	61	Stachys	107	Torilis	66	Valerianæ	69
Sempervivum	62	Statice	114	Tozzia	100	Valerianella	69
Senecio	75	Stellaria	47	Tragopogon	87	Veratrum	128
Serratula	76	Stipa	142	Trientalis	109	Verbascum	99
Seseli	65	Streptopus	127	Trifolium	52	Verbena	108
Sesleria	139	Succisa	69	Triglochin	123	Verbenacæ	108
Setaria	137	Swertia	98	Trinia	64	Veronica	102
Sherardia	68	Symphytum	104	Triticum	137	Viburnum	67
Silans	65	Tamariscinæ	60	Trollius	36	Vicca	54
Silene	44	Tamus	127	Tulipa	130	Vinca	95
Sinapis	40	Tanacetum	73	Tunica	44	Viola	42
Sisymbrium	39	Taraxacum	87	Turritis	37	Violaria	42
Smilacæ	127	Tetragonolobus	53	Tussilago	70	Viscum	68
Solanæ	99	Teucrium	106	Typha	124	Vulpia	139
Solanum	99	Thalamiflores	33	Thyphacæ	124	Willemetia	87
Soldanella	109	Thalictrum	33	Ulmacæ	120	Woodsia	144
Solidago	71	Thesium	118	Ulmus	120	Zannichellia	124
Sonchus	88	Thlaspi	41	Umbellifera	64	Zollikoferia	87

## Berichtigungen.

## Vergessen wurden :

1. *Salix reticulata* L., die in der alpinen Region durch ganz Rhätien häufig vorkommt.
2. *Salix Caprea* L. Findet sich häufig in der Ebene bei Chur, von wo sie in die montane Region hinauf steigt und dort nicht selten neue Anwüchse bildet, wo Waldbrände statt gefunden haben. — Frühling.
3. *Salix grandifolia* Ser. In subalpinen und alpinen Wäldern. Ich traf diese Weide am Wege von St. Moritz nach der Celleriner-Alp an.

## Druckfehler.

Auf pag. 5	Zeile 18	ist zu lesen	propugnata.
— 7	— 18	—	im Philanthropin.
— 33	— 9	—	C. Flammula.
— 54	— 18	—	Coronilla.
— 55	— 29	—	octopetala.
— 64	— 17	—	Sanicula.
— 65	— 19	—	Silans.
— 68	— 11	—	Sherardia.
— 79	— 18	—	pilis.
— 95	— 19	—	Cynanchum.
— 128	— 28	—	capsuliferum.

Siegfried


II 14



- |   |                      |       |            |
|---|----------------------|-------|------------|
| 1. Die Pflanzen Graubündens   | <u>A. Moritz</u>     | 3 Bd. | Taf. 1-6   |
| 2. monstruosités végétales  | <u>A. Delandolle</u> | 5 "   | Taf. 1-7.  |
| 3. Planches relatives aux Genres <u>Gästnera</u> Lam.<br>par M. Bojer | <u>A. Delandolle</u> | 10 "  | Taf. 1. 2. |
| 4. Die Corsien der Schweiz  | <u>C. Nägeli</u>     | 5,    | Taf. 2-7.  |
| 5. Über den Stein-Lichenpilz  | <u>Brünnner</u>      | 7,    | Taf. 1. 2. |
| 6. Die neuen Algensysteme   | <u>C. Nägeli</u>     | 9,    | Taf. 1-10  |
| 7. Gattungen einzelligen Algen  | " " "                | 10,   | Taf. 1-8.  |



Tab.1.















CELTIACOLEA BACCATA.




























This volume has been digitized,  
and is available online  
through the  
Biodiversity Heritage Library.  
For access, go to:  
[www.biodiversitylibrary.org](http://www.biodiversitylibrary.org).

